

ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS

DE

F O R M A T O
F O E T V

Liber Singularis.

ADRIANI SPIGELII
AD LIBROS DE
FORMATO FOETV

Præfatio.



Vi humani foetus Anatomen hæctenus ^{Vilius} ^{libri.} administrarunt, aut de eodem commentarios posteris in lucem protulerunt, tantum eas fere partes, quarum beneficio foetus in utero augetur atque nutritur, quæque à partu majore iam reddito homine obliterantur aut vix amplius comparent, examinandas sibi propofuerunt; cum tamen aliæ sint in foetu partes, ex quibus ejus corpus componitur, plurimæ, quæ fi quo tempore ex utero egreditur foetus, cum illis partibus, quæ in perfectis hominibus, natuque grandioribus vifuntur, comparentur, multum discriminis habere cernuntur, quæque in tanta varietate morborum, quibus infantes & pueri obnoxii funt, in tanto variarum corporis actionum discrimine, quod in primis ætatibus annisque teneris obfervare licet, non minus deberent infpici, quam quæ illico post nativitatem ob ufus vel actionis interitum auferuntur & obliterantur. Bonus Agricola bonusque colonus non folum quomodo tritici granum prima germina radicesque tenellas ad fui nutritionem, poftquam terræ injectum eft, edat, fcire cupit, aut quomodo & quando ad fpicas proveniat; verum etiam ut à primo germine in terra mutetur, ut producat calamos, antequam fpicas proferat, ad irrigandos commodo tempore agros, ficcitates comparandas, nebulas arcendas, quo frumentum habitius & copiofius futuræ melli alat ac nutriat: fic egregii & prudentis medici eft, ac naturalis fcientiæ cupidi, præter illas partes, quibus foetui alimentum à matre fuppeditatur, etiam alias diligentius intueri, quæ aliter fe habent ac in perfecto homine natuque grandiore videntur, &

nos

INDEX CAPITVM
HVIVS LIBRI.

CAP. I. De difpofitione partium foetus,	Pag. 1
II. De partibus externis propriis feu fecundinis,	ibid.
XII. De Placenta, & coryledonibus,	ibid.
IV. De membranis fetum involventibus, & primo de chorio,	3
V. De allantoide,	4
VI. De amnio membrana,	5
VII. De fudore in amnio contento,	6
VIII. De cutis fordibus,	ibid.
IX. De umbilico, feu vafis umbilicalibus,	7
X. De præfione umbilici,	9
XI. De partibus internis propriis, ac primum de vafis umbilicalibus,	11
XII. De ftructura vaforum thoracis in fetu,	14
XIII. De excrementis foetus internis,	15
XIV. De partibus communibus, earumque difpofitione,	18
XV. De cute,	ibid.
XVI. De mammillis,	19
XVII. De oculis,	ibid.
XVIII. De cæteris partibus compofitis internis,	ibid.
XIX. De offibus,	21
XX. De partus tempore, modo & caufa,	27

nos ad necessariam cognitionem infantis naturæ perquam admirabilis deducere possunt, ut homines in hac tenella ætate constitutos à consuetis morbis quam maxime fieri potest tueamur, sanumque corpus atque decorum alamus juventuti. Quocirca omnes fœtus partes considerabimus. Primo autem eas, per quas fœtus in utero augetur atque nutritur. Secundo illas, per quas jam ex utero in lucem mature egressi, infantis & pueri naturam induit, ut plurimarum mutationum causam, quibus in primis ætatibus homo variat pene omnes corporis actiones, pernoscere queamus. Quoad ordinem sciendum est, me potius elegisse eum, quem nonnulli Anatomici observarunt, licet minus philosophiæ legibus consentaneum, quam eum qui à Clarissimo Viro Fabricio ab Aquapendente fuit observatus. Hic enim & fœtus & alterius cujuslibet organi humani corporis particulas singulas simpliciores per dissectionem examinans, figuram prius, connexionem, situm, numerum, & alia in partibus indaganda in conspectum profert, deinde artificiosa ratione ac methodo actiones totius organi declarans, mox usum singularum organi partium, deinde connexionis, figuræ, situs, ac numeri causas subjungit. Sic Arist. in Hist. de Animalibus, naturam, quomodo se in animalibus habeat, enarravit; deinde in cæteris libris de Partibus, motu ac generatione animalium, causas eorum, quæ seorsim in historiis enarrata sunt, diligenter & artificiosè recensuit. At nos præsupponentes actionem fœtus in utero esse nutritionem & augmentum, ex utero vero egressi perfectionem hominis, enarratis partium singularum historiis, statim de actione, earum & usu verba faciemus: sperantes sic brevitati & legentium utilitati & memoriæ consulturos nos melius.

ADRIA

ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS,

DE

FORMATO FŒTV

LIBER SINGULARIS.

CAPVT I.

De partium in fœtu divisione.



Partes igitur in fœtu inspicendiæ, aliæ propriæ sunt, aliæ communes. Voco partes fœtui proprias, quarum beneficio fœtus actio in utero exercetur, quæque post partum vel evanescent, vel auferuntur, vel nullius sunt usus amplius. Communes vero dico, quas post partum infans habet, & quæ nequam abolerentur; sed grandiores fiunt crescente corpore, vel mutantur in substantia & qualitate. Rursus propriæ fœtus partes, aliæ externæ sunt, hoc est, extra fœtum corpus conspicuæ; aliæ internæ, seu intra corpus positæ. Inter externas numerantur, carne quædam moles (quam recentiores placenta vocant) vasa, membranae, & excrementa: inter internas, vasa & excrementa tantum. Communes autem partes, tum internas, tum externas, in tertia parte considerabimus.

CAPVT II.

De partibus externis propriis, seu secundinis.



Taquam ab externis partibus propriis exoritur, dicimus illis quatuor enumeratis commune nomen à Græcis Latinisque datum fuisse: etenim Græci eas appellant τὰ δευτέρα & τρίτα; Latini ad eorum imitationem secundas & secundinas; quod in partu primo quidem fœtus, deinde vero hæc omnes partes excludantur, tanquam secunda vice. Dicuntur quoque à veteribus χημειον & χημια, quod sint instar spatii & alvei, quo fœtus in utero concluditur: verum de hac voce plura, ubi de chorio membrana egero.

CAPVT III.

De placenta, & coryledonibus.



Aranea hæc moles ab Hippocrate lib. de Nat. pueri caro simpliciter nominatur, à recentioribus anatomicis placenta; quod, postquam in lucem fœtus prodiit, umbilico annexa id eduli genus referat, quod vulgus placenta vocat. Obstetricibus nonnullis hodie quoque dicitur secundina, quod hæc caro umbilico annexa & chorio, secundarum maximam partem constituat. Constat etiam apud Gal. lib. 11 de sem. veteres quosdam coryledonas seu acetabula appellasse, visumque nonnullis posterioribus fuit, apud Arist. lib. 11 de Gen. animal. nil aliud per coryledonas intelligi: ubi inquit animalia utrinque dentata, quæ loco unius magnæ venæ per uterum dispersæ multas venulas habent ac frequentes, etiam habere in utero vocatas coryledonas, parte convexa ad uterum, cava vero fœtum versus positas; has ubi fœtus accrescit atque perficitur, minores reddi; obliterari vero, ubi jam perfectus est fœtus, atque in ea, veluti mamma, reponi alimentum à natura sanguineum pro fœtu, & hoc alimentum paulatim ex multis collectum quasi tuberculum, vel φλεγματιον evadere, & sic fieri corpus acetabu-

AA

acetabu-

acetabulorum. Sed ex hoc Arist. loco non intelligo cotyledonas eum appellasse hanc carnem vel eas carunculas, quas in ovillo fœtu & vaccino observare semper licet, quales Galenus agnovit indignas cotyledonis nomine, dum eas lib. xv. de Vsu partium cap. iv. nominat carnes viscosas, veluti pinguedinem quandam; sed capita extrema venarum uteri, per quæ fœtus in utero alimentum sanguineum capere solet, mulieribusque singulis mensibus expurgari consuevit: hæc enim vasorum oscula intumescunt ubi fœtus in utero alimentum capere incipit, augescente fœtu augentur, maturecente vero paulatim abolentur; quod huic carnes molli non ita accidit, neque enim evanescit, cum insigni hac mole carnea substantia trahatur ex utero post partum una cum secundinis. Et quamquam in ovillo fœtu hæc eadem caro cavitate aliquam habere videatur, quæ fœtum respicit, convexam vero qua utero connectitur; attamen in aliis animalibus gravidis hæc carnis hujus figura non ita apparet; vicius enim fœtus adhæret utero carunculis multis, quæ fungos figurant (quos sponzolos vulgus hic Patavii vocat) quæ non habent partem concavam quemadmodum ea, quæ cotyledonis nomine digna sunt. Nam *τοῖς λευκοῖς* Græci nuncupantur cuidam mensuræ generis insigni cavitate præditi similes, quod & corylam & *ἐξοσφᾶ* nominabant, Romani acetabulum, ut herbam in calidam regionum muris nascentem, quam Romæ umbilicum Veneris vocant; similiter coxendicis cavitatem in humanis ossibus, cui caput fœmoris inferitur; præterea cavitates quasdam in polyporum cirrhis seu brachiis, quibus validissime corpus quoddamque obvium amplexantur ac figunt. His igitur cum vasorum uteri oscilla maxime similia sint, in quibusdam domesticis quadrupedibus, ut ove, vaccæ, capræ, quas antiquos & priores Anatomicos prius quam mulierem inspersisse credibile est, quod ad cibum quotidie mactarentur, idcirco cotyledones & acetabula vasorum uteri oscilla appellata sunt licenter etiam in muliebri utero, etsi in hoc ora vasorum nullam cavitatem habeant; etenim interna uteri superficies in non gravidis mulieribus lavis & lubrica est, præterquam quo tempore menses fluunt, vel fœtum continet & alere incipit, siquidem tunc asperior & inæqualior ea sit parte, qua utero carnea hæc substantia adhærescit, & hanc inæqualitatem tunc constituunt ora vasorum uteri, cum sanguine turgente. Quocirca de capitibus vasorum uteri, non de carnea substantia, & Arist. loc. cit. & Hippoc. Aphor. xlv. lib. v. sunt intelligendi, si aliquando cotyledonum uteri mentionem faciunt. Etenim Hipp. de mulieribus gravidis inquit: *Quæcumque mediocri corporis habitu prædita secundo aut tertio menses sine causa manifesta abortiunt, hæc acetabula uteri plena mucoris sunt, neque præ pondere fœtum continere possunt, sed abortiuntur.* Docens enim Hipp. causam, ob quam mulieres mediocri habitus secundo vel tertio mense absque febre, erysipelate, casu, percussione, saltu, vel alia evidenti causa abortiunt, ait id contingere propter fines venarum in uteri interna superficie infarctas vel obstructas pituitosa materia, quibus finibus cum valide annexi nequeant extremitates venarum per placentam dispersarum, evenit ut pondere suo fœtus facile fines vasorum umbilicalium à suis cotyledonibus abrumpat, atque una prohibetur, ne copia & qualitate convenientis alimentum fœtui suppedietur, præsertim grandiori, unde necesse est fieri abortum. Porro caro hujus placenta lenis parenchymati prorsus similis esse videtur, mollis, rubra, ac nonnihil ad nigredinem vergens, innumeris ^a referta venis & arteriis, quæ postea per chorii substantiam diffeminatæ ^b ramos grandiores constituunt, & in ^c umbilicalem venam & arteriam migrant; harum venularum ^d finibus fundo uteri firmissima & inæquali basi annectitur placenta, fœtusque à matre sibi sumit alimentum sanguineum; sed an arteriarum oscula cum uteri arteriarum oculis conjungantur, uti scripsit Gal. lib. de formato fœtu & alii post eum celebres Anatomici, ab Arantio insigni olim Bononiæ Anatomico negatum est. Censet enim hic, fœdi tantum per placentam in minutissima filamenta: cui viro ego quoque assentior, sed de hoc plura cum de vasis umbilicalibus agam. Probabo enim sanguinem vitalem & spiritum nequaquam fœtui à matre largiri; monstraboque postea alium harum arteriarum. Annectitur autem hæc caro, seu adnascitur internæ uteri superficiei & primæ membranæ seu primo involucri, quod dromum appellant nonnulli; neque ubique, sed modo in dextro, modo in sinistro latere, & in utroque magis posterius, quam antè: unde animadvertendum, an fœtui masculo dextro,

Cotyledonum
numera, ca-
lorum uteri
oscula præ-
sentem esse
tunc.

Qualis pla-
centæ caro.

Auctoris opi-
nio de con-
suetudine co-
rum fœtus
cum matre.

dextro, fœminæ in sinistro latere, juxta Hippoc. sententiam Aphor. xlviii. lib. v. ubi ait, *fœtus, mares quidem in dextris, fœminas in sinistris magis gestari.* Cæterum in usu hujus placente non convenio cum Arantio: assignat enim huic insignem actionem depurandi sanguinem, qui ad fœtum fertur; quæ sane actio tam longe ab hac carne abesse mihi videtur, quam hic egregius vir à veritate. Duæ enim sunt rationes, quæ maxime contra hanc opinionem pugnant: & prima est, quod si actionem depurandi sanguinem hæc caro obtinisset, cum tria à sanguine soleant plerumque segregari, bilis scilicet, pituita, atque serosus humor; quærendum est ab ipso, quemnam humorem putet ex tribus placentam evacuare; an, quia maxime videatur continere melancholicos humores, & substantia hujus parenchymati lenis similis sit, ut superius dixi, melancholicam: at hæc in fœtu fœtus segregatur. An bilem, aut serosum humorem: at ille in folliculo sellis in fœtu depuratur; hic vero, in renibus. Secunda ratio est, si sanguis crassus & faculentus proprietate substantiæ segregaretur, esset utique necesse, ut in omnibus animalibus, quorum fœtus hanc carnem habent, hæc caro ejusdem esset coloris & substantiæ, cujus est ipse lien; sed in ovillo fœtu hæc substantia multo est liene candidior, viscosior & pinguior. Idcirco alium coactus sum invenire usum, adhibita prius distinctione nominis carnis, quæ intelligimus totam massam carneam, prout est ex venis, arteriis, & carne parenchymate constituta, vel parenchyma tantum, hoc est, carnem illam, quæ interjacet venulas & arteriolas; dicimus itaque late sumpto carnis nomine, naturam eam in humano fœtu & aliorum quorundam animalium fabricasse ad firmiorem fœtum annexum cum utero; parenchyma vero seu carnem, quæ interjacet vasa, ad commodiorem annexum, tutelam, & divisionem vasorum; itaque verus usus est, ut sit radix fœtus, per quam sumat à matre alimentum, & sitque tutum conceptaculum & veluti menterium alterum fœtus, quod à matrice tanquam terra trahit alimentum. Dicere tamen posset aliquis, equinus fœtus caret hac carne, & tamen firmiter annectitur utero; respondeo alium esse uterum humanum, quam equinum, caprinum, vel ovillum. Nam interna hujus superficies non multis vasorum finibus in unum locum congregatis, ut muliebri, caprillis, ovillis, & equinis præditi est; sed grandiores per uterum dispersas & rariores habet venas; prout igitur vasa in diversis animalium uteris interius sunt constituta, ita etiam extremitates vasorum umbilicalium fœtus erant constituendæ, vel simpliciores & majores & sine carnis auxilio annectendæ, vel in multiplicibus ramulis findendæ & carnis ope cum utero copulandæ. Quoniam igitur uterum muliebri multis vasorum finibus præditi est interius, annectitur fœtus humanus utero mediante hac placenta, cujus quidem tantum venarum extremitates internæ uteri superficiei alligantur; parenchyma vero multitudine extremitates venarum & arteriarum fulcet, fovet atque tuetur: quin etiam præstat, ut venula recia suis omnibus finibus vasorum uteri jungantur, ut recta ferri sanguis ad fœtum ab utero semper queat: alioquin si vasorum extremitates hac substantia carnea caruissent, in se ipsas concidissent, augescenteque & utero & fœtu periculum fuisset, ne tam exigui fines vasorum dilacerarentur.

Arantio placenta
de usu placen-
te præcipitur.
& respicitur.

Auctoris opi-
nio de signa pla-
centæ.

CAPUT IV.

De membranis fœtum involventibus, & primo de Chorion.

Sequuntur membrane fœtum involventes: quarum duæ, fœtum totum involvunt, ut chorion & amnion; una vero, partem fœtus tantum tegere videtur, ut allantoides. Post carnem ^a chorion membrana conficitur, quam Latini recentiores secundam passim interpretantur. Sane apud Hipp. lib. de morbis mulierum, & aliis in locis per chorion nulli aliud quam ^b vesper seu secundina intelligitur: postquam enim Hippoc. docuisset, quomodo mulier & à secundina deinceps liberari possit, & quid pariat ubi non statim à partu exierit, subiungit; Si mulieri chorion in utero relictum fuerit, hoc sic contingit. Si per vim ruptus fuerit umbilicus, aut per imperitiam ejus quæ umbilicum fecit, prius quam chorion ex utero exierit, fœtus fuerit uterum sursum retrahit ^c vesper, id est, secundam, utpote lubricam & mollem, eamque artissime complectitur. Idem Hippoc. jubet Aph. xliix. lib. v. Ad secundas deturbandas,

a. T. II. B.
B. E. III.
C.C.C. IV.
A.A.A.A.
A.VI. R.R.
R.

deturbandas, sternutatorio appposito, nares et os comprimere; *ἵκεται* vocabulo usus. Et in epidemiciis lib. 11, sect. 5, *ῥωμῆς καλῶς*, sive purgationem fieri sternutatorio naribus appposito dicit. Ex quibus patet, *ῥωμῆς* & *ἵκεται* unum idemque esse, ac duplici significatione accipi apud scriptores: una, pro secundis proprie dictis, hoc est, omnibus partibus externis foetis; altera vero, & propria, pro una ex tribus membranis, quam nunc examinandam suscepimus. Apud Arist. lib. 11 de Gen. cap. 11, & membranis & secundis videtur distincta vox chorii, dum chorion & *ὀψίλη* dicit inter foetum & uterum positam esse; quasi per chorion intelligere velit massam carneam annexam cum sua membrana chorionem proprie dicta, & arteriis venis & arteriis prædita: per membranas vero allantoidem & amnion tunicas exangues, & ideo membranarum nomine dignas. Dicitur autem chorion hac prima membrana, quoniam teste Hippoc. per ipsam nutrimentum & sanguis *ῥωμῆς*, id est, permeat ad foetum; vel uti putat Stephanus Atheniensis in commento super lib. Gal. ad Glauconem, quia ad modum chori venæ & arteriæ in hac membrana congregantur; vel etiam, ut cæteris placuit Anatomicis, quod sit chorion, hoc est, exiguus locus, quo foetus concluditur. Est autem chorion membrana crassa, alba, multis venarum & arteriarum ramis in placenta desinentibus in minimos furculos insignita; parte qua foetum respicit interna, lubrica ac levis; qua vero uterum spectat, & placenta carneæ annectitur, inæqualior. Vtus hujus membranæ est, ut non modo foetum undequaque tegat ac velet; sed etiam ut radices venarum & arteriarum, seu fines vasorum umbilicalium tuto excipiat ac liget; & propterea crassam & duplicem eam fecit summum rerum Opifex. Est etiam externa parte inæqualis, ut placenta firmius connascere-
retur & adhereret; internâ, levis & lubrica, ne à subjæctis membranis tenuissimis separata, sua asperitate quidpiam damni iis adferret. Tribuunt nonnulli alium chorio usum, qui allantoidem in foetu humano reperiri negant, nempe urinam pueri supra amnion continendi, hoc est, inter id spatium, quod est inter chorion & amnion: Scribit enim Rufus Ephesius per urachum meatum urinæ similem humorem transfundi.

C A P V T V.

De allantoidæ.



Allantoidæ, chorio subjæcta membrana, nomen suum apud Græcos accepit, quod *ἀλλανξ* imitetur sua figura: nam hac voce Veteres tum farciminis quoddam genus, quod lucanicas vocat Apitius; tum intestinum nominabant. De hac autem membrana primo quaeritur, an in humano foetu reperitur? etenim negant contra Gal. & alios veteres doctissimi atque in anatomicis dissectionibus exercitatissimi viri, qui eam tantum in ovillo, vel vaccino, vel caprino foetu observasse se dicunt; putant idcirco veteres anatomicos horum animalium foetum pro humano nobis depinxisse. Et merito quispiam poterit conjicere, veteres caprinum vel ovillum, vel vaccinum, vel hujus generis alius animalis descripsisse, cum Theophilus in lib. de humani corporis fabrica, capite 119, docere unumquemque volens partes, quæ ad foetum spectant, & tres ejus tunicas, jubet dissecandam artificiose capram gravidam, & eam inspiciendam. Sic Aëtius tettrabib. 19, ferm. 19, inquit; Si quis diligentius speculari ea, quæ ad foetum pertinent voluerit, capram aut vaccam, aut cervam dissecare poterit. Horum igitur opinio uti nova est, digna certe, quæ ad examen revocetur, præsertim cum ad eam comprobendam nuper inveni in insignem Rufi Ephesii auctoritatem. Hic enim Gal. antiquior & ab eodem aliquoties cum laude citatus, lib. 1 de partium appellationibus, capite ultimo scribens de foetus humani partibus, & maxime de membranis, chori & amnion tantum meminit, & autopsia sua declarat, urinæ similem humorem in chorion transfundi, nulla facta allantoidis mentione. Reliqui porro omnes, qui hæcenus floruerunt, allantoidem humano foetui assignant, aut veterum opiniones aut celeberrimam auctoritatem secuti. Hac in tanta virorum clarorum disensione displicet me arbitrum factum esse, qui minime ut illi in anatomicis dissectionibus consueverim: tamen his ductus rationibus censeo, allantoidem in humano foetu reperiri. Prima, in humano foetu tanta est hujus membranæ necessitas, quanta in foetibus aliorum quadrupedum: non enim decebat

decebat tantum naturam urinam à sudoribus segregare, ac in proprio loco, quod est inter chorion & amnion collocare; sed & propria tunica tanquam conceptaculo continere, ne inter spatium quod est inter chorion & amnion satis amplum, per ambitum foetus, quemadmodum sudor, fluctuaret hoc & illuc in omnem partem, præsertim cum exiguae urinæ tam amplum & spaciosum locum dare, non videatur conveniens natura. Altera ratio est, quod Andreas Vesalius concivis meus in commentariis anatomicis vesicam quandam nobis depinxerit in humano foetu intestino similem, ex quo farcimina fiunt, inter chorion & amnion positam, qua urina foetus in utero coasservatur. Quod spectat igitur ad solutiones conceptuarum rationum, & ad eam primo, qua dicit allantoidem in dissectionibus non reperiri; admonendi sunt, se eam reperiuros, si à placenta prius in grvida muliere dissectionem aufuerint eo modo, quo ipse Vesalius; aliter certe propter membranæ summam tenuitatem abrumpi statim hanc membranam levissimum negotio contingit. Rufi autem Ephesii auctoritas quamquam apud me magni sit momenti; tamen tanti non est, ut Gal. auctoritati in hac re sit anteponenda, etsi enim Gal. nunquam gravidam secuerit, quod esset ejus temporibus lege vetitum humana corpora dissecare; tamen multos insignes anatomicos, qui homines secuerant, ut Herophilum secutus, quæ ipse ex anatome simiarum & aliorum quadrupedum non est assecutus, ex aliis fide dignis in suos retulit commentarios: sæpe etiam optimis rationibus ac demonstrationibus ductus, quæ ipse in dissectionibus humani corporis inspicere non potuit, credit, atque aliorum diligentiam fidem præfposuit, quemadmodum & in eo quod allantois in humano foetu reperitur. Veteres ovillum vel caprinum foetum plerumque descriperunt, non quod mulierem gravidam nunquam inspexerint; sed quod eam secandi non facili erat occasio, quodque præfati Anatomici antequam foetum humanum secuisent, in ovillo sepe prius exercuerint, ejusque membranis ea indiderint nomina, quæ ipsis convenire videbantur; unde factum est, ut allantois membrana nomen suum acceperit à farciminis vel intestini, ex quo farcimina fiebant, figura. Si enim allantois ovilla infleatur, plane lucanica farcimina imitatur; at humani foetus allantois, vesicam potius oblongam, quam farcimen vel oblongum intestinum refert: ut hac de causa lapsus Vesalius crediderit non huic vesicæ, sed chorio cum carne placenta inverso, sic ut eam undique complectatur, allantoidis nomen assignandum. Est autem allantois, membrana tenuissima, alba & mollis, in homine veluti in ovillo foetu exiguis admodum venis & arteriis ad nutrimentum prædita, inter chorion & amnion media, ea tantum parte tota conclusa, qua placenta cooperitur. Connectitur cum meatu uracho dicto, per quem & vesica urinam suscipit: hujusque munus est, urinam foetus à sudore separatam conservare.

C A P V T VI.

De amnio membrana.



Vltima tunica dicitur ab Empedocle & cæteris posterioribus Græcis *ἀμνιον* & *ἀμνιον*, quasi *ἀμνιον* *ὀψίλη*, id est, optima membrana, per metasthasim transposita una littera. Interpretes apud Gal. amiculum interpretantur, cum Grammaticis plerique *ἀμνιον* ab *ἀμνιον* nomen traxisse videatur, quod agnum sonat, quasi diceret agninam membranam; vel quod ut hæcenus multis visum est, mollis & candida sit instar agni; vel uti ego interpretor, quod primi Anatomici, agnium foetum spectantes priusquam humanum, agno proximam hanc membranam viderint, ac ipsum agnum per eam transluentem, sic ut nulla membrana circumdata esse videatur. Dicitur & à nonnullis conceptus amantia, & foetus velis; ab Arabibus, *abigas*. Est autem substantia hujus levis, alba, mollis, tenuis, translucens, pauculisisque exiguis venis & arteriis nutrita, totum foetum undiquaque vestiens, chorion tantum connata: facta non tantum ad tutelam foetus, more aliarum membranarum; sed ut aquam clariorem urinam atque ab ea separatam recipiat, quæ aqua nil aliud est, quam sudor, quem dum in utero hæret ferus, continuo per cutis spiracula admodum parula cutimque tenellam ob sanguinem, quo alitur, copioso sero abundantem large suppeditat. Hæc illa mem-

brana est, cum qua si forte contingat ut fœtus humanus prodeat in lucem, maxime circa caput vel aliam partem velatus, si mas sit, galea vocatur & *helm* à Germanis obstrictibus; si femina, vitta, indusium, seu camilia, ut Itali loquuntur. Putant vero fœtum cum capite hoc involucri vestito genitum, mira facturum, fortuna prospera in vita usurum, si eam comederit vel secum portarit, ab armorum injuriis tutum ubique fore: addita non ignobili superstitione vel potius insigni mendacio, ut si forte ab obstrictibus clanculum auferatur, magnis infortuniis obnoxium futurum & miseram vitam ducturum; quod, quam sit ridiculum credere, ipsa anatomie declarat. Sed quemadmodum nulla fabula, nulla superstitio, nullumque mendacium adest, non prius ex aliquo rei veritate originem traxit; sic etiam puto nonnullos olim existimasse velas aliquam in parte pueros hac membranâ longe magis miseram vitam traducturos, nam qui more cæterorum sine hoc velamine pariuntur: & recte quidem: nam infans cum amnio circa caput natos, puto sic nasci, vel propter robur membranæ, quam leirico infans, dum præparat egressum ex utero, perturbare commode & undique non potest; vel propter fœtus imbecillitatem, qui se ab hoc involucri expedire probe non valeat. Novi aliquando Matronam in Belgio & novæ meæ propinquam, quæ unnes filios & filias cum galea & vitta pepererat, singularique cura ac diligentia membranas aservaverat, ne ab obstrictibus auferrentur, sua omni prole numquam pubertatis annum attingente, quod admodum debiles nascerentur, orbatam.

CAPVT VII.

De sudore in amnio contento.

Porro aqua illa clara atque limpida, quæ copiosa undique fœtus corpus circumfluit, ac secundum, post urinam in allantoide contentam, excrementum est, inter externas fœtus partes proprias, non spernendos habet usus. Huic enim fœtus in utero innatus, non levior sit matri, utpote quæ & fœtum & aquam gestare debet, sed minus ponderis præbet acetabulis, quibus fœtus placenta annectitur, dum is suspensus est. Deinde, in movendo se & facilius movetur, & vertitur facilius ad os uteri, in tempore partus cum capite, quod aliquando fundum uteri versus habet fœtus. Tertio facilius fœtui ex membranæ exitus præbet amplo spatio à corpore semotis, & humore, quem continent, lubricis. Quarto, ante partum, jam ruptis membranæ, à fluente hoc humore per os & cervicem uteri cuncta loca irrigantur ac lubrica fiunt, ad facilitandum exitum fœtus ex utero. Cæterum sudorem ab urina segregatam voluit natura, non permixtum, ne cuti tenellæ aliquod damnum urinæ acrimonia inferret.

CAPVT VIII.

De cutis sordibus.

Post urinam & sudorem, sordes apparent cuti corporis inherentes: suntque tertium & ultimum excrementum, glutinosum crassumque, quod per cutis poros una cum sudoribus eductum, tamquam magis terreste cuti adhærescit: ita quoque cernimus, nobis sudantis crassiore excremento cuticulam obliniri, deinde ab induratis lineis abstergi. Putant recentiores usum hujus excrementi esse, ut hujus obstruptione cutis ab acrimonia, quam sudor circumfluens longo tempore sibi nonnihil acquisivit, vindicaretur. Sed mihi adhuc succurrit alius longe excellentior; ut scilicet vitales spiritus poris cutis nonnihil oculis ab hoc glutine conserventur, ne diffuant à magno calore, quem cogitur fœtus in utero sustinere; neve sanguis qui in partibus exterioribus tenuior est, dimanet ichoriosus, propter poros fœtus multo patentes iis, qui jam nati sunt.

CAPVT IX.

De umbilico seu vasis umbilicalibus.

NVe inter partes externas agendum restat de iis vasis, quæ Umbilicalia appellantur. Horum autem nomine intelligo id totum, quod ex media abdominis parte egressum, intestini formam adificiatur; neque aliud est, quam quatuor vasorum, & duarum scilicet artèriarum, & unius venæ & urachi connexus, per membranam à chorio delatam atque in formam funiculi ex multis funibus, vel ceræ candelæ ex multis parvis candelis contortus. Qui quia intestini effigiem refert, à multis obstrictis intestinum apud varios populos nominatur. Hippocrates, eoque posteriores Aristoteles & Galenus proprio nomine hanc partem fœtus, umbilicum appellant. Arist. lib. 11 de generatione animalium, cum dixisset, nonnulla animalia recta in uterum umbilicum tamquam radicem dimittere, addit; in de quibusdam & καὶ φάσιν, est autem umbilicus in putamine contenta vena, ut Gaza interpretatur. Per venas intelligit, & venas communes dictas, & artèrias; per putamen seu καὶ φάσιν, tegumentum membranosum, quod alibi καὶ φάσιν & φάσιν nominavit. Hac obiter dicere volui, ut sciatur, umbilici vocem æquivocam esse, & capi modo pro hoc intestino ex vasis quatuor constante; modo vero, & communiter pro mediis abdominis ea cavitate, quæ post partum à recisio vel sponte prolapsio umbilico relinquitur in nobis per totum vitæ spatium. Apparent autem in umbilico ex intervallis macule quædam nigre, veluti murum stercora continentes, quæ sunt à vena una cum artèriis & uracho contorta ac circumvoluta; modoque exterius sanguine atro, quem continet, transparente per membranam; modo à reliquis duobus vasis occultata. Longus est tres circiter spithamas plus minuse, & crassus digitum fere, quando maturus est fœtus. Et quoad situm, à placenta incipiens per mediam frontem paulatim pergit, circumflexendo se ad occiput; inde rursus oblique reductus ad sinistram cervicis & juguli partem, deorsum super pedus progreditur, donec in mediam abdominis partem inferatur. Nam ex furculis venarum & artèriarum, per placenta dispersis in chorio membranarum inter majores rami, qui tandem in truncum cœntes, in duas artèrias exiguas, sed unam magnam venam & amplam, per totum umbilicum capreolorum in morem convoluti progrediuntur, una cum uracho ab allantoide orto, donec abdomen pertingant. Porro substantia venarum, & artèriarum proflus similis est venis & artèriis per totum corpus fœtus dispersis. Urachi vero substantia non est similis poris ureteribus, sed membranosa est parte ea qua ex vesica intrat in umbilicum, ubi paulo post trium circiter digitorum transversorum longitudine supra abdomen egressus finitur, & obliteratur in medio umbilici. Ex quo patet non esse verum, umbilicum ex uracho constare, & umbilici humani tria tantum esse vasa, duas artèrias & unam venam; urachum vero poris ureteribus, per quos urina & renibus in vesicam colatur, similem esse. Herodotus, vel Auctor illius libri, qui Introductorius inscribitur in operibus Gal. cap. xi, nervum ad compositionem umbilici concurrere putat, his verbis, interprete Andernaco: Ex renibus uteri, quæ secundas implicat, bina alia producentes vene, ab artèriis ibidem sitis bina artèria, & à nervis unus nervus, mixto in unum congressu meatum, & & & appellatum, ab obstru, qui infans umbilico inseritur, ex quo & enascitur & suspensus est; ab umbilico autem vena ad jecoris portam sanguinem ita fixibus transmittit. Arterie vero juxta vesicam crassiori artèria, nervus hic spina inferitur. Hæc ille. Ex quibus colligere licet, non modo ex nervo umbilicum componi exterum, sed etiam & & ab eodem umbilicum hunc appellari. Cæterum quod umbilicus nervum habeat, probari etiam ratione potest, ex Veterum & Recentiorum monumentis desumpta: videntur enim omnes Anatomici sensisse umbilicum sensu præditi esse. Aëtius enim ad amputandum umbilicum recens nati magis laudat scalpellum acutum, quam aliam materiam arundineam vel vitream, ne atteratur umbilici pars puero annexa: deinde vetat cuninum præcisio umbilico inspergere propter acrimoniam, contra veterum nonnullorum consuetudinem, quasi umbilicum sentire putaret. Inter recentiores Pareus & alii, qui curam infantis recens nati præscripserunt, præfecto umbilico imponunt oleum vel rosâ.

u. Triv. H.
d. Triv. A.
e. Triv. B.
d. Triv. C.
f. Triv. D.
g. Triv. E.
h. Triv. F.

Vnde ora
construunt
superficies de
cutis.

Sudoris us.

Urina ex a
sudore separa
ta.

Sordes quid.

Recentiorum
opinio de usu
sordium.

Auctoris opi
nio de conserv
atione.

vel roseaceum, vel amygdaliu cum panno lineo, ad sedationem doloris. Contra Gal. aliter sentit lib. vi de Decr. Hipp. & Plat. cap. vi. Scribit idem nullum apparere neruum ex utero in secundas provenire, neque in ipsis secundis, neque in umbilico, aut de foris intro subire, aut de interiori sede extra prominare, quod nulla omnino necessitas fuerit, ut origo nervorum concepti fetus, veluti venarum & arteriarum, matri conjungeretur. Et revera nullus nervus in umbilico aut secundinis apparet; sed in urachi medio nervulus candidissimus ab interna vesicæ membrana ortus (de quo forte in lib. Introductorio facta est mentio) invenitur: veruntamen et si nervi aliquam formam induat interna urachi pars, nervus non est; cum neque ullam communionem connexionemque cum nervo habeat, neque ullo modo in spinalem medullam, sed in fundum vesicæ infatur: sed hæc nervo similis urachi pars, nil aliud est, quam pars urachi interna, quæ ubi fetus jam ex utero egressus est, contrahitur veluti in nerveum funiculum, nullo per medium foramine præditum. Sed quod hæc pars non sentiat, pater; quoniam & umbilicus non sentit. At neque erat conveniens, ut sentiret. Primo, quia dum properat ad exitum fetus, & post partum ab umbilico dependens huc & illuc movetur, varie in hac circumagitatione distrahitur, contorquetur ac distenditur umbilicus. Itaque si sentiret, doleret ob solutionem continui: si doleret, neutiquam ex matris utero exire tentaret; sed quiesceret potius propter dolorem, quem sibi alias parit ex distorsione umbilici. Quocirca erat necesse, ut matri quidem in partu magnus dolor esset; foetui vero, nullus aut saltem quam fieri poterat minimus. Exemplum habemus in iis, quæ ex ovo generantur. Omnia enim, putamine rupto, exeunt ex ovo absque dolore: at mater, quæ ovum enititur, percipit dolorem. Secundo probatur umbilicum non sentire, quod ab amputato umbilico observatum sit infantes non vagiile; imo ego aliquoties vidi puellas post partum optime se habentes dum præcinderetur umbilicus, neque post etiam per quadrantem horæ, non solum non plorasse, sed nec eos quidem aperuisse. Vana igitur & inepta hæctenus medicorum est cautio, quæ ad præcidendum umbilicum eligunt ferrum potius, quam vel arundinem, vel lignum præacutum, vel aliud quidpiam ad secandum aptum, & à præficio umbilico selecta quædam medicamenta imponi ad sedandos cruciatus jubent; cum certe si hæc pars urachi nervosa non sentiat, cæteras profecto ex quibus umbilicus constat, nullo modo sensum habere putandum sit, non venam, non arteriam, non etiam membranam, quæ illas involvit, cum hæc à chorio deducatur, quod quam sit sensus expertus, notant mulieres, quibus cum à partu secundæ extrahantur, nullus cruciatus excitatur. Quærit in problematibus Arist. cur homini magnus sit umbilicus (loquens de ea cavitate, quæ est vestigium in media abdominis parte resecti hujus umbilici) cæteris vero animalibus exiguis & non valde manifestus: putatque hoc contingere, quoniam umbilicus in cæteris animalibus in directum tendat, & cum diu in utero maneat, umbilicus interprete Gaza arefcat & dissipetur; homo vero imperfectus prodeat cum humido & viscido (sanguinolento male Gaza) exangui umbilico: sed vera ratio ex umbilici anatomie caput. Est enim multo major, proportionem considerata corporis humani fetus, quam cæterorum animantium, propter amplitudinem vasorum.

Vius hujus umbilici est multiplex: etenim per umbilicum fetus nutritur, atque suspenditur, ut in omnem partem movere se queat; & urinam in allantidem rejicit ex vesica. Convenit huic tanta longitudo ad commodiorem motum in utero, egressumque ex utero: etenim si breviorum umbilicum homini natura creasset una cum fetu placenta & membrana exire debuissent, quod partus facilitati obstetris; nunc vero tantum umbilicum natura fecit, ut prius fetus totus exire possit absque secundis, quæ etiam alia de causa debebat post egressum fetus utero annexi, ne repentina dilaceratione vel abstractione oscula venarum placenta magnam copiam sanguinis funderent, cum vitæ infantis discrimine: & propterea tantum longus est umbilicus, ut puer ex utero egressus nihilominus adhuc ipsi adherere queat. Confert etiam hæc longitudo ad commodam educationem secundarum, in qua profecto insignis prudentia requiritur in obstetricibus. Inferitur autem umbilicus in inferiorem partem totius corporis, hoc est in medium abdominis: non enim decebat puerum ex equilibrio ab umbilico dependere, sed superiores partes, ubi caput est & thorax, ponderosiores habere ab una parte,

4, T. IV. H.

pedes vero & mediam partem reliquam ventris ab altera, ut ex umbilico suspensus partibus superioribus tempore partus in caput versus uteri orificium facillime volveretur: nam partus naturalis tam homini, quam cæteris animantibus fit in caput. * Contorquentur autem in umbilico vasa in modum acie vel chordæ ex funibus binis vel pluribus constantis: non quia tanto longiora, & longiori mora sanguis præparatur ad factum prodiret, ut somniant Anatomici; sed quia umbilicus erat circumducendus à parte dextra ad sinistram per frontem circa collum, donec ad abdomen perveniret, in qua circumvolutione si recta procederent umbilici vasa, profecto compressa nimium fuissent, nec pertransire commodè per arterias vitales spiritus & calor, per venas sanguis, per urachum urina potuisset, quod per hanc vasorum tortuositatem mirabiliter evitavit natura. Adfert hæc tortuositas aliud quoque commodum in secando umbilico, ne illico sanguis fluere possit à præfessione umbilici cum vitæ discrimine. Circumducitur umbilicus à sinistro tempore in dextrum per mediam frontem, ut caput totumque foetum commodè sustineat. Quod si forte fortuna in partu ab hoc umbilico per superiorem capitis partem, secundum naturæ leges non bene expedit se fetus, sed umbilicus descendat, non solum periculosus & perdifficilis matri partus succedet, ut notavit etiam Hippocrates lib. de Septim. partu; sed etiam laqueatus prodit in lucem infans, & sic exilimatur puerum miseram vitam traditurum, imo quorundam etiam experientia edocetorum judicio, laqueo periturum. Nodos præterea seu rugas putant nonnulli annotandas in umbilico, dicunt enim mulieres multos deinceps parituras si umbilicus infans, quem primo enixa est multos nodos ostenderit, eosque longo intervallo sejunctos per longa intervalla partus prædicere; addentes mendacium mendacium, rufos nodos masculos, albos vero femellas promittere; sterilemque futuram in posterum mulierem, si fetum peperit umbilico connexum sine nodis. Quorum vanitas falsi declaratur iis fœtibus, qui jam provectis ætate mulieribus ultimo pariuntur: nam & horum umbilici quandoque magis, quam priores sunt nodosi.

CAPUT X.

De præfione umbilici.

Hic de umbilico tractationi necesse est subjungam, quanta prudentia peritiaque in secando à partu umbilico requiratur, quoniam in hoc obstetricum ars fere præcipua versatur, & nil utilius aut curiosius hoc loco dici queat. Obstetrix ut prudenter fecit umbilicum observare debet, tempus, locum, modum, tum quæ post sectionem peragenda sunt. Tempus est, cum infans ex utero egressus est, vel cum secundinis, vel absque iisdem. Hodie solum ex utero egresso relictis adhuc secundis statim præfari solet umbilicus; at si fetus bene valeat ac robustus sit, quo facilius & felicius partus alter sequatur, melius erit ante illius præfionem tentare, non secundæ paulatim sequantur. Nam notatum est aliquoties, nascitis ventulis postquam umbilicum fecerant, casu reliquam ejus partem, quæ secundis adhuc in utero adherentibus annexa est, esse manu excidisse, moxque in uterum retractam in mortis periculum maximum puerperas concessisse. Danda igitur est diligenter opera, ut ante umbilici sectionem secundæ quoque ex utero eximantur hoc pacto; sternutatorio medicamento natibus prius indito, nares & os constringenda, tum obstetrix manu sinistra abdomen superne deorsum comprimendo, dextraque umbilicum trahendo secundas ex utero eximat. Sed in utroque servandus modus, ne violenter fiat: ex violentia enim periculum instat, ne abruptum in utero umbilicus cum periculo puerperæ: nam abruptum facile, cum ex partibus admodum tenellis constat. Docet hanc trahendi modum, quem paucæ obstetrices vel norunt, vel observant, optime Hippocrates lib. de superfectione, dum inquit: Si secundæ non facile exciderint sinendo sunt maxime ad factum appendere, ut paulatim absque ulla violentia trahantur. Mulierem in sella perforata collocabis, & factum super utrum humore tepido plenum impones, ut mucrone tenuissimo compunctus uter sensum concidat, & una factum & quæ ab eo dependent involvra deorsum trahat. Hæc Hippocrates. Quod si foetus mature ex utero exeunt propter imbecillitatem vel agritudinem vitæ periculum imminet, statim egresso

BB

umbilicus

Umbilicus non habet nervum.

Vana medicorum cautio dum supra umbilicum scilicet medicamenta imponi ad sedandos cruciatus jubent.

Cur magni hominis umbilicus.

Vius umbilici multiplex.

Cur longus sit umbilicus.

Inferius umbilici.

Partus naturalis fit in caput.

Cum rugis in umbilico cum torquentur.

Vana significatione de nodis umbilici.

Sic observandi sunt in sectione umbilici.

Tempus faciendi de umbilico.

Secundo si circa cervicem maneat.

Hipp. modum in extendendo secundas.

Loco ad am-
putandum
umbilicum
apert.

Vena superfi-
cia in ante-
riori umbili-
co.

Medus am-
putandi umbi-
cum.

Quod deliga-
tio fit facienda
ante umbilici
praecisionem.

Prospice um-
bilici quid im-
ponatur.

Cum sit homi-
ni ante abpu-
tationem liga-
tur umbilicus.

umbilicus praecidendus est: secundis vero, ut excidant, deinceps prospiciendum veluti à peritis praecipitur, ad coxam nimirum alligato umbilico cum filo. Locus autem ubi amputandus est umbilicus, sine ullo sexus discrimine is statuitur ab Aëtio lib. iv, cap. i, aliisque Veteribus, ubi quatuor circiter digitos ab abdomine infantis emer- sit. Sed ne quidpiam à mulierculis & barbaris abque superstitione perageretur, sexus discrimen inventum est. Putant enim vulgo obstetrices longiorem partem umbilici praefecti masculis relinquendam esse, ut longam ipsis pubertatis annis mentulam alant; feminis vero brevior, ut angustum pudendum forment, & verecundiores sint ac minus audaces: quasi vero ejusmodi pars umbilici, quae quarto, quinto vel septimo die sponte sua decedit infra vinculum, aliquid posset ad immutandos animi mores, vel membri alicujus conformationem & augmentum; sed necesse est hanc rideam opinio- nem. Nam si in mulierum potestate esset, prima umbilici cura pendenda majora vel minora effingere, profecto parturientes de obstetricibus jure merito conquiri debe- rent, quod in prima nativitate iis magnam umbilici partem non reliquerint, ut foetus citius ex utero exire possit.

Ad modum perite secandi umbilicum requiruntur, deligatio, instrumentum, & ali- qua ante deligationem peragenda. Prius enim quam praecindatur, si puer debilis sit, aut pene mortuus edatur, sinistra manu tenendus est umbilicus, & sanguis qui è corpore foetus per venam umbilicalem refluxere solet, & spiritus vitales qui per arterias umbilici è corpore foetus effluere nituntur, reprimendi sunt paulatim rursus in corpus: sic enim statim infans, qui modo exangui debecbat, recreatur vitæque restituitur. Sin vero robustus sit infans qui prodit, statim sinistra manu apprehendendus est umbilicus; tum protinus deligandus, ne sanguis è corpore infantis in umbilicum repat. Pro deli- gatione locus tutior, est spatium quod distat duorum vel trium digitorum transverso- rum latitudine ab abdomine, seu principio exitus umbilici à corpore infantis. Nam si proxime umbilico ligetur, periculum est, ne trahantur in consensum partes abdomi- nis sentientes, & sic dolor exciteretur, qui infanciam matre vel nutrice causam praebe- re solet affidui ploratus. Ultra vero terminum, quem praescripsimus ligare nil vetat, cum umbilicus non sentiat, & tota hæc pars, quæ à praecisione relinquitur, paucis ab ortu diebus sponte decedit. Deligatio facienda est quam fortissima, duplicato & triplicato filo serico, vel è lino aut cannabe confecto, reiteratis etiam nodis, ne vinculum solvat- ur vel relaxetur; tum demum supra vinculum unius vel alterius digiti transversum spatio erit amputandus; alioquin si prope ligamentum amputetur, metuendum est, ne solvat- ur vinculum antequam sua sponte umbilicus emoriatur & à corpore decidat, & sic sanguine vitalique spiritui effuso ex arteriis, infans statim commoriatur. Ceterum quo instrumento amputes, an scilicet cultro, an forfice, an arundine, vitro, vel alia materia, nil interest, cum non sentiat. A secto umbilico denique imponendum est gossipium, qua parte vulnus est, pannique lineis involvendus, ne sua frigidity ventri obstat, do- nec pus deciderit. Querere quispiam possit, cur homini ante sectionem umbilicus ligetur; ceteris vero animalibus, quæ omnia umbilicum cum suis secundinis post par- tum statim devorare solent, minime; neque his fere ullum videatur sequi incommodum effusionis vel sanguinis vel spirituum vitalium. Hujus quæstio duplex est apud me ratio; & prima, quoniam in umbilico hominis vasa sunt majora & ampliora, præcipue vena, quæ unica est, perque ea vasa & sanguis & spiritus facilius fluere possunt. Deinde animalia dum dentibus abscondunt, à fetu proxime abdomini eum auferunt, sic ut nulla pars de umbilico extet; postea lambendo reducunt eundem umbilici exortum circumfusam supra extremitates vasorum umbilicalium, postea hæc cutis his vasorum finibus connata & supernata nodulem tantum in quibudam quadrupedibus efficit, pro vesti- gio umbilici, in aliis parvum signum, in nonnullis etiam haud conspicuum. Hinc patet vera ratio, cur homini umbilicus magnus sit, ceteris vero animalibus exiguis vel nullus; alia profus ab ea, quam attulit nobis Aristoteles in problematibus. Et sic qui- dem ars circa sectionem umbilici ab obstetricibus exerceri debet.

De partibus internis propriis, ac primum de Vasis umbilicalibus.



a, T. VII. D.
viii. E.
viii. C.

b, T. VII. E.

c, T. VII. G.
viii. K.
viii. A.

Actenus partes foetus externas proprias examinavimus, nunc autem à internarum propriarumque explicationem aggredi superest. Hæ duæ tantum sunt, vasa scilicet, & excrementa. Valorum alia, in abdomine & ventre inferiore continentur, ut umbilicalia; alia vero, in thorace, ut ramus exiguus, quo vena cava cum arteria venosa conjungitur, & arteria magna cum vena arteriosa. Umbilicalia vasa ea dicuntur quæ per umbilicum ex chorio transgressa in ventris partibus internis inferuntur. Suntque tot numero, quot in umbilico inveniri diximus: etenim vasa ista quatuor, quæ per umbilicum unita progrediuntur, ubi abdomen intrarunt, fiuntur singula, ac à se invicem dissociantur, & diversa loca suis finibus adeunt, quibus terminantur. Vena enim peritonæo subus per ejus membranam annexa, paulatim sursum in jecoris partem, quæ leviter in duas veluti alias divisa est atque homini propria, quamque nonnulli Anatomici * rimam jecoris vocant, ascendit; inde in cavam jecoris ulterius penetrando, ubi caudex seu truncus portæ à jecore surgit, bipartitur, ac in quemdam venæ portæ ramum inferitur. Sic in canibus & aliis quadrupedibus cernimus venam hanc umbilicalem, cum venæ portæ præcipuo trunco per mesenterium disperfo, cumque cave quodam ramo ad mesenterii centrum conjungi. Similiter arteriæ umbilicales abdomen ingressing, & peritonæo annexæ una cum uracho deorsum pergunt: postea vero à se invicem disjunctæ ad uteri ac vesicæ latera feruntur, & in ramos arteriæ magnæ iliacos ad crura descendentes inferuntur ea parte, quæ per pubis ossium foramina transire inci- piunt. Vrachus autem intermedius, peritonæo annexus, in fundum vesicæ termina- tur. Omnia hæc vasa umbilicalia interna, statim ac in lucem venit foetus, in funiculis abeunt, ob usum eorum maximi abolitionem. Etenim vena umbilicalis, destinata susci- piendo à matre sanguineo alimento, segregata carnea placenta, per cuius substantiam illud in venam umbilicalem per chorion & umbilicum ducitur, inutilis est. Similiter ablati venis arteriæ umbilicales inutiles sunt. Vrachus quoque, qui à natura factus est, ut per eum ex vesica urina in allantoidem transfluat, non amplius ex vesica suscipit urinam; cum allantoide privatus scorum excrementum vesicæ per aliam viam, nempe per pudendum excernatur. Neque enim est, quod refutem doctorum quorundam nuper inventum, qui putant foetum, dum est in utero, per pudendum mingere, pro- pterea quod urachum solidum nec ullo foramine præditum conspici dicant; cum mon- strare debuissent viam, per quam foetus, ubi minxerit urinam à sudoribus separatam, in allantoidem, vel spatium quod est inter chorion & amnion, transmittit; & rationem reddere, ob quam in ceteris quadrupedibus urina segregetur, cum & eadem mingere per pudendum poterant. Porro umbilicalis vena pertingit ad jecoris portam in cavam vel ramum cavæ, quod sanguis, qui foetui à matre pro nutritione dabatur, alia egebat elaboratione, quam ea, quam à matre acceptat; & ut tenellæ partes commodius & citius nutritrentur, erant segregandi serosi humores à renibus, biliosi à felle folliculo, melancholici à liene. Unde clarum est, non bene hæcenus Anatomicos censuisse matris sanguine dulcissimo purissimoque foetum uti pro alimento. Melius autem Galenum lib. i de Symp. caus. cap. vii, opinatum, sanguine æque puro & impuro nutrirî foetum; sed tenellum, sanguine puriore ali; grandiorum jam, puro atque impuro. Dixi superius arterias umbilicales ablati venis umbilicalibus inutiles esse; nunc autem necesse est, ut quibus rationibus à Veterum & recentiorum omnium sententia, qua puta- tur per umbilicales arterias vitalem spiritum à matre foetui subministrari, discedere movear, exactius ac dilucidius declarem; si prius hujus antiquæ opinionis rationes pro- tulerim. Nam Hippocrates, sive auctor de natura pueri, dum inquit, foetum per umbi- licum spirare, & alimentum augmentumque capere; nil aliud intelligere videtur, quam quod per venas sanguis ad nutritionem, per arterias vero umbilicales (quas etiam sub communi venarum nomine complexus est) spiritus à matre ad cordis refrigerium & alimentum vitalis caloris tradatur. Et paulo post in eodem libro, cum duplicem in

Umbilicalia
vasa quæ.

Vena umbi-
calis inferior.

Arteria um-
bilicalis su-
perior.

Vrachus inferi-
or.

Foram in ute-
ro non mün-
git.

Vetorum de
recentiorum
Opinio de vita
arteriarum
umbilicalium
proposita.
Ezq. autori-
tate de vita
arteriarum
umbilicalium.

semine ex quo formatur foetus, statuat spiritum, internum seu connatum & ingentum, externumque, quo ingentus nutritur; ac externum dicat esse aërem, qui per umbilicum attrahitur, frigidior paulo quam is, qui est internus; per aërem non intelligit eum, quem nos inspirando attrahimus, quippe qui ad foetum tam crudus veluti à nobis pulmonibus hauritur, pervenire non potest; sed à corde matris elaboratum, & per arterias matris ad uterum comportatum, & hinc per umbilicum in omnes partes foetus fufum. Gal. vero paulo clarius pluribus in locis usum arteriarum umbilicalium significavit, cum dicat spiritum ad vitam per has foetui dari, & quemadmodum per venas umbilicales sanguinem, sic per arterias non spiritum modo, sed etiam una cum eo subtiliorem & calidiorem quam is, qui in venis est, sanguinem accipere à matre, atque ex hoc omnium calidissimum viscus fabricari, nempe cor.

Gal. auctoritas de usu arteriarum umbilicalium

Prima ratio pro Gal. de usu arteriarum umbilicalium

Secunda ratio

Tertia ratio

Quarta ratio

Auctoritas opinionis de usu arteriarum umbilicalium argumenta pro Gal. adhibita

Secunda ratio

Tertia ratio

Præter has auctoritates non desunt quoque validissimæ rationes ad hoc probandum. Prima autem est: Si spiritus vitalis non procederet à matre ad cor foetus, frustra factæ essent arteriæ umbilicales, & earum conjunctio per anastomofum cum arteriis uteri: sed frustra non sunt factæ arteriæ umbilicales, & earum anastomofis cum arteriis uteri; ergo vitalis spiritus procedit à matre ad foetum. Major probatur, quoniam ad nutriendum foetum vena est sufficiens, & ideo cum non haberet usum ferendi spiritum vitalem, essent superflua: minor patet è naturæ legibus, quæ sicuti in necessariis non deficit, ita in supervacaneis non abundat. Secunda ratio. Cuicumque parti non suppetatur materia ad conficiendos spiritus vitales, in ea vitalis spiritus generari non potest: sed cordi foetus non suppetatur materia pro generando spiritu vitali; ergo spiritus vitalis in corde foetus generari non potest, & per consequens, à matre procedit. Major probatur: in corpore animato aut in animali, in quo non fit respiratio externi aëris, in eorum corde vitalis spiritus generari non potest; sed in foetu in utero existente non fit respiratio externi aëris; ergo vitalis spiritus generari in eo non potest: Major est manifesta; nam aër externus in animali quod non respirat, ad cordis finitrum ventriculum pervenire non potest per venosam arteriam, ut sic cum calore & sanguine permixtus fiat vitalis spiritus. Tertia ratio. Si vitalis spiritus non procederet à matre, foetus ante debitum tempus pariendi ex utero exemptus adhuc vivere posset; sed vivere non potest, cum statim moriatur; ergo vitalis spiritus procedit à matre ad cor foetus. Quarta ratio. Si in corde foetus generaretur spiritus vitalis, arteriis & venis umbilicalibus vinculo constrictis, cor foetus pulsi non destitueretur: sed arteriis & venis vinculo constrictis cor foetus pulsi destituitur; ergo in corde foetus non generatur spiritus vitalis, & sic cum à matre provenire sequitur. Ego vero contra, vitales spiritus per arterias nequaquam à matre ad foetum vitam transfundi existimo; sed potius à corde foetus ad propriarum partium externarum vitam, arteriis his immitti credo; quod multis argumentis probatur. Primo, si à matre vitalis spiritus cordi foetus suggereretur per arterias umbilicales, cor foetus non pullaret, quia non generaretur in suo corde spiritus vitalis. At cor foetus pulsare, & Galeni & Aristotelis, lib. de Spiritu, auctoritate convincitur, sensibilibus demonstratur. Et profecto majorem propositionem usque adeo veram esse fatentur Anatomici, ut insignis inter eos Andreas Laurentius assumptionem negarit; sed legat Galenum lib. 1. de semine, cap. vii. ubi expresse dicit cor foetus, quod arteriæ permancant, ob nimiam caliditatem quasi flammam quandam, assidue non moveri, sed mutua reciprocatione. Vnde sequitur vitalem spiritum in corde foetus fieri, eoque vivere omnes foetus corporis partes, nequaquam vitam foetui à matre traduci. Secundo. Vnde procedit vitalis facultas, inde quoque procedit spiritus vitalis: sed à corde foetus procedit vitalis facultas, quæ foetum gubernat; ergo vitalis spiritus à corde foetus procedit. Major est manifesta; causa enim proxima posita, effectus sequitur. Minor probatur Galeni auctoritate dicentis lib. xv. de Usu part. cap. iv, quod foetibus ex semine, non ex vulva facultatum ipsos gubernantium origo sit. Vitalis ergo facultas cordi foetus innata est ex semine, non à vulva, hoc est, à matre in ipsum missa, statimque ac formatus est foetus infans omnibus partibus facultates corpus foetus gubernantes. Tercio. Si à matre vitalis spiritus procederet per arterias umbilicales, arteriis quæ ad umbilicum sunt vinculo constrictis, omnes quæ in chorio sunt arteriæ pulsi non destituerentur, sed tantum, quæ in cor foetus ingrediuntur: sed omnes, quæ in chorio

chorio sunt, pulsi destituuntur, corde nihilominus pulsante, ut ex lib. vi. de Placit. Hipp. & Plat. cap. vi. apud Gal. habetur; ergo vitalis spiritus non procedit à matre per arterias umbilicales. Quarto. Si à matre vitalis spiritus cordi foetus suppetaretur per arterias umbilicales, aliis quoque animalibus idem accideret, quæ arterias umbilicales habent. Sed aliis animalibus idem non accidit: dum enim ex ovo generatur pullus, vitam non accipit à matre; sed à semine per incubationem formantur omnia pulli membra, statimque cor, quod palpitat, & vitales spiritus in se genitos non modo per corpus pulli diffundit, sed etiam per partes externas, nempe umbilicum: ergo vitalis spiritus foetus cordi non suppetatur à matre. Quinto. Si à matre vitalis spiritus procederet per arterias umbilicales ad foetum, mortua matre non posset fieri partus Cæsareus, neque diutius foetus quam mater vivere. Sed mortua matre fit partus Cæsareus, & diutius quam mater vivit foetus; ergo vitalis spiritus non procedit à matre per arterias ad cor foetus. Minor probatur tum experientia, tum auctoritate. Experientia: quia nonnulli post matris obitum extracti supervixerunt. Auctoritate deinde Plinii lib. vii. Natural. hist. cap. ix, cujus verba sunt hæc: *Aspiculatus enecatæ parente gignuntur: sicuti Scipio Africanus prior natus, primusque Cæsarem à caelo matris utero ductus. Qua de causa & Cæsares appellati. Simili modo natus Manlius, qui Carthaginem cum exercitu intravit. Ego etiam aliquoties ostendi publice fetum agnium à matris utero extractum per semihoram vivere. Denique favet nobis auctoritas Aristotelis, qui tantum ad alendum foetum in utero factum esse umbilicum scribit lib. i. de Generatione animalium, cap. iv. Alibi etiam dicit, alimentum foetui contingere per umbilicum eodem modo, quo plantis per radices: venas autem umbilicales esse tanquam radices, per quas alimentum haurit foetus. Neque alibi fecit unquam mentionem spiritus, qui per umbilicum ad vitam foetui à matre datur. Reliquum est, ut ad argumenta pro Galeno adducta respondeam. Et ad primum dico; Iulium Cæsarem Arantium negasse hanc arteriarum umbilicalium cum uteri arteriis conjunctionem, à Galeno propositam. Ad licet hoc concedatur, tamen non sequitur necessario, quod hac de causa fit facta, ut spiritus vitalis à matre foetui communicetur, cum ad firmiorem annexum foetum cum utero hanc arteriarum conjunctionem facere natura ponerit, & ut vitalis spiritus à corde foetus elaboratus, melius à matris vitali spiritui foretetur, tanquam debilius; utque calore ad partes placentæ extimæ sanguinem crassum per angustas venulas attractum impelleret, attenuaret, & ad foetum per umbilicum ferret. Ad secundum argumentum accedo. Cuicumque parti non suppetatur materia ad spiritum vitalem generandum, in ea quoque non potest elaborari. Sed cordi non suppetatur spiritus vitalis materia. Falsum hoc; quia suppetatur per venam umbilicalem sanguis, qui sufficit ad spiritum vitalem generationem. Præterea probatio majoris propositionis, ubi non fit respiratio, ibi quoque non fit spiritus vitalis, falsa esse arguitur exemplo eorum animalium, quæ non respirant. Nam dum in ovo pullus generatur, cordis officio ac munere gubernatur, & perficitur mediante sui cordis calore & spiritu, eoque donec partes vitales ita habeat perfectas, ut externo aëre frui queat, vel debeat. Arist. quoque lib. de Respirat. cap. vi, negat internum ignem spiritui ali, illiusque alimenti gratia fieri respirationem; & respiranti quidem, tanquam super ignem accensum, fomitem adjici; alito autem igne, fieri expirationem. Etenim, inquit, oportebat in aliis animalibus hoc idem accidere, aut huic quid simile: nam omnia habent caliditatem vitalem; pisces tamen aquam trahunt, non aërem. Ad tertium. Porro vivere foetum extra uterum exemptum non posse, partim verum est, partim falsum: verum est, quia non vivit diu, sicuti homo mature editus: falsum vero, quia diutius vivit, quam posset si à matre vitam per arterias continuo transmissam haberet. Nam abortivos per horas nonnullas vivere observatum est: & sex, septem, atque octo menses in utero portatos foetus, quos matres maturius ob aliquem errorem externum erant enixæ, per septimas aliquot adhibito conveniente foetu & alimento, vitales fuisse. Deinde aliam ob causam accidere potest, ut foetus à matrice exemptus vivere nequeat, quam ob vitalis spiritus matris privationem: privatur enim ab utero separatus materno calore, qui foetus omnem calorem in corde auget, sustinet, ac sua qualitate fovet. Vnde foetus dicitur à fovendo, non aliter quam is qui incubitu ovarum à volucris matribus editur.*

Quarta ratio

Quinta ratio

Responso ad argumenta pro Gal. adhibita

Responso ad secundum

Ad tertium

Fertur unde dicitur

Quamquam enim pullus in ovo grandior sit, & corque ejus vitalem spiritum & calorem generet, perque corporis omnia membra diffundat; tamen nisi blando matris ac tepido calore foveatur, propter cordis & vitalis ejus caloris imbecillitatem, & pororum corporis laxitatem statim rigens emoritur. Quamobrem ne rigeant fetus, maxime nuper nati, videmus matres frequenter apprimendo pectori eos fovere: pullos gallinarum sub alis matris quo teneriores sunt, eo frequentius se condere, materno tepore corpusculum conservantes. Ad quartum. Quod vincto umbilico cor fetus pulsi destituitur, fit quia deest alimentum cordi, nempe sanguis, qui per venam umbilicalem copiosissime in dextrum cordis sinum fluit per venam cavam, ut ex eo nutriatur & vitalis spiritus toti corpori conficiat. Ut igitur concludamus, credendum est contra omnia anatomicorum hactenus receptam sententiam, arterias has umbilicales factas esse, ut spiritus vitales à corde fetus transmitti possint ad externas partes fetus, nempe secundas, ad calorem vitalem illis partibus tribuendum, quo motum sanguinis per venam umbilicalem à matre in jecur fetus transfluens acceleret, ac prohibeat attenuando, ne illis concrefcat, sed debitum alimentum promptius ad minimas quasque externarum partium particulas nutriendas pervadat. Cæterum duas arterias umbilicales natura fecit, easque angustas; unam vero venam satis amplam. Decebat enim copiosum & crassum alimentum, qualis est sanguis, per amplum locum unite pertransire; tenuis vero sanguis & spiritus calidi per exiguos & angustos canales pertransire satis poterant. Sed & sollicita fuit de commodis & facili transitu sanguinis à matre ad fœtum, ut duabus arteriis venam amplecti voluerit, nullasque per chorion esset ramus, cui non arteriarum aliquis ramulus comes esset. Terminantur arteriæ umbilicales in arterias ad crura descendentes; vel si mavis dicere, ex iis oriuntur; non autem ex corde vel prope cor ex arteria magna, ut venâ umbilicalis prope jecur ex venâ portæ. Non quidem ex corde, quod partes externæ fetus vitali spiritu bene præparato ac elaborato eggebant, qui talis maxime in arteriis remotioribus à corde solet contineri. Neque prope cor ex arteria magna hos ramos prodire tutum erat, quod pertransire debuisse intestinum & intestina, quæ cibo statibusque onusta pulsum harum arteriarum poterant interciperi. Nec denique decebat duos ramos unitos semper prodire ex unico loco, cum unus ramus sufficere videbatur, siquidem ex arteria magna originem is traxisset; sed potius duos ramos prodire ex duobus locis distantibus.

CAPVT XII.

De structura vasorum Thoracis in fœtu.

Sequuntur nunc vasa in thorace contenta circa cor, longe aliter constituta, quam in nobis aliquandiu natis. Etenim vena cava cum arteria venali conjungitur, & arteria magna cum vena arteriali; sed diversa ratione. Nam vena cava cum arteria venosa configua rotundo ac satis magno foramine, membrana itidem tenui & nonnihil pellucida sociatur: at arteria magna, quia paululum distabat à vena arteriali, vase arterioso tanquam novo ductu & canali, cum vena arteriali conjungitur oblique: quod in natis aliquandiu & perfectis hominibus non amplius conspicitur, non sine miraculo; excisato nempe hoc novo ductu, atque evanescente foramine, tanquam in natis jam non amplius necessarius. Quippe cum pulmones fœtus in utero nondum cordi interfervent ad refrigerium calor per aerem externum, erat necesse illos copioso sanguine nutiri; cum vero hunc sanguinem cor copiose per venam arterialem subministrare non posset, cum per foramen amplum ex vena cava in arteriam venalem refunderet, oculo nonnihil foramine tenui membrana, ne quippiam quod intrasset statim à vicino motu cordis coactum fuisset regredi: deinde, ut edito jam in lucem fœtu hoc foramen facilius obtureretur, membrana tenui paulatim crassior facta, & acquirente corpus arteriæ venalis, similiter arteriam magnam cum vena arteriali per valculum exiguum conjunxit, ut copiose sanguinem & spiritum vitalem pulmonibus largiretur per venam arterialem. Quia vero pulmonum substantia non amplius in jam natis copioso & crasso sanguine nutriebatur, propterea non adhuc opus fuit à partu, ut abundanter cor iis vitalem

vitalem spiritum & sanguinem impartiretur. Imo cum pulmones in natis aëri expiando destinatos propterea leves esse oporteret ac substantia rariore, voluit natura à partu horum vasorum usum & structuram transmutare, & per venam arterialem sanguinem paulo tenuiorem, quam qui in vena cava continetur (utpote nonnihil attenuatum in dextro cordis ventriculo) pulmonibus nutriendis præbere: per arteriam vero venalem, modicum spiritus vitalis & sinistro sinu cordis pulmonibus ad vitam impartiri.

Ex his igitur patet, explodendam esse Anatomicorum sententiam de usu propaginis, qua arteria magna cum vena arteriosa communione habet. Putant enim per hunc ductum cor refrigerari, atque matre præberi sanguinem vitalem pulmonibus & cordi fetus, propterea quod cum per arterias umbilicales, longo ductu, per arteriam magnam in cor spiritus vitalis transire non poterat, ob ostiola circa basim cordis initio magnæ arteriæ posita, ab his repulsus vitalis spiritus per hunc ductum in venam arterialem & dextrum cordis sinum pulmonesque permeare cogatur. Sed quod fœtus nequitam vitalem spiritum à matre hauriat, jam videor supra satis probasse. Ratio autem cur in hanc erroneam opinionem lapsi sint omnes, qui usque adhuc fuerunt Anatomici, fuit administratio Anatomica fœtus formati; siquidem in hac viderunt prius eas partes, quibus utero fœtus annectitur, & ex hac venas & arterias umbilicales fœtus abdomen penetrare, unde sane probabiliter admodum & sanguinem & vitalem spiritum à matre in fœtum transire sibi persuaserunt, atque ex hoc fundamento in assignandis usibus horum vasorum erraverunt. Observavi quoque in corde & aliud, nondum ab aliis animadversum, nempe utrumque cordis ventriculorum habere parietem æqualis crassitudinis, cum in adultis sinistre habeat crassioriem parietem dextro.

CAPVT XIII.

De excrementis fœtus internis.

Excrementa hæc duorum sunt generum; alia, solida; alia vero, liquida: illa, in intestinis crassioribus; hæc vero, in tenuibus & ventriculo conspiciuntur. Solida ac dura in crassis intestinis, Latinis papaver & papaverculum dicuntur, Græcis *παπαβιον*. Suntque viridia, vel (ut Arist. describit) valde nigra ac picea, & calore sanguinea. Liquidiora vero in ventriculo, magis viscida & alba: in intestinis, viscida & pallida; atque ad flavedinem magis crassitremque vergentia, quo propinquius intestinis crassis in ileo consistunt; magis vero albidia, quo viciniora sunt ventriculo. Notandum etiam est, quod intestinum jejunum, quod in nobis est fere vacuum, in fœtu est excrementis plenum. Excernit hæc omnia excrementa infans recens natus, vel statim à partu, vel ad summum intra unum diem naturalem; & prius papaverculum excernit, deinde vero reliqua, quæ in intestinis & ventriculo continentur. Sed multo plura excernere ait Arist. quam corporis magnitudo postulat. Veteres quidam, cum viderent post partum infantem hæc excrementa excernere una cum reliquiis urinae in vesica relictis, crediderunt puerum in utero matris fegere & per os alimentum capere, nescientes undenam hæc excrementa provenirent. Recentiores omnes, & inter hos Andreas Laurentius, putant impurius & crassioris sanguinis recrementa esse, quæ per plenitum & mesentericum ramum à liene in intestina amandantur, ibique diutina mora & calore excitantur. Alii vero, à toto corpore per venas melsaricas in intestina fluere credunt. Ego autem, quamquam à liene & toto corpore amandari posse per venas mesenterii in intestina, non negem; tamen existimo non esse expurgationem ejusmodi sanguinis crassioris, qualis dum adhuc in utero est fœtus & bene valet, in venis continetur, & qualem natura semper conatur facere vel convenientem vel necessariam; quandoquidem sic ad sanguinis illius per venas expurgationem ora vasorum non sine noxa fœtus aperiri deberent, & multo commodius excrementa illa crassa cum tenuibus possent magna ex parte per patulos poros cutis expelli. Ideo potius dico, hæc excrementa crassa, nempe papaver, generari à liquidioribus in stomacho & intestinis tenuibus contentis, quæ partim sunt pituitosa, ut in ventriculo; partim biliosa & pituitosa, ut in intestino jejunum & ileo. Fluit autem hæc biliosa materia ex folliculo fellis, ejusque porus in intestinum duodenum

Refusio ad quartum.

Vena arterialem umbilicalem illam fecerunt membra distantes.

Cur venis sit umbilicalis vena, & duæ sint arteriæ.

Cur arteriæ umbilicales non oriuntur prope cor.

Vasa thoracis in fœtu quomodo constituta.

Cur pulmones fœtus copiose sanguine nutiuntur.

Vasa diversa constituta esse videntur in fœtu secundum aetatem.

Pulmones in natis levis.

Andreas Laurentius de usu diversis constitutione vasorum in fœtu rejecta.

Pala circa duodenum fœtus intestinum utriusque signi peritum umbilicalem.

Observatio nova.

Fœtus excernit excrementa quomodo concepti sunt.

Fœtus flaccidus excernit multa excrementa excernit.

Cur veteres crediderunt fœtum in matris per os nutiri.

Recentiores opinio de generatione excrementis fœtus.

Auctoritas quæ nō de generatione excrementis fœtus.

Caput fœtus
in utero ex-
purgatur.

Stip. autem
non de purga-
tione capitis
fœtus in ute-
ro.

duodenum inferitur, ut in natu grandioribus apertissime conspiciere licet: pituitosa vero à ventriculo, sed maxime à capite, quod neque per nares, neque per os, oculis omnibus his meatibus in utero, expurgari potest; hinc necesse est, ut per celophagum in ventriculum illa dilabatur. Agnovit hanc capitis expurgationem ex Veteribus & recentioribus, quod equidem sciam, nullus, præter Hippocratem vel eum Auctorem, qui de morbo sacro librum conscripsit in operibus Hippocratis. Probens enim is in eo libro, epilepsiam fieri fœtu adhuc in utero existente, inquit; Purgatur enim & floriscit cerebrum, reclusi etiam alie partes, priusquam in lucem edantur. In hac autem purgatione, si quidem probe ac moderate purgatum fuerit, & neque plus, neque minus quam oportet defluerit, hic factus sanissimus caput habebit. Si autem amplius colloquatur à toto cerebro facta fuerit, morbum caput augefcentis factus habebit, & sonitu plenum, & neque solem, neque frigus tolerabit. Si vero ab una aliqua parte colloquatio contigerit, aut ab oculo, aut ab aure, aut vena aliqua simul gracilis facta fuerit, ille sic afficitur, qualiter sane colloquatio contigerit: si vero colloquatio non contingat, sed in cerebro spissetur ac coagatur, sic necesse est fœtus pituitosus esse. Et quibuscumque quidem pueris existentibus erumpunt ulcera in caput, & in aures, ac in reliquum corpus, & qui salubri sunt ac mucosi, hi ipsi progressu ætatis facillime degunt: hic enim abie ac purgatur pituita, quam in utero purgari oportebat, & qui sic purgati fuerint, comitiali fœre morbo fere non apprehenduntur. Qui vero mundi sunt, & neque ulcus ullum, neque mucus, neque salitra ulla prodit, neque in utero purgationem fecerunt, talibus periculum imminet, ut ab hoc morbo corripiantur. Hæc Hippocrates. Igitur pituita à capite deturbata in ventriculum, & conjuncta cum tenui ea, quæ in ventriculo fuit genita, indeque in modum chyli fœnicotici ad intestina descendens cum bile permiscetur; in qua miscella quidquid utile est vel aptum alendo fœtus, id omne per venas melsaraicas rapitur in jecur, ut ex eo sanguis fiat; quidquid vero inutile, per intestina tenuia præterlabens in crassa relegatur, paulatimque exsiccatum, quo intestinis crassis vicinius sit, eò crassius redditur, magisque durum ac viride, sic ut jam tantquam excrementum in intestinis crassis consistens profusus durum reddatur, & ex jam tætiatrum; qui color ater hisce excrementis inditur, non quod sanguis sit crassus & ater, qui in intestina fluit (ut hæc tenus crediderunt Anatomici) sed quia bilis flava permixta cum pituita, crassioribus excrementis longa mora in corpore infantis conclusa, à calore uratur & exsiccat: tam quia hæc bilis flava à calore exulta, viridis reddatur & prassina initio minus, deinde magis, posteaque exsiccata & combusta, nigra evadat. Idcirco excrementa tenuia, quæ in intestino jejuno continentur, magis sunt flava; viridia vero & crassiora, quæ in ileo; nigra vero, quæ in colo & recto. Atque interea dum in utero est fœtus hæc excrementa non sperendum habent usum. Nam prohibeant, ne sibi invicem adhærescant intestina, vel in se ipsa concidant, quod evenisset, si ea omni humore vacua esse voluisset Natura; sic igitur patula manent; & apta excipiendo cibo, postquam in lucem prodit fœtus. Sed à liquidioribus excrementis aliud quoque præstat. Nam à pituita quæ in ventriculo est, exercetur concoctrix licet languida ventriculi facultas, ut hanc in substantiam commutet, non quidem chylum vocatam, sed chylom analogam; quæ postea cum bile mixta per intestina tenuia simul meat, ut ea parte liquidiori ac dulciori, quæ sanguini conficiendo idonea est, per venas melsaraicas ad jecur rapta, in alimentum cedat. Sic neque ventriculum, neque intestina, neque venas melsaraicas à suo munere, dum in utero est fœtus, ociari videmus; sed naturam jam à primordiis conceptus affluere unumquodque membrum cernimus ad nutritionem vel augmentum, aliæ actiones in fœtu ad quas singulorum propriæ actioni destinatum est. Patet ex his optime causa, cur puer statim à partu, vel spatio viginiquatuor horarum, excrementa varii coloris excernat, & prius nigra, picea ac dura; deinde vero, flava; postea liquida, & magis lactea. Non enim à lacte, quod puer fugit, excrementa albicantia, & flavedine permixta excernuntur (ut putant multi,) sed quia talia in intestinis fœtus concludebantur. Observatione dignum est, quod notavit Aristoteles lib. vii Hist. de Animal. cap. x, plura excernere infantem recens natum, quam magnitudo corporis, vel proportio requirere videatur, hoc est, uti ego interpretor, quam intestina capere possunt. Hoc fit, quia puer in lucem prodeunte multa pituita à capite dilabatur, multaque excrementa biliosa ad intestina propelluntur, concitatis in venis sanguinis humoribus, & expulsi per venas melsaraicas in intestina per modum criseos: quo motu non solum natura excernit superflua

Yst. interme-
dium excre-
mentorum
fœtus.

Thur. post
tenui corpore
excrementa
excernit.

superflua ad suscipiendum alimentum, sed patulas quoque reddit venas melsaraicas, ut per eas deinceps melius & copiosius trahatur alimentum ex intestinis in venas ad jecur. Hic non possum non mirari obstetricum, ne dicam medicorum negligentiam, quæ hæc commemorata in ventriculo & intestinis puerorum recenter natorum excrementa expurganda putant vel pomo cum melle hausto, ut hic Patavii & in aliis Italiae locis; vel syrupo rosaceo ex rosas pallidis laxativo, ut in Gallia; vel alio quopiam laxante ac detergente medicamento, ut in aliis locis. Negligunt enim summam Naturæ providentiam, quæ in tam necessaria re nascenti consuit pueri sola medicina, à matris papillis hausta & gratiore ac tutiore multo, quam quæ ab obstetrice solet præberi. Nam colostrum (lac est quod in uberibus puerperæ primis diebus à partu generatur) fit statim natus sugat infans, commodius & sine ulla noxa ab hisce excrementis purgabitur. Alimentum enim est medicamentosum, quod Natura ad eum finem produxit, ut modice nutriendo leviter pro infantis imbecillitate purget per aliquot dies. Si enim nos præbemus medicamentum, vel nimis debile, vel nimis validum esse potest; at Natura dat, quod viribus convenit. Præterea nos semel, aut bis illud exhibere possumus; at Natura largitur quod per plures dies dari potest, & usque ad perfectam corporis evacuationem, paulatim interim in lacte illo imminuens vim purgandi, & adaugens vim alendi. Nam falso hæc tenus æstimatum est ab omnibus, hoc primum lac puerperæ colostratos, quod dicitur, reddere infantes, iisque in ventriculo spissari ac coagulari, admixtumque cum prædictis illis excrementis corrumpi, & suscitare vapores ad caput ascendentes & pravorum symptomatum auctores; nullius esse nutrimenti vel pravi, quod eas omnes notas non habeat, quas bono lacti Auctores adscribunt, nimirum non sit laudabilis consistentia, calore album, odore suave, sapore dulce; sed contra potius crassum, flavum, sapore minus suave, aspectu virosium; adeoque ad evitanda omnia ista incommoda non primis diebus hoc primum lac puerperæ dandum; cum videamus quotidie alios pueros illud sugentes, nihil damni accipere; sed alio blande mota purgari ab iis excrementis, quæ non expurgata tempestive revera causa sunt malorum innocentis lacti temere adscriptorum; cumque sciamus Naturam nihil in nobis generasse, quod non cedat in nostrum usum. Quocirca monenda sunt obstetrices atque puerperæ, ne in posterum aut catulis colostrum projiciant tanquam inutile & noxium; aut à mulierculis & alijs puellis tandiu exsugi curent, donec melius lac ad nutrimentum pueri procedat, cum hoc primum lac sit ad totius corporis purgationem utilius omnibus aliis, quæ possunt præberi; pueroque non conveniat statim lac, quod optime nutrit, dare, antequam colostro per aliquot dies sit purgatus. Quod si contingat à partus primis diebus infantem non bene purgari (quod hic frequentissime solet in Italia evenire, propterea quia matres, cum non lactent suos fœtus, nutrices accerant, quæ jam per quatuor vel plures menses lactantur, neque ut oportebat recens à partu lac five colostrum infanti præbere queant) plerumque accidit, valetudinario magis educari, & in feres longas facilius, aut convulsiones, aut abcessus incidere tum magnos, tum adeo interdum frequentes, ut uno curato alius atque alius oboriatur: nam quo lac est vetustius, eo fit magis diureticum, & magis nutritius & minus purgans, ita ut alvum infantis adstrictum reddat. Itaque ut hoc caveatur, accersitus ad tales instantes interrogare soleo, qualis sit nutrix, quæ primum lactaverit; & alvum infans lubricum fervere, necne? nam si ab initio usus fuerit nutrice, quæ jam ante per medium annum, vel duos, tresve menses lactaverit, & alvo sit dura, etiam si sana sit femina, jubeo tamen illam mutari, & eligi aliam, quæ recens lac habeat: vel si talis non fuerit ad manus, purganda nutrix, atque etiam infans frequentius cum cassia lacti commissa.

Infantes post
partum non
sunt medica-
mentis pur-
gandi.

Colostrum
quid.

Primum primum
Pueri lactis
functionis des-
criptum.

Nota semel la-
cte.

Infanciæ
medicina à
matris alvæ
huiusmodi.

Quibus mor-
bis ab eo
infantes qui
non purgantur
sunt.

CAPVT XIV.

De partibus communibus, earumque dispositione.

Partium commu-
nium dispositio.

Artibus foetus propriis diligenter consideratis succedunt communes inspicienda, hoc est, ea, quas foetus cum homine perfectiore vel natu grandiore communes quidem habet, sed tamen aliter conformatas. Harum aliae externae sunt, & vel similes, ut cutis; vel compositae, ut oculus, mammae: aliae internae, atque etiam eae vel simplices, ut ossa, cartilagine, membranae ossibus annexae; vel compositae, ut jecur, cor, pulmo, intestinum caecum, cerebrum, renes, vesica.

CAPVT XV.

De Cute.

Cutis foetus ab
adultorum co-
ti descripta.

Cutis inter externas primo inspicienda est, quod sit colore quam in perfectis rubicundior, substantia rarior, poris laxioribus, & tactu mollior. Etenim cuticula cuti superposita tenuissima est, & simplex; at in perfectis natuque grandioribus longe crassior, ut aliquando duplici tunica constare videatur, propter crassiorum excrementorum copiam, quae per poros cutis exhalant, & frigus ambientis, quo ejusdem pori stringuntur. At cutis foetus laxior, rarior, ac rubicundior, tenuiorque est, quia continuo madore calido seu sudoribus tepentibus in utero proluitur undique, perque raros ejus poros sanguis copiosus ac rubicundior ad extremitates pororum permeare potest. Decebat autem ejusmodi cutem foetus dare, ut corpus, quod excrementa primae, secundae, & tertiae coctionis generat, viasque eas habet interclusas, per quas haec in nobis jam natis expurgari solent, in utero per cutis meatus & tenue & crassum excrementum e corpore amandaret. Ob talem cutis in foetu constitutionem infantia propriis quibusdam morbis corripitur, ut aliquando aphthis, hoc est oris ulceribus à lacte acri vel materia biliosa tenellam cutem oris erodente pronatis: quorum ulcerum mentionem fecit Hippocrates in Aphor. xxiv, lib. i. Sed saepissime intertriginibus, quorum mirum est Hippocratem in Aphorismis mentionem non fecisse. Oriuntur autem intertrigines modo in inguinibus & plicis femorum, modo sub axillis, modo in cervice & collo, rarius aliis in locis, quando Natura copiam materiae biliosae, quam per aliam viam, nempe per urinam & alvum expellere commode non potest, ad glandulas sub axillis vel inguine transmittit, vel ad collum ducit, ubi ob cutis tenuitatem facile per poros laxiores expellit, non sine cuticulæ ablatione primum, deinde etiam ulcere, si negligenter infans à nutrice regatur. Veteres qui de regimine infantis scripserunt, atque etiam recentiores, fassis pulvisculis & adstringentibus eas curare fuaudent, nulla adhibita cautela, quae mihi videtur summopere necessaria in infante educando ad sanitatem. Cum enim scirem Naturam per motum criscois hujusmodi intertriginem moliri, expulsa materia ad partem minus nobilem, aliter quidem ego eas curavi, & curare docui nutrices, scilicet ut in posterum intertriginibus obortis non statim mederi conarentur fassis adstringentibus & repellentibus medicamentis, sed finerent manare ichorem per paucos dies, donec cessare fluxus materiae ichorosae incipiat, intereaque prohiberent, ne nimio dolore infantes vexarentur, ac nimia acrimonia & longo tempore ulcerum profunda fierent, imposito tantum cerato ex oleo & cera simplici, vel ablatione frequenti aquae tepidae, vel linteis subtilibus madefactis in oleo lini & impositis; quibus effecti, ut infantes neque epilepsia, neque convulsione, neque febribus acutissimis, neque ullis aliis gravioribus morbis fuerint unquam correpti.

Quomodo in-
tertriginibus cu-
randa.

de Formato Fetu.

CAPVT XVI.

De Mammillis.



Mammillae quoque non sine ratione inspicienda sunt tam in masculo, quam foeminae foetu: non enim figura, aut duritie, vel magnitudine differunt; sed venis, quas parentiores habent; & virtute singulari, qua tertio vel quarto die, postquam lugere inceperunt infantes, fundere lac videntur, quod haecenus à doctissimis naturae indagatoribus observatum non est, vel neglectum. Forte propterea, quod non in omnibus infantibus id appareat, sed tantum in iis, qui admodum obesi sunt & sanguinei; ceteris vero macilentioribus, vel nihil vel paucum ex uberibus manet. At obesi in tanta copia fluunt, ut pressa papillae non secus atque nutricum procul ejaculentur ipsum lac, ac quotiescumque conglobatum est vel coagulatum, in apostema tendat. Iure igitur inquirendum, quae vi id contingat, an à mammis lac generandi virtutem habentibus, an lac jam recenter factum ad mammasillico, & per quos ductus fluat; & in quem finem Natura lac in hac aetate generet. Sane aestimandum est, ipsum illud lac quod recentem à matre aut nutrice factum, & nondum venarum ac hepatis beneficio valde alteratum est & mutatum in sanguinem, ne copia sua aggravet naturales facultates, tum per insensibiles meatus, quibus universum corpus, maxime infantis recens nati propter laxitatem & raritatem partium, perspirabile est, tum per venas parentiores in mammillas propulsum fluere, ut sic aliqua copia nutrimenti pauciori indigens corpus liberetur. Mammillas vero vim generandi lac non habere; quoniam omnium infantum mammillis haec vis innata esse deberet, videamus tamen macilentioribus nullum in iis lac generari, quod sanguine & nutrimento non abundet.

Mammilla
non in fetu
inspicitur ne-
cessario.Cur foetus lac
in mamma
dilatetur.

CAPVT XVII.

De Oculis.



De oculis infantum recens natorum quaeritur, an distincte videant à partu? quemadmodum constat nonnulla animalia distinctissime cer- nere, veluti agnum. Quod autem statim à partu videant, possumus experimento cognoscere: si enim infanti nuper nato ostendatur lumen, videbimus eum oculos in illud intendere, & quoquo versum moveret lumen, eo oculos quoque movere. Signum satis manifestum, quod videat infans. Sed unum altero distinctiorem visum habere credendum est, propter oculorum variantem temperiem: omnes vero confuse ac veluti per nebulam cuncta intueri, quod imagines non bene discernantur, propter humiditatem nimiam cerebri; nec bene recipiantur à pupilla, propter summam oculorum & praecipue corneae ac aliarum pupillam constituentium partium humiditatem; quae cum paulatim accrescente aetate mutetur ad temperamentum ficius, vel oculo perfecto magis proprium, in causam est, cur toties in infantia oculorum colores mutantur, & ex nigris flavi & caesi fiant.

Infantes na-
per naturam
describunt.Cur infantes
distincte viden-
t non possunt.Cur in infan-
tia oculo viden-
tiam colores
mutentur.

CAPVT XVIII.

De ceteris partibus compositis internis.



Inter internas partes, compositae prius occurrunt; atque inter has, omnia fere viscera, & cerebrum cum intestino caeco. Quarum quaedam magnitudine sola differunt, ut jecur, cor, & intestinum caecum; quaedam figura, ut renes: nonnulla utroque modo, ut cerebrum, quod proportionem corporis foetus majus est, quam in adultis, & duos ventriculos priores patentes habet. Ceterum quemadmodum Natura tres partes principales, cor, jecur, cerebrum majores fecit in foetu, quam proportionem corporis adultorum; sic etiam voluit esse magis sollicita de jecore, quam de aliis par-
tibus.

Partes prin-
cipales in fetu
magis.

tibus. Quippe tam magnum jecur foetui dare voluit, ut utrumque hypochondrion sua mole occuparet. Nec immerito; quoniam non modo partes totum corpus gubernantes validas habere decebat, sed robullissimam ac validissimam, maximamque eam partem, per quam conveniebat & cerebro & cordi, totique corpori alimentum præbere, idque longe celerius & copiosius quam in adultis, propter celeritimum & maxime admirabile augmentum, quod non solum natura in foetu adhuc in utero contento machinatur, sed & in infante statim ex utero egresso. Videmus enim primum natum infantem in tantam molem statim excrecere & augeri, ut paucorum mensium spatio fiat duplo grandior; quod non contingit in natu majoribus, minus in adultis. Imo unusquisque observare potest pueros, quo ortui sunt viciniore ætate, eo singulis annis grandiores evadere, ita quidem ut non solum quinto, sicut Arist. observavit lib. 1. de Gen. anim. cap. xvi. sed jam tertio anno plerique dimidium virilis stature suæ sint adepti; ultra pueritiam vero progressos non ita valde, ut antea excrecere.

Cerebrum & cor cum matre coeunt.

Cor parvis minus aliunde dedit.

Capitis magnitudo quam habent infans.

Pulmones foetus rubicundi & pumderosi.

Cerebrum autem & cor jecore minora sunt, quod iidem jecur materiam quoque subministrare debeat copiosissimam, non ad augmentum nutrimentumque tantum, verum etiam ad animales vitalesque spiritus generandos. Sed & cerebrum corde est majus, comparatis utriusque partis magnitudinibus cum iis, quæ sunt in adultis; non quod foetus copiosioribus spiritibus egeat, quam homo perfectior, sed quod cerebrum ex parte spermatica maxime confletur, cujus copia in prima conformatione foetus erat maxima, & hæc pars spermatica ad ampliandum se non multum admodum egeat alimento sanguineo. Habet præterea cerebrum ventriculos duos priores qua parte nasum spectant ita patulos, ut ad foramina ethmoidea pervii sint, proculdubio ad purgandum cerebrum à pituitoso excremento per naves commodius, quod in humido cerebro copiosissime in infantibus & pueris generatur: & inde nobis innotescit ratio, cur naves infantum & puerorum plurimo semper muco sillent usque ad octo vel decem annos, raro autem plures. Nam & in plurimis pueris, aliarum vero ætatum paucis, ventriculi cerebri versus naves ita sunt patuli. Patet etiam quod aliqui non facile purgentur per naves cum jam adoleverint, ege rationem posse, quod nimis clausos habeant hocce meatus. Datum est etiam à Natura foetui, propter cerebri magnitudinem caput magnum: hæcque magnitudo peculiarem usum obineat ad faciliorem exitum foetus ex utero. Nam cum hominis, veluti cæterorum animalium partus naturalis fiat in caput, decebat hominem grande caput habere, ut ejus pondere, dum sudoribus vel aquæ innatat in utero & se ad partum præparat & circumvolvitur, hæc pars prius cæteris ima peteret & ad collum cervicis uterique provolveretur; deinde egresso capite & amplissima pro cæteris partibus reddita via, reliquum corpus facilius sequeretur. Aliis autem animalibus plurimis non contingit caput tam magnum quam homini, dum uterogruntur, quod ea non ut homines conglobati in utero gestentur & capite ad fundum matricis sito & remoto ab uteri cervice; sed quod eorum caput prope uteri os positum sit, nec situs eorum ante partum, ut in homine transmutetur.

Pulmones rubicundi & ponderosi in foetu sunt, propter alimentum, sanguinem nimirum crassum & copiosum, quem à vena cava per foramen in venali arteria ad nutriendos pulmones fundi diximus: in adultis vero leves & subalbidi, quod occacato horum valvorum foramine, paucus ac tenuis sanguis ad pulmones permeat, admirabili nature providentia, quæ quo tempore quiescebant pulmones ab officio spiritum ætherei externum hauriendi, nutriti eos copiosiore & crasso alimento voluit; ubi vero jam ad respirationem destinati sunt in natis, ut facilius esset dilatatio, atque constriction pulmonum substantiam gravem & densam in leviori paulatim transmutavit, & alimentum levius ac spirituosius ob eandem causam ipsi subministrari voluit. Hanc igitur ob causam substantia pulmonum foetus gravis, densa, rubraque, in levem, raram, atque subalbidam natis jam transmutatur. Atque hic mirari nos summopere cum Galeno oportet Naturam, quod, cum nos venam vel arteriam aliquam magnam præcisam aut majorem in parte amputatam nunquam aut vix ullis medicamentis glutinare possumus, quod sint spermaticæ partes, ita tamen trium vel quatuor dierum spatio foramen, quod in vena cava & arteria venosa est, ita glutinet, ut primis quidem annis nihil, præterquam membrana; perfectæ vero homine, ne vestigium quidem compa-

reat. Sed

reat. Sed arteriæ portionem, quæ arteriam magnam cum arteriali vena conjungit, ita obliteret, ut cum cæteræ partes nato homini augeantur & crescant, illam prius quidem in funiculis mutet, deinde & hos quoque ne adesse quidem sinat.

Renibus quoque foetus peculiaris figura est, quam Bartholomæus Eustachius glandulosam, & instar pinæ nuci ex pluribus glandulis conglobatam recte observavit. Sic & vesica duplo major in foetu apparet, quam in adultis: in quibus contraria ratio- ne ventriculus triplo minor. Erat enim necesse, ut quæ pars copiosam humiditatem recipere debebat, amplius quoque spatium, in quo contineretur, haberet. Cum autem foetus nil per os humidi, quo ventriculum implet, acciperet; copiam autem ferosi humoris per venas umbilicales una cum sanguine hauriret, eratque necesse hanc per renes in vesicam & allantoidem deturbare, ideo voluit longe ampliorem vesicam stomacho esse.

Inter intestina nullum aliud dissimile in foetu à natu majoribus reperitur nisi cæcum, est enim longe grandius quam in adultis, & eadem materia, quæ in ileo continetur, repletum, ac idcirco circumplexans initium intestini coli. Et ratio magnitudinis est, quoniam foetus in utero conglobatus jacet & pronus, fere more quadrupedum & avium, quæ propterea cæcum intestinum amplum & longum adepta sunt, ut chylus vel cibus, qui in intestinis tenuibus est, contineatur.

C A P V T X I X.

De Ossibus.



Ossa autem recens nati quantopere ab adultorum ossibus variant, tum demum cognoscimus, cum ea cum adulti sceletro comparamus, & per singula membra. A capite igitur incipiamus, cujus ossa non modo figura, ac numero, & substantia, sed etiam connexione ab adultorum ossibus variant. Quippe connectuntur sibi mutuo fere cuncta, & ubique laxa quadam harmonia, quæ in adultis futura est; atque in quibsdem locis extrema ossium se nullo modo tangunt, ut in adultis per futuram, sed mediante membrana sibi adhærent, ut in basi & vertice capitis apertissime licet cernere. Quo enim loco futura coronalis cum sagittali in adultis concurrunt, ossis vice membrana quædam videtur forma triangulari, ob quam in infantibus recens natis motum cerebri super verticem percipimus, & oculis, & ad tactum: ideo hic locus à nonnullis palpatibus vertex dictus est; ab Arist. *ἡνὶν ὀφθαλμοῖς*, id est, os ultimo genitum, non enim antequam loqui puer incipit, hic locus ossis prorsus evadit. In Gallia vulgo dicitur la fontanelle. Notandum diligenter hic locus ab iis qui medicam praxim exercent, quod quando infantes malo quodam corripuntur, quod syriam veteres dixere, Latini fide- rationem, quæ nil aliud est quam insignis cerebri & meningum fervor cum febre continua ardenti, ad tantam caliditatem & ficitatem cerebrum perveniat, ut teste Moschione ejusmodi occipitium (ita enim appellat sinciput) concavum fiat. Nam cum in infantia sinciput non sit ossium, sed membranofum, non mirum est, quod ab insigni ficitate contractum cavitatem monstrat.

Sed ad ossa pergamus, ex quibus seles nobis offert frontis os non unicum, ut in adultis, sed in duas partes fissum, dextram nimirum & sinistram, quæ sibi invicem annectuntur per rimum seu harmoniam, quæ à media parte futuræ coronalis, qua cum sagittali jungitur incipiens recta per longitudinem faciei pergit ad narium radicem, qua frontis os terminatur. Sed & ulterius per nasi medium transiens ad extremitatem maxillæ superioris, ossa hujus maxillæ dividit in dextram & sinistram partem, & tandem inferiori quoque maxillam partitur in duas partes; quæ quidem harmonia vel fissura, tendente ad pubertatem homine, ita paulatim obliteratur, sed in adulto cranio non amplius compareat. Ossa autem sincipitis integra cernuntur, sed juxta verticem, ubi membrana triangularis est, nonnihil abbreviata. In hisce ossibus nempe frontis & sincipitis, cum in adultis sanguine extra venas inter pericranium & duram meningem ex contusione vel lapsu fluente, celebris sit chirurgia, qua, trepano dicto instrumento, perforatur cranium, ut sanguini ex propriis conceptaculis fluxu detur exitus, notare debent

Renum figura
qualis.

Vesica major
ventriculo in
foetu.

Intestinum
cæcum in
foetu.

Capitis ossa
fissa quoniam
de compon.
guttur.

Os ultimo
genitum.

Frontis os
dividit in
super.
natis.

Infantes tri-
pino trallat
non dicitur.

debet Chirurgi, ne vel infantibus vel pueris tale remedium genus adhibeat: periculoso enim est, propter ossium tenuitatem; nec necessarium, quoniam Natura sanguinem extra venas effusum inter cranium & duram matrem (nisi copia summo opere abundet) per laxa spatia, quæ ossium coagmentationibus intercedunt, & ossium cranii rimas ac meatus, porisque patulos cutis facile discutiat; quodque ex lapsu difficillime patiantur infantes vasorum ruptionem, propter cerebri & ossium molliem, quæ icui facile cedit.

Occipitis os
quod dicitur
in infante.

Os occipitis, quod in adulto unicum est, in infante nuper nato & foetu ex quatuor partibus constat, quarum pars maxima triangularis est; ubi enim lambdoidea sutura in adultis fines habet duorum veluti crurum, & additamenta incipiunt futuræ lambdoideis, rima quadam per transversum ab una cruris futuræ hujus extremitate ad alteram, eaque admodum laxa circumscribitur, & à reliquis tribus ossibus segregatur, quorum duo capitula occipitii continent, quæ *occipites*, Galenus appellavit, quibusque primæ cervicis vertebrae annectuntur; tertium vero, seu quarta pars occipitis est, quæ veluti additamentum sphenoidi ossi annectitur. Hæc occipitis ossis in infantibus in multis partibus divisio efficit, ut crescente homine atque unico facto osse occipitis, plurimum tamen in plerisque subiectis ex pluribus quam uno osse os occipitis constare videamus, & futuram lambdoideam plurimum variare; ita ut consueto termino relicto, interdum per os occipitis excurrat, & peculiaribus futuris in nonnullas partes occipitis quoque os dirimat, ac si ex pluribus quam uno osse conflaret. Eadem hæc ossium in infantibus constitutio satis manifestat causam, ob quam pueri post partum per aliquot menses caput erigere nequeant, etiam si habeant omnes illos mûculos, quibus caput flectitur & extenditur, ac circumagitur: omnes namque hi mûculi annectuntur ossibus, quæ nondum sunt firmata.

Cur futura
lambdoidea
sit varia.

Pueri statim
nati cur caput
erigere nequeant.

Ossa tempora-
rum divisio in
infante.

Ossa temporum in duas partes divisa sunt: major pars processum illum continet, qui alteram partem ossis jugalis constituit, & squamosi futuræ vel conjugationibus, ossibus utrinque sphenoidi & fincipitis committitur. Ideoque squamosum os ea pars dicitur, & separatur per harmoniam ab osse petroso, quæ minor est pars ossium temporum. Vbi quoque observandum est, intra calvariam os squamosum processum habere, quem temporum quartum nonnulli ex ordine enumerant, facile, imo tantum cultri acie à suo osse, cui adhæret, separabilem, cuius divisionis rudimentum etiam in adultis sæpe apparet. Cæterum minor pars ossis temporum, quod petrosum appellari diximus, meatum habet auditorium in foetu prorsus cartilagineum, osseum circulum intus habentem, cui tympanum alligatur; insuper & ossicula, stapedem, malleum & incudem, ficiissima, ac duritie & magnitudine pari, ut in adultis; verum mammillari processu atque styloide prorsus destituitur.

Meatus audi-
torium in foetu
cartilagineum.

Os ethmoides
cartilagineum.

Os ethmoides cartilagineum quoque est, cujus medium, quod cristatum est, prius osseum fieri à curiosis Anatomicis fuit observatum. Præclara quoque est ea observatio, quam Fallopius de sphenoidi osse foetus scribit, quæ ab aliis Anatomicis omissa est. Constat namque dicit hoc os ex quatuor partibus, atque eas sensim brevitate connasci, ut post septimum ab ortu mensem vix distincte appareant. Prima pars hujus ossis est, quæ sellam equinam dictam continet: secunda pars, quæ primæ copiosa cartilagine copulatur, ea est, cui viorii nervi simul copulati primo adhærent, atque disjuncti, dum oculos petunt, foramina incurrunt; quæque alas geminas possidet, dextram & sinistram rimam efficientes, quæ maxime in intima oculi cavitare apparent, & transitum secundæ nervorum conjugationi, dum oculos petunt, atque aliquot aliis tertiæ, quartæ atque octavæ propaginibus ministrant. In hac secunda parte (ut ait Fallopius) in pueris quamvis spongiosa sit, nulla adest cavitas aut sinus usque ad integrum annum; in adultis vero geminus reperitur & satis amplus, qui post primum exactum annum fieri incipit, & pro ossium incremento magnus aut parvus adest. Hic sinus vestitur tenuissima quadam membrana aut pellicula, veluti vestiuntur etiam cavitates geminæ, quæ in ore frontis & malis contentæ sunt, quæque pariter in nuper natorum calvaris non reperiuntur; sed interea dum adolefcunt ossa, fiunt. In hac eadem parte, qua respicit palatum, quidam clavus seu palus osseus inest, cui affigitur os fatis longum & latum, in ortu cartilagineum, vomeri vel cultri potius in aratro vomer præeuntum simile, quod (ab aliquot

(ab aliquot Anatomicis neglectum) magnam operam in distinguenda narium cavitare dextra & sinistra præstat. Tertia & quarta pars, continet processum alatos, dextra dextrum, sinistra sinistrum, & quidquid inter illam rimam oblongam in oculorum cavitare positum, atque ossa temporum continetur. In dictis partibus etiam sunt illa foramina, per quæ minor propago quinti paris nervorum defertur ad temporum mûculos, item major portio tertii paris, & totum quartum par, & ramuli arteriæ lopalris per membranam duram distribuendi feruntur. Colligantur sibi invicem hæ partes cartilagine, quæ in os evadens unicum os efficit, quod à formæ varietate à Græcis merito *manducæ* appellatum fuit.

In palato tres reperiuntur futuræ. Præter enim illam communem in adultis, quæ dextra palati pars à sinistra dividitur, duæ sunt aliae in utraque parte, quæ ad utrumque caninum dentem, à medio termino sexti ossis maxillæ superioris procedunt; ut hac ratione palatum ex sex ossibus constitutum esse videatur.

Maxillam inferiorem duas partes continere, seu duo ossa propter harmoniam, quæ in infantibus per ejus maxillæ medium excurrit, jam dictum est.

Dentes autem, ut unicuique notum est, in infantibus desunt, & post ortum generantur. In cavitatibus enim utriusque maxillæ infans reperitur folliculi quidam membranosus, in quibus materiam quandam mucosam cernere licet, quæ paulatim indurata audiorque reddita foras egreditur, & folliculum gingivæ perforans evadit candida squama, instar favi tenuis, & excavata. Bartholomæus Eustachius in lib. de dentibus observavit, hanc cavitatem ad septennium, & plures etiam annos insigniter amplam perdurare, albo quodam humore repleta, qui procedente tempore durior factus, ossis naturam suscipit, & totam fere cavitatem opplet; & deinde fieri putat, ut dentes in adultis duplici substantia (quemadmodum arbores cortice & medulla) constare videantur; externa nempe, teris, densa & alba instar marmoris, atque interna subobscura & nigricante. Dentis inferior pars in maxillis infantum recondita, etiam molliis appareat, durior tamen est ea parte, quæ extra gingivæ prorumpit, cui tantum in puncto adhærens facile trahitur & educitur: folliculus vero in perfecto dente veluti glutine præsepiolis ac gingivis dentem alligat.

Tanta igitur capitis infantium ab adultorum capitibus dissimilitudo causam nobis reddit, ob quam in infantia & pueritia toties facies humana mutatur; caput modo oblongum, modo rotundum cernatur; modo depressum, modo acuminatum, præcipue in nonnullis quando dentes eruperint; cur item in adultis apud varios populos varia caput figuræ cernantur, prout tenella hæc infantum capita à nutricibus variè gubernantur. Nam Belgis & Parisiensibus capita sunt oblonga, quoniam in cunis pueros super alterutrum tempus dormire matres sinunt, & capita ad frigus depellendum confringunt nonnulli tegumentis, quæ baginas vocant. Germani compresso capite donantur ac lato, quod matres in cunis puerulos locent super dorsum, ac manibus, citra sæpe fasciarum usum, lateribus cuniarum alligant, ne in quatiendo è cunis excidant. In eruptione porro dentium peculiaris ordo à Natura servatur, ne omnes illico emergant, ut molares ante caninos aut incisores. Non enim conveniebat dentes omnes simul prodire, quod cum membranam perforant sensu præditam, nimis magnos dolores, inflammationes, ac totius corporis perturbationes, febresque intolerabiles excitassent, quodque non oportebat cibum solidum statim, ac uno eodemque tempore tenero lacti assuetum puerum assumere; sed paulatim cibo solidiori affluere conveniebat, & propterea prius incisores, deinde molares produci voluit Natura, quod usu in mandendo cibum solidiorem incisores præcedant molares. Prioribus enim dentibus apprehendimus ac incidimus; deinde cum buccis & lingua ad latera in ore cibum præhendimus ac incisum protrudimus molaribus, ut eum in minimas partes confringant. Sed & in superiori maxilla ut plurimum in infantibus dentes prius erumpunt, raro in inferiori; quia papillis uberum superior maxilla magis arteriæ ac pruritatur, quam inferior; gingivæ autem attritis facilius dentes erumpere argumento est densi lupi vel apri, vel corallum vel aliud quippiam durum, quod pueris à collo suspenditur dentientibus, ut in manu teneant & ori admoveant, quod atterant gingivæ, & sic facilius ac accelerent dentium ortum. Arist. in Hist. de animal. scribit lac nutricum calidius citius dentes procreare:

In palato in-
fantis tres
futures.

Maxilla inferi-
oris duplex.

Dentes infan-
ti desunt.

Quomodo
dentes gene-
rantur.

Dentes in-
fantum
constant
infantibus.

Facies huma-
na cur toties
mutetur.

Cur variæ
sint capitis
figure.

Dentes qui
fiunt
non accedunt.

Prius superio-
res dentes er-
nantur.

Lac calidius
citius dentes
generat.

procreare: cujus rei duplex succurrit ratio. Prima. Quod alimentum hoc, quo cilius est, eo citius per omnes corporis partes penetrando, alit partes solidas, hoc est, ossa & dentes. Secunda. Quod cum infans lactat, calidum lac calfacit gingivas, & laxat membranas, sub quibus dentes latent. Cæterum ex hac dentium procreatione, quæ & paulatim fit & ex ordine, docemur solo lacte pascendos esse pueros, utque dentes anteriores producant, nec citius ablaquandos, quam omnes producerint, ac prout multi dentes producant, pro eo pueris solidiora alimenta esse præbenda. Quocirca lubet summam obitericam & nutricum multitiem reprehendere, quæ paucis post ortum non dicam mensibus, sed etiam diebus, una cum lacte panem vino maceratum vel panatellam infantibus præbent, cum sic plurimas in tenello corpore generent eruditates, morbosque pariant sæpe periculosissimas, sapissime funestos. Novi olim Bononiæ Typographi uxorem, quæ cum multis filios feliciter parceret, omnes incaute occidebat, quod cibum solidiorem, nempe panem cum vino maceratum suis infantibus nimis cito præberet, meminique cunctos hydrope cachexia, magnisque lienibus consumptos ante biennium fuisse. Quamobrem curandum est, ut filii solo lacte usque ad tempus dentitionis nutriantur, quantum fieri potest primis mensibus. Hoc enim alimentum quam citissime per totum corpus distribuitur, ac teneras quasque partes nutrit, ossa perficit, firmat, augetque velociter pro naturæ decreto primis mensibus.

Prosequamur deinceps differentiam reliquorum ossium capiti subiectorum. Os hyoides ossæ basim habet, cornua vero fuit cartilaginea; quia basi hyoidis firmatur lingua ad deglutitionem, quæ in lactando pueris erat maxime necessaria; cornibus vero vocis modulatio perficitur, quam antequam solidiora vel ossæ evadant, formare recens natus homo nequit.

Vertebræ omnes non sunt unicum os, ut in adultis; sed singulæ ex pluribus ossibus constant. Observavit aliquando Fallopius, primam vertebra collis ex quinque partibus constare; reliquæ omnes vertebrae tum cervicis, tum dorsi & lumborum usque ad os coccygis, in tres partes divisæ sunt, præter cervicis secundam, quæ cum odontoide epiphyssi in quatuor portiones divisæ est. In cæteris namque pars prima est vertebrae corpus, reliquæ duæ continent foramina in lateribus, & processus cartilagineos. Carent autem omnes processu, quem spinam vocant Anatomici; unde fit, ut dum infans est homo vel puellus, in posteriorem partem mirabiliter flecti possit, ita ut occiput calcaneo tangere queat. Quocirca non sunt mirandi funambulatorum, agyrtarum & circumforaneorum monstrici flexus in omnem partem, saltusque formidabiles. Hi enim scientes hanc infantium dorsi constitutionem, à teneris assuescunt facile flectere in omnem partem tenellos puerorum artus absque dolore, sed maxime ad posteriorem, quæ consuetudine vertebrae istæ processus paulatim succreuit decurtatus vel obtrusus acuminis suo recto aut caput versus tendente.

Scapularum ossa processum ancyroidem cartilagineum habent, oraque basis cartilaginea, & angulum inferiorem basis multo majori quam in adultis cartilagine præditum. Superior quoque scapulae processus appendice sua caret, quæ cum sensim succrescat in pueris, ex plurimis officulis cartilaginosis interveni coalescentibus conformatur, ut Vesalius annotavit.

Sternum os ex multis constat ossibus à se invicem separatis: maximum os id est, quod primarum costarum cartilaginibus est vicinus; minus huic est subiectum; deinceps reliqua, quæ magis xyphoidi cartilagini sunt viciniore, eo minora existunt. Ejusmodi ossa in pueris usque ad septem annos divisâ sunt, paulatimque grandescunt & solida fiunt, sed prius ea, quæ nunc sunt majora; deinde, minora.

Artus denique, nempe brachia & crura, articulis, extremitatibus seu appendicibus ossium carent & destituuntur, manifestius autem humerus, cubitus, manus articuli, coxæ, femoris, genus seu tibiæ, & pedis: obscurius vero, quod exiguis habent appendices, metacarpi cum ossibus carpi & pedis, seu tarsi cum ossibus metatarsi: & ossa digitorum, quod careant appendicibus laxa compagine, & eaque membranosa hærent. Hinc patet causa cur pueri non statim ab ortu salient, vel ambulant, vel repant in terram sicuti agni, vituli, vel catuli. Cunctis enim his animalibus articuli & ossa conformata sunt, antequam in lucem prodeant; at homo ossa cuncta imperfecta obinet dum nascitur,

nascitur, nulloque modo articulate prodit. Carpi & tarsi ossa omnino cartilaginea sunt, præter os calcis, in cuius medio quid ossi apparet. Octavum carpi os ultimum omnium ossæam acquirit substantiam, quod os Galenus *de ossibus* appellavit, id est, innominatum; Cello vero, os coxæ dicitur. Constat autem ex tribus ossibus, nempe ossi ilium, coxendicis & pubis; cum tamen in adultis unicum sit os, cognosciturque inde causa, ob quam hoc os, quod in adultis unicum est, ab Anatomicis in tres partes (propriis jam dictis nominibus nobilitatas) dividitur. Non enim in infantibus & fœtu tantum, sed etiam in pueris usque ad septem annos ejusmodi os in tres partes separari potest: at in infante amplioribus intervallis, quam in puero distinguuntur. Iam satis ni fallor explicavi hanc ossium infantium & fœtuum imperfectam constructionem; cui triplex subiungenda est ratio, una, situs fœtus in utero; altera, partus facilitas; tertia, hominis imperfectio. Dico primum, situm in utero causam esse, ob quam in fœtu humano ossa imperfecta à summo rerum opifice creata sunt. Nam aliter in utero humanus fœtus situs est, quam cæterorum animalium. Horum namque fœtus capite semper uteri orificio, per quod exituri sunt spectant, nec aliter situm mutant: at homo in matris utero contra capite ab uteri orificio averfus spectatur, & octavo mense, vel paucis diebus ante partum situm mutat capite deorsum ad uteri orificium declinans, quæ quidem mutatio situs non poterat fieri, nisi cum maximo dolore matris, ruptione membranarum chorii, & vice discrimine, si ossibus perfectis homo esset in utero. Præterea cum animalia expansa in utero sint, propter uteri oblongam formam, & amplam cornu; homo vero in unum suis articulis conglobatus, ob rotundam uteri internam capacitatem, non poterat in globum flecti totum corpus, nec in omnem partem se movere in utero, si ossa articuli, uti in adultis, donata fuissent. Iam quoque & partus facilitas commoditate fecit hanc ossium imperfectionem. Nam cum in partu exire oportet per angulum uteri foramen tanta moles, & caput ejus prius prodire, id ex pluribus ossibus conformavit, laxis suturis & membranosis nexibus sibi invicem adhaerentibus, ut hac ratione totum caput, quod amplissima pars est, in fastigium & oblongam formam comprimere posset ad faciliorem exitum. Idcirco erat quoque necessarium, ut neque humeri articuli, neque coxæ perfecti essent. Nam humerorum & articulorum coxæ latitudo commodiori partui, propter latas eminentias, prorsus restitissent.

Tertia causa cur ossa in puero sint imperfecta jam dixi, quod fit hominis imperfectio. Posset tamen aliquis me redarguere, cum à magnis naturæ indagatoribus statutum sit, Naturam nil magis expetere, quam cuiusque rei perfectionem. Dico tamen imperfectiorem cæteris animalibus Deum hominem creasse, ut omnium fieret perfectissimus, quod & in nostro sexu observare licet. Nam mas inter homines ut femina fieret perfectior sapientia, & omnibus membris fortior, à femina imperfectiori in tenella ætate, in loquendo expeditus, in gignendo semen citius, & alias corporis actiones peragendo vincitur. Sic homo, ut omnium animalium fieret perfectissimus, nascitur imperfectus. Ambulandi enim &prehendendi quippiam manu impotens est, præter ejulatam nullam vocem edit; & cum multa animalia statim nata herbam comedant, vel fœnum, vel grana tritici & milii, ut volucres: homo præter lac nil assumere, nil deglutire potest. At oportebat hominem ita nasci, ut esset rationis omniumque disciplinarum capax & aptus ad docendum: ideoque matris industria loquendi & ambulandi promptitudo, & paulatim ipsa ratio infunduntur; deinde crescente ingenio sapientia, artes & scientiæ variæ à præceptoribus hauriuntur, quæ cuncta non fuissent tam egregie confectura, si sine auxilio illico, more animalium, post partum ambulare potuissent. Propterea unicuique observare licet, infantes quo frequentius eos matres alloquuntur, eo citius & expeditius loqui incipere, & quo sæpius cum pluribus hominibus versantur, aut eos loquentes audiunt, eo & mores eorum varios & loquendi modos facilius addiscere. Itaque ad educandos infantes diligenter præcipiunt sapientes viri, ut nutrices elegantur non taciturnæ vel stultæ, vel pravorum morum; sed quæ expedite prudenterque loquantur, & bonis moribus sint prædita.

Porro propter hanc eandem ossium dissolutam connexionem & imperfectionem, consuetudo invaluit in omni terrarum regione, præterquam Scytharum Nomadum, ut scribit Hipp. Infantes statim natos falcis ligandi per annum unum vel alterum; non

D D

tantum,

Os innominatum infans triplex.

Cur puerorum ossa non perfectiora in utero.

Secunda causa.

Tertia causa.

Femina mas perfectior sapientia.

Cur fœtandi tenelli infantes.

tantum, ne lata fiant corpora & fluida, veluti Nomadum, quos Tartaros hodie vocant; verum etiam, ut ossa paulatim corroborentur, & ipsis articuli adnascantur. At quod in fasciando infantes obstetricum & nutricum non modica requiratur peritia, ne vel pedes ligent fasciis, vel brachia contorqueant, ut vaci & valgi cruribus impostum evadant, brachiique mutili, vel claudi cruribus, docet hæc Anatomie; quæ etiam similiter demonstrat sæpe evenire, ut claudicent impostum quando ante debitam ossium consolidationem matres vel nutrices, ut se ab onere gestandi pueros quam citissime liberent, post sex vel septem menses docent infantes ambulare vel pedibus se firmare. Propterea si mater vel nutrix scire cupiat tempus, quo ambulatio docenda est, triplici modo hoc docebo. Primò, si ea parte crani, quæ caput apertum esse solet, ac sola membrana loco ossis velatum videtur, percipiat cerebrum vix amplius pulsare. Signum enim est, sincipitis hoc os, quod omnium ultimo generatur, jam natum esse, ideoque etiam reliqua ossa cum suis articulis jam esse firmata satis ad principium ambulationis. Secundò, si fasciis exutus infans, pedibus insistere potest. Tertiò, si cum post tres quatuorve menses manus à fasciis liberantur, infantes brachia & manus bene moveant, & firmiter manu teneant. Semper enim contingit, ut quo tempore brachiorum ossa perficiuntur, etiam perficiantur & crurum & aliorum, nisi aliquo fortassis naturæ impedimento aliquod os à prima conformatione debiliter sit formatum. Nam apud Forestum legi aliquando infantem natum brachio uno exosse, altero vero osse prædito, atque hunc admotis plagulis, & fasciis confictis, ut in fracturis fieri solet, fanitati restitutum, admirantibus cunctis medicis & chirurgis, qui hanc curationem audierant vel viderant, quod os generaretur, ubi numquam erat conspectum. Nesciebant autem isti in cunctis nuper natis puerulis quædam plus ossis in membris ac perfectius, quædam vero minus habere, cunctique fere apophyses & articulos deesse, qui deinceps ætate succrescere ac indurari consueverunt. Rursus ex hac ossium conformatione quomodo infantes fasciis ligati sint in cunis collocandi docetur. Non enim in latus, ut adulti vel pueri, sed dorso incumbere sinendi sunt; capite nonnihil elevato, ut è naribus & ore pituita profluat; quod ut fiat commodius, nonnulli caput leviter in alterutrum latus declinant. Cæterum quoniam constat ex his, quæ diximus, infirmas partes infantium infirmas satis edere actiones respectu adultorum, ut oculum infirmum infirmam visionem; querere quispiam merito potest, quamobrem, cum ossa puerorum minus robusta sint, nihilominus citius celeriusque ambulent, quam viri. Videtur enim celeritas motus ad demonstrandum cuiusque partis robur conferre, & propterea dicendum crura esse robustiora puerorum, quam adultorum; quod Anatomie repugnat. Ad hanc dubitationem dico, celeritatem ambulandi in pueris procedere à debilitate crurum. Cum enim ambulatio fiat unius cruris translatione & alterius pedis firmatione, propter ossium vero & articulorum imbecillitatem non bene firmari pes possit tamdiu, donec alter sensim transferatur, fit ut pes alter qui transferitur pedis firmamento cogatur quam citissime auxiliari, quod nequeat diutius totum corporis pondus sustinere; idcirco homo, quo ætate fit provectior, eo tardiore gradu procedit, ad sua munera obeunda; quo vero infantia aut pueritia vicinior, eo celeriori cursu suos res peragit. Est etiam notabilis omnino ossis coarctatus vel ejus articuli infirmitas, quæ ad infantes vel herniosos puerulos accesserunt, ne vel ferreos cingulos, quibus omentum vel intestinum in scrotum prolapsum & in fenum locum repositum prohibere solemus ne denno ex abdomine prolabatur in scrotum, illis, neve cingulos duos, eosque fortiter strictos nondum septimum annum attingentibus præscribant: metuendum enim est ne à duro & restricto sub cingulo ita coarctata hæc ossa reddantur in suo augmento, ut propter horum ossium angustiam inferior corpus indecorum evadat. Quærat autem quispiam ultimo loco, quomodo ossa seu eorum extremitates, quæ desiderantur in infantibus paulatim perficiantur, vel succrescant. Nonnulli existimant eam, quæ ossa ossibus annectit, membranam in os verti, & antequam in os vertatur in nonnullis partibus verti in cartilagineum, quod falsum est. Si enim ex membrana durior facta os fieret, proculdubio non pars aliqua membranae, sed tota simul mutaretur in duriorum substantiam, nempe cartilagineum prius, cuius natura media est inter os & duram membranam, quod non ita apparet. Nam ossium omnium eadem generatio non est: etenim

etenim processus inferni femoris tibiæ & fibulæ, & cubiti duo, qui trochlea obvolvuntur, prius toti gignuntur cartilaginei, antequam ossi evadant: alia vero ossa perfectionem suarum extremitatum acquirunt per appositionem, ut superius vidimus in capite, ubi fit concursus futuræ coronalis & sagittalis membranofus. Non enim illico membrana in os tota mutatur, uti hæctenus existimantur Anatomici, sed paulatim materia alimetalis, quæ in os vertitur apponitur ossium sincipitis & frontis extremitatibus tamdiu, donec omnes fines per futuræ medium coeant, eo pene modo, quo glacies concrevit in aquæ superficie. Fiunt namque prius tenuia veluti flamma seu filamenta circa oras fluvii vel vasis aquam continentis, deinde hæc alia glacies accrescit, & sic tandem aquæ tota superficies congelascit. In calcei ossis quamvis in superficie cartilagineum appareat, antequam ex membrana os fiat, in medio tamen natura aliquod ossium jacet fundamentum, ex quo per appositionem calcei os paulatim grandescens conformatur.

CAPVT XX.

De Partus tempore, modo, & causa.



Formati fœtus exactionem cognitionem scire etiam necesse plurimis videtur partus tempus, modum, & causam; quibus ego quoque non reclamabo, præsertim cum videam hanc disputationem non tantum medicinæ studiosis utilem fore, sed etiam legum peritis. Cum enim legibus eorum imperatorii recte fit, propter summam Hippocratis nostri auctoritatem sancitum, septimo mense natos fœtus vitales esse legitimique censeri debere, non secus atque eos, qui octavo, nono, decimoque mense nascuntur: tum noscere quoque debent etiam ultra prænominatos menses, nempe undecimo, duodecimo, decimotertio, ac decimoquarto legitime nasci posse, Vlpianumque reprehendendum, qui post decimum mensem editum nullum ad legitimam hereditatem admittit. Nam ut ea præteream, quæ à Veteribus recentioribusque adducuntur, olim novi hominem, qui tabellarium agebat in Belgio, litteracæ ferebat ex Zelandia in Batavia, Urbis Medioburgensis testimonio publico omnibus commonstrasse, se sexti mensis initio editum, corpore exiguum ac viribus ita debilem & ossibus infirmum, ut mater coacta fuerit per tres menses in sinu ac inter ubera gossipio circumdactum ad frigora fovere, donec robur acquisiverat, quo posset fasciis circumligari, erat autem hic homo dimidius pumilio quadraginta annorum. Atque nuper, ne ab externis repetam exempla, neve historias recitem, quibus Schenckius probavit duodecimo, decimotertio, decimoquarto, & decimoquinto mense gestari posse, in manu scriptis observationibus legi, Bellocatum hic Patavii excellentissimum medicum aliquoties enarrasse discipulis suis in lectionibus, sororem eruditissimi viri Buccellæ Patavini per menses sexdecim uterum gestasse, & cum molam omnes eam in utero habere suspicarentur, peperisse filium optime formatum. Cum igitur tam varium incertumque sit pariendi tempus, inquirenda causa, quam videtur hæctenus omnes docti viri vel omisisse, vel satis jejune obscure investigasse ac tradidisse. Etenim existimantur nonnulli, quod homo non haberet ad coitum designatum tempus, multipliciti victus ratione uteretur, phantasiæ quoque & pathematum variis alterationibus obnoxius esset omni hora, & propterea incerto tempore pareret. Sed hæc omnes causæ nimis sunt remotæ; quero ego aliquam proximior. Hæc nulla alia esse potest, quam maturatio & perfectio fœtus, quæ fit in utero incerto tempore & variis interdum mensibus, ob facultates corpus fœtus gubernantes vel debiliores, vel robustiores. Facultas utero debilis vel robusta fit vel per se, ex semine nempe, cui inhaeret tamquam suus principio; vel debilis validave fit ex accidenti, nempe apti alimenti penuria, ob quam nequeunt ossa firmari, & corroborari spirituales animalesque partes, adeo ut debito tempore, cum jam in lucem prodire debebat fœtus, neque flectere movereq; se in utero, neque lac fugere, aut spiritum ore naribusque ducere queat. Contingit autem hæc penuria alimenti vel matris vitio, nempe morbo, inedia, aliave causa externa; vel fœtus ægritudine, quam sibi à pravo matris alimento, vel copioso nimium acquisivit. Nam plurimis quoque morbis in utero matris fœtum corripit, & Veterum auctoritate didicimus, & nuper fœtum

Cui multi claudicant.

Quando ambulationi infantes affliguntur.

Quando infantes in cunis locantur.

Celeritas ambulandi in pueris à debilitate procedit.

Fœtus cum puerulis in fœtus in fœtus.

Quando eximantur ossa in fœtus in fœtus.

Auctoris opinio de generis fœtus.

Vlpianus reprehendendus.

Fœtus fœtus fœtus.

Auctor qui per fœtum menses uterum gestasse.

Nonnullorum opinio de incerto tempore partus.

Auctoris opinio de incerto tempore partus.

Fœtus mortuus in utero cuiusdam mulieris.

dissectione experti sumus. Quod si in nobis jam natis videamus saepe agrum corpusculum parum, interdum vero nil augeri, praesertim si diuturno malo fuerit conflictatum, nisi vires recolligat; nonne similiter nobis licebit opinari, foetui ob morbum posse differri maturationis suae tempus & exitus ex utero, usquequo debeat, confirmatis facultatibus particulas qualesque corporis gubernantibus, perfectionem acquisiverit. Videmus eos, quibus corporis potentia robustiores sunt, citius quoque perfici ac nasci; septimoque mense natos foetus plerumque mares esse, raro feminas, aut minus vitales. Praeterea cernere licet in pomiferis aut alterius generis arboribus, non omnes eos fructus, qui uno eodemque tempore florebant veris initio, illico cunctos simul maturefcere ac decidere; sed aliquot vel solis calore privatos, vel ventis aquilonaribus expositos, vel grandine & nebula laesos, vel facultate attrahendi & concoquendi sibi alimentum languidos diu adhuc arboribus post alios harrere, donec maturentur. Quocirca existimandum est, maturationis tarditatem vel celeritatem partum accelerare vel tardare: causamque quod foetus in lucem prodeat, non esse ejus magnitudinem, aut inopiam alimenti; Vt veteres nonnulli somniarunt; sed ipsam perfectionem, seu maturationem foetus, quae praesertim circa partes spirituales & naturales talis est, ut in lucem prodians naribus & ore spiritum trahere, & lac ex matris uberibus sugere queat. Nam videmus multas matres saepe minimos foetus parere, & tamen magnum incrementum corporis crescente aetate acquirere; aliquando maximos foetus parere & gemellos; deinde post partum, & gemellos, & parvos, & magnos foetus solo lacte, quod in uberibus generatur nutrire, non dicam per mensem unum vel alterum, sed etiam per annum fere integrum: quod non contingeret si mulier pareret vel foetus ex utero exiret ob magnitudinem corporis, & penuriam alimenti. Nam ille sanguis, qui fluit tanta copia post partum ad ubera, nonne ad uterum fluere quoque poterat ad nutriendum amplius foetum? Porro qui superius causam incerti partus hominum retulerunt in coitus incerta tempora, varias victus rationes, phantasias, & varios animi affectus, hac opinione decepti sunt, quod putarent alia animalia quadrupeda, vivipara, & quae unum vel alterum tantum pariunt foetum, ut equam, elephantem, vaccam, asinam, certo tempore parere, equam uno, elephantem secundo anno, atque hoc esse praefinitum ipsis tempus pariendi; quod falsum esse ratio & auctoritates ostendunt. Etenim tarditatis & celeritatis partus eandem causam haec animalia habere possunt cum homine communem. Ideoque Absyrus Veterinarius praestantissimus etiam equam undecim mensium curriculo decemque dierum uterum gerere scribat; Varro tamen lib. de Re rustica inquit, duodecimo mense, die decimo nasci; quae post id tempus nascuntur, fere inautilia & vitiosa existerent. Sic Aristoteles elephantem biennio uterum gerere scripsit. At Strabo, Diodorus Siculus, Arrianus in Indicis menses ut minimum sexdecim, ut plurimum octodecim.

F I N I S.



IVLII CASSERII
PLACENTINI
DE
FORMATO FOETV
TABVLÆ,
Earumque Explanatio.

TABVLÆ PRIMÆ
EXPLANATIO.

Figura hæc mulieris gravidæ uterum, communibus tegumentis ablaris, ostendit.

AAAA. Tegumenta communia in abdomine decussatim dissecta, & foras projecta.

BBB. Vterus gravida, qui tunc temporis multum à membranosa natura degenerat, & spongiosam quamdam substantiam induit.

CC. Vasa per uterum totum disseminata.

DD. Intestina, quæ utero intumescenti nonnihil cedunt.

Tab. I



TABVLÆ SECVNDÆ
EXPLANATIO.

HÆc Tabula secunda foeminae parturientis uterum offert,
& fœtum exitum molientem sub tunicis chorio & amnio de-
monstrat.

AAAA. *Membrana uteri foras reflexa.*

BBB. *Chorion tunica fœtui propria exterius, sub qua fœtus hic
obscurè apparet.*

CC. *Fœtus prout ad exitum disponitur sub chorio.*

Tab. II



TABVLÆ TERTIÆ
EXPLICATIO.

Tertia tabula, dissectis tunicis uteri & chorio, puellum in eodem situ, amnio adhuc involutum, ostendit.

AA. *Cutis exterior abdominis.*

BBB. *Vteri dissecti membrana.*

CCCC. *Membrana exterior fetum involvens dissecta, quæ Chorion dicitur.*

DDD. *Puellus amnio involutus exitum parans.*

Tab. III.



TABVLÆ QVARTÆ
EXPLANATIO.

QVarta tabula ostendit puellum nudum, tunicis omnibus, tam propriis, quàm communibus divisis.

- AA. Chorii dissecti portiones à suo loco remotæ.
 B. Amnii portio.
 CC. Vteri dissecti membrana.
 DD. Placenta, seu hepar uterinum, mole quadam carnea & pluribus vasis donata, per quæ infans nutrimentum capit.
 E. Divaricatio vasorum, quæ hic unum vinculum constituunt ad umbilicalia vasa contegenda.
 FF. Vinculum, per quod vasa umbilicalia à placenta ad umbilicum feruntur.
 GG. Puelli perfecti & partui proximi situs in utero.
 H. Insertio vasorum umbilicalium in ipsum umbilicum.

T. 6. III.



TABVLÆ QVINTÆ EXPLICATIO.

Tabulæ quintæ figura prima continet chorii internam faciem, quâ foetum respicit, unâ cum amnio tunica.

AAAA. Chorion, hoc est, exterior foetum involvens tunica, in modum crucis divisa, usque ad carneam suam placenta;

BBB. Carneâ placenta ipsa interiori quoque sui parte, ubi rami vasorum umbilicalium magno numero conspiciuntur, & ubi vasa umbilicalia ipsa emergunt.

CCC. Rami vasorum umbilicalium per placenta errantes.

DDD. Vasa umbilicalia sua membrana inclusa.

EEE. Altera membrana interior, amnios vocata.

Figura secunda repræsentat idem chorion extrinsecus, quâ uterum respicit.

AAAA. Membrana pars chorii, ad carnem crucis modo itidem incisa.

BBBB. Placenta carneâ, qua parte utero connascitur: & observetur obiter ejus inæqualitatem.

CC. Vasorum umbilicalium extrema radices, quæ cum uteri vasis unitæ foetus alimentum advehant.

DDD. Funiculus vasorum umbilicalium, ex opposita interna parte chorii, unde pronascitur eminens.

Tab. v

Fig. I.





Fig. II.



TABVLÆ SEXTÆ
EXPLANATIO.

TAbula Sexta exhibet hæc umbilicalia vasa à chorii placenta liberata.

AAAA. Vascularum umbilicalium chorda, suo adhuc involucri, quod intestinum vocatur, excepta.

B. Initium divisionis vascularum umbilicalium in chorii carnem.

CC. Vena umbilicalis prima, sed insignis ramificatio.

DDDD. Horum ramorum vena umbilicalis anastomasis inter sese.

EE. Progressus reliqui trunci vena umbilicalis.


FFFFF. Insigniores rami vena umbilicalis.

GG. Truncus arteriarum umbilicalium.

HHHHH. Rami arteriarum umbilicalium.

IIII. Coniunctio venarum, & arteriarum umbilicalium.

KKKKK. Vasa umbilicalia in minutissima filamenta divisa, & à carnea placenta liberata.



TABVLÆ SEPTIMÆ
EXPLICATIO.

Tabula hæc septima vasa umbilicalia, & membranas, five involucra foetus explicat.

- AAAA. Abdominis muscoli, & peritonæum, ipsaque cutis crucis modo dissecta, & retrorsum flexa.
 B. Hepar foetus gibba sua parte prominens.
 C. Vesica urinaria.
 D. Rima seu fissura hepatis, in quam vena umbilicalis ingreditur.
 E. Vena umbilicalis ipsa.
 FF. Due arterie umbilicales deorsum ad iliacas arterias tendentes.
 G. Vrachus ex vesica fundo prodiens.
 H. Vasa umbilicalia extra corpus foetus existentia quomodo conjuncta sint.
 I. Membrana, quæ vasa umbilicalia extra ventrem involvit.
 KKKK. Intestina foetus.
 LLL. Vasa umbilicalia à chorio ad fœtum extensa, & in modum funis longa, ac inorta.
 M. Locus ubi rami vasorum umbilicalium in truncos collecti primum sunt.
 NNNN. Ramus vene umbilicalis per carnosam placentam chorii sparsus.
 OOOO. Ramus arterie umbilicalis.
 PPPPP. Conjunctio ipsius vene & arterie umbilicalis per placentam disseminata.
 QQQQ. Extrema ora venarum, & arteriarum umbilicalium desinentium in circumferentiam placentæ chorii.
 RRR. Chorium.
 aaaa. Umbra, quam quatuor vasa umbilicalia in altum elevata in subjectis partibus efficiunt.

Tab. VII




TABVLÆ OCTAVÆ
EXPLANATIO.

IN hac octava tabula videtur foetus foemineus, cujus abdomine pariter discisso uterus, diductusque cruribus & vulva, hymen apparet.

- AAAA. *Cutis, musculi abdominis, & peritoneum crucis modo dissecta, & reflexa.*
 B. *Cartilago Ensigiformis.*
 C. *Vena umbilicalis abscissa.*
 DD. *Gibba pars hepatis.*
 E. *Rima, in quam umbilicalis vena se ingerit.*
 FFFF. *Intestina.*
 G. *Uteri fundus.*
 H. *Uteri cervix.*
 I. *Vesica.*
 K. *Vrachus.*
 L. *Umbilicus.*
 MM. *Ligamenta superiora uteri coxis annexa.*
 NN. *Arteria duæ umbilicales ab umbilico resecta.*
 O. *Clitoris.*
 PP. *Labra pudendi.*
 Q. *Hymen membrana transverse vulvæ occupans, in medio perforata.*
 RR. *Ala seu pterygomata.*
 S. *Foramen hymenis, per quod menstrua in adultis fluunt.*

Tab. VIII.




TABVLÆ NONÆ EXPLANATIO.

TAbula hæc nona continet muliebria omnia genitalia in foetu.


- AAAA. Totum abdomen, hoc est quatuor tegumenta communia una cum musculus abdominis, & peritoneo crucis modo dissectum, reflexumque.
- B. Vena umbilicalis.
- CC. Rima hepatis quam vena umbilicalis ingreditur.
- DD. Sima pars hepatis.
- E. Rima ad sima hepatis usque pertingens.
- F. Vesica fellis.
- G. Dexter ren.
- H. Ren sinister.
- III. Viriusque renis ureteres.
- KK. Vena emulgens sinistra.
- LL. Divisio vena emulgentis ante ingressum.
- MM. Dua venula, dextra emulgentis vena vicem in hoc corpore gerentes.
- N. Arteria spermatica dextra.
- O. Vena spermatica dextra.
- QQQ. Truncus vena cava.
- RRR. Truncus arterie aorta.
- SS. Arteria iliaca à quibus oriuntur arteria umbilicales.
- T. Alius ramus arterie aorta.
- V. Ramus arterie iliace ad uterum pergens.
- XXXX. Arteria umbilicales.
- YY. Arteria spermatica sinistra.
- Z. Uterus.
- Vena sinistra spermatica cum arteria se jungens, & ad sinistrum testem descendens.
- a a. Duo testes.
- b. Cervix uteri.
- c c. Ligamenta uteri.
- d. Vesica, & ex ea prodiens urachus.
- f. Rectum intestinum.
- gg. Gibba pars hepatis.

Tab. VIII



In hac Figurâ diductis cruribus pudenda muliebria cum HYMENE depinguntur.

- A. *Clitoris.*
 BB. *Labra pudendi.*
 CC. *Ala, sive Nympha.*
 D. *Orificium Vrethrae.*
 EFFF. *Caruncula myrtiformes quatuor, pudoris sinum, sive externum cervicis uteri orificium angustantes, & membranosis fibris colligatae Hymenem constituentes.*
 E. *Caruncularum summa & bifida Vrethrae orificium occludens.*
 G. *Hymenis foramen, expurgandis menstruis exitum præbens.*
 H. *Caruncularum infima fissum pudoris sinum ad orbicularem virginis claustrum formam contrahens.*
 I. *Anus.*
 K. *Perineum.*



INDEX RERVM DE FORMATO FOETV.

A.
Allantoideum in humano fetu reperiri probatur. *id.*
Allantoideus humana figura qualis. *id.*
Allantoideus ovilis figura. *id.*
Allantoideus frons & uisus qualis. *id.*
Allantoideus (salsus). *id.*
A. & L. farcinis gemitus. *id.*
Allantois que membrana. *id.*
Allantois unde nomen accipit. *id.*
An reperitur in humano fetu. *id.*
Aetheris opinio de allantoide, quod follicit reperiatur in humano fetu. *id.*
Amni frons & uisus. *id.*
Amni (salsus) qualis. *id.*
Amni varia nomina. *id.*
Amnion membrana unde dicta. *id.*
Amnion que membrana. *id.*
Miliarium superposito de amnio unde orta. *id.*
Aphorismi capitulum explicatio. *id.*
Arist. sententia de arteriarum umbilicalium usu. *id.*
Arteria umbilicalis inferio. *id.*
Arteria umbilic. cur prope cor non oriatur. *id.*
Arteriarum umbilicalium usus ex Gal. nomen argumentum probatur. *id.*
Arteriarum umbilicalium usus ex mente auctoris. *id.*
Arteriarum umbilicalium usus ex mente auctoris. *id.*
Arteriarum umbilicalium usus ex mente auctoris. *id.*
C.
Capitis cur varia sua figura. *id.*
Capitis figura magnitudo quae habet usum. *id.*
Capitis ossa in fetu quomodo conjungantur. *id.*
Caput fetus in utero expurgatur. *id.*
Chori nomen dupliciter accipitur. *id.*
Chori qualis substantia. *id.*
Chori verus & falsus proponitur usus. *id.*
Chori que membrana. *id.*
Chorion totum ambit fetum. *id.*
Clavatio multorum inde. *id.*
Colostrum pueri dandum. *id.*
Colostrum quid. *id.*
Conjunctio vasorum fetuum cum utero ex mente auct. *id.*
Coryleodonum nomen vasorum uteri officium tributum est licet. *id.*
Coryleodonum vox apud Graecos aequiva. *id.*
Cuius fetu ab adultorum quo diversus. *id.*
Cuius in fetu cur tenuis. *id.*
D.
Dentes erui omnes non oriuntur. *id.*
Dentes duplici constant fistula. *id.*
Dentes infanti deficiunt. *id.*
Dentes quomodo generantur. *id.*
Dentes superiores cur prius nascantur. *id.*
E.
Equinus fetus quomodo utero annectatur ab. *id.*
Equus placenta. *id.*
Excrementa fetus crassa cur atra. *id.*
Excrementa fetus quomodo generentur ex mente auctoris. *id.*
Excrementa fetus quomodo vocentur & Graecis & Latinis. *id.*
Excrementorum fetus interorum usus. *id.*
F.
Facies humana cur toties primis annis mutatur. *id.*
Fetum cingulum in pueris hemiois cur administrare non conveniat. *id.*
Fetum mare perfector nascitur. *id.*
Fetus cur aliquando laqueatus nascitur. *id.*
Fetus cur faciem suam distendere valere non possit. *id.*
Fetus in utero non mingit. *id.*
Fetus sanguine aquae puro ac impuro nutritur. *id.*
Fetus fetu mense autis vitalis. *id.*
Fetus faciem suam cur tot excrementa excernat. *id.*
Fetus variis in utero moribus laborare potest. *id.*
Frontis duplex in super nati. *id.*

G.
Al. argumenta de usu arteriarum umbilicalium refutata. *id.*
Galen. auctoritates de usu arteriarum umbilicalium. *id.*
H.
H. Erodoti sententia de partibus umbilicum confluens. *id.*
Hipp. auctoritates de usu arteriarum umbilicalium. *id.*
Hipp. loci de chorio explicatur. *id.*
Hipp. modus in excrementis fecundis. *id.*
Hippoc. sententia de purgatione capitis fetus in utero. *id.*
I.
In eorum est omnibus animalibus parienti tempus. *id.*
Infantes cur faciem nati capere nequeant. *id.*
Infantes cur trepano tractari non debeant. *id.*
Infantes post ortum cur non ambulent ut aqua & trini. *id.*
Infantes quando ambulationi assuetiendi. *id.*
Infantes quomodo in curis locandi. *id.*
Infantes solo lacte usque ad tempus dentitionis nutriendi. *id.*
Infantes faciem post ortum medicamentis non fuit purgandi. *id.*
Infantium medicina unde fundenda. *id.*
Infantibus cur saepe oculorum colores mutantur. *id.*
Interius uteri superficies in non gravis levis & lubrica est. *id.*
Interitines quomodo curanda. *id.*
Iustitiam caecum in fetu cur magnam. *id.*
L.
L. Ac calidus citius dentes generat. *id.*
Lamboides futura cur locum tepet. *id.*
Loci Artidis. & Hipp. de coryleodonibus explicatur. *id.*
Locus ad amputandum umbilicum aptus. *id.*
M.
Mammæ fetus cur lac habeant. *id.*
Mammillarum in fetu inspectio necessaria. *id.*
Maxilla inferior duplex. *id.*
Meatus auditorius in fetu cartilagineus. *id.*
Modus amputandi umbilicum. *id.*
Modus investendi allantoideum in humano fetu. *id.*
Mortui quibus pueri qui non purgantur sunt obnoxii. *id.*
Mulier que per sexdecim menses uterum gestavit. *id.*
N.
Nervum ad umbilici compositionem concurrere probatur. *id.*
Nervus ad umbilici compositionem non concurrere. *id.*
N. ex Gal. mente. *id.*
Note boni lactis. *id.*
Nutritus qualis exigenda. *id.*
O.
O. S. dissecetur in adulto tria habeat anatomia. *id.*
Os ethmoidale cartilagineum. *id.*
Os frontis quomodo in fetu constitutum. *id.*
Os hyoides quale. *id.*
Os immominatum infanti triplex. *id.*
Os in pueris quomodo post ortum generatur ex aliorum sententia. *id.*
Ex auctoritate sententia. *id.*
Os puerorum cur in utero non perficiatur fetu. *id.*
Os cæterorum animalium. *id.*
Os temporis divisa in infante. *id.*
Os sphenoidale quadruplex. *id.*
Os ulnari genus. *id.*
Ovillus fetus quomodo utero adheret. *id.*
P.
Partes fetus interne propriæ quæ. *id.*
Partes fetus propria quæ dicenda. & quæ communes. *id.*

Partes principes in fetu magnæ & cur. *id.*
Partium communium divisio. *id.*
Partium externarum fetus enumeratio. *id.*
Partium externarum synonyma. *id.*
Partium fetus divisio. *id.*
Partis naturalis quomodo fiat. *id.*
Partis temporis instrumentum ex quibus proveniat caussa ex mente aliquorum. *id.*
Placenta cui asuectatur. *id.*
Placenta caro qualis. *id.*
Placenta usus secundum Arantium proponitur. *id.*
Pueri carnes artice. *id.*
Pueri carnes auctoris. *id.*
Pueri cur celeriter ambulent. *id.*
Pueri cur faciant. *id.*
Pueri cur plurimum mico abundant. *id.*
Pueri cur possint in posterorem partem se flectere. *id.*
Pueri cur faciem post ortum non loquantur. *id.*
Pulmones fetus cur sanguine copioso nutrantur. *id.*
Pulmones in fetu cur ponderosi. & in natis leves. *id.*
Q.
Q. V. observanda in sectione umbilici. *id.*
Quomodo pueri solo lacte nutriendi. *id.*
Quomodo ligandus umbilicus & ubi. *id.*
R.
R. Emu fetus figura. *id.*
R. K. E. opinio quæ de allantoide. *id.*
S.
S. Capule quales in infante. *id.*
Secunda quomodo ex utero eximenda. *id.*
Sordium fetus usus ex mente aliquorum. *id.*
Ex mente auctoris. *id.*
Serrum in infante quale. *id.*
Sudor in fetu cur ab urina separatur. *id.*
Sedoris vari usus. *id.*
T.
T. Tempus docendi puerum ambulare. *id.*
Tempus fecandi umbilicum. *id.*
V.
V. Accinus fetus quomodo utero adheret. *id.*
Vana medicorum cautio in secundo umbilico. *id.*
Vana superfluitas de nodis umbilici. *id.*
Vana superfluitas in amputando umbilico. *id.*
Vasa thoracis in fetu quomodo constantia. *id.*
Vasorum umbilicalium qualis substantia. *id.*
Vena umbilicalis inferior. *id.*
Vertebra ex pluribus ossibus constant. *id.*
Vertebra puerorum ex pluribus ossibus constant & spina carum. *id.*
Vicia major ventriculi in fetu. *id.*
Veteres cur crediderint fetum in utero per os alimentum capere. *id.*
Veterem & recentiorum opinio de arteriarum umbilicalium usu proponitur. *id.*
Vitiis cur reprehendendis. *id.*
Vulvicalia vasa cur orto fetu in funiculo abeant. *id.*
Vulvicalia vasa quæ. *id.*
Vulvicalia vasa cur unica. & due arterie. *id.*
Vulvicalia longiora & crassiora quina. *id.*
Vulvicalia frons. *id.*
Vulvicalia vox aequiva. *id.*
Vulvicalia non habere servum probatur. *id.*
Vulvicalia cur in infioriorem abdominis partem inferantur. *id.*
Vulvicalia cur longius. *id.*
Vnde orta Anatomorum sententia de arte uteris rursus umbilicalium. *id.*
Vrachi infertio. *id.*
Vitis diversa constitutionis vasorum thoracis in fetu secundum alios auctores. *id.*
Ex mente auctoris. *id.*
Vitis umbilici multiplex. *id.*
Viresque cordis ventriculus in pueris habet partem aequali crassitudinis. in adultis fuit est major. *id.*

TRACTATUS corum, qui post SPIGELIUM ANATOMIAM INVENTO ALIQUO Majoris usus adauxerunt.

GASPARIS ASELLII Itali.
GVILIELMI HARVEII Angli.
IOHANNIS WALÆI Belgæ.

Recentente

IOHANNES ANTONIDES
VANDER LINDEN
Medicinae Professore.

FINIS.

GASPARIS ASELLII
CREMONENSIS,

DE

LACTIBVS,

SIVE

LACTEIS VENIS

quarto vasorum mesaraicorum genere.

DISSERTATIO:

Qua sententiæ Anatomicæ multæ vel perperam receptæ
convelluntur, vel parum perceptæ illustrantur.

Ex recensione

IOHANNIS ANTONIDÆ van der LINDEN
Med. Prof.

GASPARIS ASELLII
CREMONENSIS
IN
DISSERTATIONEM
DE LACTIBVS,
SIVE
VENIS LACTEIS,
PREFATIO.

*In qua 1. Quæstio de chyli vasis utilitat. 2. Difficul-
tas. 3. Descriptionis argumentum & causa. 4. Sum-
ma capita propinquantur.*

INter multas Scholarum
Anatomicarum controver-
sias necdum aut explicatas
satis, aut plâne perceptas,
illa mihi semper & gravis
& perquam digna scitu vi-
sa est, quæ viæ perquirun-
tur, per quas secretus ab
ventre & intestinis cibis,
veluti è promptuarii cella ad Iecoris, quas vo-
cant, portas, tanquam ad communem, ut loquimur
Gal. coctionis officinam comportatur. Nec id
temere, opinor.

1. Primum, ea hujus quæstionis indoles est, ea
vis, ut, quantum illius nos fugerit præterieritque,
tantundem necire nos oporteat tum in nutritio-
nis universo negotio, quæ una animantium vita
continetur, iidem, quibus illa, terminis circum-
scripta; tum ignorare, de natura omni, in fabrica
nostri corporis, arte, consilio, providentia, quæ ut
nullibi magis quam in minimis tota est, ita infi-
mita hanc animæ vim ac potestatem incredibilem
plâne præter cæteras instrumentorum quæ appa-
rati, quæ numero intruxit. Neque id satis. Mul-
tæ & magnæ quæstiones aliæ, quadam five focie-
tatis, five artis communione ac serie colligatæ in-
ter sese ac nexæ, ita ab hujus notitia aptæ sunt ac
pendent, nullum ut fine ea rectum explicatum in-
veniant. Quo sicco alatur venter, quo intestina:
ab his solis, an ab illo etiam communiter tradu-
cendus ad hepæ fucus hauriatur: arteriarum,
quæ per Mesenterium & intestina magna copia
& pari prope cum venis numero necdum, quis
sit ulus, quæ conditio ac ratio: quod minus ac
officium Lienis: Venæ unde primam sui originem
sumant, quem numerum faciant, tum sanguinem
contincant solum, an etiam procreent, quod *anima*
temeris vocant: quantam disceptatione diffiden-
tiam inter se ac discrepantium medicorum ver-
santur? At nihil de his omnibus constimere recte
aut definire est, nisi hac ipsa, quæ de agimus, quæ-
stione constituta prius ac definita.

2. Certat cum hac tam multiplici utilitate,

quæstionis ejusdem difficultas & obscuritas. Nec
facile enim aliam reperias, quæ aut majori labo-
ret opinionum varietate, aut acrioribus conten-
tionibus agitur. Prope quot capita totidem sen-
tentiarum sunt. Etsi enim de hoc facile inter omnes
convenit, per vasa, quæ crebra multaque toto
Mesenterii corpore sunt intertexta, trajici, quem
dicimus, ad hepæ fucum; quæ tamen sint ea va-
sa; & hæc, solum hoc negotium agant, in nullo
altero dedita; an aliud præterea munus fungantur
expleantque: tum, si alteri præterea vacant, uno
ne eodemque tempore, an ejus intermissione ac
intervallo, facta quadam veluti reciprocatione
utrique vacent? denique, quod maxime rem to-
tam & causam continet, quo modo, quæ descri-
ptionis lege ac ordine, quo proposito fine id agat,
quod agunt: hæc omnia tanta in ambiguitate ver-
santur, tam perplexe, tam dubia & suspensa or-
atione à vulgaris Anatomicis explicantur, ut uni
omnium, hac quidem in re, verissime illud Galeni
usurpare posse videantur, *καὶ οὐκ ἔστιν ἡ ἀλήθεια*
καλὴ.

Accedit huic maximum illud incommodum,
quod, ut quisque ad veritatem accedit propius,
ita insanire maxime & vaticinari abis creditur,
qui rei omnis medicæ ad se censuram olim jam,
fama nominis & exultationis, revocatur. Sic
non modo ἡ δοκίμη, ut dicebat Simonides, *τῶν ἀνέ-
στων βιάζεται*, id est, *multioritas obruitur veritas*: sed
etiam via ipsa perveniendi ad eam præcluditur, &
ire cogimur ritu precorum, quæ itur, non quæ eun-
dum est. Hæc omnes causæ facile persuaserunt,
minime mihi perituro operam, si quam in rei lu-
jus tam multum ac sæpe quæsitæ, necdum exqui-
sitæ perquisitionem pervestigacionemque confer-
rem; & quo minus ingenio possum, subsidio mihi
diligentiam compararem, Ita igitur feci, & in eo
totis viribus elaboravi, quæ literis super ea re ma-
gis ab ingenio fuere prodita evolvi, accurate &
sedendo, quod ajunt, expendi, cum fummis viris,
quotiescunque fuit occasio, sententiam meam
contuli; denique, quod rei caput est, quodque
unum opus, unum studium Anatomici effice Gale-
nus voluit, Autopsiam in consiliis adhibui, ut,
de ejusdem Galeni hortatu, propriis oculis, non
libris credere, hoc est, oculata fide, seu mani-
bus potius assequerem, quod quærerem, Favit tan-
dem

LECTORI S. M.

INexhausti sunt Nature thesauri, & recondita adeo Conditoris humani corporis est sapientia, ut
licet tanti viri, studio incredibili, tandum naturam ejus inquisiverint, omnem tamen necdum
invenerint: quin multa majoribus ingustata subinde atas deiegit, & plura adhuc ventura ad-
invencenda restant. Hinc GASPAR ASELLIUS Anatomica cathedra in Ticinensi Aca-
demia olim professor publicus, præter alia rara & singularia secundo indices corpora, æse observata,
novum hæcenus incomperitum venarum Mesentericarum genus, quas lacteis appellavit, primus
Anno MDCCCXXII sibi notavit & aliis patefecit. Verum quæ super illas, dum vive-
ret adhuc, in commentariis retulit idem ipse, ad Alexandrum Tadinum, & Senatorem Septalium, viros Medicos
illustres & Physicos de Collegio Nobil. Mediol. morte auctoris, pervenerunt: qui etiam eadem publici typis descripta
Italica nuper exhibuerunt. Galenus de Difficul. Resp. lib. 22, cap. 1. iustum & decem premium eorum, qui quod-
cunque tandem in vita bonum invenerunt, esse ait, ut inventa ipsorum non occultentur, neque hominibus sint igno-
ta: quare ut alii quoque novum hoc inventum appareat, hunc de Venis lacteis tractatum omni fide ac diligentia revi-
sam: & a multis quibus scatebat in citatorum præcipue falsa annotatione, commissum & Quæstionis restitutum, nostris
dare constitui, & quidem ea forma, quæ spectatissimum Adriani Spigelli opus Anatomicum expressum est: ut
qui ei operi adjuungere voluerit, nihil amplius ad ejus perfectionem desideret. Hoc meum studium probis Anatomicis
studiosis tam Philosophis quam Medicis non ingratum fore confido: quo interea utere benigne Lector, donec quæ de
Venens arti studio & admirabili judicio, idem Asellius congegit, in primis vero Observationes ejus Chirurgicæ
prodeant. Vale.

a. 4. off. port.
cap. 1. 0. 1.

b. Arg. 2. de
Anima, 6. 1.
de Reg. 1. 7.

c. Phil. Nat.
lib. 1. 1. 6. 9.

d. 1. de pla.
cap. 4.

e. 1. An.
edim. cap. 1.
1. 2. off. port. 3.

24. ms. part
10.

5. *Isag.* c. 11
6. *Anat.* 6. C
4. *us. Hart.* 30

c Spur. fol.
65. lit. E.

f Galen. 1. d.
Temper. c. 9.

2 3. de alim
facult. c. 6.
h 2. de jem c
i 14. Meth.
11,

k l. de anas
cirvorum.

m *ibid.*

o *Sper.* f. 63.
lit. H.

p num. 3. ex
edit. Mari-
nelli.

r in observ.
 f observ. Ana-
 tom. de Me-
 senterio fol.
 99.
 t l. 2. lib. 13.

C A P. III.

1 a 6. Anat. 6
 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 8

1 a 6. Anat. 6
 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 8

2. *Diff.*

b Gal 4. 10.
part. 2.

i 13.math.
14

1 6 de plac.

4. *us part.*

1.5. April.
Gal con

l. ven. c.

1. 1. doct.
sum. 5. c. 1.
l. 4. Ana-
m. c. 3.
doct. 13.
1.
6. de re
nat. 1.
lib. 2. At
rop.
Theat.
nat. 15.
in Avic.
i. sup.
de Venn
tā.

mat; ramos, si originem ab hepate; radices, si opus spectes. * Inanissimam enim esse hanc distinctionem, perspicue similitudo arboris docet, quae passim hac in re Galenus & Hippocrates uti consueverunt. Columbus * civis meus singulis suam valvulam apponit, quae intestinis committantur, quem totis viribus oppugnant Archangelus, Laurentius *, & alii. Ego quam recte, quam non recte id fecerit, mox in loco reddam.

111. Progressum Mefaricarum Gal. sic describit: *Plorina venarum oscula ad quodque intestinum penetrant, veluti arboris capsum ad tenues flos, & hinc vero ut in arboribus radices, exiguas in crassiores & majores sensim natura quousque colligit, dum in unum ramum, & denique in unum omnes truncum, venam scilicet quae ad portas est hepatis, coeant, à qua etiam tum quae ad ventriculum, tum quae ad splenem feruntur, progressantur.* Est familia alius quoque * locis habentur, ubi notandum est, Galenum eorum progressum ab intestinis ad hepar, hoc est, à fine ad principium prosequi, non contra. Sed parum refert. Eadem enim est, ut Aristoteles dicere solebat, via Athenis Thebas, & Thebis Athenas. Porro nomen ille, in quem omnes coalescant, ex eodem Galeno ad Pancreas est. Ibi enim ut docet, principium est omnium valorum mefaricarum divisionis. Ob hoc quoniam divisionem, ut commodè & sine periculo heret, dum, inquit, *solerti simul natura machinata est, primum, quod pancreas illi veni tum infestavit, tum in orbem circumposuit, alterum, quod intestinum duodecimum non in anfractus reflexit, sed rectum fecit: illud, ut divisiones fulciret, quod maxime patiantur vasa, ubi divisa in plura & minora abeunt; hoc, ut iustum spaciū in eis progressum suppedicaret, quod involvula, quae non parvas faciunt angustias, impediissent.* Cur autem unierit eas ad portas, cum rursus dividere oportuerit in hepate, ejus rei causa videri potest apud Galenum ipsam *. Clara enim est & longiori explicatione non eget.

C A P. IV.

Agitur de venarum Mefaricarum actionibus, & usibus. Ii tres Galeno, & vulgo Medicorum, *avadores, avadones, & avadones*. Ex his duo primi rectius, tertio alius * & novus additus ex ipso Galeno. Galenus multo dixit *avadores* & *avadones* fieri eodem tempore. Laurentius Hippocratem non recte cepit.

Q Uod praecipue quavis in parte spectatur, id ejus est actio, in quam omnis ejus molitio apparatusque conspirent necesse est. Ea causa de venarum Mefaricarum actione eorum & suo ac proprio capite agere nobis visum. Id quod in arteriis inter se servabimus.

Actionem hanc esse usum (nec enim hic accuratius habet hac distinguere) triplicem omnino Galenus, & cum eo plerique omnes, venis Mefaricis assignant. Primus & praecipuus, est *avadores*, sive Chyli, postquam is ab intestinis direptus, & ab aridioribus recentibus secretus est, ad hepar traducit, unde illas manus hepatis idem Galenus * appellat, & alibi bajulus comparat, * in Crivelliana, repargendum in cella penaria frumentum ad commensum aliquam Civitatis officium deferant, cognominem illi & utile ad murrandum futurum; passim vero,

ut jam supra diximus, arborum radicibus assimilari: quod Aristoteles quoque facit. Ceterum hunc usum nec omnibus mefaricis tribuit, nec solis. Non omnibus, quia, ut jam supra diximus, quoddam earum negat ad hepar referri, illas scilicet quae in glandulis desunt. Non solis, quia etiam ventriculi venas eodem officio vult * fungi. Id quod Hippocrates quoque sensisse videtur lib. de Carnibus, ubi sic loquitur: *Vena, quae per ventrem & intestina feruntur, in quibus cibi & potus conservantur, ubi includuntur, id quod est tenuissimum & humidissimum attrahunt.*

Alter usus est preparatio Chyli, & in sanguinem mutatio, de quo ita idem Galenus habet. *Vena non deducit solum nutrimentum ex ventriculo, sed attrahit simul, & hepatis preparant, modo, quo ipsum, similitudo, quae natura ipsi sunt assimilares, & ex eo germen ducunt.* Et alio * loco. *Propter & venas, inquit, quae ad ventriculum & universa intestina pertinent, inest facultas quadam sanguinis efficitur, quae faciem, quae est cibi distribuit vici, in sanguinem venae naturae est, prius etiamquam ad hepar is perveniat.* Est familia plane leguntur in volumine de Plac. Hipp. & Platonis. Idem sentiant auctor Isagoges *, & auctor lib. de Compag. membrorum *.

Tertius usus, est *avadores*, id est, distributio sanguinis ab hepate ad menterium, ventrem & intestina, eorum nutritioni. Hanc *avadores* autem vulgo fieri velle Galenus * partim, & id plerumque diverso ab *avadores* chyli tempore, cum scilicet vacuae chyle venae sunt, & nutrum autem: partim, sed rarius, eodem quoque: adeoque qui id negant ignaros vocari ab illo, ut aliorum naturae operum, ita roboris in attrahendo instrumentorum nutritione egentium. Dixi * vulgo: Nam ex verbis, quae adducunt, *Admirantur nemini, &c.*, nihil tale, imo contrarium convincitur. Atque priorem modum praeter auctorem lib. * de Anatom. vivorum, qui venas mefaricas determinatis horis & aperire sua orificia, & claudere affirmat, etiam Hippocrates * (si modo is est auctor librorum de morbis) agnoscere videtur, cum sic ait: *Postquam cibi & potus in ventrem inciditur, fruitur corpus de ventre, & una cum sensibus ipsorum. Pli vero alens vacuatur, rursus humor retro ab ipso redditur, quemadmodum suspensat, veluti ex alio ad unum vasculum, & quae sequuntur.*

Ex his vero tribus usibus, ego non nisi ultimum agnosco, qui, ut dicam in quarto valorem genere, primo usui longe alias venas fervire autopsia ipsa didicerim. Illo vero fabulato, ruit etiam secundus usus. Quomodo enim chylum preparabit, id est, ut Galenus amat loqui, sanguinis speciem inducet venae mefaricae, quem non contrahit, ut omittam interim quaerere, an venis alias *avadores*, id est, sanguificatio, ut vocant, competeat, de qua re ipsa quoque agam postmodum. Porro illi ultimo usui adjungo alium *, qui est humorum et toto corpore per eas venas profusio atque expurgatio, five ipsa sponte naturae, five vi & opera medicamentorum procedat. Quae hoc est, cur inter loca conferentia intestina ab Hippocrate * numerantur. Addunt alium alii, ex * Hippocrate ut inquit, qui est deferre ad intestina calorem & spiritum, quem * Laurentius nunc vitalem, tum naturalem intelligit. Ceterum puto ego hunc

De Lactibus, seu Venis Lacteis.

viii

hunc usum cum venis Hippocrates tribuit, venis pro arteriis, ut tolet more praefata medicina, abunde. Et haec de venis mefaricis, superest de arteriis videamus.

C A P. V.

De arteriis mefaricis. Earum 1. Nomen. Cur * vocem Erasistratus, 11. Situs. Numerus. Magnitudo. Aristotelis hic error. 111. Origo. 1V. Inferio. Galenus in hac explicandis omnibus recentioribus accuratior. Aristotelis hic quoque hallucinatio. V. Progressus. Arteriarum quarum venarum principium obscurum.

A Rterias Mefaricas Erasistratus * *isodotes*, id est, *extremas appellavit*, comparando illas, ut Gal. * explicat ad eas, quae insunt Epigastrio. Nec enim ut fit, ita continuitate & exortu proxima sunt, sed longissimo originis intervallo se contingunt, exemplo tangentium se aliquando in arboribus foliorum, quae ex diversissimis ramis exoriuntur.

11. Adjacent fere venis, his * comites, earumque numerum equant.

Aristoteles * longe minores esse vult, quam venas, perangustas & fibris nervorum proximis, cavas tamen. Putat enim aortam ita semper progrediendi extenuari & in angulum redigi, ut tandem in extremis partibus ex toto nervi natiuram accipiat. Quae sententia alibi à nobis considerata est.

111. Origo iis omnibus ab arteria magna, quae spina incumbit, hoc est, à trunco arteriae magnae, quae per inferiorem ventrem, venae portae attinga defertur, ex illo ejus ramo, qui mentericis à recentioribus dicitur, & in superiorem ac inferiorem dividitur.

1V. Inferio nihil diversi habet à venis. Inferiunt enim non fecus ac illae in concavam anfractum intestinorum partem, totamque longitudinem eorum omnium, excepto duodeno & jejuni principio, in quae à caeculo ramo vocato arteriae intestinales dicte mittuntur. Recentiores Anatomici à ramo * menterico superiori arterias in leonum, ileon, & Colum quā ad dextrum rum leguntur, deducunt: inferiorem, potissimum in coli sinistram partem, tum in rectum intestinum absumi ajunt. Sed haud scio an rectius diligentiisque Galenus qui totam arteriam, quae venae portae congrua est, distributionem accuratissime simul ac brevissime his verbis describit. *Arteria magna dextrum procedit, ex una statim radice bifariam deducitur, ceteram vero, intestini distribuit per duas menterias, tum id, quod ad dextram situm primarium est calparium, tum id, quod est dextrum, id est, ventriculum inferiorem medium. Nam tertium Menterium, quod prope sedem pertingit, in sinistra situm, nullam inde assumit arteriam, sed de imis partibus quadam in ipsam exigua inferiunt, quae post venas à magna arteria inguini infusor. Interdum statim ab initio duplex apparuit, & è duabus inguibus arteriam, hoc est, alteram in ventriculum & lienem; alteram, hoc est, humiliter in jejunum & menteria dextram. Vbi obiter rursus notandus error Aristotelis, qui sicut etiam auctor lib. de respir. utilis * observavit, negat ab aorta arteriam ullam ad hepar pervenire. Nec satisfaciunt, qui aut de hepatis gibba parte solummodo locutum*

ajunt, aut id tantum velle affirmant, non transire per hepar arteriam, sicut transit venae. Simpliciter enim, *Nulla, inquit, ab aorta ad hepar venae pervenit.* V. Progressum istarum arteriarum recte idem Galenus * venarum progressui comparat, & vult eodem modo ut illas, ex tenuissimis & minimis in majores semper ac majores coire, donec in unum omnes principium conveniant. Illud tantum discrimini adfert, quod venarum principium facile compertitur, quippe quae ad jejoris portas in unam omnes colliguntur; arteriarum non ita facile, quia magis exangues & crassiores tunica principium habent contiguam exangui corpori, à qua menterium est cum intestini aptum, quodque menteria aequa vocant, id est, *suspensorium, vinculi naturam habens.* Est autem principium illud ad dorsum. Dividenda, inquit idem Gal. in Mefarum arteriam, principium dextrum suae habet medio loco inter ventriculum ac intestina, & novissimè spinae subsistentibus ceteris, tum quia venae porta ibi dividitur, venis autem naturae, ubique nihil prohibet, adtingit arterias, tum quia ad jejun & hac ipsa arteria produci ramum oportuit.

C A P. VI.

In actiones arteriarum & usus inquirent. An chyli quipiam fit ejus aliquid. Galeni & Hippocratis in eam rem sententia expensa, & in medio relicta. Auctor lib. de utilitate respiratoria, & Parvis accuratè confutatus. Sanguis per quas vias & ex quo cordis sim in sinistram subeat, Cui ducit in corpore.

D E actione & usu arteriarum Mefaricarum in eo plerique omnes consentiunt, datas intestinis & menterio non magis, ut vitali calore frigoris eorum nativi vim temperent fovantque; quam ut affiduo fuo motu, & ceu verbera ventiliando illa & irrigando salutaris spiritui, à putredine & corruptione, qui impris natum receptacula quaedam superfluum & emulsaria sunt obnoxia, vindicent.

Sed praeter hunc usum videtur etiam velle Galenus * chyli aliquid ex intestinis exaurire tradendo, eo tempore, quo fatiat ventriculus cum reliquo habet, in ipsa exonerat. Id vero ex eo demonstrare conatur, quod omne dilatorum necessario trahat à vicinis, arteriae autem perpetuo dilatantur & conflantur.

Ceterum offendit, id quod trahunt esse primo permodicum omnino, & cujus vis fit habenda ratio: secundo, exquisitissime confectum & levissimum.

Posterioris rationem hanc adfert, quia tractus hic non formae aut qualitatis fit similitudine, cumjmodi aut ad nutritionem aut oblectamentum reuertur trahens, fed successione ad vacuum, quae necessitate quadam nititur, cum, ut dictum est, dilatatio ejus fit causa. At in ejusdemodi tractu semper id primo, quod levissimum est, sequitur, tum fabulum. Is enim semper, inquit, aquam prius quam fabulum ad se rapit. Prioris causam istam statuit, quod necessarium cum dilatantur arteriae, aut implentur levioribus, hoc est, iis, quae trahunt à corde & ex venis.

Longe ulterius, quam Galenus, progressus est de Bysp. lib. de util. respir. qui pertinet ad auctor

Bb

naciter contendit, attrahere succum bili cor, non solum à cava hepatis, sed etiam ab intestinis per medias has arterias, frivolo plane argumento, quia arteria habet mesenterio continetur, & hepar tamen non transeat. Atque huius fave sententia fundum & auctorem facit Aristotelem. Nec sine iusta causa fortassis. Quippe non solum lib. de Spiritu⁴, qui inter Aristotelicos ambiguae auctoritatis est, differt ita loquitur: *Ad intestina & ventrem venae & arteria committuntur, quas par est alimentum attrahere à venis in carnes max distrahendum*: sed loco etiam minime dubio⁵, tam venas, quas ab aorta five minore, quam quae à magna, id est, caetera in mesenterio ducit, nullis diffinitione rades facit, quibus à ventre ad vena cibis defertur. Quam sententiam prope iam inter mortuam nostrum aro non revocare modo, omnibus ingenii viribus, sed magno quoque cumulo magnae accessione augere conatus est Anatomicus aliqui ingeniosissimus, Constantius Varolius⁶, qui praecipuum arteriarum istarum munus esse contendit, portionem chyli purissimam exungere ex intestinis, & procreando inde subtiliori & arterioso sanguini ad cor comportare. Nititur his argumentis.

Primum, Nulla alia via pervenire in finitrum ventriculum, sanguinis huius officina, materia gignendo illi sanguini potest, cum nullus in illum à dextro pateat aditus. Secundo, Duae arteriae umbilicales in foetu aortam ingrediuntur, quae sanguinem arterialem comportant ad cor infantis. At in nato, quemadmodum chylus sanguini materio, ista arteriae mesaraicae respondent umbilicalibus. Denique, Frustra esset ablique hoc usum tanta arteriarum copia frigidis partibus concessa. Poterat his addere ex Gal. experimentum Erasistrati⁷, qui in hodiis lactentibus refertas lacte arterias ini in ventris conspexisse saepius, testatur.

Ego hac in re, non difficulter dederim, quod praeter Galenum⁸ Hippocrati quoque visum est, successione ad vacuum concedere tantillum chyli in arterias, ob allatas à Galeno rationes: ista eas ex infinito trahere chylum & corrivare in cor, id vero nullo modo dandum puto. Quis enim unquam credat subtilissimum sanguinem ex rudi, crudo & incocto chylo posse exire? Quis etiam non videat repugnare è diametro ingressum in cor chyli, valvas principio aortae affixas, quae viam omnem reciprocum ab arteria in cor pracludunt? Quae utraque ratio nequaquam aut recens aut mea est, sed tum ipsius Hippocr.⁹, qui naturam ideo valvas inagae arteriae applicuisse scripsit, ne impurum alimentum, quo arteriae circumstant, in cor verheretur, quod purissimo sanguine nutrirı oportebat. Quod si illud quaerit quipiam, si nec nutrantur eo, quod hic trahunt arteriae, nec in cor ipsum deferant, quod illud concedat? facile è Galenus¹⁰ responderet, arterias, quemadmodum, cum dilatantur, trahunt quod vicinum est bili, ita dum contrahuntur, vicinum quod hic fibere, expellere. Quam responsionem, praeter alia, vel aër in pulmonem per ista diaholes & systoles intervalla inductus vicinum & redditus, nec absurdo fortassis, nec levissimo indici confirmet.

Argumenta Varolii leviora sunt, quam ut nequicquam facillere cuiquam merito debeant. Per vias inconspicuas & caecas multa alia, eaque non minus, quam hoc, quod de agimus, miranda moliri naturam, tum exemplis plurimis Galenus¹¹ ostendit, tum Hippocrates¹² auctoritate, qui totum corpus nostrum *expansum* est & *impermixtum*, docemur. Quid igitur prohibet tales quoque à dextro cordis finis in finitrum per septum ejus cum Galeno ob eas, quas adducit¹³ rationes, statueret. Accedit, quod ista vice effi in mortuis, ut aliae plurimae, parum cernuntur, quod in his, ut Galenus ibidem ait, omnia sunt perfrigera & densata: in vivis tamen, quae praestabit, aut nullas eas esse, aut non manifestas eas patentes? Sed fac esse etiam, nulla sint haec Gal. in septo cordis foramina, neque sic tandem decrit fortassis alia & commodior via sanguini venoso à dextro in finitrum ventriculum traducendo? Mihi sane nequaquam absurdum videtur, eum sanguinem, qui per venam arteriofam in pulmones è dextro cordis finis effunditur, ibi assiduè eorum verberare extenuatum cum aère, altera vitalis spiritus materia, in ventriculum finitrum relabi. quam viam forte nec Galenus ignoravit. Sed hac examinare huius non est huius loci.

Quae de umbilicalibus arteriis adferuntur, ea nihil prolius aut veri aut sani habent, & quae affirmantur facilitate, eadem negantur. Nec enim materiam sanguinis ullam rationem habere chyli potest, quem concedere in sanguinem demum oportet; nec mesaraicae arteriae umbilicalibus ullo modo ad succedunt aut respondent. Quomodo enim succedant sibi respondeant tam diversi succi, quales sunt chylus & maternus spiritus, ad tam diversum locum, quales sunt pulmo & cordis finis, delatrics arteriae? Nam, ut semel reo dicam, ad cordis ventres (quos plane in foetu octavo esse, & nec pulsare per se, nec ullos spiritus aut alios arteriae respondere ostendam, Deo volente, alibi huius nihil prolius per arteriam aortam, cui continui sunt umbilicales, deferunt, sed ad pulmones tantum, fabricato eam in rem à natura de industria canali, qui arteriam magnam cum vena arteriosa committit, ne quippiam, quod pulmonibus debebatur, in ventriculos cordis effundatur, ut praecare nos jam olim Galenus¹⁴ docuit.

Arteriarum vero illa copia, quae ultimi argumenti loco erat, cor opus habere interstina, jam supra in communi earum usu declaratum est.

De Erasistrati observatione dicam mox loco apriori. Nunc id satis est nolle, deceptum eum, non arterias, habuisse pro arteriis.

CAP. VII.

Panca de Nervis Mesaraicis. Eorum Numerus. Ma-
goitudo. Progressus. Insertio. Principium quae
originis, quae divisionis. Vlus. Laudatus Fallopius.
Fernelius reprehensus. Arteris cor contingit isti nervi.

DE Nervis Mesaraicis panca dicenda sunt. Quare hoc capite omni corum negotio deungemur. Multos eos esse, & venis, praecipue autem arteriis adiacere membranae modo dilatatos, autopsia docet. Sed & exiguis esse, praeter Galeni¹⁵ auctoritatem, eadem autopsia perspicue ostendit. Consistit praeterea non secus ac venas & arterias custodiæ causa, inter duas mesenterii tunicas, in intestina quinque propagari (nam duode-

h 7. aph. 14.
i lib. de ali-
mentis.

h 3. Fac. num.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
pari 17.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

c 1. aph. 9.
1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1.

denum, si quos habet, à nervis habet oris ventriculi inferioris) & singulos singulis revolutionibus¹⁶ inferi.

Principium in iis duplex considerari potest, aliud divisionis, aliud originis. De illo Galenus¹⁷, & recte, idem sortitus esse cum principio arteriarum & venarum mesaraicarum. Causa, inquit, quia *multum ab illis habebat locum aptiorem alium nervum, unde germem, quod ad hepar erat propagandum, tutius emitteretur*. De isto aliquid disputationis est. Galenus simpliciter à sexto nervorum pari deductit. Vel falus¹⁸, & cum eo Pareus¹⁹, ac alii plures, paulo distinctius ab iis sexti paris derivant, qui à cervice orti costarum radicibus exporriguntur. Sed recte advertit Fallopius²⁰, & ab illis & aliis praeterea ejusdem sexti paris, quae ad diaphragma, quae ad ventriculi os superius pertinentibus, auctis tamen in progressu cum ab aliis, tum à lumborum nervis, propagari atque profeminari.

Vlus eorum quatenus Mesenterio & intestinis inferuntur, unus & communis est, animalem, hoc est, sentientem vim à cerebro manantem iis com-

municare. Qua egere illa & praesertim intestina, quicquid alii dicant, si non exquisita, at multiplici cerere, satis illud ostendit, quod excretionis non secum modo, sed etiam totius corporis expurgationis destinata, eo officio fungi nullo modo possent destituta sensus ope atque adminiculo. Et hoc facit, quo minus Fernelius²¹ assentiri, putanti mesenterii inflammationes fine magno dolore consistere, cum inflammatio sensus & ponderis aliquo lenis. Profecto enim tanta copia nervorum, quales ibi est, tam obstum sentum minime admittit. Qui à lumbis adiunguntur, si, praeter hunc usum particularem, illum quoque praebent, ut lumborum partes eorum beneficio quo molestia afficiunt sentientes, irritata expultrice ea in intestina ablegant ac tempestive deponant. Arteris vero contriguos esse eos natura voluit, ut sic contactu earum redditu calidiores melius illam, quam diximus, vim frigidis & exanguiibus partibus communicaret. Atque de tribus Mesaraicorum vasorum generibus vulgo notis, eorumque consideratione haec tenus.

PARS SECVNDA,

DE

QVARTO ET NOVO VASORVM

MESARAICORVM GENERE.

CAP. VIII.

Discendum propositio, & ordo. Antecceptae rei informa-
tio, quae Ciceroni?

siderationisque, sua ac propria rem totam conti-
nent, desinunt, & ad scientiam cognitionemque
adducunt.

HISTORIA VASORVM CHYLI

CAP. IX.

Historia prima vasorum istorum inventionis cum fide
narrata. Obiter multa notata ad illa recte sectione per-
quirendum.

Reter tria illa vasorum genera Mesenterium peragrantium, quae ad recensum jam duximus excussimusque, reliquum aliud est genus quartum, novum ac ignotum haecenus, & à me primo (quod relegata omni ambicione dixerim) ab hinc fere triennium, hoc est annu adeo $\kappa\iota\sigma\iota\kappa\alpha\chi\iota\iota$ casu magis (ut verum fatear) quam consilio aut data in id peculiari opera observatum. De hoc, pro eo, ac ab initio constitutissimum, agendum nobis in praesens est. Agitur autem quam fieri potest accurate & diligenter, quod & inventi novitas postulat, & vi cogit, quae novis comitari semper amat, rei ipsius difficultas. Quae tota ut simul fiat quam planissima, simul via ac ordine procedat, quem ego rerum tractandaram animam usurpare atque appellare soleo, praemittam primum tanquam omnium, quae disputabuntur deinceps sedem, seminarium ac modicum ea artingam, quae ad absolutam eorumdem perceptionem explicatamque scientiam, & ut Storicum verbo utar, comprehensionem oportet habere praecognita & veluti praefata, quod *περί τῆς ἀριστοτέλης* Aristoteles²², ut *περί τῆς ἀριστοτέλης* Ciceroni²³ antecceptam, five anticipatam animo rei informationem reddidit. Demum ad illa veniam, quae Anatomicae contemplationis con-

QVod igitur ad historiam attinet, res hunc in modum acta est. Canem ad dem Iulii xxxix, ejusdem anni bene habitum, beneque pastum invadendum vivum sumpleram, amicorum quorundam rogatu, quibus recurrentes nervos videre forte placuerat. Haec nervorum demonstratione perfundus cum essem, visum est eodem in cane eadem opera diaphragmatis quoque motum observare. Hoc dum conor, & eam in rem abdomen aperio, intestinaeque cum ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu impello, plurimos repente, colque tentissimos candidissimosque conspicio. Per omne mesenterium & intestina infinitis propemodum propaginibus dispersos conspicio. Eos primo aspectu, nervos esse rarus, non magno- pere moratus sum. Cum deinde, ut ventriculo collecta in unum deorsum manu imp

[illegible]

Iam recentiores multo etiam magis sunt in re hac Laetium, quam veteres varii. Alii Melente- rium esse Lactes volunt; quorum principes Gaza est, qui ubiquecum apud Arist. *μελентιον* legitur, Lactes interpretatur. Columbus sic *α* appellat, quod Graecis *μυλας* est, sive *καλλινος*. Carolus ⁷ Stephanus glandulas, quae passim Melente- rium interfertungunt, hoc nomine afficit. Qui ⁸ idem tamen, & cum eo ⁹ Carpus, vulgares Melaraicas ita nominari voluit, & sunt fortassis, qui alia quo- que omnia sentiant.

Nos in id tot significationum varietate ita censemus inter cætera, ad nullam rem aptius nomen hoc, quam ad venas nostras accommodari. Quid mirum autem, cum infinite finit res, ut ait Aristoteles, finita vero nomina, si unum nomen ad plura significanda transferatur? Cur vero ita sentiam, duo imprimis faciunt, Etymon, id est, notatio huius nominis, quam Etymologiam quoque & interpretationem usurpamus; Cicero verbi loquimur vocat (quod male vulgo veriloquium legunt.) Deinde veterum in appellandis hoc verbo intellitis gracilibus infitutum, consilium atque ratio.

De Etymo. Voluit aliā labendo sic dīdas;
quod per eas chylus labatur, quā notio vix Plinio
videtur placuisse. Aliā laē deducunt, cuius
similitudinem gerant in candore, mollitie
pinguitudine. Quidam, & meo sensu rectissime
ab exloeto verbo laeo, quod idem est ac allicio,
derivant. Nulla harum est interpretatio, quam in
notrissimas venas non adumfium quadret ac
expectat. Nam verissime, ut vix loco confabatur
chylus per eas labatur, verissime idem ex intestinis
ab is lactur, hoc est, forbetur exhauriturque, de-
nique, non fac ipsum famile lacti est, quam
liqor, qui in is cernitur. Nam veteres qui non
facile existimet notissimo loquendi modo ulso-
que quod continet, pro eo quod continetur, vago
que usurpamus, non alia causa famile donasse
nominē intestina grācia, quam quod confertur
illa laē praesentis itis vix, ignotis ibi, viderent
in agnis praefertim & hœdis, per quorum intestina

copiam ab ubere conficiuntur fusae ad propaga-
tam, et tota non nisi ex lacte quidam roris
velut aspergine confittere videntur. Vnde non
leviter meo quidem animo, etli alio quam nos sen-
sus, maximum & admirabilissimum<sup>in apud Aris-
m. 1. lib. 2. 6.</sup> Scaliger primum
in agnitis posthum hoc nomen suspicatur, & inde
ad hominem opinione quanda similitudinis, et
solet, traductum. De recentioribus non est quod
multum laboremus. Nihil nostrae sententiae offi-
cunt, & facile adigi ad concordiam possunt. Qui
enim vulgares Melaricas Lactes appellant, etli
non ferendum errant errorem, et dicitur flos &
proprio loco ac tempore, hoc ipso tamen pro no-
bis sunt. Nimirum enim ideo hic vocandas pu-
tant, quod allicere in sese ab intestinis chylum sibi
persuadent. At qui eo ipso offendit, in nostras
venas, quae vere id muneri obeunt, et non in alias
hoc nomen quam apte cadat & conveniat. Co-
lombo vero ac Stephano facile largiemur, dici
Lactis posse quae illi volunt haecsums, si qua uos
veteres diximus, eadem dicendi figura fe ipsi quo-
que uti fateantur. Nam & glandula Mesenterii, et
inprimis Pancreas, ad Lactibus nostris sciantur,
et vel levissimum tractatu compressique digitorum
magnam in vivis animalibus lactis liquoris copiam
velut imbrem profundam. Atque eadem inter-
pretationis benignitate Gaza quoque attropi po-
telt, cum Lactibus nostris Mesenterium nihil quam
Pancreas minus, foris magis erant abundet. Quan-
quam ille fortassis non debuit à Plinio suo hic de-
cedere, quem sibi in aliis veluti Cynosuram, quam
sequebatur, constituerat. Nam quod Hermolaeus
in ejus excusationem addert, Meronymia absumum
continentes pro eo, quod continetur, nihil est.
Nec enim in Mesenterio, fed à Mesenterio intrecti-
na continentur. Sed de nomine tantum est.

C A P. X I L.

Quæsitum de vasorum nostrorum existentia. Primum, vere sint nec ne? Esse, monstratum fide sensus, & conclusum ratione. Sensuum veritas & evidentia præ omni ratione est. In eam rem Aristotelis & Galeni testimonia. Anatomicus non nisi oculis suis credere debet.

Post explanatam enodatamque rationem nominis, restat ea videamus, quæ ad *τὸν ἐνive ad τὴν ἀσθενειάν*, id est, existentiam attinent. De ea perquirenda nobis duo sunt. Primum, *Verè ne deus sit, et constet in re quartum hoc videremus genus?* Alterum, *Si deus, vetus invicentum sit, an novum?* Diversa hæc sunt, et genere à se disjuncta. Nec enim aut ex illo hoc efficitur, ut scilicet, si fuit, etiam nota antiquioribus Medicis fuerint: aut vicissim ex hoc illud concluditur, ut non fuit, si fuerint ignota.

Primum horum miuime difficile habet explicatum, & abunde jam Historiæ fide probatum est. Sentiu enim eget, ut Aristoteles loquitur, qui id negat, & haud fœdè ac pœna etiam. Docet oculorum fides atque confuetudo plurimas (vide *fig. 1, 2, 3, B.*) per omnem Melenferii, abusque centro ejus, regionem, dispergi ramulos candentium valorum, inde in intestina deferri, ad ipsa fecunda in propagines penè infinitas, his propaginibus unque intestina ambiæ ac comprehendî. Docet eadem manifeste distingui, dispararique à valorum reliquo

De Lactibus, seu Venis Lacteis.

religunor fingulis; cavitare, a nervis; tenuitate
unicuram, ab arteriis; venis, cander; ab om-
bus nullum, tum fucco, quem includunt, qui in ne-
vis finit, in venis & arteriis tra substantia & co-
lore dispar est, tum locis per que feruntur. Vi-
cimum fape tria illa conituntur, attingit aut con-
tingit, tum non raro ab eis incedunt fcorium, &
fola. *Item 1, 2, 3, litera li.* Denique unum
argumentum rem omnem conficite; VENI, VIDI,
QUE GALEO in fimili re, hoc est, novo invento fi-
olm Galuano juffit. *Quicunque vult operum tui
effe contemplator, eam propriis oculis credere oportet,
e aut ad eis accedere, aut cum aliquo eorum, qui nobis
verfati funt, verfari, aut ipfum per fe diligenter exerci-
tari anatomis magno abunde.*

Quid referemus? enim, quod nobis Aristoteles ipse
Certeus esse quærit, quæ verba & falsa notamus:
Quid nisi finem, ratio quæque claudicat omnes?
Invaleto quodam mentis est, inquit Aristoteles, re-
putata finem antiquitate, ac confusam rationem re-
quirere. Et talibus, Sanctis mens, quam rationis flu-
diis est, rationi haculæ fideremus, si quæ demonstretur
falsitas: sed quæ sit finis, ratio finis nulla est
& impræsta. Atque si finis sit, finis Galenus
notum est: Ille vero multo etiam luculentius, non
enim solum quod Aristoteles dicitur, *finem
sine præteriterationis finis, finem evitandum*. Ita
illius præteriteratione plana insignia. Si quis finem
autem rationis, cum omni ad demonstrandum principia de-
fuit, nullatenus habere posse ullius magnarum artium fene-
stram, itaque ad ludibrium omnibus debere, quod mul-
ta simplici esset, *ἀνακρίτης, & Σοφιστής*, hoc est
homines ex fraudibus & fallacis compositos. Est
ergo, inquit hic amplius? Est vero. *Sive quam*
extremam finem, sive quam finem non finem. Quin in re ipsa no-
ta, indicium, inquit, *circum ceterarum scilicet non*
est demonstratio, sed finis.

Quod si omnino ratione tamen agendum sit, hac unica instar omnium feriat. Necessarium est hoc valorum genus præter reliqua. Est igitur. Consecutio clara & notissima. Nec enim in necessariis deficere natura potest, quæ utilitatem omnium opportunitatque provide affatim, etiam in minus necessariis, quibus est opus suppediatur. Quod præsumitur, id vero vincit consequens omnis disputatio. Ita facile & brevi de primo confectores est.

C A P. XIII.

*Quæsitum alterum, Novum inventum sint, necne? Re-
cte vidisse veteres alia chylo, alia sanguini deberi va-
sa; illa tamen ignorasse. Erasfratum novisse, nec
agnovisse. Hippocrates, Plato, Aristoteles, Stoici, He-
rophilus, ipse Galenus, varie illustrati, & explicati.
Item Pollux, Rhafis, quidam recentiores.*

Majoris operæ & negotii videri potest, de quo secundo loco quæsitum est. Quis enim facile credat tam expeditam sensui rem, tam obviam, ita omnibus ante hunc diem, tanquam fœpulta in tenebris esset, latuisse? Accedit, quod in hoc genere, & in hoc negotio ac pulvere nostro nihil frequentius, quam pessimo more & exemplo, novare de veteribus. Quod utinam paucioribus, quam expedit exemplis testatum posset ferri. Hæc tamen nihil moratus, ita brevier de re

hac tota cenſeo. Non fuſſiſſe quidem veteres, vaſa alia
chylo, alia & diverſa ſanguini continendo, deſcenden-
doque deberi: Ceterum, vasa ipſa chylo vaſa, hoc eſt, no-
ſtras venas eſſe viſas quibusdam eorum, neminem tamen
unquam agnoviſſe. Quæ à me una comprehenſio-
ne, ſemel & generatim dicta, ſigillatim & per partes
plana ſi facio.

Quod fusa quaedam & propria chylo vafa tri-
buerint veteres, docet primum omnium Hippo-
crates, five quicquis est, auctor lib. de *Humana na-
tura**. Is enim postquam venas omnes, quas cras-
fas appellat, in quatuor diduxisset paria, earum
denique omnem divisionem distributionemque
per corpus abolvisset, diserte, quo ipse quoque
Galenus in comm. animadvertit, praefer eas, alias
reperiri dicit, ad defendendum & ventriculo alimen-
tum comparatas. Et eadē habentur lib. de *officium
naturae*, quem Hippocrati omnem attribuit tan-
quam generum. Et possunt non diffimilia ex lib.
de *morbo facio*, & de *loc. in hom.* colligi.

[illegible]

Atqui idem multo clarius alio modo eodem in
Timaeo loco repetit, quo a rivis alimentis per totum
corpus permenientibus (*ῥιζῶν ἀφ' ὧν* vocat.) diffingit,
dividitque in riva exitus (*ῥέζαν*) fecit
venas expletis, quae et ventre effluntur.

Platonis Aristoteles iungere libet, magistro discipulum. Ipse quoque confentit, & Meleniterii
fue chyli venas palam a venis sanguinis separat ac
fecerunt. Tendant, inquit, ab intestinis in venas
magnum & totum. Ecce tendunt in illas, non funt
ab illis. Porcus: Per eas in venas et ventre tantum
per radices percutit alimentum. Non potuit aptius.
At tantum radices cibum de ventre ad venas
deferre, ab his porro venis cibum illum in alimentum,
id est sanguinem mutari, & in omnes totius
partes ad eas nutriendum differgi ac diffipari.

Edam quæ Hippocratis, Platonis, & Aristotelis, Stoicorum quoque apud Ciceronem⁴ fuit sententia. Quadruplices enim illi alimenti vias faciebant, prorsus inter se distinctas; alias à medio intestino (sic Mefenterium Cicero vocat) ad portas jecoris ductas directasque, per quas permanet fucus à reliquo cibo in ventre, ac intestinis secretus; alias inde pertinentes, per quas cadat cibus à jecore delapsus; alias, per quas versus in sanguinem

ad partes

ad partes easdem jecoris vicissim confluit, & in cavam venam confunditur: postrema denique, ipsam venam cavam, per quam ad cor perlatus idem sanguis in totum corpus ei nutriendo dividitur. Vbi notandum illud imprimis est, priores illas vias ne venarum quidem nomine eos dignatos.

Iam Herophilus* antiquus medicus, (ex cui tantum Gal.* in Anatome tribuit, ut ad exquisitissimam ejus cognitionem pervenisse dicat; quemque Tertullianus*, ut hominis naturam cognosceret, septingenta cadavera incidisse scriptum reliquit,) duplex in Mesenterio venarum genus, ut supra etiam diximus, constituit, alias tendentes versus jecoris portas, cujus manus finit, alias proprias intestinis ipsis alendis, haud quaquam ad hepar trajicientes, sed in glandulosa quædam corpora finientes.

Cum quoque recentiorum numero multis, Vaso, Paræzo, aliis, ac forte Galeno ipsi convenit. Quin affirmat idem Galenus*, suo quoque tempore non defuisse qui mirarentur, si audirent per quas venas prius distributo ad hepar facta esset, per easdem rursus benignum sanguinem recurrere. Arque ad hos omnes aggregari possunt, quotquot vulgatas Mesaricas chili ducendo comportando ad hepar chylo dictas contendunt. E quorum numero inter præcæso Pollex est*, qui Mesenterium definit *opæta* *opælo* *ducentium*, *eis* *si* *trans*, id est, *membranam ciliam transmittentem* ad hepar, inter Arabes Rhafis*, qui ea ipsa causa, ne venas quidem effe concedit (sed canales tantum nominat: inter recentiores Theophilus Protospatharius*, Stephanus*, Benedictus*, & alii plures apud Costæum*, Laurentium*, Mercatum*.

Iam vero, quod secundo loco dicit, neminem horum agnovisse vera chyli vasa, hoc est, venas nostras, id multo facilius etiam ad probandum est. Constat siquidem ex iis quæ dicta sunt, plerisque eorum a vasis communibus illa sua derivare. Hippocratem a vena cava, Aristotelem ab eadem & præterea ab aorta: Herophilum, Rhafin, & qui cum eo sunt, ab ea, quæ ad portas dicitur; alios aut Stoicos, etsi sui generis ductus, five vias consistere videntur, quales tamen sint, aut quæ iis origo, ne verbo quidem attingere. Quo ita explicato, non negesse effe eorum opinio, qui saltem Rhafin ignota fuisse existimant, eo quod a venarum numero illas, quæ chylo operantur, excluderit. Certissimum enim est, quas a venarum genere reject, eas non alias fuisse, quam quæ ad portas veteribus fuerunt indigitate. Quæ Rhafis sententia præter alia, hoc vel maximo urgetur in commodum, quod semel constituto, si chylo ferendo vacare portæ venas, nullo modo doceri potest, quibus venis intestinorum & aliorum, quæ iis vicina sunt, viscero nutritioni succurrant, cum à cava nullas prorsus perire ad illa vincat aut topia. Quæ autem de Lactæa Arabum vena quidam adferunt, scire licet, necesse illam à portæ venis aliam fuisse ab ipsis habitam, qui Lactæam non alia causa dixere, quam quod, falsa quadam veri opinione, lacteum & ventriculo ac intestinis ad se pellere fucum sunt arbitrati. Denique nec minus verum illud est, quod addidit, vasa quibusdam eorum fuisse, nec tamen cognita. Erasistratum enim & ejus afflicta intellego,

quem vidisse nostras venas, & suis ostendisse, ex duobus Galepi locis manifestum mihi est, quorum alter libro an sanguis*, alter inde. Anatom. adm. c. 65. *legitur. Ex utroque enim liquet, ad probandum solum Spiritum in arteriis attineri, confuere autem post sanguinem vel aliam naturam quamcunque, experimento hoc Anatomico usum esse, quod in hoc nuper lactatis, si venter inus & interior membrana dividantur, initio simul scilicet ac nudatum mesenterium fuerit, arteriæ *aspendis*, id est, *areæ*, mox plenæ lacte conspicuntur. Vidit igitur omnino Lactæa hæc vasa, nec agnovit tamen, quippe quæ pro arteriis, deceptus veri quamvis inani similitudine, habuerit. Ex quibus omnibus satis opinor patet, ignorata fuisse hæc tunc vasa, quæ prius invenisse profiteamur.

C A P. XIV.

Ex occasione quasi finculla dua. Prima: Quæ casant tamulid laterum? Triplicem videri. Excusati veteres, non Galenus, qui videntur nasse omnino demissis. Secunda: Cur ita repente obliteret & excolat. Post plures causas allatas, res in medio relictæ.

Videri jam poterat ad exitum Preætionis omne negotium perducum, nil vel in limite occurrerent, quæ sistent adhibe & morarentur. Querunt enim plerique, *Qui fieri tandem poterit, ut tandem laurici vasorum fundi genu, veritibus præferant, eo usque in scitibus dectis, nihil ut ad diligenter nobis scisse reliqui videntur?* Hæc quaestio omnino amolenda est, cum præsertim comitem aliam trahat longe obcursum & maxime arduum, *Quoniam modo tam repente vasa illa excolant & obliterant.*

Igitur ignorationis veterum causam si quis petat, cam ego puto non difficulter ex Aristotele* posse colligi, bonorum omnium nobis auctor, ut de Hippocrate dicebat Galenus. Hic enim perquirens, cur venarum ratio, natura & origo ita philosophorum veterum cognitionem fugisset? causam inter cæteras reddit, quod in jugulatis animalibus examen earum insisterent. In his enim, inquit, multo *visu sanguine languente & collabuntur, natura principiorum venarum abolita, plerique occurrunt & obscurari necesse est.* Quæ ipse in stragula potius perpendenda exploranda quæ præcipit. Simile quidem nos dicere possumus, evenisse illis, de quibus agimus, ignoratorem hanc, quod non in vivis, sed demortuis animalibus anatomas suas insisterent, in quibus has venas experientia docet ita consensum pervenire, ut omnem aspectum etiam attentissimum fallant atque effugiant. Potest etiam fieri ut vix secuerint, sed non vix tempore aut sitivisset absoluta jam perfectæque, ut necdum tentata inchoataque chyli distributione atque ad hepar appullu. Fortæ illud quoque iis imposuisset, quod me quoque primo intuitu induxit, quod nervorum implicationes arbitrari sunt, quæ erant Lactidum. Quæ causa (aut ego vehementer decipiar) recentiorum quibusdam tradi fuit, qui nescio nam quam in Mesenterio ac intestinis congeriem, & tantum non infinitam plurimorum eorumque insignium nervorum vidisse autumant, cum Galenus* vix exiguis, imo plane exiguis eis tribuat.

Ac pro aliis quidem hæc dici possunt. De Galeno

leno autem quid cogitem, prorsus ignoro. Qui enim sectiones vivas amplius sexcentas dedit, ut ipse quidem gloriatur, & plurima* animalia à passu tam sæpe incidit, ei fieri ne posse putandum est, ut nunquam sese vense ille in conspectum dederit? ut nunquam eas obvias habuerit, imo nunquam pervestigat, cum præsertim exquirende totius rei maximam illi causam Erasistratus, de quo supra, præbuisse? Contra quem ita frigide ille disputat ac perlexe, ut judicare vix possit, quid ipse negere, & detne illi quod in experimentum sumit, an abnuat? Certe quidem nihil aliud, quo merito illum convincat. Id quod facile videri, quicunque locum illum totum sedendo, quod ajunt, perlegerit expendente. In promptu enim est, & à quolibet inspicere potest. Ad facillima ei palma erat futura, si explorata: ipsi vense illi fuissent, quæ perperam arteriarum in loco Erasistratus habuerat.

Cur vero in mortuis, aut morientibus etiam, iam repente exhaustis, qui in eis est, succo obliterant vense ipsæ, ac sensum excolentes desistant, quemadmodum supra* in exemplo canis dixi? Id in iis, qui fato suo aut vi morbi pereunt, non magnopere fortassis mirandum sit, quod in illis constet gethionis omnes functionesque nutritias animæ, quæ naturales medicis dicuntur, & inter quas nec minima illa chyli est confectio ac distributio, excolito jacent, & cum ipsis veluti emoriuntur. At cur idem iis quoque usque veniat, qui vel sectione vasa citra morbum, vel alias violente occumbunt, ejus rei rationem malim ab alio quovis dicere, quam ipse temere quicquam tam obscura in re decernere. Est enim, ut de rebus cæteris plerique, ita de hac longe verissimum illud Cotta* apud Cicero nem*, multo effe facilius dicere quod non sentias, aut quare fallim te quippiam, quam quid sentias, aut quare verum aliquid putes. I. Sulpiciatus sum aliquando eo istud evenire, quod lacteo illo humore in auris modo absente fuit tenuitate, dissipatoque concidant, collabanturque perexiles venule, & ita sensum insisterent. Quam in sententiam ideo veniam, roris tenuissimis inlar rari in Mesaricis, quidquid effe in omni chylo lubellissimum. Sed coegit me res ipsa mutare sententiam. Cum enim periclitandi gratia, perrupta cutello una ex majoribus illis venis, liquorem, qui inde promanarat, in cochleare collegissem, animadverti non horas modo, sed diei etiam solito cum candore durasse. II. Quare alio animum divisi, & cogitare cepti, ne ideo fortitan id fieret, quod, qui in venis illis stabularum succus, is ad hepar mox dirigeretur, tractu illius valido, five etiam impulsu venarum, tum violento præterea motu, qui tunc animal agitatur, novus vero alius nullus in locum ejus reponeretur, & sic vense perexiguis periret, quod videndas antea præstitisset. III. Alius quidam, nec indoctus & mihi peramicus existimavit simile quid effe hic et, quod pulmonibus quoque videmus usque venire. Nam & illos, quo ad vita fterit, plurimo sanguine circumfluere, mortuo animalis, omni pretere defuncti, vane tene illo, velut in spongia, in visceris raritatis. Etenim & Mesenterium, inquebat illi, rarissima texture est (unde Mesarai quoque nomen Galeno auctore inventi)

& glandule, quæ plurime in eo cernuntur, facile possunt diditum in vense succum in sese combere, quod ipse private, necessario fe sui tenuitate sensui subducant.

Quas sententias propothere volui, non quod probarem omnino, sed ut sic, dato veluti ligno aut posita in medio palma, quod ajunt, meliores aliorum elicerem.

sententia vice cutis, acutum
Reddere que ferum valet, exorsu ipsa fecandi.

Sed de prænotandis ad horum valorum Anatomiam perceptionem, quæ dicenda erant, hunc habebant terminum.

ANATOME HORVM VASORVM.

C A P. XV.

Transfuso ad ea, quæ Anatomies propria. Quid ea nobis? Tribus cum rebus alservi. Quæ prima historia patris. Quæ quatuor quævis in parte perpendi. Aristoteles in his omnibus Galeno quævis & q.

Ultima nos ad se vocat laboris nobis pars, sed præcipua & longe maxima, valorum nostro Anatomie. Intellego autem Anatomem, non quod nomen prima ipsi vel notione præsert, artificiosum partium corporis nobis sectionem: sed illud, qui præcipue significando Sapientium consilio, tradicum paululum immutatque à nativo suo significato, positum datumque est; habuit puta, fere scientiam, si ita mavis, quæ sectione adjuncta quicquid proprie inest in quaque parte, eamque complecti & aboluit, via ac ratione perquiri, aperit, explicat. Sunt ea, quæ in parte quasvis ipsa spectantur, tria omnino, et ipse paucis plane aut, si verum amamus, nemini adhuc observata satis & perfecta. Ex his primum *structura* est, quæ condita pars quæque vel fabricata conspiciunt: aut Galenus sectionem*. Aristoteles* Historiam, Cicero* partis descriptionem appellat: alterum, *Alia* vel *functio* *effluere*, quæ ea ex se promit: postremum *usus*, quem ad rite obendum affert. Hoc loquitur, nature membra ipsæ *que* *peritiam* definit. Nec in omni Aristoteles de animalibus tam varia & multiplex dispositione, quicquam reperire est, quod non ad horum trium aliquod referatur. Videamus breviter in re nostra præsentem singula, & ante omnia Historiam.

Huic enim principem effe præ reliquis locum, idem Galenus* ex eo docet, quod vel *functionem* *variā* *offendit*, *vel ratiocinationes ad ipse inventionem exhibet*. Et idem quoque Aristoteles* sentit, cujus hæc sunt: *Præcedere oportere, si modo tractanda sint partes animalium, historiam singularum. Hinc enim patere quibus de rebus, & ex quibus effici demonstrationes debeant*. Et alibi*: *Debere Physicum, non siccus ac Astronomicum, primum ea tueri, quæ apparent in animalium genere, partemque singulas explorare, deinde vero quævis ita hæc sunt, causas reddere*. Explicat autem Historia ex eodem Galeno* naturam membrum. Natura autem intelligitur, cum hæc quatuor perfecta fuerint, id est, Substantia patris (quam & substantia proprietatem* appellat;)* Temperies ejusdem, Quæ temperiem consequuntur; Quæ accidunt*, id est, Conformatio, Magnitudo, Nunc,

a de respo.
4. 17.

les*, quicquam a nutritione vitam interesse, aut si quid interfit, illud totum non in re magis, quam in verbo & cogitatione seu *ἐν τῷ λόγῳ* esse positum. Hoc igitur cum certum ratumque sit, non controvertiam habet ullam, nec eget disputatione longiori: quemadmodum nec illud, alias præterea omnes functiones edere, quæ nutritioni continentes ac continuæ nec separari ab illa possunt, & naturam ejus omnem abolvunt; cujusmodi sunt alimentum in se fere prolicere; idem arceri, & contineri; quod ejus purum probumque est, sibi adjungere; quod ejus diversum ac contrarium prius fectere, mox etiam excernere.

Illud in questione esse potest. *Quid sit ipsum, quo aluntur, cibifque, seu, ut vulgo loqui amari, chylo, an sanguis, an nutritivusque?* Si enim verum habet, ventriculum & intestina, quod in coquendo chylo digerendoque occupantur, chylo quoque naturæ lege atque ordine semper, sanguine vero non nisi per longiores inedia alique educari; eadem utique harum partium ratio fuerit, ut quæ ipse quoque chyli procuratio nisi addita. At enim chylo, quo diximus modo, nutriti ventriculum & intestina, ita certum acceptumque est Galeno, ut prodigio videtur simile queat, esse qui alter pronuntiare audeat. Pluribus locis*, & quidem totidem verbis, id affirmat. Nec momentum habet, quod regerunt quidam & contra disputant, nequaquam quod nos, sed id tantum velle Galenum, *δοτλάνον*, id est, voluptatis quandam levem nec duraturum fructum ex chylo capere, quod, inquit, vetus interpretis *volutari* interpretatus est, Archangelus* imperfecte, Massa* secundario nutriti, *δοτλάνον*, nihil sanum. Fracta vitæ, & fomionum interpretamenta.

Primum quæro, quemadmodum appellant imperfectam nutritionem & secundariam, an ut passim dicimus esse puerum imperfectum hominem; & rei magnitudinem, figuram, intervallum, alia his similia, secundo loco seu ut ipsi, secundario videtibus nobis percipi. At sic nihil minus quam quæ volunt, effecerint, ut scilicet vere & proprie nutritio non fit illa ex chylo Galenica *δοτλάνον*. Quin vera maxime & germana profusius ita fuerit, non fecus quam & puer verus est ac germanus homo; & vere ac proprie rei magnitudo & cætera, quæ diximus, aspectu oculorum accipiuntur. At enim non hoc inquit, volumus, quod ut infusulas, aliud est, quod intelligimus. Quin nitentur igitur enigmata & humane, hoc est, plane & aperte loquuntur, nosque participes faciunt sue sapientie? Quo (malum!) griphi & scrupi in re clara? Non omnes Hortensii fumus, aut phibgem domi habemus, & inique injurius est, ait illæ, ut quæ intelligentia interpretari alios æquum censet.

Iam de *δοτλάνον* quæ jactant, cui non minus *ψηλλας*? Eri enim volutatio interdum, fere voluptaria oblectatio, subiecta notio huic verbo est, non minus tamen & sæpius nutritionem, & eamque veram & perfectam significat, Medicis præsertim & Philosophis, in his Hippocrati, Aristoteli, Theophrasto, Alexandro & aliis. Quorum in hanc rem testifonia & auctoritates quamvis magno numero & vero adferri possent, si id operæ sit precium. Non est. Abunde ipse, quid velit sibi Galenus aperiri nobis, si nostri modo juris, nec opinioibus

mancipati fumus, qui ea omnia isti ex chylo *δοτλάνον* tribuit, quæ nisi in exactam & absolutam omnibus numeris nutritionem convenire nullo modo possunt. Ait, *saturari ventriculum chylo*, Ait, *Sua ipsius causa chylum scilicet per se, ut eo tum fratur, tum supplet, quod sibi desit*. Ait, *Constringi ac cibos ventrem*, ut accommodatum sibi ex his alimentum eliciat. Ait, *trahere & retinere, ut ejus, quod in qualitate conveniens consentiensque sibi est, aliquam partem palatit*. Ait, *quod in cibo optimum est, id habuit specie palatit in se fere allicere, sugendo in tunica sua reponere*, id adjungere, agglutinare, denique adformare*. Nihil potest clarius, nihil explicatius. Non urgeo verba toties inculcata iteratque, *nutritivum, alimentum*, ejusmodi in qualitate conveniens est, quæ ut extorquet nulla ratione possit, torqueri tamen possunt. Illud pectore libet à Medicis istis *δοτλάνον* nutritionem, quæ tandem definiant? Nulla re alia puro, quæ Galenum modo suum audire volent, quam vel ejus*,

quod nutrit ad id, quod nutritur assimilatione: vel ejus, quod evacuatur*, repletione. Illius enim ita fuit. At utrumque horum, ut perspicuum ex dictis est, tam *δοτλάνον* idem tribuit, & quod repletur per eam, quod decessit parti, & quod amplius eidem reddit, quod ex chylo accessit. Peto amplius *saturari* quæ esse putent? Idem ait Galenus*, quod apponi & affigi. Recte. Iam vero appositum & quæ huic naturæ lege semper comitatur, five affixio five agglutinatione quid sunt? Naturæ opera, respondet enim Galenus*, assimilationis proxima, hoc est ejusmodi, quæ perpetuo cum ordine & modo naturam agit, excipit ea, quæ genuina est nutritioni, affiguntur. At enim apponi chylum ventriculo & intestinis, affigi item & agglutinari pertendit Galenus. Quidni igitur assimilatur quoque? & si hoc, quidni nutrit? Rursus igitur vera & perfecta nutritio erit *δοτλάνον*.

Ita brevi & evidenter de Galeni fœntentia, simul tota nutritionis ventriculi & intestinum conclusa res atque ratio est, simul patet, nihil in *δοτλάνον* esse voce aut argutia aut effugii esse loci.

Quid ita igitur, inquit aliquis, ita fentis? Ego vero quia omnia, & hac fœntentia nihil esse fentis, nihil leveus. An ergo ad Aristotelem abeo & Galenum ut clamant illi, prodo? Ne id quidem. (Erit quod proditio esse potest, duo armatos vivideas*, si ad fortorem confugas?) Galenum hac quoque de re famo iudicem, ad ipsum provocato sed ut anus illa à Kege* Philippo, à domientem ad vigilantem, hoc est, rectus alibi, ut solet, nec parum sæpe, & ad rationis præscriptum cum Aristotele philosophantem. Cum eo doceo, ut *ἐν τῷ αὐτῷ* omnes partes, ita ventriculum quoque & intestina, & quod consequens his est, *Lactes nostris non nisi sanguine alii, educari, fœntemur*. Si enim aliter est, & si chylo naturæ perpetuo instituto ventriculo & intestina aluntur, quid est? de Galene (licet enim mihi tuis i verbis convenire, & tanquam in re præsentem cum agere) quid est, inquam, quod alibi Aristotelem laudas, qui sanguinem* dixit verum alimentumque ultimum partium omnium alimentum, & totius corporis* materiam? quid quod ipse toties, sine ulla exceptione repetis, & ferri describis, *in omnes animalis partes ex jecore* sanguinem*, & ex se descripto divisoque, suam & propriam nutritionem* singulis, accedere? quod hepar proprium nutriti.

a 5. de locis.

b 2. aph. 47.

c 2. de diet.

d 2. de diet.

e 2. de diet.

f 2. de diet.

g 2. de diet.

h 2. de diet.

i 2. de diet.

k 2. de diet.

l 2. de diet.

m 2. de diet.

n 2. de diet.

o 2. de diet.

p 2. de diet.

q 2. de diet.

r 2. de diet.

s 2. de diet.

t 2. de diet.

u 2. de diet.

v 2. de diet.

w 2. de diet.

x 2. de diet.

y 2. de diet.

z 2. de diet.

aa 2. de diet.

ab 2. de diet.

ac 2. de diet.

ad 2. de diet.

ae 2. de diet.

af 2. de diet.

ag 2. de diet.

ah 2. de diet.

ai 2. de diet.

aj 2. de diet.

ak 2. de diet.

al 2. de diet.

am 2. de diet.

an 2. de diet.

ao 2. de diet.

ap 2. de diet.

aq 2. de diet.

ar 2. de diet.

as 2. de diet.

at 2. de diet.

au 2. de diet.

av 2. de diet.

aw 2. de diet.

ax 2. de diet.

ay 2. de diet.

az 2. de diet.

ba 2. de diet.

bb 2. de diet.

bc 2. de diet.

bd 2. de diet.

be 2. de diet.

bf 2. de diet.

bg 2. de diet.

bh 2. de diet.

bi 2. de diet.

bj 2. de diet.

bk 2. de diet.

bl 2. de diet.

bm 2. de diet.

bn 2. de diet.

bo 2. de diet.

bp 2. de diet.

bq 2. de diet.

br 2. de diet.

bs 2. de diet.

bt 2. de diet.

bu 2. de diet.

bv 2. de diet.

bw 2. de diet.

bx 2. de diet.

by 2. de diet.

bz 2. de diet.

nutrientis facultatis* confutatio? quod sanguinis transformationem cam, quæ simpliciter optima est, ipsam partium animalis nutritionem* definitis? quod & sanguine animalis omnes partes* & conditis primitivis doctis, & idem non negas, quod dicitur* Philosophus, isdem alios, quibus compagis nostræ prima origo debetur? Rursus si alii chylo ultra partium potest, quo ista pertinent tua, nihil nutrire posse, ne vim quidem, esse id, ut nutrit minimum omnium mutationem desiderat, nisi in ventriculo & jecore moram traxerit, nisi omnes, quæ in medio sunt mutationes* transferat? non ex his, quæ de nutriuntur, sed ex his, quæ confecta substatque in ventro, in jecore mutata in sanguinem sunt, alimentum toti corpori* suppeditari? Cur denique, ut ad rem nostram veniamus propius, nutrimentum, quod in ventre est, non nutrimentum, nec veluti nutrimentum, sed futurum modo nutrimentum, si coquatur, cum Hippocrate* pronuntias, hoc est, ut tu explicas, maxime omnium æquivoce, & nonne, sed nomine nutrimentum. Quid illa sibi volunt? & ut possit esse nutrimentum, ut & cætera simul ad cibos se converterent, & ventriculus ex his, quæ sunt primæ per venas est exhaustum, in se ipsum trahat? Non enim hic manifeste alii sanguine ventriculæ, & quidem perpetuo fateris? Nam & trahere ais ex venis, at quid trahat nisi sanguinem? & fieri hoc postquam exuicatus est à venis chylus, sine ulla temporis aut necessitatis majoris prædictione. Possent adferri doceant huius rei ex Galeno multo plura, nisi ipsa hæc, quæ allata sunt, & multa jam essent, & satis superque quod sententiam de Lacturum nostram nutritione ostenderent. Si enim chylo alii nulla profus corporis pars potest, ne illa quidem, quæ naturæ veluti cognationem quandam jungi cum ipso videntur, dispensationi ejus procuratioque præfectæ, ventriculus scilicet ac intestina, quo solas Lactæas, quæ neutiquam cum ventre & intestinis tenentur servituti lege, fuscus ille pascat, nulli parti rescindendæ reparandæ comparatus? Sanguine igitur ipse quoque aluntur. Id quod præter dicta magis etiam venæ docent, quæ junctas iis videmus, non solum, quæ reliquis vasibus attinge sunt, sed etiam quæ seorsim progrediuntur, est hæc exiles admodum, & prope capillares. (tab. 1, & 2, B, C. Est autem id quod unum ex Galeni placitis*, ad quam venæ pertineant partem, & necessario pro nutrimento sanguinem esse.)

Hæc vero omnia cum ita sint, nihil moror; miror potius recentioribus cujusdam & maximi viri nuperam cogitationem, quam tanquam novum & præclarum inventum, tanta ille copia verborum, tanto apparatu proponit, ut non quod in faba pueri, fed Batti Sylphium putes reperisse, ea scilicet res frigida, exangusta, remota, à naturæ præcæta intestina, nil pauculo iis esset opus chylo, quo alerentur, ne nullo maxime ejus portio, si carnosa essent, si calida crassaque, hepati & cætero corpori ipsi subduceretur, intercepere aliter. & in suam rem convertere. Est enim profecto hoc quoque novitum commentum unum ex multis, quæ vulgo hodie jactantur, de quibus usurpare illud* Coniici possis.

Quæ nutrant vino veteri septentes puto,

Et qui illicet veteres fœdant fabulas.

Non minus nove, quæ præcedunt, Comedia

Multa sunt scaptores, quam nummi novi.

Atque de nutritione Lactum res dictum in mo-

nud habet. Quomodo autem Galenus purgari inconstante, & manifesta contradictione vindicari possit, alii viderint, quibus Galenus in *ἀνὰ τὰς ὅμιας* est, idemque *ἀνὰ τὰς ὅμιας* Lacti nescius, quique, quicquid ille dicierit Delphis sibi responsum putant.

Ὅτι δὲ Πλάτωνος ἀπὸ τῶν αἰνῶν τὸ κενὸν πῦρ,

Ναμπε μέλιτος ἵλλι ἰντέλλειν & iudicat.

Mihi ut ingenuis fatear, aqua hic hæret. Quare ea dederit καὶ Φύλο & Ζωήφρου, & αὐτὸς τὸ Φῶς, & εἶς ὁ νεγὸς, & quod dicam non habeo. Ego nihil icio, nisi nescio. Et certe non hac fiat ad cadit Galeni existimatio. Quod enim adferat à quibusdam foliis, velle quidem Galenum omnes partes nutriti lausim, sed non loco omnes, ἀπὸς δὲ τῶν αἰνῶν ἰσχυρῶς ἐστὶν τανύον, Non enim id solum dicit, nutriti omnes partes sanguine; sed alia quoque & hoc inprimis*, nihil nutrire posse, quod non per omnia cõditionis instrumenta provectum, excrementa omnia abijcerit ac defecit. Quod Galeni pronuntium mirari subit, qui venire in mentem potuerit principii Anatomorum nostri ævi, ut negare? audeat? eo solo argumento, quod nec ipse sanguis excrementis suis vacet, & tamen nutriti. Nihil potest dici levius, nihil dilutius. Nec enim unquam, aut qui vere ait sanguis, hoc est, qui parti jam inolefcentis speciem ejus & naturam induit, & excrementis illis permixtus est, aut qui permixtus est, id est, qui vel in venis adhuc coæctetur, vel adenda parti circumfunditur, vere alit. Arcue hoc est, quod istum alimentum nomine Hippocrates & Galenus non audent afficere, fed veluti alimentum aut futurum alimentum appellant, illum vero à Aristotele ultimum alimentum nuncupant. Quæ qui minus intellexerunt, multis fe falcibus implicare, quæ complanare alii conati funus.

Verum hic error huius viri alteri geminus est, quo ventriculum alii non sanguine, fed chylo conatus est efficere. Ita enim colligit. Fit chylos à tota ventriculi substantia. Ergo totum quoque nutriti. Hoc enim placet, etiam id quoque, ut nec cerebrum, nec cor alantur sanguine. Ejus enim vestigiis, hoc modo rationum concludam. Front vitæ & animales spiritus à tota cordis & cerebri substantia. Spiritus ergo cor & cerebrum aluntur, non sanguine. Simile in testibus, simile in utero audebo. Denique permittite semel mihi hanc concludendi licentiam, non minorem in ageris nutritionis, quam olim in Arcadiæ apud Erymanthus frangere dederim.

Nec ille ejus rationes meliores sunt, quamvis & cum aliis ipsi communes. Prima. Ignobiliora sunt caræ ventriculi & intestina. Chylo igitur debent alii. Non puto tam ignobilem ventriculum. Fac tamen esse. Quid hæc cartilagibus, membranis, & ossibus? Imo, quid utrique vesicæ, omento, utero, alio? Cur illa quoque nutriti huius non oportebit?

Altera quæ tamen, ne quid diffimulem, Averroës* quoque est. Cessat famel sitam à cibo assumptæ. Chylo igitur nutritur venter. Quid enim hic proposito conflat, quod consensuendum? Desinit à cibo oblatum famis molestia confestim, necdum tantillo chyli genio. Quomodo igitur ventre nutritio famem chylos sedat, qui nondum est? Non ergo, quia nutritur mox à cibo venter, eo famem eximitur

q Hipp. lib. de diet. Gal. 1. fac. nat. 11. c. 1. de gen. anim. 4.

r Hipp. de diet. Gal. 1. fac. nat. 11. c. 1. de gen. anim. 4.

s Colicæ

eximitur aut depellitur; sed ideo oblitescit tanquam, & veluti placatur mitigaturve, quia alio ductus ille & operi incumbens suo, non sentit fucum, famis causam. Quod non inelegerat quidam, effi obfcurus & sine appofita causa, dixit cessare famem animale, non naturale. Quid autem mirandum fi, cum dolor dolorem, genere fimi similem, obfcurit, voluptas, eaque major, dolorem fimi contrarium, eumque minorem extinguit? cum ita comparatum natura videamus, ut quemadmodum omnis detractio voluptatis confuetudinem adfert dolorem; ita omnis successio voluptatis, adfert amotionem doloris.

Tertia, quae tamen Galeni quoque putatur. Nisi chylus datur venter, efficitur agere illam ratione & confilio. Nec enim fimi laborat, nisi feres, fed alius partibus. Hic quoque plumbeo pugione pugnat. Multum abest, ut hoc efficiatur. Laborat aliis partibus publice, & Naturae confilio, quae provida cum fit utilitatem opportunitatemque omnium, incredibiliter hoc, ut cetera, quod scilicet totius necessitatibus ita confuleretur, effi fabricata. Laborat fimi privatim & confilio suo, dum voluptati studet, quam ex ingeffi cibi commercio & nutria tanquam cognatione percipere sentit.

Atque hoc est admirabile illud *μαρτυρία* seu *αἰσθησις* potius, quia licet indocta, nihil tamen effi callidius Naturae, quod in delinendis & velut ineficandis per illecebras & nefcio quae lenocinia partibus illa utitur, quas alienis parere, quam fuis vilius maluit, quibus detractis aut est rerum natura exemptis, nec flirpium genus ullum, nec animalium stare queat. Sed diu jam longior sum in explicanda Lactium hac communi actione, quam volui. Ad propriam venire tempus effi.

C A P. XXII.

De Propria Lactiarum actione. Eam esse distributionem chylis ad secur. Hanc componi ex tractu & pulsu. Quamvis uterque motus, & quae utriusque cause principes, instrumentales? *Διάδοξος* & *ἀντιδόξος* quid differant? Trabantium duplex genus, item pellentium. Tractum, qui fiat successione ad vacuum, nullum esse. Calor aut instrumentum tractus? Hippocrates, antequam Finitionem Medicarum, alii, explicati. Avicenna laudatus. *Δοκίμασι* quidam obiter perfrictus.

Actio propria venarum nostrarum abfque omni dubitatione chylis distributio effi, & quidem distributio ad secur. Quae ut notat Galenus, *ἀντιδόξος* quibusdam dicitur, ad discrimen ejus distributionis, qua in totum sanguis describitur, quam ibidem *Διάδοξος* nominare maluit. Effi distributio. Quid? Vasa enim sunt. Omnia autem vasa & distributionis instrumenta sunt. Sic venae sanguinem distribunt; arteriae sanguinem cum spiritu vitali permixtum; nervi animaleum & spiritum. Effi distributio chylis ad secur. Docet hoc sensus, qui chylis scitare deprehendit, & ad secur recta ferit. Docet ratio, quod, ubi chylus nullus conficitur, ut in fetu, ibi haec venae non cernuntur, quia ociatur. Sed quid effi hac distributio? Nihil aliud, quam compositus ex tractu & pulsu motus. Trahere venas haec offendit earum cum intestinis commiffio. Nec id minus ex valvulis, quae affixae iis sunt, perfpicuum effi.

Hiare enim ad intestina hirudinum moris, ac esse radicum instar, jam diximus. Et hoc Galenus suis tribuit, quas falso ille deducendo chylo praefecerat. Quin Hippocrates omnem distributionem simpliciter tractu firi docuit. Sed & pelle, re, five transmittere, ex eodem Galeno intelligere effi. Et vincit idem ratio, quod abfque omni controversia chylus ille redundat in eis, asperit. Effi autem iste genius cufpae partis, ea vis, nihil redundans, nihil supervacuum unquam ut tolleretur fed quantum conitit viribus ac robore potest spermat a fefe, & amolitur, & pellat. Nec obstat didis, quod intestina pellere dicuntur in Mefaricis, & secur per eas trahere, effiue tanquam manibus? uti. Quid enim prohibet, quominus fingant omnia illa confilium effi? Exemplo juxta & argumento cefoyagus effi potest, quem trahere & pellere, quod negare audeat, nihil idem sensum quoque neget? Et tamen non ipse minus venarum, quam jecoris Mefaricae venae, manus appellatur, depulsumque a lingua accipere in fe succum dicitur. Atque hinc illud Galeni effi, *venarum expressio* (tu adde intestinum) distributionis chylis principium praestare, reliquum progreffum, nam venarum contractionem, nam partem, ad quam mittitur, chylo perficere. Quocirca recte, meo animo, Iacobus de Partibus quadruplicem ex Avicenna motum ponit, quod chylus ad secur promoveatur, impulsione intestinorum, tractum Mefaricarum, impulsu earundem, & tractum hepatis.

Porro cum duplex fit apud Aristotelem trahentium omnium & pellentium genus; unum, quod motum trahit, ut pellit, aliud, quod immotum & quiescent; sane fi sensus testimonio standum fit, posterioris dicam generis tractus hic & pulfus, nostrarum venarum videri poterit. Sin ratio quae in partem vocetur, consularque effi structura earum deprompta, forte nec prior, effi nobis perobfcurus, denegandus iis fuerit, de qua re mox in usi dicatur sum.

Quomodo autem & a qua causa sunt duo motus isti? De tractu antiqua effi controversia, & multis ultra citroque rationibus agitata. Vt omittam Epicuri sententiam (quam apud Galenum, & apud Lucretium*, etfi a Galeno discrepantem aliquantulum, legere uniusquisque per se potest) Galenus, cum duplicem tractum statueret, alium qui successione ad id quod vacuatur, alium qui qualitatit, ut ipse loquitur, convenientia ferret; cumque graviter Effi stratum reprehendisset, qui priore digestionem alimenti perpetrari contendere, ipse posteriorem amplectitur. Rectissime. Effi in eo non parum peccat, ad certe valde populariter loquitur, cum successione, ad id quod vacuatur, cum felicitate, usi quique cessant aliud illico subsequitur, tractus speciem putat constitui. Nam profecto, fi verum querimus, & rem totam limamus perscrutemur, atque ad libellam philosophicae exigimus, tantum abest, ut id, quod succedit ei quod vacuum inanimatum effi, trahi possit dici, ut ne cogitari dumtaxat facile id queat. Quis enim aut vacuum trahere fimi irifio affi ferat, ab hoc fi difcedat, aliam hujus tractus causam manifesta sine vanitate comminifcat? Verum non effi nostrum ista *ἐξ ἑμῆς* hic profequi, quae vel ad finem spectant, quem propofitum fimi habet id, quod trahit;

trahit, vel certe dotes quaedam sunt fei conditiones in eo, quod trahitur, quibus aut tracturo fei commendat, aut ad agendum necessitate quaedam compellat.

Efficientem enim fei conscientem tractus nostrifri causam querimus. De qua, ut breve faciam & praecidam, ita sentio, duplicem esse, principem aliam, fei principalem; aliam, ut instrumentum. Illa facultas effi, ut fufe Galenus toto primo libro de Facultatibus Naturalibus demonftrat. Instrumentum fribat finit rectae, quibus venas has cum ceteris intertexti superius jam diximus. His vero fi quis ex Galeno* calorem quoque adfcribere, & veluti succurum, cum circumstantium partium, id me non illibet fecerit. Videtur enim nec Hippocratem* ab ea sententia esse alienum, qui venas possi- quam incaluerit, & ventre quid tenuissimum effi trahere jam olim fcriptum reliquit. Cuius quo auctor quod Finit, medicarum* consenti, dum digestio nem definit alimenti in totum corpus utraque, quam naturalis calor molitur. Andor item libri de Vitalitate respirations*, qui glandulas per Mefenterium sparsas, in causis caloris succum ab intestinis trahentes connumerat. Quin ipsum hepar ideo trahere vult, quia calidum fit & spongiosum. Quid vero de tractu dictum effi, idem fuo quodam modo, de pulsu dicendum fuerit. Nam & hic, ut a principe causa, ab vi expultrice peragitur; ut ab instrumentum, a fibris transversis.

Erat mihi animus quaedam adijcere hic, veluti corollidem, de posteriore tractus genere, qui fit quiescente, quod trahit. Negat enim hunc dari Neophytes quidam & Mexico *doxoi* & eoque nomine erroris dicam Aristoteli impingit. Verum & longior necessario, quam pro instituto, erat disputatio & paucis absolvi non poterat homo ex eorum genere, qui cum primos* se esse omnium rerum velint nec fiant, & tamen non omnium fcientiarum modo, fed juris quoque & morum dictatorem ad fefe revocant alios pra se omnes & ipsum adeo Aristotelem esse fecum oportere putant. Quare fatius vifum effi, integram rem fervare, & alibi fuis ex virtutibus philosophum tam capitale ornare, qui etiam pro eo, qui effi in ipfo, fale, ipsum hanc Lactiarum nostrarum inventionis laudem, fi qua effi modo, in fe & focios suos transmoveat effi conatus, fempet alienus, nunquam finis, & in hac ipfa in Aristotelem de tractu inventiva Plagiaris.

C A P. XXIII.

Remota duae objectiones. Cofei, & Laurentii rationes in nos mife. Chylus aut sanguis crassior? Cur tot venae vult ad intestina? Non fempet verum, quia frigida & exangusta panno egere alimento. Intestina cur multo egerant? Totum per illa expurgatio. Renibus cur angustissima vena?

Non minor effi virtus, quam quare parva fuerit, aut Poeta*. Plane ita effi. Non diligenter investiganda veritas effi, quam defendenda, cum investigaris, contra hominum ingenia, caliditatem, arguitis. Id hoc capite facere vifum effi, & removere argumenta, fi quae negotium facessant. Ea duo funt, quibus quidem momenti aliquid infti,

aut ponderis. Nam quibus aliis Cofteus*, & Laurentius*, in eos pugnant, qui diverfas in Mefaric venas chylo, diverfas fangi nati ducendo tribuunt (quod nos quoque facimus, dicimus, licet longe ac illi, alter) ea fiponte & ipfa fua vanitate, ex his didis ruunt; nec dicta fuisse ab ipsis unquam, fi ut ille ait, ut sensu cum labore aliquo uti vellent, aut temperare potuissent sine fide sensum incassum rationes accervare. Nam vel explorato falia sumunt, cujufmodi illa funt, *in folem multum inter Mefaricas diverfas facere, omnes fimites, exortu, colore, contentis* vel ea, quae ipfa in quaestione & controversia versantur, quatuor itud effi, omnes eadem lege ac conditione teneri, *ut dum operibus perfingit*. Alia ita fivola funt & inania, & *ἀντιδόξος* & *ἀντιδόξος*, rationis ac confequentiae experta, ut opera fit abuti, dare operam iis retellendis.

Ergo omitto, & ad illa venio, quae dixi majoris roboris, & falem cum specie aliqua argumenti. Eorum primum hoc effi. *Tenuissima & angustissima finit ha vena, ut vivit sensus*. Chylus sanguine etiam crassior effi. Quomodo igitur recte aut recipitur in eas, aut per eas permanit? Alterum. *Vena Mefarica confusa fere rubra, plurima funt ad intestina & tantum vifigata*. At quo tanta copia venarum & sanguinis, nutriendi corporibus frigidis & exanguib? Alui igitur praeferat ceteris, ut fuis oportet. At qui ille, nisi chylis transpositio & traditio ad secur? Firmatur hac ratio. *Vena ha plures in gradibus numeratur intestinis, quam in crassia*. At contra fieri oportet, ut nutritio illi provicia foret digesta. Quis enim nefcit pluri alimento egere, eodem in genere, quae fuit maiora, plenior, progrius, quam quae varia fuit & diverfa?

Ad primum in proclivi effi refponfo. Quicquid fit de fibris crassitie, de qua non difputo (nam alii sanguine tenuiorem faciunt, quia minus inveniunt effi, quam ille excoctus. Crassifcit autem omne, quod coquitur. Galenus* contra, nihil, ait, ex ventre & intestinis in arterias, ut ex ventis, fuit. Quomodo enim ex tam crasso gravece nutrimento quippiam in fe, cujus habenda fit ratio, ille traferat?) Quicquid fit, inquam, de hac crassitie, nihil ea distributionem impedit potest. Ita enim ab aqualo cibi vehiculo diluatur, in eam rem a natura comparato, ut vel arctiores venas fubire potest videatur, fi opus fit. Taceo, quod hoc argumenti genus, non nos magis quam eos uerget, qui obijciunt, & inverte ac retorqueri nullo negotio potest. Nec enim vena, per quas ipfi chylum derivant, noftris funt patentes, arctiores etiam fortassis & angustiores, ad intestina certe.

Magis premere argumentum alterum videtur. Verum haec quoque refponderi, & multimodis potest. Primum, non effi ea multitudo itarum venarum, quam videri illi volunt, fi longissima intestinum corpora perpendas: fed vni fufi hinc, quod is folet, ut docent Atrologi, qui in Coelum uno aspectu & quasi praetercentes fufpicunt. Innumerae enim hic felle videntur, quae tamen, fi diffidit oculorum obtutus obocutur, mille numerum non multum excedunt. Secundo, compensa multitudinem cum tenuitate & parvitate. Capillares enim propemodum omnes funt, & minimum sanguinis includunt. Tertio non effi perpetuum, ut fi exangue fit quippiam & frigidum, idem quoque statim paucas venas habeat & ex-

guo nutrimento egat. Cerebrum in argumentum iusque. Metropolis frigida est, si Hippocrati ^{a credimus}; tamen non venis modo plurimis scatet, quae a jugularibus in illud subeunt, quae interius, quae externis: sed fons etiam sanguinis, tanquam aqua ductibus quatuor ingentibus irrigatur. De frigore vero ventriculo quis nescit tritum illud & perulgatum, plus multo appetere cibi semper, quam potius peragere? Nihil frigiditas illis jejuniis. Fames illis mater est. Quin & aqua vorax, ait Hippocrates⁴. Cur? nisi quia refrigerat. Et novi ego aquae potorem non ignoblem, qui facile duos capos uno prandio conficeret, nec sine pulmento, infuso, quale quadra, & locum tamen relinqueret, ubi reliquiarum reliquias reconderet. Quid multa? Nemo habuit majorem edendi experientiam. Et an non hoc illud est, quod Horatius⁵ asserit,

*Nulla placere diu, neque vivere carmina possunt,
Quae scribuntur aqua potioribus.*

Non alit poticos spiritus plenus venter. Quarta, copioso alimento praeter partes reliquas opus intestini est, quod ad excernendum influens bilis acrimonia continuo proritatur tenuia praefertim, quae & primam vim ejus excipiunt, & sui reunitate gravius eam ab eo quam crassa feruntur. Sane tam difficili cum humore non minimum de fluere alientis & nullis succi est credibile, & opus ergo esse alium subinde ac alium sufficiens in opus ejus, & reponi. Quae astatim & celeriter evacuantur, dicebat Hippocrates⁴, astatim quoque & celeriter oportet rescire. Denique non nutritioni solum, sed expurgationi etiam corpori destinatae sunt illae vires. In vero usus, quam non parvas vires aut paucas requirit praecare Galenus in exemplo renum⁶ ostendit, ad quas maximas infuso, venas perducit, non quod multo alimento illi egent, sed quod cetero recremento purgando & corpore vacare illas oporteat. Suppleverit igitur hic quoque Natura magnitudinem multitudinem. Atque haec causa inter ceteras, quas dedi, familiam fortassis ducat. Quod autem contra adferunt aliqui, purgationem illam per inferiora maxime intestina obiri, & ideo illis potius quam tenuibus venarum istarum copiam dandam fuisse, si datae expurgationis causa fuissent, id malum docere illos, quam ita nudo affirmare. Galenus quidem⁷ nihil tale expit, loco, quo cum usum proponit & fuerit, praeter fensum testimonium, omnis ratio, modo propiore via per tenuia protrudi quod molestiam toti creat.

C A P. XXIV.

Lactis an chylum preparant jecori, & quo id modo Galenus & Fernelius reprehendi. Praeparare non esse praeparare, seu conferre quippiam figuraturae. Senfus Lactearum.

Nondum ad exitum suum venit de propria Lactearum actione disputatio, nec diu tamen nos tenebit. Queritur praeter chylum distributionem, alio ne munere sive opore teneatur? Quaestio hujus in causa Galenus⁸ est, & qui ab eo sunt. Voluit hic omnes, quos chylus ipsi praeficiunt Mefaraicas, praedire clari jecori, hoc est, quem dispensant faccum, eundem praeterea praeparare & tanquam praecolere ad sanguinis futuram formam ac speciem.

An ergo nosse idem praestant? Res paucissimas ab solvi potest. Si praeparare, intelligas ita afficere chylum, quia infusa vi, quae partium vicinarum auxilio, ut aptior semper ac aptior fiat ad sanguinis formam induendum in jecore, non video cur id muneri denegari eis debeat? Est enim, ut recte Galenus⁹ animadvertit, nihil quicquam in corpore nostro ociosum aut immobile: sed mobilia omnia, & varium expeditumque opus efficientia, cum decenti structura, non secus ac Vulcani instrumenta apud Homerum. Sin illud velis, quod Galenus dicit, praeparare modo jecori¹⁰ similis: mutare in sanguinem primum¹¹ ad hepar pervenit: vel ut Fernelius¹², conferre rudimentum sanguinis, quale per diffusionem in rubrum venit, quae ante hepar sunt, comprehendunt, eundem, loquor libere, figmentum id puto. Docuit me sensus evidenter, nihil in colore mutatum chylum ad hepar usque per venas itisse perferri: idem autem quantum scilicet in ipsum excidat, modo subspallimus, modo subfugimus conspici. Id in equo & in vacca praegante mihi notavi.

Sed profecto nec hoc sonuit unquam praeparationis nomen, quod isti perpendunt: nec visus & potestas cum ullo pacto trahit necessitatem, quam isti formant. Praeparantes autem Aristoteles¹³, & Galenus¹⁴ statuit: & nos omnes novimus Coriariam Stortiae, Ferrariam fabili materiam praestare. An igitur illa, calcei rudem formam corio, haec secus verbi gratia ferre imponit? Nihil minus. Illud modo praestant, ut in eas materias figurae illae facilius ab propriis artificibus induci queant. Sed est haec tota res multo in ipso humano corpore manifestetur. Praeparat cibum ventriculo gula, & chylum tamen nihil unquam vel leviter simile in illa reperias. Praeparant vasa feminalia fensum testibus: quis unquam in eis, antequam cum testibus committantur, vestigium aliquid feminis conspexit? Praeparat dexter cordis ventriculus sanguinem sinistro, in vitalem illi spiritum exornandum, nec tamen vitalis spiritus speciem ullam aut imaginem, aut rudimentum illi unquam imprimit. Atque idem est, ne fimo longior, de plexu choroide, qui in anterioribus cerebri ventriculis.

Quomodo autem fiat haec praeparatio, & quibus causis atque auxiliis, ex iis, quae de usu dicturum sum, fiet perspicuum. ubi & de venarum sanguine aquarum¹⁵, id est, consuetudinis famam vi ac potestate. Illud hic obiter observo, cum praeparare succum hepatis venae nostrae dicuntur, non id illas agere in hepatis gratiam, ratione enim sic & consilio ducerentur. Sed primo & per se sui oblectamenti causa, tum necessitate quadam, qua fit, ut cum duo corpora congruuntur, unum in aliud non possit non agendo nisi unum sensum.

Referatur ad actionem partis etiam Senfus, de quo ipso quoque ambigi potest, inquit nescis venis nostris? Non multis verbis opus est. Quod de aliis venis Galenus¹⁶, idem de his censet, per se & natura sua sensus omnino esse expertes, sive frangere velis, sive arere, sive incidere, sive laqueo excipere. Quod si sentire aliquando dicuntur, ut etiam fensum videtur, id non alter praefecto, quam unum membrum, quam sibi aliunde adficiunt, opus aut beneficio adjuncti proximae nervi consequuntur. Id quod nec Aristoteles¹⁷ latuit, qui & ipse, *Nervus, inquit, ignem non patitur, cum vena patitur.*

I. A-

LACTIVM SEV VENARVM

Lactearum Vfus.

C A P. XXV.

Explicatio usus Lactearum bipartita. Partis usus alius quoque, alius quoque pars cognita, Galeni librorum de usu partium duo summa capita. Actio, & usus partium, est vicius, namque, ac regula. Dispositionum inter se nexu, & connexu.

Restat ut declarata actione Lactearum, agrediamur ad explicationem illarum usus. Erit haec omnis bipartita. Exponetur primum ad fingendum recte atque ordine munus suum, quemadmodum affecta sint, seu quam opportune probeque comparatae & compositae, qui est usus partis proprie & simpliciter. Tum docebitur, quantum earundem inventio, cognitio & explicatio ad rem omnem medicam & philosophicam momentum habeat, & utrique quantum lucis adferat, qui usus ipse quoque partis est, sed cognite a nobis ac perceptae; quique ni fallor, Velitatis reclusus, qui usus ipse dicitur.

Vtrumque Galeni adeo imitatione fiet, qui ipse quoque in de usu Partium, cum sexdecim totilibris, Vfus omnes singulorum membrorum, edendi actionibus destinatos fuisse persequutus quam exactissime ultimo tandem¹⁸, quantum doctrina ista usum ad rationem omnem explicationemque naturae ad ethologiam, ad medicam *ἀνθρώπων, πονέων, ζώων* conferret, demonstrandum sibi, explanandumque putavit. Sapienter, ut scire solet. Est enim certe non parti modo cuique suus quidam usus proprius, quem, cum *κατασκευα* ut fuisse doctetque idem Galenus¹⁹ actione metimur, non secus ac membri ipsam *εὐφροσύνη* (quod quam ad actionem est appositum maxime, tam maxime fens omnes numeros obtinet), sed habet ipsa quoque cognitio, ut rerum ceterarum, ita partium humani corporis suas utilitates, qua scilicet vel ad actionem aliquam necessariam humanis usus illa referunt, vel in aliarum & aliarum rerum cognitionem vicissim nos inducit, non in eadem modo disciplina, sed saepe in diversis & toto genere & ab adjunctis.

Habent siquidem hoc omnes artes²⁰, & scientiae, ut, tanquam in catena articuli, nexae inter se apteque, communibus quibuldam vinculis junguntur, & quasi cognitione quadam inter se continentur. Quod adeo verum est, ut, si Ciceroni credimus²¹, ne virtutis quidem philosophia, est in alio plane ac diffinili genere, abque natura consideratione contemplationeque ad vitam beate & cum ratione degendam ad sufficere sibi possit, aut satis fiam dignitatem tuere. Sed utrumque ipsam usum explicemus.

C A P. XXVI.

Vfus partis ab actione, quibus differat? Galenus a contradictione vindicatus. Vfus qui, quoque, praestantior? Activi perfectio duo in parte requiritur, non plura. Partium organi actionem edenti quadruplex viciet. Partes singulae Lactearum, quemadmodum

ad actionem conferunt, Fibrae, Caro Membrana, De venarum fibris consutatae Pulvisque opus.

Anequam de primo Lactearum usus decernamus, quem usum diximus proprie & simpliciter, statuenda nobis differentia est, qua ab actione ille sejungitur. Ea Galeno²² auctore in hoc posita est, quod ille partibus adfert semper, etiam ociosis & cessantibus haec, nisi negotiis & agentibus nunquam. Recte. Est enim nihil aliud usum, quam quod vulgo *εὐφροσύνη* appellatur, id est, ad utendum quadam aptitudine: actionis autem *κίνησις* est *δεξιότης*, id est, efficiens motio, modo, quo supra jam explicatum est. Oritur vero ex hac alia differentia, quae est, quod idem usus, est parte, in qua inest, non secus quam actio ipsa, natura & dignitate prior est, ut praecare Galenus contra Epicurum²³, & Alcibiadem disputat, actione tamen his omnibus modis est posterior. Quomodo enim posterior ea non fit, in quam totus refertur: cuius inprimis gratia membris a natura est datus atque ingentis: qua tanquam regula & norma²⁴, omnis cum illius, tum partis ipsius perfectio iudicatur?

Quod si quando Galenus dixit²⁵, tempore quidem, seu ut ipse loquitur, *ἡ γὰρ* posterioriorem actione; de significatione vero priorum, praestantiorumque Vsum illum, nihil id nobis officit. Nequaquam enim cum hac ita dixit, intellexit usum, de quo nos hic agimus, qui ad actionem comparatur, sed actionis ipsius finem, id est, usum, qui ab actione partis toti corpori accedit. Et merito actioni fuit hunc usum anteposui, non ea solum causa, quia in eo actio, ut in finem fertur, eoque indeper est facta (est autem fuis natura sua ita temperata, quae sunt ejus gratia, praestabilior) sed illa etiam, quod latius ipse multo, quam ista patet, & ad plura pertinet, non unam partem, sed universum corpus complexus.

Hoc vero ita explicato constitutoque, actionis perfectione partis omnem cum usum tum *εὐφροσύνη* iudicari aestimarique: & repetito praeterea ex iam dictis propriam & praecipuam Lactearum functionem in chyli versari distributione, minime difficile, opinor, fuerit, de omni earum tum usu, tum *εὐφροσύνη* pronunciare. Nimium duo, non plura, actionis omnis perfectio in deipso illi membro requirit; alterum, ut singulae ejus particulae, alterum, ut in eo & in illis influant omnia ad colendum efficiendumque munus suum, tanquam collatis in commune vinibus conspiciant ac consentiant.

His enim ceu limitibus rem hanc totam jam olim Galenus²⁶, natura dux definitivus, & illud praeterea, partem qui adfuit ista, ea esse abolitione perfectioneque; ut si vel tantillum ejus ad perimere aut commutare conere, totam ipsam tollas aut pervertas. An igitur habent ista omnia Lactear nostrae? Habent vero, nec id cuiquam obscurum esse potest aut dubium, quicquid diligenter aliquid de his consideraverit. At de illis quidem, quae insunt in ipsis, mox videbimus; de partium vero singularum, & quibus conditae constant, contentu, consensione, concordia, qua, ut continuata quadam cognitione conspiciant in suam functionem, inde aestimari poterit.

D d a Partium

a. 4. n. p. 10.
a. n. p. 10.
7. n. p. 10.
d. n. p. 10.

Partium organi, inquit Galenus*, unam & certam ex se actionem promittens, aliaz funt in ipsa actionis causa (partes principes has alibi vocat): aliaz ita se habent, ut in eis non fiat actio: aliaz faciunt, ut earum ope melius fiat: aliaz denique ad harum omnium speciem conservationem. Nulla harum, quod miraris in tanta paucitate (tres enim omnino funt) Latetis nostris deest. Vis causam distributionis principem? Ecce tibi fibras rectas, & transversas. Vis alias? en fibras obliquas, Carnea Membranas.

De fibris non me fugit, quod etiam supra monui, eas venis Vesalium omnino negare: Fallopium, ex se admittit (quamvis aegre id quoque), nihil tamen profus eorum que nos, iis tribuere. Sed rectas transversasque his venis nostris, ut & aliis, principis partis in vicem esse, facile ratio vincit. Nam nec partem ullam aliam similem illis reperire in corpore est; quae una est & praecipua principis partis prerogativa. Et jam ante ostensum est, rectas tractui, transversas pulsi praesse. At enim tractu & pulsu omne, quantum est, distributionis munus perficitur. Accedit Galeni* auctoritas, qui commane id ait naturalibus omnibus instrumentis, ut non nili fibrarum ministerio beneficioque moveant: tum arteriis, quarum (quod quidem hanc ad rem pertinet) eadem plane est quae venarum ratio, perspicue fibras, quibus transmittant, attribuit.

Quibus omnibus fir, ut facile seorsim a Fallopio sentiam. Quod enim contra ille? Vult ad solam duarum datus venis, ne rumpantur a violentis sanguinis occurrentibus, exteila illarum ope in omnes partes venae mittant. Trahere autem, ut pelle digne duplici argumento negat. Altero ad structuram eorum potest. Quia ita, inquit, latent in membrana, ut potestote potius, quam actu inesse videantur; tum ita intertextae sunt & in sese mutuo implicatae innoxiae, ut moveri nullo modo possint. Altero ad sensum. Quia nec contractio in illis, nec dilatio ad sensum. Quia nec contractio in illis, nec dilatio ad sensum. Quia nec contractio in illis, nec dilatio ad sensum.

C A P. XXVII.

Ex iis, quae insunt, Temperies quid Latetisrum actioni accommodat? quid item, quae obsequuntur, alior, levitatis, tenuitatis, & variis tunicarum, fibrarum durities? Temperies frigida & siccatioribus partibus constantiam inprimis tribuit. Albor materiae necessitatem sequitur, fors etiam levitatem.

Non satis est, ut diximus, si partium organi singularum suas quoque ad promovendam illius actionem vias intendat ac conferat: oportet hoc amplius, ut ea quoque, quae in parte quilibet insunt, Temperies puta, quae consequuntur. Quae accidunt, mutuas eandem in rem operas trahant. Haec enim illa sunt, inquit Galenus*, per quae & agit pars quilibet quod debet, & praestet quae agenti funt ex usu. Et ista igitur nobis videtur.

Ac in Temperie quidem non est, quod diu immoremur. Sive enim ipsamet facultas illa est, sive facultatis primum & proximum instrumentum, quantum ad omnem actionem vim habeat, ignotari nullo modo potest. Per Temperiem, inquit idem Galenus*, quae propria subtilitas est cuiusque partis, magna ex parte organum quodvis suam actionem

nancisci

nancisci refert, quiescat id, quod trahit, an moveatur. Atque de fibris rectis simul ac transversis ita res est. Quid de fibris obliquis, quod suum est, agunt.

Fibras obliquas ad meliorem distributionem faciunt. Venant praecipitare chyli ad jecur, dum contendunt se vicissim & expellunt. Eadem ejusdem preparationis ferviunt, qualem quidem explicavimus. Nam inter moras castigatur. Privatam quoque partis coctionem promovenit, cum elabi non sinunt, quod semel fuae nutritioni, fuisse necessitibus illa seposuit.

Caro fibrarum spaciis interfusa, vice causae est sine qua non. Quippe explens, quae inter illas inanitas, tum ipsas jungens ac uniens simul, spacium eis praebet contrahendi se, laxandique; simul contractioni opitulatur, quam disjunctae a se se & divulsae, quomodo recte obirent? Eidem praeparatio chyli debetur, & prope tota. Nam & carnis cuiusque partis proprium est coquere, quod in ea est: & fibris ac membranis ipsa calore praestat, ut jam ostendimus.

Membrana, quae venis propria est, tutelae inprimis ac custodiae comparata est, non carnis modo & fibrarum, sed & coercit concludere intra illas succi. Id quoque adfert commodum, omnibus membranis commune, ut cum diffundi preceperit, & rursus contrahi apta nata fit, sine periculo nunc minorem, nunc multo maiorem chyli copiam admittat, prout res scilicet & usus ac necessitas postulant. Membrana scilicet & exterior, quae vestit extra jecur venae illae sunt, ad custodiam ipsa quoque refertur. Data ideo est, sicut venis ceteris quoque, ut longo illo quod est ab hepate ad intestina finire toto eas deducat, succi & ac Mesenterio ac vicinis partibus colligat. Eo quoque prodest, quod sensum eis preceperit. Quo extra hepar confutis, non minimum ad provium propulsuque noxiorum ac molestorum illis erat opus.

7. Annot.

a. 3. Simil.
terra Samis.
ex pulvis.
b. 3. Simil.
17. H.

c. 1. Fac. nat.
c. 3.

d. 6. n. p. 10.

e. lib. de gland.

f. 1. de pres.

g. 1. de pres.

h. Gal. 1. p.

g. 1. de pres.

nancisci invenies, si ratione & sui ponderis rem examines. Et sane frigidas & licetas, ut cuius proprium est contendere partes adducere & in unum cohere, tum istum praestare stabilitatem ac firmitudinem, non potest non plurimum praeter cetera, & fibrarum augere robur & ad omnem actionis constantiam proficere. Scitum illud est, plus posse vires junctas ac unitas. Sed refertur inprimis ad privatam nutritionem ejus vis, quae actio est, ut ostendimus, singulis partibus communis. Temperies enim illa est, ait Galenus*, quae pars quilibet tum familiaria sibi allicit, complectitur, coquitur, tum aliena a se segregat atque expellit.

Inter ea, quae consequuntur, eminent & praecipuum animadversionem requirunt, Tenuitas & Raritas, quae in tunicis istarum venarum cernitur, qua in jecur se inferunt potissimum, sed & extra jecur. Utrobique usum praebent non contentandum. In hepate in causa sunt, ut & citius in ipsum & pluribus modis chyli transmutatur, quem usum Galenus* suis quoque Melaraicis tribuit, etsi falso. Extra jecur id praestat, ut facilius ejus beneficio in corpora ipsis subtrata, quicquid inest chylo coenofae humiditatis, ut Hippocrates* loquitur, deponatur, & sic quod reliquum ejus est purius defaecatiusque ad hepar perveniat.

Non eadem in ceteris hujus generis dignitas, & explicatus habent faciliores.

Fibrarum illa mediocri durities, quae frigida & sicce partis, & ex lenta materia condita asidit tantum non necessario, quem habeat usum notius est quam ut pluribus dici debeat.

Albium earum, sive ut Plautus albidum, ut Varro, albor, nihil habet ad usum peculiare. Neque materiae, ex qua condita primum venae istae sunt, id est, feminis necessitatem sequitur, ut in ceteris omnibus partibus, quibus origo ex illo est.

Simile de levitate est, si Galeno* modo fides est. Et ipsa enim materia comitatur, ubi aequaliter scilicet percorda a natura fuerit, ita ut nulla pars ejus effugerit vim ac facultatem. Si tamen ex his quoque usum omnino velis, non deicit per levitia viscera intestina & jecur venas nisi laeves & aequabiles undique perducere.

C A P. XXVIII.

Qua actione Latetis, quae ex sensu in actionis commoda proman? 1. Figura. 11. Asperitas. 111. Cavitas. & Mutus. 1V. Falculis in meatibus. V. Angustia. VI. Continuitas. VII. Numerus, & Magnitudo. VIII. Stimulus. IX. Inferior. X. Modus inferiorum. XI. Crassa quae in intestinis. XII. Adeps. XIII. Glauca, quae in Mesenterio. Hippocrati lux. 14. paracrisis. 15. quid? Fallopi meatum elegans. 16. Dolus, seu buccula dulcis.

Ad partis integritatem, plenamque perfectam absolutionem non necessaria minus funt Quae illi accidunt, & communi Compositionis nomine a Medicis comprehenduntur, quam aut ipsa Temperies aut quae Temperiem consequuntur. Nimirum non per illa, quam per haec fecius aut agunt partes id ipsum, quod agere aptae natae sunt, aut ad suos & necessarios usus opportunitateque instruntur. Organum apprehensionis manus funt. Quae actionem tam insignem, tam homini neces-

fariam & tantum non propriam moluntur? Per conformationem, respondent, polt Hippocratem*, Aristoteles*, & Galenus*. Nisi hic divisa esset in digitos, nisi digitus ita distinctus articulis, ita sibi invicem oppositi, nil complecteretur, nil teneret. Chylum, ut ad rem nostram veniamus, distribuit Latetis. Quomodoquid peragitur distributio ista? A fibris per Temperiem suam, sed ne vacillet quid aut claudicat timet, praeter cetera, imo supra cetera, praestante suos usus & tantquam operas reliqua totius venae compositione. Et hos ergo Vfus explicare oportet, qui soli adhuc ex his supersunt, quos proprie & simpliciter partis Vfus diximus. Fiet id hoc capite & ordine

1. Figuram habent Latetis teretem & oblongam, quia ad remotam partem distribui succum, quem vellet, oportebat. Est enim supra ceteras omnes ejusmodi distributionis figura haec accommodatissima*, quae & ideo Valorem reliqua omnia genera, arteria puta, venae & nervi funt donata. 11. De Lavitate, quae in extrema junctura, jam egimus. Inaequalitas vero illa & veluti asperitas interior ad chyli moram non nihil facit, & per eam ad meliorem quandam, qualicumque ea sit, praeparationem. Quo enim quid moram trahit in parte diutius, eo coquitur ab ea rectius & felicius, ut illud non male hoc poete conveniat.

Habent partes commoda magna moram. 111. Cavis fuis & veluti meatibus destituta si essent ne distributio quidem chyli uliusque. Hinc fieri adeo videmus, ut oculis obstruere hunc cavi canaliculis, aboleretur quoque continuo acciperet ipsa distributio. Et recte Galenus*, addens venae functionem, non quia corpus illa est, sed quia meatum habet. Praecipuum hic usus est. Sed cum alius exipit, nec ipse levis, quod in eius meatibus tanquam ex Φυλακῇ, id est, in custodia chyli non continetur modo, sed in corruptis etiam ac integer praestatur conservaturque. Vt enim ex una venas effluis sanguis in quamcumque partem, uno & excepto corde, concrevit mox putreficere; ita chylo quoque uso veni, si ex vasis suis alio, quam in hepate accidit. Scilicet vim quandam, nec mediocre habet locus conservandi, quod collocatum in eo est, ut docet Philosophus*.

1V. Valorem, quae obditas meatibus intus foras diximus, unus idemque hic, qui ceteris omnibus in partibus, quibus adfertur illae, usus est; impedire scilicet, ne quod semel haustum est materiae, inani atque irrita labor remeet vicissim ac restagnet in partem, unde haustum est. Id quod exade exacte hic praestat, ut nec digitorum compressu nec alio nifu ullo retro cogere unquam fecim conceptum in iis liquorem estis varie id sonum poterunt.

V. Perangustia* sunt in hepate & ad intestina. Utrobique, ut quam fieri potest in minutissimis partibus divisis diffractis chyli, illinc trahatur, hic alteretur commodius minima quoque sui parte ad vi hepatis conuertatur.

VI. Continuae sunt omnes, & partes unius, foris nulla usquam, quod, ut recte Aristoteles* de

b. n. p. 10.

c. 3. Fac. nat.

d. 6. n. p. 10.

e. 1. de pres.

f. 1. de pres.

g. 1. de pres.

h. Gal. 1. p.

i. Gal. 1. p.

j. Gal. 1. p.

k. Gal. 1. p.

l. Gal. 1. p.

m. Gal. 1. p.

n. Gal. 1. p.

o. Gal. 1. p.

p. Gal. 1. p.

q. Gal. 1. p.

r. Gal. 1. p.

s. Gal. 1. p.

t. Gal. 1. p.

u. Gal. 1. p.

v. Gal. 1. p.

w. Gal. 1. p.

x. Gal. 1. p.

y. Gal. 1. p.

z. Gal. 1. p.

aa. Gal. 1. p.

bb. Gal. 1. p.

cc. Gal. 1. p.

dd. Gal. 1. p.

ee. Gal. 1. p.

ff. Gal. 1. p.

gg. Gal. 1. p.

hh. Gal. 1. p.

venis animadvertit, nisi suæ origini continuæ tenderent succum, quem vehunt, conservare illæsum inviolatumque nequaquam possent. Quippe profluens ab origine calor is demum est, qui fovens tutansque succum facit, ne aut concre scat inutiliter, aut etiam putrescat.

vix. Plurime sunt, & fufæ per omnia intestina, exque parvæ; non una aliqua & amplia. Primum, nec crassæ & inutilis fciabente simul cum inutilibus temere in eis habent. Deinde, nec quid fciis utilis fci præterlabatur, & fci quid illius unum eorum aut alterum ordinem fufpergunt, id comprehendunt in aliis. Tum, ut citiffime quidem eam, quemadmodum oportebat, non tamen conferunt & tumultuarie fiat diftributio. Denique, ut ne continuo cibo ingerendo eam vacare cogamur, quod fci eff, hominem *quædam* & *intestum* faciat, raptim & abunde quod ingeftum effusum eff, per viam exantho. Numero Mefaricas vulgares multo minus, non fuperant. Non injuria. Fias multo magis, & citius perit, quod fecum non tantum fciis intestinis in privatam nutritionem debetur, plurime ad gracilia, pauciores aut ferè nulla ad crassa pertinent. Id quod recte. Ila nempe, diftributio; ifta, excretioni imprimis ferviunt. Ila, fucci alibis; ifta, fæcum & purgamentorum inutilium tum receptacula.

VIII. Locum imo in ventre obtinuerunt. Culina: enim corporis & nutrimenti officina, cujus ibi sedes est, famulari eas oportebat, bajulorum⁴ instar, qui triticum ex agris ad communem aliquem urbis locum seu furnum coquendum ibi, mitigandumque in panem deferunt.

Quod venis & arteriis minus in abdito fitæ, & magis in propulatu sunt, id valorum illorum dignitati tributum est. Vt enim, necessitate nihil fortassis, ita dignitate minime parum illis utrique concedunt, fide lucum spectes, quem dispensant, five munus etiam officii, quod per se & prima ratione in solius jecoris gratiam comparatum videtur. Consequitur autem natura semper quod dignius est, ei de tutiori quoque ac digniori loco providere.

ix. Inferiuntur in infertina omnes, nulla in ventriculo, nec minima quidem. Ratio. Quia, ut recte Galeus^z, etsi fibi parum in hac re constans (nam ventriculo quoque suas Mefaricas alibi addidit, etsi pauciores) digestiōnis organum est ventriculus, non distributiōnis. Fieri nullo modo poterat, cum agens necessitate natura quicquid agunt, quin crudum & rudem adhuc chylum, si ad ventrem etiam pertinerent, direptum ex eo ad hepar traducerent, non sine ingenti economiae totius corporis confusione, & irreparabili coctiōnis succedentium detrimento, quarum nulli redintegrare datur quod necavir quippe praefecit.

x. Ad intestina nisi haerent oculis suis hirudinum instar, sicut diximus, nec trahere possent ad chylum; & promiscue pellettibus in ea intestinis, non chylus magis, quam quæ mixta ipsi funt crementata atque reliqua confecti cibi ad hepatis per ipsas concederent, nunquam ibi sanguinis specie recte exornada. Quod probe Galenus vidit, & ideo suis quoque Medaracis cum, quem veris nostris damus, infectionis modum adscripit, ut supra laudatis ipsius in eam rem locis docujmus.

xi. A Crusta oblinente gracilia intestina, in quibus finit, duplex commodum illis accedit. Primum, vicem tanquam operimenti exhibet osculis earum ad interiore mefenteriorum capacitatem manantibus, ne obliteratis illis occaeativo a fordibus chyli aut pereat distributio abolefcaturque, aut fruftrare faltem ac interpellat. Deinde, veluti per filtro eff, per quod fenfim & ceu guttatim chylius ad eadem ofcula, fugendus ab iis, appellatur fele atque inftuat.

xii. Adeps, præterquam quod usum præbet
seu mollis strati, cui incumbant, calorem quoque
earum fovet, quo sic ejus ope tum tractio ipsa,
tum præparatio feliciter absolvatur.

tixit. Ad eandem caloris rem Glanæ quoque
 facies faciunt, ut jam olim observatum auctori libri
 de utilitate respiratio^{nis}. Praefant eadem illis
 renis illis quoque usus quo praefare ceteris Me-
 rariis vas diximus ex communi sententia; quod
 duntur & in divortia varie abeunt; mox fulcure in
 dilecti progreſſu ac turo deducere. Qui usus ca-
 uis non sunt contemendi, ista meo iudicio
 maxims & Pancreatis praecipue (si tamen hoc
 non prius magis, quam simplici glandula subit
 ericem, de quo supra dubitavimus) ille est, quem
 facile candor illarum infignis & substantie ipse
 modus argunt, conſenſione, crudiore & pin-
 gioris chyli partem in feſe corrivare ac combi-
 urare, quod non diffimili, qui in foetu jecur fe-
 ſeſcentia, mox in adultum, quod in feſeſcentia
 ſeſcentia non nuncupata, quod in materno fan-
 guine ſeſcentem effe exharui in feſe & abſor-
 bere, quod ſic quod reſtat illius purius liquidiusque
 ad hepatis, in ſanguinis ibi formam induendum,
 ſubeat & permaneat. Atque hoc omnino illud eſſe
 mihi perſuadeo, quod Hippocrates dixit, *ἐν
 πνεύματι, καὶ ὁ αἷς*. Hoc enim palatibus
 illi aliud mihi eſt, quam chyliſta, quoniam dil-
 ſenſior & impurior portio. Quos enim fal-
 ſos ponit in ſena hepatis meatus, qui in Glan-
 dulas & Pancreas inde porrecti, oleaginofum gen-
 erant ſuſum flavum & ſubamarum in illas erigi-
 entem deponunt, mihi videre nondum contigit.
 Et quod de ſucci amaro dicitur, id ſatis Pan-
 creatis caro convincit falſi, ista palato gratia, ut in-
 de velut etiam nomen inveniret, Dulcis boli, Fe-
 dulcis buceae, ut quidem Carus annotavit.

C A P. XXIX.

De *Vibis*, qui ex *Lactearum* cognitione *Medico* & *Philosopho* accedunt. Eorum *prae* prioribus dignitas. Duplex esse, alias *communes* urinae, alias *Medico* magis proprias. Illi *Physiologi* appellant. Ex eis *primus* explicatus. Sublata *gravissima* controversia de officio *Metaricarum*. Odo omnes de illi sententia falsi convicti. Vena *hermaproditæ*. *Iacobus* de Partibus, *Zerbus*, *Carpus*, *Massa*, *Laurentius*, alii, varie notati, aut confutati.

Q Vos hactenus recensimus Lactearum Vfus, ex eorum numero omnes sunt, quos simpliciter ac proprie esse vfus diximus, qui in Actionem scilicet referuntur toti corpori utilem ac necessariam. Superest de iis videre, qui ex earum cognitione, ut Galenus loquitur, Philosophis & Medicis accedunt. **Qui** etsi in secundum locum ad ordinem

De Lactibus, seu Venis Lacteis.

ordinem coniecti à nobis fuit, nihil
debet primis illis, si ratione modo rem fructus
placeat, inferiores; superiores etiam fortassis
praefrantes. Galenus quidem certe ita fuit
generis Vfus magnificat, ut cum perdifficili
Theologia principia contineri iis dicat, fol
naturae totius comparari fcientiam affirmet. Quo
idem eorumdem explicationem cum *iradq* com
parat, qui ante Deorum aras à flantibus concen
tur, alibi quoque etiam h'ymnis ipsi facies praefere
re, quod non vitiis, sed virtutibus ornatis, et
Eleufiorum ante Samothraciorum faciem, et
Myfteria. Quicquid fit, non effe opus vno vendibil
fufpenfa heder. Ipfi, quanti fit, facile per fe lo
quentur. Nos eo, cum multi plane finit nec eo
dem omnes referant, ad duo fumma fuis capit
fuis genera redigimus, ut alii finit Philofopho cum
Medico magis communes à lii huc quoque illi ma
gis proprii. Adferemus etiam utroque g'neri ali
quos, qui fcilicet in mentem nobis huius, è mult
tis paucos, etiam à nobis à nobis à nobis à nobis
non modo initio, quo Phyllogogica caufas
appellamus, dum vocis aptioris nobis copia
perderet. Ex his

[illegible]

Sunt qui per solas ventriculi/venas perferri ac
hepar chylum velint; per Mefaricaia nutriti tan-
tum intestina. Contra alii utraque utrumque mun-
tri definitans, in numero solum factò discriminem.
Plerique de foëis Mefaricaia difceptant, (vulga-
tas semper intellige) quorum quatuor factiones
sunt. Vult alii solum chylum¹ vehere: alii, et
hunc & fanguinem prætereà, sed diuersi veluti &
partitis inter se operis, ita ut diuersæ sint quedam
huic, quedam illi perferendo delegate. Rursus
alii contendunt², utroque pariter omnes officio

tingi, sed diversis temporibus & descriptis inter-
vallis, nunc in uno, nunc in altero deditur; ali-
contra, una & eadem omnes conditione fit; id
quod nulla vicissitudine temporum, una eademque
simul humorum congreffione. Nec istis inter se fa-
ctis convenit, cum quidam t, præcipue & primo
loco deferendo chylis, secundo loco & minus fan-
guinis operam dare pugnant. Denique, ne quid
desit ad ineptiarum cumulum, reperis, qui in du-
bium vocent, eodemne ductu promulcæ feratur
humor uterque, an secundum latus suum quique,
quasi dimidium loci, isto cœu feedere, cum altero
pactus.

Tam difficultates, quibus confidendum haec omnes sententia, quante, tunc, quam inexpressibiles? Omnia illam de ventriculi veni opinione, de quo mox fuo loco, Quae circa Melaricas veritatem, imprimis quoque sunt aptitudinem sensui ad veritatem, qui foli nutritioni dedit appetitum sensui ad periculum arguit vincit, ut ne Fernelius quidem inficiari id ausus fuerit. *Sensui*, inquit, *dedit illi rationis delegata, sive iuxta speciem, quae iuxta se coequent, sive ipsam in intestina ingentem.* Nature quoque faciunt iniuriam, cuius dignitatem magis quoque exalavit erudit immuniu. Quod enim alienis ab ejus artificio, folertia, providentia, quam una eademque particula ad functiones duas, tam inter se distans, tam repugnantes sibi & nullo aptas ordine, tanta cum rerum perturbatione abutitur? *Nature*, inquit *Aristoteles* "Nature quidem, uno non nisi ad unam vitam, & nunquam quicquam tale facit, quae Delphicus gladii est."

Nec vero minus per se lingule laborant. Qui folium linguam vehere contendunt, nunquam explicabunt, per quas alius se vias five venas indigentie intestinorum subveniunt. Qui præter linguam sanguinem quoque ferre affecerant, fed alias eas atque alias, equod tant discrimen inter illas, ut ita esse credamus? Nam differe oportere, ut nullo alio ad colorem certe, & contentis quis non intelligit? Atque inde incommodum eis quoque manet nihilo minus, qui utrunque omnes facere autunt, fed tempore alio atque alio. Nam quod aut diluioem in is sanguinem videri, nihil est, nilo fallum est. Nullus prope alius in venis aut crassior apparet aut nigrior.

At maximis omnibus difficultatibus obrutorum,
qui quarta in opinione fuit. Coguntur hi dare
(quod & dant ulla) nonnulli nulla creatura, nulla
coctio[n]is, nulla nutritio[n]is omnia cetera effe ad
definita aut rata tempora. Quod quid aliud effe,
quam potissimum, idemque primum natura munus,
quo continetur animantium omnia[m] falus,
fide quae non effe vitam vivere, nulla lege flatu aut
praecipito regit, nullum modum, nullum ordinem
tenere; omnia falu, omnia vi ac impetu, & atomorum
tanquam incartione gregi atque admini-
strari, tum vero infatigabili, facraeque & ab-
fame perpetua parces omnes attente & abfombe,
huc illud morbo continetur & fide intermiffio[n]e,
tenetur in Bulmo aut Diabete jacere? Co-
guntur dare, eadem venas ad eadem intellina re-
ferre, fimul radices effe, fimul ramos; ramos,
qua ferunt ad illa; radices, qua ab infidem figunt.
Coguntur dare, quaque venarum iftarum par-
tem fimul trahere, fimul pellere: pellere ad hepar,
trahere

a Gal. 4. us.
p. 17. Auctor
lib. de anat.
vivor. qua d
intestinis.
b Gal. ibid.

c. ibi. & c. 18

d. 4.10.19.2.

E. 16.46.2.1

f Gal. 1. us.
p. 17. 2. us.
part. 3.

g. 4. us. part.
l. 17.

a 17. *ms. part*
1. & 2.

b *ibid.* 5.2.

€ 7.46 p.p.

d. *ibid.* c. 1. c.

b. Sp. f. 62.

2. 11. 1. 1.

k de venis
obferu 2

e Fernel.6.
Physi. Mer-

f and Co-

b Rhafis r.
ad Almanfor.

k Iacob. de
partib. ad 1.
1. Aric. doct.
5. sum. 1. c. 1.
Maffa Anat.
c. 14.

in 1. Polit. I.

n *Laurent.*
4 *Hist. g. s.*

Huius quoque opinionis figmentum delent venae nostrae, quas & chylum trajicere ad hepar constat, & ventriculo tamen ne unica quidem vel minima sui propagine misceri.

Quae in experimentum adducta sunt, nihil dicta labefaciunt aut veritatem infirmant. Nequaquam, ut aegris vires mox a cibo redeant, praecipitatio eo ad hepar, & inde ad partes ceteras opus est. Vaporum id beneficium fit, qui excitati ab ingestio cibo instantur, rescitunt ac recreant spiritus, quos animantium vita tenetur & viget vegeteque, ac confirmatur corpus. Illius vero tam celeris eorum quae bibuntur, ad urinae vias propter lapsum longe alia sunt, quam quae adfertur ab his, causae, quas diligenter Galenus^a exequitur: convenientia scilicet qualitas, humorum tenuitas, vasorum laxitas ac amplitudo, robur trahentis facultatis, quibus conspirantibus, nulla tam longa esse via potest, quae non facile acceleretur. Quod ita esse satis illud ostendit, quod in quibus alia ista est, nec per urinas semper quae bibere, & saepe longo post tempore profundunt. De bilis in intestina prolapsum, quod satis fit supra dictum est. Hinc repetantur. Mihi non placet τωινλογίζω, id est, actum agere.

Occidit miseris erumbe repetita magistros.

CAP. XXXIV.

Ex his Physiologicis scitur, cum aliis quibuslibet. De venarum generibus, & numero nondum recte constitutum esse. Lacteis nostras vere esse portae venas, non illas alias. VII. Fumus causam non videri scilicet venarum ad ventrem. VIII. anasarcticos venarum in hepate, si modo sunt aliqui, non cum usum praebere, quem vulgo volunt. IX. Cavitas cur nulla in jecore.

Sto jam Sexta utilitas, ad σάκμια & commentum illud Anatomicon spectans, quo de venarum numero, ortu, nominibus constituitur. Aristoteles^a unicam venam numerat, quam magnam vocat, & cuius primum ortum a corde repetit. Medici duas agnoscunt, quas & jecore dispenant, quarum alteram, cavam nominant, alteram, portae. Plurimum faciunt nostrae, nec numerum venarum recte adhuc innotum vulgo, quarum tertium genus ipsae sunt, & dari venas, quibus nulla proferus intercedat cum corde societate conjunctiove, praeter illam, quae ut cum principio, cum partibus omnibus illis est communis.

Illud praeterea docent, quam portae vulgo usurpamus, quamvis tueri id nomen possit, si primum ejus spectemus id siffo jecoris inter duos veluti sulcos progressum, quos πύλας, id est, portas vocavit Hippocrates^b etsi non primus, & alibi τὸν πύλου, si minus tamen aestimetur, cui destinatione illa est, & a quo praecipue peti nominis ratio solet, nequaquam amplius eo recte appellari. Si enim verum est, quod ex Hippocrates^c & Aesclepiadarum omnium sententia, nos monet Galenus^d, non aliae portae venae hoc nomen obvenisse, quam quod, ut bajuli perpuratum in promptuario frumentum in communem Civitatis officinam percoquendum mitificandumque deferunt, ita ipsae per propagines suas Melaraicas directum ab alvo & intestinis secretumque ad recrementis crassioribus alimentum ad hepar, locum coctionis

totius animalis communem comportat, quis est omnium qui ignorare possit, quanto in nostras reatius, quam in ulla alias nominis illius notio conveniat?

VII. De fame passim ita philosophantur, ut ejus causam statuunt sicutum venarum a ventre, qui veluti pro terra fit animalibus. Moneant haec venae nostrae, nequaquam ita simpliciter & promissive dici id possit. Si enim venas intelligimus illas exsuccum chylo delegatas (ut videntur intelligere qui eam, quam diximus, rationem famis ineunt, dum terrae ventriculorum comparant), scire licet, cum nulla proferus eorum ad ventriculorum pertineant, nullo modo posse fuctum earum poni in famis causis. Sin accipimus alias illas, quas dispersas per omnem ventriculi regionem, a porta ex splenico maxime ramo videmus, amplius quaerendum & per otium considerandum, venae quae nutritioni & sanguinis ad ventrem translationi dicatae solum videntur, quemadmodum vel fugi ab aliis (ut ita loquar) vel ipsae fugere a ventriculo recte dici possint.

VIII. Qui ingenio uti volet, is occasione natus venas istas fortasse de anastomosis quoque illa venarum per hepar, quam pingunt quidam an fingunt? aliquid conjiciat. Vt enim dentur, quod tamen perobscurum & incertum est, negatque Galenus^e, at certe non eum usum praestiterint, quem populariter iis assignant, ut eorum commercio, excocto in radicibus portae chylo, ad cavam aditus aperitur.

IX. Poterit idem nec difficulter fortassis causam sive reddere, sive venari saltem ac indagare, cur nulla in hepate sit, ut in corde & ventriculo cavitas. Quae res non parum tum Galenum^f ipsum, tum post ipsum Iacobum de Partibus^g, Carpum^h, Archangelumⁱ, Laurentium^j, alios exercuit & sollicitos habuit. Atque usus doctrinae de Lacteis Medico cum Philosopho communes, quod adhuc sciam, hunc habent numerum. Sequuntur qui sunt Medico, quam Philosopho magis proprii.

CAP. XXXV.

De istius Medico magis proprii. Qui sint isti? Complurima novorum morborum genera haec venas nobis aperire. Chylorum fluxum, quem vocant, non fieri nisi harum venarum vitio. Eisdem in causa esse Atrophie totius, quae ab infestis Scirrhis Mesenterii glandulis de Melancholia hypochondriaca, & intermittenti febribus quadam. Concisio operi.

V Sicut Medico magis quam Philosopho proprios, eos intelligo, qui ad Pathologiam & reliquam πικρὰν Medicam magis ardent. Nam nec isti nullum utilitatis fructum praebet ista istarum venarum cognitio, quam imprimis novis Partium morbis augent quorum nihilo minus, quam aliorum & causae perquirendae sunt, & habenda in promptu ac numerato signa, & instituenda curatio. Cui enim dubium esse potest, si dentur istae venae, quin ut in ceteris, ita in illis quoque omnino Intemperiei, tum solutae unitatis genus, locum fuisse habeant: & praeter ista, etiam quae in Compositione insunt vitia, illa praesertim, quae ad Riguram, & canales plus justo sive laxatos patefactosque, sive adstrictos clausosque referuntur.

^a Galen. 1. de sympt. c. 57.

^f 4. 4. 13.

^g 4. 4. 13. h. 2. 2. 1. 4. 4. 13. i. 2. 2. 1. 4. 4. 13. j. 2. 2. 1. 4. 4. 13. k. 2. 2. 1. 4. 4. 13. l. 2. 2. 1. 4. 4. 13. m. 2. 2. 1. 4. 4. 13. n. 2. 2. 1. 4. 4. 13. o. 2. 2. 1. 4. 4. 13. p. 2. 2. 1. 4. 4. 13. q. 2. 2. 1. 4. 4. 13. r. 2. 2. 1. 4. 4. 13. s. 2. 2. 1. 4. 4. 13. t. 2. 2. 1. 4. 4. 13. u. 2. 2. 1. 4. 4. 13. v. 2. 2. 1. 4. 4. 13. w. 2. 2. 1. 4. 4. 13. x. 2. 2. 1. 4. 4. 13. y. 2. 2. 1. 4. 4. 13. z. 2. 2. 1. 4. 4. 13.

Sed haec communiora sunt, illa singularia & praecipua, quod causas nobis aperit, corporis affectuum non parum multorum vel ignoratas habemus, vel certe non plane satis & explorato cognitae ac perceptas.

De chylo sive albo, ut vocant, intestinorum fluxu quam varie disputetur apud Medicorum filios, quis est cui lateat? Nihil dubitationis res habet, si has venas semel videas. Certum & constitutum esse debet, cum in vitio venarum incidit chylum eurgentem, ut est apud Galenum^a, sive vitium illud intemperies sit trahendi vim exolvens, five angustia viam interceptis, non nisi istarum venarum vitio incidere, praesertim cum medium canalem angustia occupat, unde vi perruptis valvulis & dilatatis, patefactisque oscillis in intestina (quod fieri quandoque minime est incredibile,) chylus refunditur. Secus, quemadmodum & Melaraicis vulgaris rubro perpetuo succo interfusus possit albus purusque chylus in intestina excidere, ne suspitione quidem attingere possum.

Non dissimilis ratio illius Atrophiae est, in qua sentire cibum moles corporis vetatur, ob infestas Scirrhis Mesenterii glandulas, arctatis inde stipatissime vasis, quibus illae objacent; cujus exempla apud Altimum^b, Schenkium^c, & alios legere est. Non nisi adstrictione compressiveque Lactearum nostrarum incidere putanda est. Haec enim sola sunt, per quas utilis & necessaria toti corpori materia perlabitur, cujusque intercluso commeatu

necessario id defectum cibo, confectum penuria extabescit. Ceteris Melaraicis si quid tale accidat, cum ad privatum solum intestinorum commodum comparatae illae sint, par profecto est, ut sola quoque intestina incommodum inde accipiant contrahantque.

De intermittenti febribus, quarum sedem in Mesarum non ignobiles Scriptores collocant: de Melancholia idem, quam Hypochondriacam vocant & φωνάζω statulentam, haec quoque mala comitari affectis his venis possint, quaerendum aliis relinquo; quemadmodum alia multa, quae dici de iis quaque posse praclare intelligo. Non omnia aurora statim prima sua luce distinguit; & vetus verbum est, *Plus oculos videre, quam oculum*. Multa quotidie sua volent cuique observatio subijciat: nec mihi sane aut quaerendi labor, aut proficiendi cura deerit in posterum.

Nunc quidem ista habui, quae & asseri in communem fructum, & proferri in lucem aspectumque posse putavi. Quae si viris bonis & doctis (his scribis) non improbat omnino fuerint, magno id in lucro deputabo: sin, istud ipsum quoque in rem meam verteret. Discam meliora, errasse admonitus. Quod quam facile fieri a me potuerit, in re praesertim nova, non sum nescius. Homo mihi, humani a me nihil alienum puto^d. Nihil humanum, quam labi errare, falli: nihil inhumanum, quam errores fovere, excusare, tueri.

^b Termin. Anatom.

FINIS.



^a 1. 4. 13. 2. 2. 1. 4. 4. 13.

^a 1. 4. 13. 2. 2. 1. 4. 4. 13.

^b 4. 4. 13. c. 1. 4. 13. d. 4. 4. 13.

^d 4. 4. 13.

Index Capitulū de Venis Lacteis.

- Cap. I. Considerantur, quæ toti Mefenterii communia. Nomen, &c. Pag. iiii
 II. Explicantur propria Mefenterii partes singulæ, & Membrana, &c. v
 III. Ad curatorem Veficem Mefenterium aggreffo. Quæ ea valde? Prima de venis explicatur. Eorum Origō, &c. vi
 IV. Agitur de venarum Mefenteriarum alimoniis, & ufu, Iuxta Galenū, & vultu Mediceum, aduocant, aliaque, & aduocant, Ex iis duo primi rejecti, tertio alius & novus additus ex ipfo Galenū, Galenū nullo dixit aduocant, & aduocant fieri eodem tempore. Laurentius Hippocratem non recte copit. vii
 V. De arteriis Mefentericis, Eorum Nomen, &c. viii
 VI. In actiones arteriarum & ufu inquiratur. An Chyli quicquid in fe alitiant. Galenū & Hippocratem in eam rem sententia expenfa, & in medio relicta. Auctor ibi, de nutritæ refpirationis, & Varolius accurate confutatur. Sanguis per quas vias à dextro cordis finem in finitum fubeat. Cuius dicitur in corpore. ibid.
 VII. Pusea de Nervis Mefentericis. Eorum Numerus, Magnitudo, Progressus, Infectio, Principium quæ originis, quæ diftinctio, Vltima Laudatus Fallopius, Funiculus representat. Arterius cur contigui iis nervi. x
 VIII. Dicendum propofitio, & Ordo, Anteccepta rei informatio, quæ Ciceroni? xj
 IX. Hiftoria primæ vaforum huiusmodi inventionis cum fide narrata. Obiter multa notata ad illarum fcilicet perquirendam. ibid.
 X. Transcendenda ad abfolutam horum vaforum perceptionem. Ea duo esse in re prefenti, non plura. Notionem nominis, & eorum vñgñ, Negligentia ad rectum fcilicet fcilicet, Nequeque non est vox Epicuro propria, & ille poffit esse rei fcilicet. xij
 XI. Data huius vaforum nomina. Eadem explicata & fcilicet confufa quæ viderentur, quæ recentiorum. Novus rebus nova nomina quæ modo pñi poffint. Pñe alia Celfi, Pñe alia Atrium. Rhogeti rejecti. Pñe verbum bonis & antiquis auctoribus latiffimè patet. Ejus etymon. Latet vox in rebus diverfiffimis infufa a quo quæ pñe, quæ noftro, In eam rem compulfa adnotata. Pñi vultu lectio defufa contra Dacchamptium. Pñe, & Hærodo libi apud Lampriidum. Ex Hippocrate Probi loci declaratur. Latitum Erymon non minus. Ciceroni obiter correctum. Scdageri laudatur. Gata præter morem fuum à Plinio diffidat. xij
 XII. Quæftum de vaforum noftro exiftentia. Primum, verè fit nec ne? Eff, non ftratum fide fcilicet, & conclufum ratione. Senfuum veritas & evidentia præ omni ratione eff. In eam rem Aristotelis & Galeni testimonia. Anatomicum non nifi oculis fuis creare debet. xij
 XIII. Quæftum alterum, Novum invenitum fuit, nec ne? Rele vultu veteres alia chylis, alia fanguinis debet ufa, alia tamen ignoraffe. Erafciftratum noviffe, nec agnoviffe. Hippocrates, Plato, Aristoteles, Stoici, Herophilus, ipfe Galenus, variè illuftrati, & explicati. Item Pollux, Rhogeti, quidam recentiores. xv
 XIV. Ex occasione quæftionis dicitur. Prima: Quæ caufa in tandem latuerit? Triplicem videri. Excufati veteres, non Galenus, qui videretur noffe omnino deffusi. Secunda: Cur ita repens obliuifcent & excufant. Pñi plures caufas allatas, res in medio relicta. xvj
 XV. Transiunt ad ea, quæ Anatomæ propria. Quid ea nobis? Tribus eam rebus adfcit. Quæ prima hiftoria partis. Quæ quatuor quævis in parte perpendit. Aristoteles in hoc canibus Galenū ipfoque, xvij
 XVI. Perpenditur horum vaforum fuffufantia. Sunt & quære viderentur. Sunt partes compofite & diftinctæ, non fimilares & fimiles, De Galenū & Aristoteles huc in re fententia cum cura inqñifitum. Eufthafius, Sylvius, Fallopius expofita. Partes compofitæ venarum tres, Membrane, Vafa, Caro. Aristoteles iterum expofita, notatus Capricciofus, rursus Fallopius, & cum eo Pñfilius. xvij
 XVII. Explicata Temperies, & quæ eam confequuntur. Iouberum obiter perfcilicet. Galenus explicatur. xvij
 XVIII. Ex iis, quæ accidunt examinata. Conformatio, &c. ibid.
 XIX. Diftinftio de horum venarum fuit (vñgñet). Considerata illarum tum Pñfio (Stens), tum communio cum parvis ceteris (vñgñet). In hac Corffum, Origō, Finis, Infectio, Progressus. An poru ftrata? Fultus. Nōtamen quæpñe & quæ materiæ, Principium fecti, an Pñfanti debent? An venæ fuit fuit generis? Ilego pñfanti fuffufanti inuanti vera caufa. Galenus huc refutatur, & ex occasione Fallopius. Cruffa infufionum. Ventriculus huius venæ caret. xx
 XX. Actio partis antecedit ufu. Quid ea nobis in re prefenti? Quoniam? Agendum de ea Anatomico quam diligentiffimè, & cur? xxj

- XXI. De actione Lactium communis, quæ Nutritio eff. Non alia eat chylis, fed fanguine, Galenū in declaranda nutritio ventriculi & infufionum mira inconftantia, & quæ fuffra excufatur. Recentiores, qui chylis volunt alia, cum fuis rationibus expofiti. Nutritio perficere, imperfcilicet, Scdageri, Sauritius quid? Maffa, & Archægælus notati. Magni cufpifque Anatomici notum invenitum examinatum. Qui fanguis alia, qui non? qui ille, qui ultimam alimentum Aristotelis? Alia fimit, cur mox ad ingreffo cibo definat? Ventriculus quomodo fuit laborat, quomodo parti- bid.
 XXII. De propria Lactearum actione. Eam effe diftributionem chyli ad fcar. Hanc componi ex trachis & pulfu. Quales merque motus, & quæ ufuque caufæ princeps, inftrumentales? Aduocant, & aduocant quid diftinct? Valentium duplex genus, tum pñfionem, Trachion, qui fuit fuffufione ad vacuum, nullam effe. Caler an inftrumentum trachis? Hippocrates, auctor Finimion Mediceum, alia, explicati. Avicenna laudatur, aduocant, quidam obiter perfcilicet. xxiiij
 XXIII. Remota due obfektionen. Celfei, & Laurentii rationes in nos nulle. Chylis an fanguis craffior? Cur ita venæ rubræ ad ingreffum? Non fimpler verum, quæ frigida & excoquens pñe egere alimetur. Infufia cur multa egere? Tertium per illa expurgatur. Reuifus cur ampliffima vene? xxv
 XXIV. Lactes an chylum præparent ioceri, & quid modo? Galenus & Fernelius reprehendi. Præparare non effe præferant, fuit conferte quicquid forme future. Senfus Lactearum. xxvj
 XXV. Explicatio ufu Lactearum bipartita. Partis ufu alia quæ parti, alia quæ parti capiti. Galenū liberum de ufu partium dua fuma capta. Actio, & ufu partium, effe idiole norma, ac regula. Difpñtationem inter fe necu, & conuocant. xxvij
 XXVI. Pñi partis ad actionem, quibus diftinct? Galenus à contradidione videretur. Pñi qui, quæ actione, præfentat? Alioquin perficere duo in parte requirit, non plura. Partium argui alioquin alioquin quadruplex varietas. Partes fingule Lactearum, quæ aduocant ad actionem confiftent, Fibra, Caro, Membrane. De venarum ftris confutata Fallopius opinio. ibid.
 XXVII. Ex iis, quæ infunt, Temperies quid Lactearum actioni accom- modet? quid item, quæ confequuntur, alio, leuina, pñfanti, & varietas tunciam, ftratum daretur? Temperies frigida & fcarior parti & confufantia, inprimis tribuit. Alia materia neceffitatem fcilicet, fortetiam leuina. xxvij
 XXVIII. Quæ accidit Lacteis, quæ ex fe ufu in alioquin commodum promat? Figura, &c. xxviii
 XXIX. De Vifu, qui ex Lactearum cognitiene Medico & Philofopho accedunt. Eorum præ prioribus dignitas. Duplices effe, alio communes veteres, alio Medico magis proprias. Iis Physiologi appellant. Ex iis primus explicatur, Subleita grauiffima controuerfia de officio Mefenteriarum. Odo omnes de illo fententia fuffi conuocant. Venæ hermapbrodite, Iacobus de Artibus, Zetius, Capus, Maffa, Laurentius, alia, varietas, aut confutatur. xxx
 XXX. Pñi Physiologi fecundus. Exploditur vis aequalitudo venarum extra ioceri, &c. xxxj
 XXXI. Pñi Physiologi tertius, aliaque in ioceri ubi fuit, & quomodo. Opiniones quingue. Quatuor aliorum ea de re opinionis nihil, Lactis nulla cum venis hepatis ceteris communio. Fiffum ioceri, ibid.
 XXXII. Pñi Physiologi quartus. Subleita Galeni de Lienis officio fententia. Varolius nova, & antiqua Aristotelicorum refutata. Lien nihil profus trahere à venis chyli pñe. De Lactis nulla ad eum per- xxvij
 XXXIII. Pñi Physiologi quintus. Refilunt, qui putant à ventriculo quoque chylum exfugere præferant. Profrate per morbos vites quæ modo tam celeriter ad affumpo cibo refpiciunt? Cur & xubum pñfanti tam cito reddant per venas quæ libere. Lactearum ne minima ad ventriculum, ibid.
 XXXIV. Pñi Physiologi fectus, cum alia quingñam. De venarum generibus, & numero notum rectè confutatum effe. Lactes noftros vere effe parte venas, non illas alias. vii. Famis caufam non videri fuffum venarum à ventre. viii. aduocant (nos venarum in hepate, fimo fime aliaque, non eam ufu prætere, quem vultu voluit. ix. Cæuifit cur nulla in ioceri. xxxiiij
 XXXV. De Vifu Medico magis propriis. Qui fuit it? Complura notorum morborum genera huc venis nobis operit. Chylorum fluxum, quem vocant non fieri nifi harum venarum vitiis, Eafdem in caufaffe Atrophie reuifus, quæ ad ingreffu Scirrho Mefenterii glandulis, De Melancholia hypochondriaca, & intermitentibus febribus quædam, Conclufio operis, ibi.

GASPARIS ASELLII
CREMONENSIS,

T A B V L Æ De Venis lacteis.


L E C T O R I S.

Difertationi Gasparis Afellii de Venis Lacteis, figuras quatuor, formis aeneis elegantioribus expreffas, subjunximus; quibus author earum Originem, Progressum, & Infertionem representare conatus est, ut Venæ illæ aliquatenus legentium, Anatomicorum præsertim, oculis exponerentur, & certius cognoscerentur. Vale & utere.

TABVLA PRIMA


Ventriculum, Intestina & Mesenterium, cum Vasis Mesaraicis quatuor generum per illa hinc inde distributis, exhibet.

- A. Vene Mesaraicae vulgatae, Portae rami, cum Arteriis mesaraicis.
- B. Vena Lactea discurrentes per mesenterium ad intestina.
- C. Mesenterii portionem: una etiam Nervorum Mesaraicorum per eam distributionem signat.
- D. Ventriculi fundus.
- E. Inferius Ventriculi orificium *pylorus* vocatum.
- F. Intestinum duodenum.
- G. Jejunum intestinum.
- H. Ileum intestinum.
- I. Vena & arteria fundum ventriculi perreptans.
- K. Omenti pars.
- L. *mesenterii* portiuncula: in quam Vene lactea, inter se implexae insinuantur, formae capreolorum.




TABVLÆ SECVNDÆ
EXPLICATIO.

- A. *Vene Mesaraica vulgate cum Arteriis.*
 B. *Vene Lactea.*
 C. *Mesenterium.*
 G. *Iejunum intestinum.*
 H. *Ileum intestinum.*
 L. *Implicatio Lactearum in pancreate.*
 M. *Ramus Vene cavae.*
 N. *Progressus Lactearum ex Pancreate ad Hepar.*
 O. *Hepatis fibrae.*
 P. *Vesica fellea.*
 Q. *Pars quadam carnosâ, glandulosa & adiposa, canibus peculiariis.*




TABVLÆ TERTIÆ
EXPLICATIO.

- A. Vena & Arteria Mesaraica.
B. Lactea vena.
C. Mesenterium.
G. Intestinum jejunum.
H. Ileum intestinum.
M. Vena cava.
N. Lactea juxta Cavam ascendens ad Hepar.
N.† Eadem Lactea ad venam Portæ propagata, camque co-
ronans.
O. Hepatis fibræ.
P. Vesica fellis.
R. Vena Portæ.
S. Colon intestinum.
T. Origo Mesenterii.



TABVLÆ QVARTÆ
EXPOSITIO.

- M. *Vena Porta.*
N. *Lactearum in Hepar insertio.*
O. *Hepar.*
P. *Vesicula fellea.*
V. *Ductus Cholodochus ad intestina.*



GVILIELMI HARVEI
ANGLI
EXERCITATIO
ANATOMICA,
DE
MOTV CORDIS
ET SANGVINIS
IN ANIMALIBVS.

Ex recensione

IOHANNIS ANTONIDÆ
van der LINDEN, Med. Prof.

Serenissimo & Iuvicissimo

C A R O L O,
MAGNÆ BRITANNIÆ,

Franciae & Hyberniae Regi,

Fidei Defensori.



Erenissime Rex,

COR animalium, fundamentum est vitæ, princeps omnium, Microcosmi Sol, à quo omnis vegetatio dependet, vigor omnis & robur emanat. Rex pariter regnorum suorum fundamentum, & Microcosmi sui Sol, Reipublicæ Cor est, à quo omnis emanat potestas, omnis gratia provenit. Quæ de motu cordis hic scripta sunt, Majestati tuæ (uti hujus seculi mos est) offerre magis auctus sum, quod ad hominis exemplum humana pene omnia, & ad cordis, Regis plurima. Regi itaque non inutilis cordis sui notitia, tanquam actionum divinum Exemplarium: (sic parvis componere magna solebant.) Poteris saltem Regum optime, in fastigio rerum humanarum positus, una opera & humani corporis principium & Regiæ simul potestatis tuæ effigiem contemplari. Suscipe itaque, humilime precor, Serenissime Rex, usitata benignitate & clementia de corde nova hæc, qui ipse novus splendor hujus seculi, & totum vere cor es, princeps virtute abundans, ac gratia; cui acceptum jure merito referimus, quicquid nostra Anglia boni, quicquid vita nostra jucundi, habet.

Augustissima Majestatis Tue

devotissimus servus

GVILIELMVS HARVEVS.

Excellentissimo & Ornatissimo Viro D.

D. A R G E N T,

Collegii Medicorum Londinensium Præfidi Amico
suo singulari cæterisque Doctissimis Medi-
cis Collegii suis amantissimis.

S. P. D.



Eam de motu & usu cordis, & circuitu sanguinis sententiam E. D. D. antea sapius in prælectionibus meis Anatomicis aperui novam. Sed jam per novem & amplius annos multis ocularibus demonstrationibus in conspectu vestro confirmatam, rationibus & argumentis illustratam, & ab objectionibus doctissimorum & peritissimorum Anatomicorum liberatam, toties ab omnibus desideratam, à quibusdam castigatam, in lucem & conspectum omnium hoc libello produximus. Quem nisi vobis transmissum E. D. D. minus sperarem prodire posse integrum & tutum, cum pene omnium illarum observationum, ex quibus aut veritatem colligo, aut errorem redarguo, è vobis plurimos & fide dignos appellare possum testes, qui dissectiones meas vidistis, & ocularibus demonstrationibus eorum, quæ hic ad sensum palam afferebam, assistere candidè & astipulari consuevissetis. Et cum, contra receptam viam, per tot seculorum annorum ab innumeris, usque clarissimis doctissimisque viris tritam & illustratam, sanguinem iter novum metiri suum & revolvere solus iste liber affirmaret; ne arroganter nimis factum videretur, si libellum istum, per aliquot abhinc retro annos aliquo perfectum, vel in publicum exire vel transfractare permissem, summopere verebar, nisi prius vobis proposuissem, & per autopsiam confirmassem, vestris dubiis & objectionibus respondissem, & Præfidi ornatissimi censuram in favorem accepissem. Persuasissimum veruntamen habui, quod si coram vobis nostroque Collegio tot tantisque viris doctissimis nobilitato, propositum sustinere poterim, ab aliis tum demum minus pertimescendum fore, & jam illud, quod mihi à vobis, ob amorem veritatis, contigit unicuique solatium, ab omnibus aliis, qui similiter sint philosophati, non minus esse sperandum. Philosophi enim veri, qui amore veritatis & sapientiæ flagrant, nunquam se tam æquos, sapientia plenos reperiunt, aut suo sensu abundant, quin veritati, à quocunque & quodocunque venerit, locum dent. Nec tam angusti animi ut credant quamvis artem aut scientiam adeo omnibus numeris absolutam & perfectam à veteribus traditam, ut aliorum industria,

& diligentia nihil sit reliquum: cum profiteantur plurimi, maximam partem eorum quæ scimus, eorum quæ ignoramus minimam esse, nec ita traditionibus & præceptis quorumcunque addicti, inservire se patiuntur Philosophi, & libertatem perdunt, ne oculis propriis fidem adhibeant, nec ita in verba jurant antiquitatis magistræ, ut veritatem amicam in apertis relinquant, & in conspectu omnium deserant. Sed sicut credulos & vanos, omnia prima facie admittere & credere, ita masifesta sensui non videre, & Luce meridiana diem non agnoscere, & insensatos pariter existimant. Et non minus poetarum fabulas, & vulgi deliramenta, quam Scepticorum epochen in via philosophica declinare docent. Omnes item studiosi, boni, honestique, nunquam ita passionibus indignationis, invidia, obriui mentem fiunt, quo minus audiant æquo animo quæ pro veritate proferantur, aut rem vere demonstratam intelligant. nec turpe putant mutare sententiam si veritas suaderet & aperta demonstratio: nec errores, licet antiquissimos deferere arbitrantur inhonestum. Cum optime norint quod humanum sit errare, decipi, & quod casu multa reperta esse contingat quæ discere quis à quovis possit, à juvene senex, à stulto intelligent.

Verum ito tractatu, Collegæ Amantissimi, in authorum & scriptorum Anatomicorum nominibus, operibus & sententiis reconferendis, exagitantis memoriam meam, & lucubrationes, multamque lectionem & magnum volumen ostentare nolebam. Tum quod non ex libris, sed ex dissectionibus, non ex placitis Philosophorum, sed fabrica naturæ discere & docere Anatomicum proficere. Tum quod neque è veteribus quemquam debito honore fraudare, neque è posterioribus quemquam irritari æquum censcam, aut molari. Neque cum iis qui in Anatomicis antecesserunt, & me docuerunt, manus conferere, aut dimicari honestum putem. Accedit, quod nec falsitatis crimen, in quempiam veritatis studiosum mea sponte inuere vellem, nec quemquam erroris labe infamare. Sed solam veritatem sectari, & omnem tum operam, tum oleum eo contuli, ut aliquid bonis gratum, doctis commodum, & rei literariæ utile in medium proferre possim. Valete Domini D. Excellenti, & Anatomico vestro favete

GVILIELMO HARVEO.

Ff 2 P R O.

Quo demonstratur, quæ hæcenus scripta sunt de motu
& usu cordis & arteriarum, minus firma esse.



DE cordis arteriarumque motu, pulsu, actione, usu, & utilitatibus cogitant operarij, quæ prius ab aliis mandata sunt literis evolvere, quæ unguo jactata & tradita animadvertere, ut quæ recte diffusenimur: quæ falsa, distillatione anatomica, multiplici experientia, diligenti & accurata observatione emendantur.

Pene omnes huc usque Anatomici, Medici, & Philosophi possunt cum Galeno, eundem usum esse pulsum, quem respirationem, & una re tantum differre, quod ille ab animalis, hæc à vitali facultate emanet: reliquis, vel quod ad utilitatem, vel quod ad modum spectat, similiter se habentibus; unde affirmant ut Hieron. Fabr. ab Aquapendente libro suo de respiratione nuperime edito) quod quoniam non sufficit pulsu cordis & arteriarum ad eventandum & refrigerandum; ideo à Natura pulmones circa cor subfalsos esse. Hinc patet quæcumque discerim priores de Systole & Diastole, de motu cordis & arteriarum, hæc omnia ad pulmones respicientes eos tradidisse.

Cum vero aliter se habeat motus & constitutio cordis, quam pulmonum; aliter arteriarum, quam pectoris, alia exinde usque & utilitates exoriri verisimile est, differreque plurimum cordis & similiter arteriarum pulsu & usu, à pectoris & pulmonum. Si enim idem usum transserviant pulsu & respiratione, & in Diastole intrinscant aërem in cavitates suas arterie (uti vulgo dicunt), & in Systole per eisdem poros carnis & cutis fulgines emittant, nec non modo tempore inter Systolem & Diastolem aërem continent; & quovis tempore aut aërem, aut spiritum, aut fulgines. Quid itaque respondeant Galeno, qui librum scripsit, Natura sanguinem contineri in arteriis, & nihil præter sanguinem, nimirum neque spiritum, neque aërem, sicut ab experimentis & rationibus in eodem libro facile colligere licet. Et si in Diastole replentur arterie ab aëre intrinsepto in majori pulsu, majori subeunte aeris copia: ergo magno existente pulsu, si sit totum corpus in balneo immeris vel aque vel olei, necesse est pulsum statim aut minorem esse, aut tardius nullum; cum per corpus ambientis balnei aërem intra arterias permeare distictum sit, si non impossibile. Similiter, cum omnes arterie tam profunda, quam cutanea, eodem tempore & parivolatitate descendunt; quomodo poterit aer tam libere & celeriter per cutem, carnem, habitumque corporis in profundum penetrare, quam per cuticulam solam. Et quomodo Embryonum arterie foris in cavitate suas aërem per ventrem materum, & per corpus uteri attrahant? Vel quomodo Phœx, Balæna, Delphinus, cetæcum omne genus & pisces omnes in profundo maris arteriarum suarum Diastole & Systole per immeris aquæ massam cleri pulsu aërem intrinscant in aqua absorbant, & in aquam fulgines suas reddunt, signum hand à simile. Et si in Systole arterie per poros carnis & cutis fulgines & cavitatibus illorum expellant, cur non

item spiritus? quos dicunt etiam in illis contineri, cum spiritus multo tenuiores fuliginibus sint. Et si cum in Systole, tum in Diastole aërem arterie accipiunt & reddunt, ut pulmones in respiratione, cur non & hoc faciunt inquit per arteriotomiam vulnerem? Scilicet trachea per vulnus aërem ingredi & regredi, duobus contrariis motibus, palam est. Et si vero arteria statim uno continuo motu sanguinem vi protrudit, & non aërem vel ingreditur vel regreditur, manifestum est. Si pulsu arteriarum partes corporis refrigerant & eventant, uti pulmones ipsam cor; quomodo dicunt vulgo arterias à corde in partes singulas vitalem sanguinem differre referri sumum spiritibus vitalibus? qui partium calorem foveant, spiritum faciant, & quasi assumptum reserant, & quomodo (si ligaveris arterias) statim partes non modo torpent, frigunt, & quasi palidae vernuntur, sed & ab tandem desinunt, quod legundum Galenum contingit, quia calore, qui per omnes partes superne à corde confluerat, privata fuit: cum hinc pateat arterias magis calorem partibus deferre, quam refrigerare & eventantem. Præterea, quomodo Diastole simul spiritus à corde attrahantur ad calefaciendas partes, simulque ab externis refrigerant? Amplius tamen idem usum pulmones, arterias, & cor inservire aliquid asserunt, tamen cor spirituum officium esse, & arterias spiritum continere, transmittere etiam dicunt. Pulmones autem spiritus suum aut retinere, contra Galeni opinionem negant. Quin & cum Galeno, quod sanguis continuatur in arteriis, & non spiritus, contra Erysiarum asserunt. Videtur ipsa opinio ita inter se pugare & sese invicem refellere, ut omnes non immerito spiritus spectent. Sanguinem in arteriis contineri, & arterias solum sanguinem deferre tum experimento Galeni, tum in arteriotomia, tum in vulneribus, manifestum est, quoniam una arteria dissecta, quod etiam Galenus affirmat plurimum in loco, unius emolore statio totam massam sanguinis ab universo corpore magna & impetiosa profusione exhauritur. Experimentum Galeni tale est. Si inquit, lib. quod sang. cont. in arter. funiculo arteriam utrinque ligaveris & medio rescisso secundum longitudinem, quod inter duas ligaturas in arteriis comprehendum erit, nihil præter sanguinem esse reperies. Et sic probat, sanguinem solum continere. Unde etiam similiter nobis ratiocinari licet: Si eundem sanguinem, qui venis similiter ligatus & rescissus inest, invenire in arteriis (quem in mortuis & aliis animalibus sepius ego expertus sum) eadem ratione similiter concludere non possumus, arterias eundem sanguinem, quem venæ, & nihil præter eundem sanguinem continere. Aliqui dum dissolvere difficultatem tentant, & spiritus solum arteriarum esse sanguinem affirmantes, tacite concedunt, arteriarum munus esse sanguinem à corde in universum corpus deferre, & repleri sanguine arterias esse. Spiritus autem sanguis, non minus sanguis est. Etiam sanguis prout sanguis, & qui in venis fluit, cum spiritibus imbuti aëre negat. Quod si, qui in arteriis est, sanguis uberior spiritum copiam turget, tamen existimandum est hoc spiritum à sanguine intrinsecabile esse, sicut illi in venis, & quod sanguis & spiritus unum corpus constituent (ut serm. & inprimis in lacte, aut calar in aqua calida)

calida) quo corpore replentur arterie & cuius corporis distributionem à corde arterie præstant. & hoc corpus nihil aliud, quam sanguis est. Si vero hunc sanguinem in arteriis, & corde per arteriarum Diastolem attrahi dicunt, videtur asserere, quod arterie sua distentione sanguinem replentur, & non aëre ambiente, uti prius. Nam si etiam aëre ab ambiente repleri dicant, quomodo & quando recipient à corde sanguinem? Si in Systole id fiat, contingit impossibile, repleri arterias cum contrahantur, vel repleri & non distendi. Sin autem in Diastole, in duas usque contrarios, & sanguinem & aërem, & calorem & frigus simul recipiant; quod est impossibile. Amplius cum afferant, simul Diastolem cordis & arteriarum esse, modo & simul Systolem, alteram esse inconvencientem. Quomodo enim cum simul descendunt duo corpora si invicem conantur, alterum ab altero attrahat, vel cum simul contrahantur, alterum ab altero recipiat aliquid? Insuper forsan impossibile est, aliquid posse aliud corpus ita in seipsum attrahere ut descendatur, cum descendit in pati, nisi ut sanguis prius vi ab externis confusa, dum redit ad consuetam suam naturalem. Tale autem aliquid in arteriis posse esse, difficile est fingere. Sed arterias descendendi, qui replentur, ut facili & utres, atque non repleri, quia descendunt ut folles, facile & aperte demonstrare ne possit, & palam antea demonstrasse existimo. Atiamen lib. quod sang. cont. in arter. Galeni ex experimentum in contrarium sic se habet. Arteriam nudatam secundum longitudinem incidit, calammque vel concavum peritum fistulam immittit, quo & sanguinem exire non possit, & vulnus obtineat. Quoad ulque (inquit) sic se habet, arteria tota pullabit: cum primum vero obducimus filum super arteriam, & fistulam in laqueum contrahens arterie tunica calamo obtinueris, non amplius arteriam ultra laqueum palpitare videbis. Nec ego scio experimentum Galeni, nec recte posse fieri vivo corpore ad impectu sanguinis ex arteriis eruptionem puto, nec etiam ad sine ligatura vulnus fistula; & per fistulam cavatum universum profusile sanguinem non dubito; tamen hoc experimentum & probare videtur Galenum facultatem pulificam per tunicas arteriarum, à corde manare, & quod arteria dum descendunt, ab illa facultate pulifica replentur, quia descendunt, ut folles, non descendunt, quia replentur, ut utres. Sed & in arteriotomia & vulneribus contrarium manifestum est: sanguis enim saliendo ab arteriis presudant cum impetu, modo longius, modo propius vicissim profusendo, & salus semper est in arteria Diastole & non in Systole. Quo clare apparet, impulsu sanguinis arteriam descendit. Ipsa enim dum descendunt, non potest sanguinem tanta vi projicere potius, aut in se per vulnus attrahere deberet, secundum ea, quæ vulgo de arteriarum usu jactata sunt. Nec crassities tunicarum arterie nobis imponit, facultatem pulificam provenire à corde repleri tunicas. Nam quibusdam animalibus arterie à venis nihil differunt, & extremis partibus hominis, illius spiritus in arteriam: quid est quod separationem & parvis diffminationibus arteriarum, quales in cerebro, manu, &c. nemo per tunicas, arterias à venis petiti distinguere: eadem enim utrisque tunica, in accuratissime præterea ex inesa vel exesa arteria genito, eadem omnia pulfata arteria, & tamen non habent tunica arteria. Hoc mecum doctissimum Riolanus lib. vii. att. attestat. Neque eundem usum pulsum ac respirationis quibusque, quod idem causis quibus replentur, arteriores, majores, celeriores fieri cernat, vel aut cursu, aut balneo, aut quovis calfaciente, ut dicit Galenus. Nam non solum illud experimentum est in contra-

rium (quod solvere Galenus nititur) cum ab immodica respiratione pulsu existant majores, respirationes minores; sed & in pueri pulsu frequentes, cum respiratione intermura. Similiter in timore & curis & anxietate animi, tum aliquibus in febribus pulsu celeres, frequentes, respirationes vero tardiores. Hæc & hujusmodi incommoda possunt opiniones de pulsu & usa arteriarum consequuntur: non minus respiratione etiam ea, quæ de usu & pulsu cordis affirmantur, difficultatibus plurimis & inextricabilibus implicata sunt. Cor affirmant vulgo fontem & officium vitalis spiritus esse, quibus vitam singulis partibus largiatur; & tamen negant decurrere ventriculorum spiritum afferant, sed prætere duntaxat alimentum pulmonibus, unde dicitur piscibus defici decurrere ventriculorum cordis, & omnino omnibus defici quibus non sunt pulmones: & quod dexter ventriculus cordis, pulmonum gratia sit.

1. Cor, quæso, cum eadem pene confusio sit utrisque ventriculi, eadem fabrica fistularum, & lactuolodum, & valvularum, & visorum, & arcularum, & eodem utroque in distentionibus reserantur sanguine, similiter negantem, & similiter crumescunt; cur, & quomodo, cum eadem sit utriusque actio, motus pulsu, & tamen eos nullo tam differuntur existimemus definitos fuisse? Si valvula tricuspidalis sub jube dextri ventriculi ingressu impedimento sit sanguinis regressui in venam cavam, & si semilunares tres ille in officio arterie venæ ut sanguinis regressum impediunt scilicet sit; cur, cum similiter se habent, similiter ventriculo similiter sanguinis tum egressui, tum regressui impediendo facias esse negemus?

11. Et cum magnitudo, forma, sita, omnino eodem pene modo fuisse se habeant ventriculo, qui in dextro, cor dicitur hic spiritum egressui & regressui impedimento esse, in dextro vero sanguinis? Idem ergo ratione simile non videtur sanguinis, & spiritum motum similiter impedire que possit.

111. Et cum meatus & vulsi illi invicem respondeant magnitudinem, videlicet vena arteria & arteria venosa, eorum privato usui deficiunt, videlicet alendus pulmonum, alterum publico?

1V. Et quomodo probabile est, uti notavit Realdu Colombus, tanta sanguine opus esse ad nutritionem pulmonum, cum hoc vas, vena videlicet arteria, exuperet magnitudinem extrinsecam rationem distributionis vena cavæ descendenti crumescit?

V. Et, quæso, cum pulmones tam prope sita, & vas tam amplum exilat, & ipsi continuo motu aguntur, quid est quod dextri ventriculi pulsu opus sit? & quid est quod Natura, gratia alendurum pulmonum, alteram ventriculorum cordis adungere necesse habeat?

VI. Cum dicunt finitum ventriculorum & pulmonibus & dextro cordis sui materiam attrahere ad spiritus condendos, aërem videlicet & sanguinem, & patet in aërem spiritum sanguinem colligere, & subeunte fulgines, videlicet retro per arteriam venalem remitti in pulmones, illius spiritus in arteriam: quid est quod separationem facit, & quomodo hic illic spiritus fulgines circa permissionem aut consensionem committat? Si tricuspidales mitrales non impediunt egressum sanguinem ad pulmones, quomodo impediunt aëri? Et quomodo semilunares prohibebunt regressum spiritum, subeunte Diastole cordis, ad aëri? Et omnino, quomodo dicunt per arteriam venalem spiritum sanguinem sanguinem distendi & ventriculo sinistrali in pulmones, nec interim impediunt tricuspidem? cum affirmant aërem per idem vas à pulmonibus in ventriculorum finitum ingredi, cuius regressui tricuspidem

illa valvula impedimento esse voluerunt. Deus bone! Quomodo triuiculus impediunt aëris egressum, & non sanguinis?

VII. Implus, cum venam arteriosam, vāū amplum, magnam cum tunica arterie factum, non nisi privato & uni usui, videlicet alendis pulmonibus destinatus, cur arteriam venalem citi pari magnitudine cum tunica vene molli & laxa, pluribus usibus, tribus vel quatuor videlicet fabricatam asseverant? Volunt enim per ipsam aërem & pulmonibus in sinistram ventriculū permeare: volunt similitè corde in pulmones fulgines per ipsam venare: volunt spirituosū sanguinis portionem à corde per ipsam in pulmones ad ipsos reſcitolandos diſtribui.

VIII. Si fulgines & aërem à corde illas, ad cor hunc per eundem tubulum volūt transmitti; tam contrariis moribus & usibus unum vāū & unam viam fabricare Natura solita non est, nec videre usiam contigit.

IX. Si fulgines & aërem hac via permeare & venare contendunt, ut per bronchia pulmonum, quare exſcitā vel incita arteria vene, neque aërem, neque fulgines reperire in dissectione possumus, & unde imperſeretur caſſo sanguine arteriam venosam ipsam videmus, & nunquam aërem in pulmonibus & aërem remanentem ceruimus?

X. Si quis experimentum Galeni faceret, & cani aduſe viuenti tracheam incidere, & ſolibus pulmones aëre implet per vim, & diſtensos ligare fortiter, idem mox diſſectio pectore multam aëris copiam in pulmonibus usque ad extremam illorum tunicam inueniret, sed neque in arteria venosa, neque in sinistro ventriculo cordis quidquam. Si aërem & pulmonibus in cane oriūte aut cor attraheret, aut pulmones transmittenter, multo magis hoc experimento id ſacro deberet. Imo in administratione Anatomica inſtrata cadereſque pulmonibus, etiam aduſe ſtatim huc ingreſſi, si alii eſſent meatus, qui dubitaret? Tam magis vero facinus hunc uſum arterie veneſe, videlicet ad aërem & pulmonibus cordi deſcendum, ut ſicet, Fabr. ab independente huius uſus cauſa pulmones factos fuiſſe, & hanc eſſe præcipuam pulmonum particulam contendit.

XI. Sed emaho, si aëri deſcendendo arteria venosa condita ſit, cor citò conſtitutio eſſe vene?

XII. Viſtulo potius opus eſſet Natura & quidem quales Bronchia ſunt annularibus, ut ſemper pateant & neque concideri, aut si omnino vacua ſanguine permanent, ne honor artem tranſitum impediūt, uti manifeſtum eſt, quando pulmones piſcita Bronchiū vel inſarctā vel paululum adreſcā laborant, ſtillo & ſtrepitu oborto dum reſpiramus.

Minus toleranda illa opinio, quæ cum duplicem materiam, aërem & ſanguinem neceſſariam eſſe ad ſpiritus vitales eſſendos ſupponit, ſanguinem per mediaſtini cordis & cæcis porſitates de dextro in ſiniſtrum ventriculū tranſfudere, aërem per magnam vāū Arteriam venosam & pulmonibus attrahi contendit, & proinde in ſepto cordis porſitates plures eſſe produciendo ſanguini accommodatas. Sed, me hercule! porſitates nullæ ſunt, neque demonſtrari poſſunt.

Septi enim cordis ſubſtantia denſior & compaſſior eſt quævis altera corpora particula, exceptis uſibus & nervis. Sed ſi adreſcent foramina, quomodo (cum ſimul uterque ventriculus deſcendunt & dilatantur) alterum ab altero quidpiam, aut ſiniſtrum ſanguinem de dextro exhalare poſſibile eſt? Et cor non totius dextrum ſpiritus ex ſiniſtro, quam ſiniſtrum ſanguinem de dextro ventriculo per eadem foramina evocare crederem? At mirum & incongruum certe, ſanguinem per cæcis obſcuſque ductus, & aërem per patentiffimos eodem inſtanti commodum attrahi. Et cor queſo pro ſanguinis tranſitu in ſiniſtrum ventriculū ad cæcis & inviſibiles porſitates incertis obſcuſque conſequenti, quando adreſ per arteriam venosam tam patens iter? mirum mihi certe eſt, quod per cordis ſeptum craſſum, durum, denſum, compaſſiſſimum viam ſacere vel ſingere potius maluerint, quam per patentem vāū venoſum, aut etiam per pulmonum ſubſtantiam raram, laxam, molliſſimam, ſpongioſam, Præterea ſi ventriculi ſubſtantiam ſanguis permeare potuiſſet, aut & per ſeipſum imbihi, quid opus eſſet vena & arteria coronalis ramulis ad ipſius ſepti nutritionem derivatis? Quod notatè digniſſimum, ſi in ſetu (quando omnia rariora, molliora) Natura coacta fuit per foramen ovale ſanguinem in ſiniſtrum ventriculū & vena cava per arteriam venosam traducere; quomodo veriſimile poſſit eſſe quod in aduſo per cordis ſeptum jam denſum ætate factum tam commodè nulloque negotio tranſfundat?

Andreas Laurentius lib. ix, cap. xi, Quæſtione xxi, authoritate Galeni de loc. affeſt. lib. vi, cap. vii, & experientia Hollerit fulſit, aſſerit & probat & exortat pectoris ſeroſitates & pus Empyoricum in arteriam venosam aſſerit per ſiniſtrum ventriculū cordis, & per arteriam cum urina vel cum ſacibus abſci poſſe expeſci & reſeruiſe quæſtione in confirmationem caſum cuſum Melancholici, qui ſepius deſcriptum animi paſſiſe a poroſoſo liberatus fuit conſiſſione urina turbide, ſeſide, acris, & quæ genere morbi tandem conſeſſit, diſſectio cadavere talis ſubſtantia, qualem migeſcat, neque in veſſica, neque in renibus uſquam apparebat, ſed in cordis ſiniſtro ventriculo & cavitate pectoris plurima: unde gloriar ſe horum affeſtuum talem prædiſſiſſe cauſam. Ego autem non poſſum non mirari, cum ipſe materiam heterogeneam poſſe eodem tractu evacuari arinarum & prædicaverat, quod iſdem viis ſanguinem & pulmonibus in ſiniſtrum ventriculū ſecundum naturam deduci conveniret ceruere aut aſſerere non potuit aut noluit.

Itaque ex his & huiusmodi plurimis patet, quæ cauſa dicta antehac à prioribus de motu & uſu cordis & arteriarum, aut inconvenerint, aut obſcure, aut impoſſibilia diligenter conſideranti appareant: utile proinde admodum erit paulo penitus rem inſpiciſſe, arteriarum & cordis motus non ſolum in homine, ſed & aliis univerſis animalibus cor habentibus contemplari: quæritiam vivorum diſſectione frequenter multaque autopia veritatem diſcernere & inveſtigare.

G V I L I E L M I H A R V E I A N G L I D E M O T V C O R D I S E T S A N G V I N I S I N A N I M A L I B V S,

Exercitatio anatomica.

C A P. I.

Cauſa, quibus ad ſcribendum Author permotus fuerit.



Vm multis vivorum diſſectionibus (uti ad manum dabatur) animū ad obſervandum primum appuli, quo cordis motus uſum & utilitates in animalibus per autophiam, & non per liberos aliorumque ſcripta inven-

rem: Rem arduum plane & difficultatibus ita pene continuo reperi, ut cum Fracalſtorio motum cordis ſoli Deo cognitum eſſe pene opinarer. Nec enim quomodo Syſtole aut Diaſtole fieret, nec quando aut ubi dilatatio & contrictio existeret, recte potui internoscere, propter celeritatem ſcilletot motus qui in multis animalibus nictu oculi, quaſt trajecto fulgure, ſe in conſpectum exhibuit & ſubtraxit illico, ita ut modo hic Syſtole, illic Diaſtole, modo & contra; modo varios, modo conſuſos fieri motus me exiſtimarem ceruere: unde animus mihi fluctuabat, nec quid vel ipſe ſtatuere, vel alius crederem habebam, & motum cordis eſſe qualis Euripi fluxus & refluxus Ariſtoteſi, Andream Laurentium ſcripſiſſe non mirabar.

Tandem majori indies & diſquitione & diligentia uſus, multa frequenter & varia animalia viva inſpiciendo, multis obſervationibus collatis, & rem attriſſe, & ex hoc labyrintho me extricatum evaſiſſe, ſimulque motum & uſum cordis & arteriarum, quæ deſiderabam, comperta habere me exiſtimavi. Ex quo non ſolum privatim amicis, ſed etiam publice in prædicationibus meis anatomis, Academicis more, proponere meam in hac re ſententiam non verebar.

Quæ cum aliis, ut fit, placeret, aliis minus: hi convellere, calumniari & vitio vertere ceperunt, quod præceptis & fide omnium Anatomicorum diſceſſerint: illi rem novam cum inſiſtu dignam, tum maxime utilem fore confirmantes, plenus fibi explicari poſcebant. Tandem amicorum precibus, ut omnes meorum laborum participes fierem, partem etiam aliorum permotus invidia, qui dicta me iniquo animo accipientes & minus inſtantes, me publice traducere conabantur, ut omnes de me & de re ipſa iudicium ferant, hac typis mandare publice coactus fui. Sed & eo libentius, quod Hieronymus Fabr. ab Aquapendente cum ſingulis pene animalium particulis accurate & docte peculiari tractatu delineaverat,

folum cor intactum reliquit. Denique ut ſi quid reipub. literaria ex opera mea utile & commodum hac in parte accederet, forſan recte ſciſſe me conſtare, nec alii omnino inerte me viſiſſe viderent. Et quod Senex ait in Comœdia,

Nunquam quiſquam ita bene ſubdita ratione ad vitam ſuit,

Quin res, ætas, uſus aliquid oportet novi; Aliquid admonet, ut illa quæ te ſire credas, neſciſ: Et quæ tibi putari prima, in experiendo repandis; illud forſan in cordis motu eveniat nunc, aut alii hinc ſaltem, hac data via & felicioribus freti ingenii, rei rectius gerendæ & melius inquirendæ occaſionem capient.

C A P. II.

Ex vivorum diſſectione, quali ſit Cordis motus.

Primum itaque in Cordibus omnium adhuc viventium animalium, aperto pectore & diſſecta capſula, quæ cor immediate circumcludit, obſervare licet, Cor aliquando moveri, aliquando quieſcere, & eſſe tempus in quo movetur, & in quo motu diſtenditur.

Hæc maniſteſta in cordibus frigidorum animalium, ut buſone, ſerpentibus, ranis, cochleis, gammaris, cruſtaceis, conchiis, ſquillis, & piſciculis omnibus. Funt etiam omnia maniſteſta in cordibus aliorum, ut canis, porci, ſi eo uſque attente obſervaveris, quodæ enori cor & languidius moveri, & quaſi extingui incipiat: tum etiam tardiores & rarioreſ ipſius motus fieri, & longiores quietes ceruere apertè & clare poteris, & motus quaſi fit, & quomodo fiat, comodiſſime intueri & dijudicare licet. In quiete, ut in morte cor laxum, flaccidum, enervatum, inclinatum quaſi jaceat.

In motu & eo, quo movetur, tempore tria præ cæteris animæ vertenda.

1. Quod erigitur cor & in mucronem ſe ſurſum elevat, ſit illo tempore ſerire pectus, & forſis ſentiri pulſatio poſſit.

2. Vndique contrahi, magis vero ſecundum latera, ita ut minoris magnitudinis, & longiusculum, & collectum appareat. Cor anguilla exemplum & ſuper tabulam aut manum poſitum hoc facit maniſteſtum. Æque etiam apparet in corde piſciculorum, & illis frigidioribus animalibus, quibus cor conformè aut longiusculum eſt.

3. Comprehenſum manu cor eo quo movetur tempore, duriusculum fieri; à tentione autem illa

illa durities est, quemadmodum si quis lacertos in cubito mani comprehendat, dum movent digitos, illi tendi & magis renitentes fieri percipit.

rv. Notandum insuper in piscibus & frigidioribus sanguineis animalibus, ut serpentibus, ranis, &c. illi tempore, quo movetur cor, albidioris coloris esse, quam quiescit a motu, coloris sanguinei saturum cerni.

Ex his multi videbatur manifestum, Motum cordis esse tentiorem quamdam ex omni parte & secundum duum omnium fibrarum, & contrictionem undique, quoniam erigi, vigorari, minorari, & durescere in omni motu videtur; ipsiusque motum esse, qualem musculorum, dum contrahitur fit secundum duum partium nervosarum & fibrarum; musculi enim cum moventur & in actu sunt, vigorantur, tenduntur, ex mollibus dum sunt, attolluntur, incontractantur, similiter quoque Cor.

Ex quibus observatis rationi consentaneum est, Cor eo, quo movetur tempore, & undique contrahitur & secundum parietes incontractit, secundum, ventriculos coarctari & contentum sanguinem protrudere. Quod ex quarta observatione satis patet, cum in ipsa tensione sua, propterea quod sanguinem in se prius contentum exprimit albeat, & denuo in laxatione & quiete, subingrediente de novo sanguine in ventriculum, redeat color purpureus & sanguineus cordi. Verum nemo amplius dubitare poterit, cum usque in ventriculi cavitatem insititio videntur, singulis moribus five pulsationibus cordis in ipsa tensione proficere cum impetu foras contentum sanguinem videtur.

Simul itaque hæc & eodem tempore contingunt, tensio cordis, mucronis erectio, pulsus, qui forissecus sentitur ex allusione ejus ad pectus, parietum incontractio & contenti sanguinis protrusio cum impetu a contrictione ventriculorum.

Hinc contrarium vulgariter receptis opinionibus apparet, cum eo tempore, quo cor pectus ferit & pulsus foris sentitur, una cor distendi secundum ventriculos & repleri sanguine putetur, quam contra rem se habere intelligas, videlicet cor dum contrahitur, inaniri. Vnde qui motus vulgo cordis Dialtote existimatur, revera Systole est. Et similiter motus proprius cordis, Dialtote non est, sed Systole; neque in Dialtote vigoratur cor, sed in Systole; tum enim tenditur, movetur, vigoratur.

Neque omnino admittendum illud (tameñ magni Vesalii adducto exemplo confirmatum) de vimineo circulo ex multis juncis pyramidatim junctis, cor secundum fibras rectas tantum moveri, & sic dum apex ad basin appropinquat, latera in orbem distendi, & cavitates dilatari, & ventriculos cucurbitulae formam acquirere, & sanguinem introferre; nam secundum omnem quem habet ductum fibrarum cor eodem tempore tenditur, contrahitur, & potius incontractatur & dilatantur parietes & substantia, quam ventriculi; & dum tenduntur fibræ a cono ab basin, & cor una ab basin trahunt, non in orbem latera cordis inclinant, sed potius contrarium, ut omnis fibra in circulari positione dum contrahitur versus reditum. Et sicut omnes musculorum fibræ dum contrahuntur, & in longitudine abbreviantur, ita

secundum latera distenduntur, & eodem modo quod in musculorum ventribus incontractantur. Adde, quod non solum in motu cordis per directionem & incontractationem parietum contingit ventriculos coarctari; sed ulterius eo quod fibræ illæ five laterculi, in quibus solum fibræ rectæ (in pariete enim omnes fibræ sunt circulares) ab Aristotele Nervi dictæ, quæ varie in ventriculis cordis majorum animalium, dum una contrahuntur admirabili apparatu, omnia interiora latera veluti laqueo invicem compelluntur ad contentum sanguinem majori robore expellendum.

Neque verum est similiter quod vulgo creditur, cor ullo suo motu ad distentionem sanguinem in ventriculis attrahere, dum enim movetur & tenditur, expellit, dum laxatur & concidit, recipit sanguinem eo modo, quo postea patebit.

C A P. III.

Arteriarum motus qualis ex vivorum dissectione.

Vltimus in cordis motu observanda veniunt hæc, quæ ad arteriarum motus & pulsationes spectant.

i. Eo tempore quo cordis fit tentio, contractio, percussio pectoris, & omnino Systole, Arteriae dilatantur; pulsus edunt, & in sua sunt Dialtote. Similiter eo tempore quo dexter ventriculus contrahitur, & protrudit contentum sanguinem, vena arteriosa pulsatur & dilatatur simul cum reliquis arteriis corporis.

ii. Quando finit ventriculus cessat moveri pulsare & contrahi, cessat pulsus arteriarum; imo quando languidius tenditur, pulsus in arteriis vir perceptibilis; & similiter cessant dextro, in vena arteriosa.

iii. Item secta quavis arteria vel perforata in ipsa tensione ventriculi sinistri propellitur foras sanguis ex vulnere cum impetu. Similiter secta vena arteriosa eodem tempore, quo dexter ventriculus tenditur & contrahitur, exinde cum impetu sanguinem proficere videbis.

Similiter etiam in piscibus secta fistula, quæ è corde in branchias ducit, quo tempore cor tendi & contrahi videbis, eo una etiam sanguinem exinde pertrahi cum impetu.

Similiter denique cum in omni arteriotomia sanguis proficiendo exeat modo longo, modo propius, saltum fieri in arteriarum Dialtote & quo tempore cor pectus ferit, compries; atque hoc nimirum eo tempore quo cor tendi & contrahi apparet, & in sua esse Systole erectione, unaque sanguis expellitur eodem modo.

Ex his videtur manifestum contra communia dogmata, quod arteriarum Dialtote fit eo tempore, quo cordis Systole; & arterias repleri & distendi propter sanguinis a contrictione ventriculorum cordis immisionem & intrusionem. Quin etiam distendi arterias, quia replentur ut utres aut vesicae, non repleri, quia distenduntur ut folles. Et eadem de causa universi corporis arteriae pulsant, videlicet a tensione sinistri cordis ventriculi; sicut vena arteriosa, a dextro.

Denique arteriarum pulsus fieri ab impulsu sanguinis è ventriculo sinistro; eodem pacto, quo cum quis in chirothecam inflat, omnes digitos simul

mul & una distendi videt, & pulsus amulari. Et enim secundum cordis tentiorem pariter pulsus sunt majores, vehementiores, frequentes, celeres, rhytmum & quantitatem & ordinem servant. Nec est expectandum, ut propter motum sanguinis tempus inter contrictionem cordis & arteriarum (præcipue magis distantium) dilatationem intercedat, ne fiant simul, cum eodem modo se habeat, ut in inflatione chirothecæ aut vesicæ; quod per plenum (ut per tympanum & in longis lignis) ictus & motus simul sunt in utroque extremo, & quod Aristoteles lib. xii Hist. de Anim. cap. ix, & lib. de respir. cap. xv: *Palpiat intra venas (arterias) omnium animalium, pulsusque simul undique movetur, sic pulsant venæ omnes & simul invicem, propterea quod pendunt omnes à corde; movet autem semper, quare & illa semper & simul invicem quando movet.* Notandum obiter cum Galeno, à veteribus Philosophis venas pro arteriis appellatas fuisse.

Accidit aliquando me vidisse, & præ manibus habuisse cadum quandam, qui multi hæc veritatem aperitissime confirmabat. Habuit quidam tumorem ingentem pulsantem, Aneurisma dictum, in dextra parte juguli prope descensum arteriæ subclaviæ in axillas ab ipsius arteriæ exsectione propternatum. Is summum indies incrementum capiebat propter immisionem sanguinis ab arteria, singulis pulsationibus distendens, quod fæcè post mortem cadavere deprehensum erat. In illo pulsus ejusdem brachii exilis admodum erat, eo tempore major sanguis portio in tumore distendebatur & influxus in brachium interceptus fuit.

Quare, five per compressionem, five per insarctum vel interceptionem, ubicunque sanguinis motus per arterias præcipitur, ibi posteriores arteriæ minus pulsant; cum pulsus arteriarum, nil nisi impulsus sit sanguinis in arterias.

C A P. IV.

Motus cordis & arteriarum qualis ex vivorum dissectione.

Præter hæc circa motum cordis observanda sunt, quæ ad arteriarum usum spectant.

Quod Galpar Bauhinus lib. ii, cap. xxi, & Ioannes Riolanus lib. viii, cap. i, viri doctissimi & Anatomici peritissimi observarunt & admodum quod, quod si in viva sectione alicujus animalis cordis motum distulisses absceses, quatuor motus loco & tempore distinctos observares: quorum duo sunt proprii auricularum, ventriculorum duo. Pace tamen temporum virorum, quatuor sunt motus, loco, non vero tempore distincti. Simul enim ambe arteriæ moventur, & simul ambo ventriculi, ut quatuor loco distincti sunt motus, duobus tantum temporibus, atque hoc se habent modo.

Duo sunt quæ eodem tempore motus, unus auricularum, alter ipsorum ventriculorum: nec enim simul omnino sunt, sed præcedit motus auricularum, & subsequitur cordis, & motus ab auriculis incipere & in ventriculis progredi videtur. Cum jam languidiora animala emoriente corde sunt, & in piscibus & in frigidioribus sanguineis animalibus inter hos duos motus tempus aliquod quietis intercedit, & cor quasi suscitatum motui

respondere videtur, aliquando citius, aliquando tardius; ac tandem ad mortem inclinant cessat motu suo respondere, & quasi capite duntaxat leviter annuit, & obscure adeo movetur, ut potius motus signum præbere pulsanti auriculæ videatur. Sic prius definit cor pulsare, quam auriculæ, ut auriculæ supervivere dicantur, & prius omnium definit pulsare finit ventriculus; deinde ejus auriculæ, demum dexter ventriculus ultimus, quod etiam notavit Galenus, reliquis omnibus cessantibus & mortuis pulsatur usque dextra auriculæ, ut ultimo in dextra auriculæ vita remanere videatur. Et dum sensim emoritur cor, videre licet post duas vel tres pulsationes auricularum, aliquando quasi expectatam cor respondere, & unum pulsus lente & ægre peragere & moliri.

Sed & præcipue notandum, quod, postquam cessavit cor pulsare, adhuc auriculæ pulsant, digito super ventriculum cordis posito singule pulsationes percipiuntur in ventriculis, eodem plane modo, quo ventriculorum pulsationes in arteriis sentiri aut diximus, à sanguinis impulsu nimirum distentione facta. Et hoc tempore, pulsante solum auriculæ, si foris coris mucronem abfueris, effunde singulis auriculæ pulsationibus sanguinem, exhibere conspicias: ut hinc patet, quomodo in ventriculis sanguis ingreditur, non attractione aut distentione cordis, sed ex pulsu auricularum immittitur.

Notandum est, ubique omnes, quas voco & in auriculis & in corde pulsationes, contractiones esse: & plane primo contrahi auriculæ videbis, & in consequentia, cor ipsum. Auriculæ enim dum moventur & pulsant, albidiores fiunt, præsertim paulo paucio sanguine replentur. Replentur autem tanquam promptuarium & lacuna sanguinis, declinant sponte sanguine, & venarum motu compreffo ad centrum. Quin etiam in finibus & extremitatibus ipsarum hæc albedo à contractione fieri vel maxime apparet.

In piscibus & ranis, & similibus, quæ unum ventriculum habent cordis & pro auriculæ vesicam quandam in basi cordis positam & retestimant sanguine, videbis hæc vesicam primo contrahi, & subsequi postea cordis contractionem apertissimam fime.

At vero etiam quæ his contrario modo se habent à me observata ascribere hæc visum est. Cor anguille, & quorundam piscium, & animalium etiam exemptum fime auriculis pulsant. Immo fi in frutia dissecueris, partes ejus dividas separatim se contrahere & laxare videbis ita, ut in his post cessationem motus auricularum, cordis corpus pulsium faciat & palpitet. Sed an hoc proprium vivacioribus animalibus, quorum radiale humidum glutinosum magis aut pingue & lentum est, & non ita facile dissolubile? Quod etiam apparet in carne anguillarum, quæ post excoriationem, excoriationem & in frusta dissectionem, motum retnet.

In columba certe experimento facto, postquam cor delierat omnino moveri, & nunc etiam auriculæ motum reliquerant, per aliquod spatium digitorum saliva madefactum & calidum cordi superimpositum detinui, quo fomentum quasi vires & vitam postliminio recuperasset, cor & ejus auriculæ

cula moveri & sese contrahere atque laxare, & quasi ab orco revocari videantur.

Sed & præter hæc aliquoties à me observatum fuit, postquam cor ipsum & ejus auricula etiam dextra à pulsatione, quasi mortis articulo quiescebant, in ipso sanguine qui in dextra auricula continetur, obscurum motum & inundationem ac palpitacionem quandam manifeste superfuisse, tandem scilicet, quam calore & spiritu imbuvi videretur.

Tale quiddam evidentissime in prima animalis generatione intra septem dies ab incubatione, in ovo Gallinaceo cernitur. Inest primum ante omnia gutta sanguinis, quæ palpitat, quod etiam annotavit Aristoteles, ex qua, incremento facto & pullo aliqua ex parte formato, sunt cordis auriculæ, quibus pulsantibus perpetuo inest vita: cum postea corpus delineari intermissis aliquot diebus incepterit, tum etiam cordis corpus procreatur, & per aliquod tempus albidum apparet & exangue, ut reliquum corpus, nec pulsum edit, nec motum. Quin etiam in fœtu humano vidi, circa principium tertii mensis similiter cor formatum, sed albidum & exangue; cujus tamen auriculæ sanguis inerat uberissimus & purpureus. Sed enim in ovo, jam adaucto & conformato fœtu, simul & cor adaugeri, & ventriculos habere, quibus sanguinem tunc recipere & transmittere occipit.

Ita ut si penitus introspicere quis velit, non solum cor esse primum vivens & ultimum moriens dixerit, edit auriculæ & quæ in serpentibus, piscibus & hujusmodi animalibus pars pro auricula est, & prius quam cor ipsum vivere, & post etiam emori.

Imo an prius adhuc ipsæ sanguis vel spiritus habeat in se obscuram palpitacionem, quam post mortem retinere mihi visus est; & an cum palpitacione vitam incipere dicendum sit, dubitare contingit, quandoquidem & sperma animalium omnium (ut notavit Aristoteles) & spiritus prolificus palpitando exit, velut animal quoddam. Ita Natura in morte, quasi decursione facta, reducem (ut Aristoteles de motu animalium cap. vi 11) agit motu retrogrado à calce ad carceres, & eo unde prorsus ille recipit: & cum animalis generatio ex non animali procedat in animal, tanquam ex non ente in ens; dum retro gradibus corruptio ex ente revolvitur in non ens, unde quod in animalibus ultimus sit, deficit primum, & quod primo, ultimum. Observavi quoque in omnibus pene animalibus cor vere inesse, & non solum, ut Aristoteles dicit, in majoribus & sanguineis, sed in minoribus, exangueis, crustaceis, conchis, atascis, gammaris, similibus, multisque aliis; imo vespis & crabronibus & muscis (ope periscilli ad res minimas discernendas) in summate illius particule quæ cauda dicitur, & vidi pulsans cor, & aliis videndum exhibui.

In exangubus vero Cor lente admodum, rarissime ictibus pulsant, & sicuti in aliis jam moribundis contingit, tarde sese contrahit, ut facile in cochleis esse cernere. Quorum cor deprehendes in fundo illius orificii in latere dextro, quod se aperire & claudere eventationis causa videtur, & unde salivam expoit, fectiōne facta in summatem juxta partem jecori analogam.

Sed notandum & illud, quod hyeme & frigidiorebus tempestatibus exanguia aliqua (qualis est Cochleæ) nihil pulsans habent, sed vitam magis plantæ agere videntur, ut etiam reliqua quæ Zoophyta five plantanimalia ideo dicuntur.

Notandum insuper in omnibus animalibus ubi cor inest, ibi etiam auriculæ esse vel auriculæ aliquid analogum: Et ubicunque cor duplici ventriculo donatur, ibi duas semper addere auriculæ, non contra. Sed si in ovo pulli conformationem advertas, primum inest, ut dixi, tantum postea, vel auriculæ, vel gutta sanguinis pulsans, postea incremento facto absolvitur cor. Ita quibuldam animalibus (quasi ultiorum perfectionem non adificientibus) pulsans vesicula quedam instar puncti ejusdem rubri vel albi duntaxat inest, quæ principium vite, uti apibus, vespis, cochleis, squillis, gammaris, &c.

Est hæc apud nos minima squilla (quæ Anglice dicitur a Shrimp, Belgice een Garnel) in mari & Thamefi capli solita, corpore foris pellicudo, hanc aquæ impositam sapius præbui spectandam amicissimis quibuldam meis, ut cordis illius animalis motus liquidissime perspicereamus, dum exterioris illius corporis partes visui nihil officere, quod minus cordis palpitacionem quasi per fenestram intueremur.

In ovo gallinaceo, post quatuor vel quinque dies ab incubatione, primum rudimentum pulsi instar nubeculæ videndum exhibui, nimirum ovo, cui cortex adimebatur, in aquam limpidam tepidamque immisso, in cujus nubecula medio punctum sanguinem palpitans tam exiguum erat, ut in contractione dispareret & visum augeretur; in laxatione instar summitatis acus apparet rubicundum; ita ut inter ipsum videri & non videri, quasi inter esse & non esse, palpitacionem & vite principium ageret.

C A P. V.

Cordis motus actio, & functio.

Go vero ex his tandem & hujusmodi observationibus repertum iri confido, motum cordis ad hunc modum fieri.

Primum sese contrahit auriculæ, & in illa contractione sanguinem contentum (quod abundat tantquam venarum caput, & sanguinis promptuarium & cisterna) in ventriculo cordis conjicit, quo repleto cor sese erigit, continuo omnes nervos tendit, contrahit ventriculos, & pulsum facit, quo pulsu immisso ab auricula sanguinem continenter protrudit in arterias, dexter ventriculus in pulmones per vas illud, quod vena arteriosa nominatur, sed re vera & constitutione & officio & in omnibus arteria est: sinisterr ventriculus in aortam, & per arterias in universum corpus.

Isti duo motus, auricularum unus, alter ventriculorum, ita per consecutionem sunt, servata quasi harmonia & rhythmo, ut ambo simul fiant & unicuique tantum motus appareat, præsertim in calidiorebus animalibus, dum illa celeri agitantur motu. Nec alia ratione id fit, quam cum in machinis una rota aliam movet, omnes simul movere videntur, & in mechanico illo artificio, quod Clocetis adaptant, ubi compressione alicujus ligulæ

cadit

De Motu Cordis & Sanguinis.

cadit filix, percutit chalybem & propellit, igitur elicitur, qui in pulvere cadit, igitur pulvis, interior proreptit, disploditur, evolat globulus, metam penetrat, & omnes isti motus propter celeritatem quasi in nictu oculi simul fieri apparent. Sic etiam in deglutitione, radicis lingue elevatione & oris compressione cibis vel potus in fauces deturbatur, larynx à mulculis suis & epiglottide clauditur, elevatur & aperitur, summitas gulæ à mulculis suis haud aliter quam sacculus ad implendum vel potum acceptum transversis mulculis cibum mitit, & longioribus attrahit: & tamen omnes isti motus à diversis & contradiuctis organis facti, cum harmonia & ordine dum sunt, unum efficere motum videntur & actionem unam, quam deglutitionem vocamus.

Sic contingit plane in motione & actione Cordis, quæ deglutitio quedam est & transfusio sanguinis & venis in arterias. Et si quis (dum hæc hautescitur) laus, qui in arteriis spiritus duntaxat contineri arbitrabatur, sed isti ipsi contradicerent interea, & id esse turpiter negaret, quod libro proprio acriter esse contendere contra eundem Erasistratum, & multis & validis argumentis comprobaverat, & experimentis demonstraverat, nimirum sanguinem contineri in arteriis natura, & non spiritum.

Sic vero divinus vir (uti facit eodem loco sepas concedere, omnes arterias corporis à magna arteria ortiri, & hanc a corde: qui etiam in ipsi omnia sanguinem natura contineri & deferri, & vasculis illis tres signis officio aorte appositæ regere sanguinem in cor prohibere professus, & quod hæc Natura nequaquam præstantissimo visceri apposuisset, nisi maximum aliquod ministerium fuisset exhibitura. Si, inquam, hæc omnia & his ipsissimis verbis concederet Pater Medicorum, uti facit recitato libro, quomodo negare possit arteriam magnam istiusmodi vas esse, quod sanguinem (jam absolutam suam perfectionem adeptum) e corde in universum corpus dispenfer, non video. An adhuc forsitan hæsitaret, ut omnes in hunc ulque diem post ipsum, quod propter contextum, ut dixi, cordis cum pulmone non videret vas, per quas sanguis & venis in arterias transferri possit.

Quod dubium etiam anatomicis (dum semper in dissectionibus inveniunt arteriam venosam & sinisterr ventriculorum cordis repletos sanguine, eoque crasso, grumescente, atrox non mediocriter perturbat cum sanguinem & varia, sub finitum per septum cordis transfundere coacti sunt affirmare. Sed hanc viam antea refutavi. Iam idco via paranda est & apertenda, qua inventa nulla amplius sit difficultas, quæ quempiam, credo, inhaibet, quo minus quæ ante propoli de pulsi cordis & arteriarum, de transusione sanguinis & venis in arterias, & de dispensatione in universum corpus per arterias concedere & agnoscere facile possit.

C A P. VI.

Quibus vitis sanguis & vena Cava in arterias, vel dexterr ventriculo cordis in sinisterr deferatur.

Cum errandi occasione præbuisse probabile sit, quam in homine vident, ut dixi, cordis

Gg 2 cum

cum pulmone connexionem: in hoc peccant, qui dum de partibus animalium (ut vulgo omnes Anatomici faciunt) pronunciare, & demonstrare aut cognoscere volunt, unum tantum hominem, eumque mortuum inspicunt, & sic tanquam, qui una reipub. forma perfecta disciplinam politici componere, ut unus agri naturam cognoscens agriculturam se scire opinatur; nihilo plus agunt, quam si ex una particulari propositione de universali per syllogismum concludere aintenterunt.

Veruntamen, si in dissectione animalium æque versati essent ac in humani cadaveris anatomico exercitii, res hæc, quæ omnes perplexos retinet, indubie palam absque omni difficultate mea sententia elucesceret.

In piscibus, in quibus unus tantum ventriculus cordis (ut non habentibus pulmones) res primum factis manifesta est, vesicam enim sanguinis in basi Cordis positam, auriculæ nimirum analogam, sanguinem in cor immittere, quem cor denuo per arteriam vel situlam arterie analogam aperte transmittit tunc vasa, tum secta arteria (exinde sanguine singula pulsatione cordis proficiente) oculis palam confirmari posse constat.

Idem etiam deinde in omnibus animalibus, in quibus unus duntaxat ventriculus vel quasi unus est, non difficile est cernere, ut in busione, æna, serpentibus, lacertis, quæ etiam pulmones aliquo modo habere dicuntur, ut quæ vocem habent (de quorum pulmone artificio admodum et ceteris ejusmodi permultas apud me observationes habeo, quæ non sunt hujus loci); tamen ex autopsia eodem modo in illis è venis in arterias sanguinem pulsus cordis tractum esse palam est, & via patens, aperta, manifesta, nulla difficultas, nullus hastidius locus. In his enim perinde se res habet atque in homine; in quo si septum cordis perforatum aut adeptum esset, aut unus ex utroque fieret ventriculus, nemo credo dubitaret, quia via sanguis è venis in arterias transire possit.

Cum vero major numerus animalium non habentium pulmones sit, quam habentium; & similiter major numerus sit unum tantum ventriculum cordis, quam habentium duos, proclive est statuere in animalibus *ἓν ἂν μὲν*, ut plurimum & in universum sanguinem aperta via è venis in arterias per cordis finem transmitti.

Consideravi autem mecum, quod etiam in embryonem eorum quæ pulmones habent, sectione aperitissime constat, in fœtu vasa cordis quatuor (videlicet venam cavam, venam arteriosam, arteriam venalem, & Aortam five arteriam magnam) aliud modo unum, quam in adulto, id quod omnes Anatomici norunt satis.

Primum contactus è uno venæ cavæ cum arteria venosa (quæ sit priusquam vasa in dextrum ventriculum cordis se aperit, ut venam coronalem emittit, paululum supra egressum ab hepate anastomosis lateralem exhibet, hoc est, foramen amplum patens, ovali figura, pertusum è cava in arteriam illam pervitum, ita ut per illud foramen tanquam per unum vas sanguis è vena cava in arteriam venosam & auriculam cordis finitram usque in ventriculum finitrum liberrime & copiosissime dimanare possit. Insuper in illo foramine ovali è

regione, quæ arteriam venosam respicit, operculi inflexa membrana tenuis dura est, foramine majore, quæ postea in adultis operiens hoc foramen & coalescens undique illud foramen omnino obstruit & prope obliterat. Hæc inquam membrana sic constituta est, ut dum laxè in se concidit, facile ad pulmones & cor via resupinetur, & sanguis à cava affluenti cedat quidem, atne rursus in cavam refluat, impeditur; ut liceat existimare in embryone sanguinem continuo debere per hoc foramen transire è vena cava in arteriam venosam, & inde in auriculam finitram cordis; at postquam ingressus fuerit, remeare nunquam possit.

Alteri uno venæ arteriosæ sit, postquam vena illa è dextro ventriculo egressa in duos dividitur ramos; etque velut è duobus dictis tertius truncus & quasi canalis arteriosus, ab hinc in arteriam magnam oblique ductus & perforatus: ut in dissectione Embryonum quasi duæ aortæ, vel radices arterie magnæ è corde orientes duæ appareant.

Canalis hic in adultis similiter fœsum attenuatur, tabescit, & penitus tandem, ut vena umbilicalis, excicatur & aboletur.

Itæ canalis arteriosus nullam membranam in se habet, sanguinis motum hinc vel illinc impediens. Sunt enim in officio illius venæ arteriosæ (cujus itæ canalis, ut dixi, propagæ est) valvule signoides tres, quæ intras foras fiunt, & sanguis è dextro ventriculo hac via in magnam arteriam fluenti cedunt facile; remeare vero contra ab arteria aut pulmonibus in dextrum ventriculum volenti ad amissum clausæ omnino impediuntur sunt. Vt hic etiam arbitrari consentaneum sit, in Embryone dum cor sese contrahit, continuo sanguinem è dextro ventriculo hac via in arteriam magnam invehi.

Quod vulgo dicitur, has duas uniones tam magnas, patentes & apertas, nutriendorum pulmonum causa factas fuisse tantum, & in adultis (cum jam pulmones propter ipsorum calorem & motum copiosius nutrimentum desiderant) aboleri & consolidari, commentum improbabile est & male coherens. Et similiter quod dicunt, cor in embryone feriari & nihil agere, nec moveri, ideoque Naturam hos transitus facere alendorum pulmonum causa coactam fuisse, falsum est: cum in ovo cui gallina incubuit, & in Embryonibus recent ex utero exectis autopsia pateat, æque cor moveri atque in adultis, neque naturam illa tanta necessitate urgeri. Cui motui non solum hi oculi saepe testes, sed & Aristoteles ipse lib. de Spir. cap. 111; *Pulsus*, inquit, *per initia statim in constitutione cordis emergit, quod & in sectione vivorum, & pulsi formatione ex ovo deprehenditur. Quin & observamus has vias (tam in hominum genere, quam in cæteris animalibus) nec unum apertas & patentes esse usque ad tempus partus, ut annotatur Anatomici; sed etiam permultos post menses, imò in aliquibus per aliquot annos, ne dicam toto vitæ curriculo, veluti in anseræ, beccagine, & avibus plurimis, & animalibus præsertim in minoribus. Quæ res impeditur forsitan Leon. Bortallo fe novum transitum sanguini de vena cava in finitrum ventriculum cordis invenisse gloriant; & fateor me quoque, cum in mure majori jam adulto hoc ipsum ipse reperi, tale quid statim existimasse.*

Ex

Ex quibus intelligitur in Embryone humano, quin & in aliis, in quibus itæ uniones non abolerunt, idem ipsum accidere, ut cor suo motu per patentissimas vias sanguinem è vena cava in arteriam magnam aperitissime traducat, per utriusque ventriculi ductum. Dexter liquidem sanguinem ab auricula recipiens, inde per venam arteriosam & propaginem suam (canalem arteriosam dictam) in magnam arteriam propellit. Similiter similiter eodem tempore mediante auriculæ motu recipit sanguinem in illam finitram auriculam diductum per foramen ovale è vena cava, & tentione sua & contractione per radice aortæ in magnam itidem arteriam simul impellit.

Ita in Embryonibus dum interea pulmones oriuntur, & nullam actionem aut motum habent, quasi nulli forent, natura duobus ventriculis cordis quasi uno utitur ad sanguinem transmittendum. Et similis est conditio Embryonum pulmones habentium, dum adhuc pulmonibus non utuntur, ac est eorum animalium, quæ pulmones non habent.

Itaque tam clare in his etiam elucescit veritas, quod cor suo pulsu sanguinem è vena cava in arteriam magnam traducit & transfundit, perque tam patentes & apertas vias, ac si in homine, quod dicit, ambo ventriculi, eorum septo adepto, ad invicem pervii essent facti. Cum itaque majori ex parte animalibus, & omnibus quodam tempore patentissimè itæ extet via; quæ transmissio sanguinis per cor inserviat, restat ut illud perquiramus, Cur in quibusdam animalibus (ut in homine) itique calidioribus & adultis per pulmoneum substantiam illud fieri non existimemus, quod in embryone natura per eas vias illo tempore quo pulmoneum nullus erat usus antea efficit, quas ob defectum transitus per pulmones coacta videbatur facere: aut Cur melius sit (natura enim semper quod est melius facit) in adolescentibus naturam transitui sanguinis omnino oclusisse vias patentes illas, quibus antea in embryone & fœtu usa fuerat, & in omnibus aliis animalibus utitur, nec alias ullas pro illo sanguinis transitu aperuisse, & sic omnino potius hunc impedivisse.

Ita jam cor res cessit, ut iis, qui in homine quaerunt vias, per quas sanguis è vena cava in finitrum ventriculum & arteriam venosam permeat, magis operæ pretium esset, & recte magis facere videretur, si ex dissectione animalium veritatem investigare vellent, quo causam inquirent, cur in majoribus & perfectioribus animalibus, itique adultis natura sanguinem transcolari per pulmoneum parenchyma potius voluerit, quam, ut in cæteris omnibus, per patentissimas vias; quam nullam aliam viam & transitum excogitari posse intelligerent: si ve hoc fit quod majora & perfectiora animalia sunt calidiora, & cum sint adulta, eorum calor magis, ut ita dicam, igitur, & ad suffocationem fit progressivior; ideoque tranare & trajici per pulmones, ut inspiratio aëre contemperetur, & ab ebullitione & suffocatione vindicaretur; si ve quid aliud tale. Sed hæc determinare & rationem omnem reddere, nihil aliud agere est, quam propter quod pulmones facti sunt, speculari. Atque de his horumque usu & motu, & de eventatione omni, & aeris necessitate & usu, & cæteris hujusmodi; deque variis organis & differentibus hujus causa in ani-

malibus factis, tametsi multa quamplurimis observationibus me deprehensa sint, tamen, ne nimium à proposito de motu & usu cordis hoc loco aberrando aliud agere, & stationem relinquendo rem interturbare & subterfugere videar, hæc proprio tractatui convenientius exponenda relinquam. Et quæ resstant, ut ad propositum scopum revertar, transigam pergam.

Contentum autem in perfectioribus nimirum & calidioribus animalibus, itique adultis (ut in homine) sanguinem è dextro ventriculo cordis per venam arteriosam in pulmones, & inde per arteriam venosam in finitram auriculam, & subinde in ventriculum coelis finitrum permeare. Et primum posse hoc fieri, deinde ita factum esse nunc probatum eo.

C A P. VII.

Sanguinem de dextro ventriculo cordis per pulmoneum parenchyma permeare in arteriam venosam, & finitram ventriculum.

Fieri autem hoc posse, & nihil esse, quo minus fiat, satis constat, cum quomodo aqua per terrea substantiam permeans nivosos & fontes procreet, consideramus; aut quomodo per cutem sudores, vel per narium parenchyma urinae fluant, speculamur. Animadvertite inquit, qui Aquis Spadeubus vel de la Madonna (ut ajunt) in agro Patavino, vel aliis acidulis aut virgatis utuntur, vel qui ad congios ingurgitant potum, quemadmodum una aut altera hora post per vesicam emingant totum; cum tamen debeat ita copia aliquantulum in concoctione immorari, debeat per jecur (ut singulis diebus his ingesti alimenti succum omnes consentit facere), debeat per venas, per renem parenchyma, per ureteres in vesicam fluere.

Quos itaque audio tanquam impossibile & nullum modo credibile negantes, posse sanguinem, imo totam massam sanguinem, per pulmoneum substantiam aque, ac succus alimentalis per jecur permeare? Quid genus hominum (cum Poeta loquor) ubi volunt, concedant facile posse; ubi non volunt, nullo modo: hic ubi opus est veretur; ubi nihil opus, ibi non veretur affirmare.

Iecoris parenchyma densius multo est, & similiter renis: pulmoneum, rarioris multo texture; & si renibus & jecori conferatur, spongiosius.

In jecore nullum impellens, nulla vis cogens, in pulmone ex pulsu dextri ventriculi cordis impingitur sanguis, cuius impulsu diffendi vasa & porositates pulmoneum necesse est. Præterea pulmones in respirando elevantur & concidunt, quo motu necesse est, ut porositates & vasa aperiantur & claudantur, ut in spongiosis contingit, & in omnibus particulis habentibus constitutionem spongiosam, quando contrahuntur & rursus dilatantur. Contra jecur quiescit, nec ita dilatur & contrahitur visum est.

Denique, si nemo est, qui non asseret per jecur totum ingestorum succum in venam cavam tam in homine, quam in bove alisque maximis animalibus pertransire posse; & hoc propterea affirmare coacti sint, quod cum nulla alia extet via, tamen pertransiisse aliqua nutrimentum & permeasse in

Gg 3 venas

Gal. de uf. 129.

venas sit necesse, quandoquidem fiat nutritio: Cur non iidem argumentis de transitu sanguinis in adultis his per pulmones, fidem similem habent, & cum Colombo peritissimo doctissimoque Anatomico idem afferunt & credunt, ex amplitudine & fabrica vasorum pulmonum, & eo, quod arteria venosa & similiter ventriculus replet sit semper sanguine, quem & venis huc venisse necesse est, cum nulla alia sit quam per pulmones semita, ut & ille & nos ex ante dictis & autopsia, aliisque argumentis palam esse existimamus.

Sed quando aliqui funt, qui nil nisi adductus auctoritatis admittunt, iidem ex ipso etiam Galeni verbis hanc veritatem confirmari posse sciunt; scilicet non solum pulsi sanguinem & vena arteriosa in arteriam venosam, & inde in finitrum ventriculum cordis, & postea in arterias tranfmitti; sed etiam ex continuo pulsu cordis & pulmonum motu inter respirandum hoc fieri.

Sunt in orificio venae arteriosae, valvulae tres figmoides five semilunares, quae omnino sanguinem in illam venam arteriosam, qui immittitur non solum remeare in cor. Id quod norunt. Harum valvularum necessitatem & usum Galenus libavi de Vlu part. cap. x, his verbis explicans, *In toto est, inquit, vena anastomosis atque scissura apertio arteriae simul cum vena, transmittuntque ex se se pariter sanguinem & spiritum per invisibiles quasdam atque angustas plane vias. Quod si ex ista vena arteriosa iidem semper patuisset, nullamque natura invenisset machinam, qua claudere istam, cum est tempus, ac rursus aperire eam, fieri nunquam potuisset, ut per invisibilia atque exigua scissila, sanguis (contra thoracis arterias transiret). Neque enim similiter omnis ex quocumque attrahitur, neque emittitur. Sed quemadmodum quod leve est, facilius eo, quod gravius dilatatis instrumentis attrahitur, iidem autem contractis exprimitur: ita & per latam viam celerius aliquid, quam per angustam trahitur ac rursus emittitur. Cum autem thoracis contrahitur, pulsi atque intro compressi undique fortiter qui in pulmone sunt venosae arteriae, expriment quidem quam celerissime, qui in ipsis est, spiritum, transmittunt autem per subtilia illa scissila sanguinis portionem aliquam; quod nunquam accidisset profecto, si sanguis per maximam os (compressa est vena arteriosa ad cor) retro remeare potuisset. Nunc vero rectum per os magnum intersticio, dum comprimuntur, nudum, & scissila quidam in arterias per exigua illa scissila. Et paulo post loquente capitulo: Quanta thoracis contrahitur volumentum sanguinem eductum os ipsum occludunt, & nihil remeare sinunt. Quod & eodem capitulo decimo paulo ante: Nisi valvulae essent, triplex sequeretur incommodum: ut sanguis ipse frustra longum hoc curriculum subinde emittatur, in dissolis quidem pulmonis adhaeret, & quae in ipsis sunt, venas omnes repleant; in Systole vero, quasi alius quidam maritimus, insisteret Europi motum iidem huc atque illuc reciprocans, qui haudquaquam sanguinem converteat: at hoc quidem videri forte possit exiguum. Quod vero interim ipsum quoque respiratoris utilitatem labefaceret, id vero non amplius pro parvo est habendum, &c. Et paulo post: Atque etiam tertium secutum fuisse incommodum haudquaquam contemnendum, cum sanguis vero in expirationibus remigasset, nisi Opifex noster membranam epiphyris fuisse fabricatus. Vnde concludit cap. undecimo. Communis autem ipsarum em-*

nium, videlicet valvularum esse usum, ut materiae retro remigare prohibeant: utrumque vero proprium, educationem quidem ex corde materiae, ne amplius ex ipso effluat remeet; inducendum vero, ne amplius ex ipso effluat: non enim volebat natura vano labore cor fatigare, neque in eam partem aliquam emittere, unde trahere praestiterat, neque rursus ex illa iidem ducere, ad quam mittere erat necesse. Sed sunt quatuor omnino officia, bina in utroque ventriculo, alterum quidem inducens, alterum vero educens, &c. Et paulo post: Porro, cum vas alterum, quod tunica simplici constat in cor infigitur: alterum vero quod duplici, ex ipso producat, communem utroque locum, videlicet ventriculum dextrum: ita Galenus intelligit, & ego eadem ratione similiter finitrum ventriculum cordis] quasi cisternam quandam parari necesse fuit, ad quam pertinentibus utriusque, per alterum quidem trahatur sanguis, per reliquum vero emittatur.

Quod argumentum Galenus pro transitu sanguinis per dextrum ventriculum de vena cava in pulmones adducit, eodem nobis rectius pro transitu sanguinis & vena per cor in arterias, mutatis tantum terminis uti liceat. Ex Galeni igitur, viri divini, patris Medicorum, locis & verbis clare apparet, sanguinem per pulmones & vena arteriosa in arterias: venosae ramulos permeare, tum propter pulsum cordis, tum propter pulmonum & thoracis motum. Quinetiam cor continue in ventriculo quasi cisternam recipere & emittere sanguinem, & huius rei causa valvularum genera quatuor, duo inductioni, emissioni sanguinis duo inservire; ne aut sanguis Europi in morem inconvenientem agitur, huc, illic, aut retro remearet, unde trahere praestiterat, & ex illa relaberetur potius, ad quam mittere erat necesse. Et sic cor vano labore fatigaretur, & pulmonum respiratio prepediretur. Denique clare apparet assertio nostra, unde trahere praestiterat, & ex illa relaberetur potius, ad quam mittere erat necesse. Et sic cor vano labore fatigaretur, & pulmonum respiratio prepediretur. Denique clare apparet assertio nostra, unde trahere praestiterat, & ex illa relaberetur potius, ad quam mittere erat necesse.

Et itidem cum semper & continue ingreditur sanguis in cordis ventriculum dextrum, & egreditur continue & finitrum, quod similiter & ratione & sensu patet, quin continuo pertranseat sanguis & vena cava in Aortam impossibile est.

Illud igitur, quod in animalibus majore ex parte & plane omnibus donec adolescant, per patentissimas fieri vias ex dissectione manifestum est; illud inquam in adultis his per pulmonum caecos porositates & vasorum eorum ostia atque fieri tam ex Galeni verbis, quam ex ante dictis manifestum est. Vnde apparet, quod quanquam unus ventriculus cordis, videlicet finitrus sufficiens esset sanguinis dispensationi pro corpore & educatione & vena cava, quemadmodum etiam fit in omnibus quae pulmonibus caret; natura tamen cum voluerit sanguinem ipsum per pulmones transcolari, dextrum ventriculum superaddere coacta fuerit, cuius pulsu per ipsos pulmones & vena cava in finitrum ventriculum locum sanguis compelleretur. Et hoc modo dextrum ventriculum pulmonum causa factum

vide. Ref. maei distict. fusi Commentarii supra Galeni lib. de vlu part. Quam librum postquam haec vna sententia esset vide.

factum esse & ob translationem sanguinis, non ob nutritionem duntaxat, dicendum est. Quandoquidem tanto proventus annonae atque cum pulsu subministrato, & tanto puriori & spirituosiori (utpote immediate à ventriculis cordis subvecto) indigere alimento pulmones magis, quam aut cerebri purissima substantia, aut oculorum splendidissima & divina constitutio, aut ipsius cordis caro (quae rectius per arteriam coronalem nutritur,) inconveniens omnino est existimare.

C A P. VIII.

De copia sanguinis transmittenti per cor & vena in arterias, & de circulari motu sanguinis.

Hic utque de transfusione sanguinis & vena in arterias, & de viis, per quas pertranseat, & quomodo ex pulsu cordis transmittatur ac dispensetur; de quibus forsitan sunt aliqui, qui antea aut Galeni auctoritate, aut Columbi, aliorumque rationibus adducti assentiri se dicant mihi. Nunc vero de copia & proventus istius pertranseuntis sanguinis, quae resstant (licet valde digna consideratione) cum dixerio, adeo nova videbuntur & inaudita, ut non solum ex invidia quorundam metum malum mihi & fide verace, ne habeant inimicos omnes homines. Tantum consuetudo aut semel imbibita doctrina, alisque defixa radicibus, quasi altera natura apud omnes valet, & antiquitatis veneranda suspicio perloque cogit nos velut nulla putare. Vt cumque jam iacta est alea, spes mea in amore veritatis & doctorum animorum candore.

Sane postquam tum ex vivorum experimenti causa dissectione, & arteriarum apertione, disquisitione multimoda; tum ex ventriculorum cordis & vasorum ingredientium & egredientium symmetria & magnitudine, quam natura, nihil faciens frustra, his valis proportionatam frustra non fecit; tum ex concinno & diligenti valvularum & fibrarum artificio, reliquaque cordis fabrica; tum ex aliis multis saepius mecum & serio considerasse & animo diutius evolvissem, quanta scilicet esset copia transmissi sanguinis, & quam brevi tempore ea transmitteretur, nec tamen suppeditari illam ab ingenti alimentum succo posse animadverterem, quin venas inanitas & omnino exhaustas, arterias vero nimia sanguinis intrusionem diutius haberemus, nisi sanguis aliquo ex arteriis denuo in venas remearet, & ad cordis dextrum ventriculum regrederetur. Crepi egomet mecum cogitare, an motiorem quandam quasi in circulo haberet; quam postea veram esse reperi, & sanguinem & corde per arterias in habitum corporis & omnes partes protrudi & impelli à finitri cordis ventriculi pulsu; quemadmodum in pulmones per venam arteriosam à dextris: & rursus per venas in venam cavam, & usque ad auriculam dextram remeare, quemadmodum ex pulmonibus per arteriam dextram venosam ad finitrum ventriculum, ut ante dictum est.

Quem motum, circularem eo pacto nominare liceat, quo Aristoteles aerem & phlegma circularem superiorum motum æmulari dixit. Terra enim madida à sole calefacta evaporat, vapores sursum elati condensantur, condensati in pluvias rursus descendunt & terram madescunt, atque hoc pa-

cho sunt hae generationes, & similiter tempestatum ac meteororum ortus, à solis circulari motu, accessit & recessit.

Sic venis similiter contingit in corpore, motu sanguinis partes omnes sanguine calidiori perfecto, vaporoso, spiritoso &, ut ita dicam, alimentativo nutriti, foveri, vegetari: contra in partibus sanguinem refrigerari, coagulari & quasi effectum reddi, unde ad principium, videlicet Cor, tanquam ad fontem five ad lares corporis, perfectionis huius recuperanda causa revertitur; ibi calore naturali, potenti, fervido, tanquam vitae thesauri, denuo colliguntur, spiritibus &, ut ita dicam, balsamo praeagnis inde rursus dispensatur, & haec omnia à motu & pulsu cordis dependere.

Ita cor, principium vitae & fol microcosmi, ut proportionabiliter sol, Cor mundi appellari meretur, cuius virtute & pulsu sanguis movetur, perficitur, vegetatur, & à corruptione & gramefacta non vindicatur; suumque officium nutriendo, fovendo, vegetando toti corpori praestat. Lar iste familiaris, fundamentum vitae, auctor omnium; sed de his convenientibus, cum de huiusmodi motus causa finali speculabimur.

Hinc cum vena sit via quadam & vasa defarentia sanguinem, duplex est genus ipsarum, Vena & Aorta, non ratione lateris (ut Aristoteles,) sed officio; & non, ut vulgo, constitutione (cum in multis animalibus, ut dixi, in tunica crassitie vena ab arteria non differat,) sed munere & usu distincta. Vena & arteria ambae à veteribus vena eo immodico dicte sunt, ut Galenus annotavit; eo quod haec, videlicet arteria, vas est defrens sanguinem & corde in habitum corporis; illa, sanguinem ab habitu rursus in cor; haec, via à corde; illa usque ad cor; illa, continet sanguinem crudorem, effectum & nutritioni jam redditum indoneum; haec, coctum, perfectum, alimentarium.

C A P. IX.

De sanguinis circuum ex primo supposito confirmato.

Sed ne verba dare nos dicat quispiam, & assertiones speciosas tantum facere hinc fundamento, & non nulla de causa innovare: tria confirmanda veniunt, quibus positus, necessario hanc sequi veritatem & rem palam esse arbitror.

Primum, continue & continenter sanguinem & vena cava in arterias in tanta copia transmitti, pulsu cordis, ut ad assumptis suppeditari non possit, & adeo ut tota massa brevi tempore illinc pertranseat.

Secundum, continue æquabiliter & continenter sanguinem in quodcumque membrum & partem pulsu arteriarum impelli & ingredi majori copia multo, quam nutritioni sufficiens sit, vel tota massa suppeditare possit.

Tertium, ab unoquoque membrum ipas vena hunc sanguinem perpetuo retroducere ad cordis locum.

His positus, sanguinem circuire, revolvī, propelli & remeare à corde in extremitates, & inde in cor rursus, & sic quasi circularem motum peragere, manifestum fore potest.

Supponamus (vel cogitatione vel experimento) finitrum ventriculum in dilatatione, quam reple-

tus est, continere sanguinis uncias duas, tres, quatuor: ego in mortuo reperi ultra duas.

Supponamus similiter, quantum minus in ipsa contractione redditur vel quantum sefe contrahit cor, tanto ejus ventriculū minorem capacitatem habere in ipsa contractione vel contractionibus, adeoque partem aliquam sanguinis in arteriam magnam protrudi: (protrudere enim aliquid semper & ante demonstratum est cap. 111, & omnes in Systole fatentur, ex fabrica valvularum persuasi.) Verisimili autem conjectura ponere licet, in arteriam immitti partem vel quantam vel quantam vel sextam, & minimum octavam.

Quod si jam in homine protrudi singulis cordis pulsibus supponamus unciam semis vel drachmas tres aut unam tantum sanguinis, quæ propter impedimentum valvularum in cor remare non possit, cor autem una femihora plusquam mille pulsus faciat, imo in aliquibus & aliquando duo, tria, vel quatuor millia, si eos multiplices per drachmas, videbis una femihora tria vel duo drachmarum millia, vel uncias quingentas, aut tale aliquam proportionatam quantitatem sanguinis per cor in arterias transfundi, majori certe semper copia quam in universo corpore contingat reperi. Similiter in ovis aut cane quod pertransit, est aut scrupulum unum in una cordis contractione, tum una femihora mille scrupulos vel circa libras tres & semis sanguinis pertransire oportebit, cum tamen in eo corpore plerumque non contineatur plusquam quatuor libras sanguinis, uti in ovis expertus sum.

Ita tene, supputatione facta secundum minimum quod conjectare possumus transmissi sanguinis, & enumeratis pulsationibus, videbitur totam quantitatem massæ sanguineæ pertransire & venis in arterias per cor, & similiter per pulmones.

Sed etiam, quod non una femihora, sed una hora vel die uno, id fiat, nihilominus manifestum facit, plus sanguinis per cor ejus pulsu transmitti continue, quam vel ingestum alimentum possit suppetitare, vel in venis simul contineri.

Nec est dicendum, quod cor in sua contractione aliquando protrudat, aliquando non, vel quasi nihil & imaginarium quid. Hoc enim ante confirmatum est, & præterea sensu contrarium est & rationi. Si enim dilatato corde repleti necesse est ventriculos sanguine; contracto rursus necesse est protrudere semper, & quidem non parum, cum & ductus non parvi & contractio non parva sit. In quavis autem proportionem, videlicet subtripla, subseptupla vel suboctupla, similiter proportio sanguinis exclusi debet se habere ad ante contentum & in dilatatione replentem; ut si habet capacitas contracti ventriculi ad illam, quæ est dilatati. Et sicuti cum in dilatatione non contingit repleti nihil vel imaginario: ita in contractione nunquam nihil vel imaginarium expellit, sed semper aliquid secundum proportionem contractionis. Quare concludendum, si uno pulsu in homine, vel ovis, vel bove, cor emittit drachmam unam, & mille fusi pulsus in una femihora, contingit eodem tempore libras decem & uncias quinqve transmissas esse: si uno pulsu drachmas duas, libras viginti & uncias decem: si semunciam, libras quadraginta unam & uncias octo: si unciam, libras octoginta tres & uncias quatuor contingit,

inquam, in una femihora transfusus esse & venis in arterias.

Sed quantum in unoquoque protrudatur singulis pulsationibus, & quando plus aut quando minus, & qua de causa, accuratius post hæc ex multis observationibus à me forsā palam fiet.

Interim hoc scio, & omnes admonitos velim, quod aliquando uberiore copia pertransit sanguis, aliquando minore; & sanguinis circuitus quandoque citius, quandoque tardius peragitur, secundum temperamentum, ætatem, causas externas & internas, res naturales & non naturales, somnum, quietem, victum, exercitia, animi patetiam, & similia.

Verumenimvero cum per pulmones & cor vel minima copia transit sanguis, longe uberiori adhuc proventus in arterias & totum corpus ducitur, quam ab alimentorum ingestione aut omnino suppetitari possibile sit, nisi regressu per circuitum facto.

Hoc etiam palam fit sensu, vivorum dissectione multientibus, non solum si aperta magna arteria, sed (quod confirmat Galenus in ipso homine) quavis vel minima arteria dissecta fuerit, unus pene femihoræ spatio totam sanguinis massam in toto corpore, tam venis quam arteriis exhaustam fore.

Similiter laiones omnibus hoc fati attestari possunt, quando relictis arteriis jugularibus in macinando bove, minus unius horæ quadrante totam sanguinis massam exhauriant, & vasa omnia inania reddunt. In nemurorum excisione tumorum, quæ ex larga sanguinis profusione idem compemur aliquando brevi contingere.

Nec perfringit hujus argumenti vim, quod per venas efflueret in jugulatione & membrorum excitatione æque, si non magis, quam per arterias dicit quispian, cum contra se res habet. Venæ enim, quia subsident, quia in ipsis suis vix cogens foras sanguinem, & quia impedimento valvularum positio est (ut postea patebit,) parum admodum reddunt: arteriæ vero impetu impulsu sanguinem foras largius, impetuosius, tanquam cum syphone ejectum profundunt. Sed experienda res est, omnia vena & incisa jugulari in ovis vel cane; & quanto impetu, quanta protrusione, quam cito omnem sanguinem è toto corpore, tam venis, quam arteriis contingat inaniri admirabile videbitur. Arterias autem nullibi sanguinem è venis recipere, nisi transmissione facta per cor, ex ante didicis patet. Quod si ligando Aortam ad radicem cordis, & aperiendo jugularem vel aliam arteriam, foras arterias inaniri & venas repleri conspexeris, non potes amplius dubitare.

Hinc causam aperte videbis, cur in Anatome tantum sanguinis reperiatur in venis, parum vero in arteriis; cur itidem multum in dextro ventriculo, parum in sinistro; quæ res antiquis dubitanti occasione forsā præbuit, & existimandi, spiritus solos in illis cavitatibus contineri quamvis ultra superfluis animalis fuerit. Illius autem causa forsā est, quod è venis in arterias nullibi datur transitus, nisi per cor ipsum & per pulmones. Cum vero expiraverunt & pulmones moveri desierunt, è vena arteriole ramulis in arteriam veniam, & inde in sinistram ventriculū cordis sanguis perire prohibetur,

prohibetur, uti in Embryone ante notatum est prohiberi ob defectum motus pulmonum, oscilla & porositates coeas & invisibiles eorum aperientis claudique. Cum vero una cum pulmonibus cor non desinat moveri, sed postea pulsare & supervivere pergat; contingit sinistram ventriculū & arterias emittere in venas ad habitum corporis sanguinem, & per pulmones non recipere, & proinde quasi inanita inveniri.

Sed hoc etiam in rem nostram non parum facit fidei, quod hujus nulla alia causa, nisi quam nos ex nostra suppositione asserimus, adduci possit.

Præterea hinc patet, quod magis aut vehementius arteriæ pulsant, eo citius in omni sanguinis hæmorrhagia inanitur uti corpus.

Hinc etiam in omni Lipothymia, omni timore, & hujusmodi, quando cor languidius & infirmius, nullo impetu pulsant, omnem contingit hæmorrhagiam sedari & cohiberi.

Hinc etiam est, quod cor morte, postquam cor cessavit pulsare, non poteris vel è jugularibus vel cruralibus venis aut arteriis apertis ullo conatu massæ sanguineæ ultra partem mediam elicere. Nec lanio, si bovi, postquam ejus caput percussit, & attonitum reddidit, jugulum prius non secuit, quam cor pulsare desierit, totum sanguinem exhaustare ab eo poterit.

Denique hinc de Anatomosi venarum & arteriarum, ubi & quomodo sit, & qua de causa, nemo hactenus recte quidquam dixisse licet suspicari, ego in illa disquisitione jam funi.

C A P. X.

Primum suppositum de copia pertransfuentis sanguinis è venis in arterias, & esse sanguinis circuitum ab objectionibus vindicatur, & experimentis ulterius confirmatur.

HACTENUS primum suppositum confirmatum est, si res ad calculum revocetur, si ad experientiam & autopsiam referatur; videlicet, quod sanguis pertransit in arterias majori copia continue, quam ab alimento suppetitari possit, ita ut tota massa brevi spatio illac pertransfuerit, necesse sit, ut circuitus fiat & sanguis regrediat.

Verum si quis hic dicat, quod magna copia possit pertransire & non sit necesse circuitum fieri, quoniam ab assumptis refarciri queat, & exemplo esse lactis in mammis proventum: vacca enim una die lactis congios tres, vel quatuor, vel septem, vel plures reddit; mulier itidem duas vel tres heminas, infans unum duove lactans singulis diebus præbet, quas ab assumptis repleti manifestum est. Respondendum, quod cor tantumdem vel amplius una hora vel altera, computatione facta, remittere solet.

Sin vero nondum persuasus inest, usque dicendo, quod licet dissecta arteria, quasi data & aperta via, præter naturam contingat sanguinem cum impetu effundi; non tamen propterea integro corpore & non data exitu, & arteriis plenis vel secundum naturam constitutis, tantam copiam tantum brevi spatio pertransire debere, ut regressum fieri sit necesse. Respondendum, quod ex ante dicta computatione, subducta ratione, apparet, quoniam cor repletum ulterius continet in sua dilata-

tionem quam in contractione, tantumdem, majori ex parte, singulis pulsationibus emitti, & proinde in tanta copia pertransire infra corpore & secundum naturam constituto.

Sed in serpentinis & piscibus quibusdam, ligando venas per aliquod spatium infra cor, videbis spatium inter ligaturam & cor valde cito inaniri, ita ut regredi sanguinem (nisi autopsiam neges) asserere necesse habes. Posterius etiam idem clare patet in secundi suppositi confirmatione.

Hæc omnia uno exemplo confirmantes concludamus, quod sicut oculis propriis adhibere uniusquisque possit, si sanguinem vivum dissecuerit, videbit plusquam per integram horam cor placide, distincte, pulsare & sese tanquam vermem in contractione (cum oblongum sit) secundum longitudinem contrahere & propellere, in Systole albidior colore esse, contra in Diastole, & reliqua pene omnia, quibus evidenter hanc veritatem confirmatum uti diximus: hic enim omnia longiora & distinctiora magis sunt. Sed hoc peculiariter & luce clarius meridiana experiri licet. Vena cava partem inferiorem cordis subingreditur, exit arteria parte superiori; jam comprehensa vena cava vel tenaculis vel digito & pollice, sanguineque cursu intercepto, per aliquod spatium infra cor, videbis exinde statim pene inaniri illam partem intra digitos & cor, sanguine exhausto à cordis pulsu, simul cor albidior multo colore esse, etiam in dilatatione sua, & ob defectum sanguinis minus esse, & languidius tandem pulsare, sic ut emori denique videatur. Contra statim soluta vena, color & magnitudo redeunt cordi; postea si relinquas venam, & arterias similiter per aliquam distantiam à corde ligaveris vel compresseris, videbis contra illas turgere in parte comprehensa vehementer, & cor ultra modum distendi, purpureum colorem contrahere usque ad livorem, & tandem opprimi sanguinem, sic ut suffocatum iri credas: soluto vero vinculo rursus ad naturalem constitutionem in colore, magnitudine & pulsu redire.

Ecce jam, duo sunt genera mortis, extinctio ob defectum, & suffocatio ob copiam. Hæc ad oculos uterisque exemplum habere licet, & dictam veritatem autopsia in corde confirmare.

C A P. XI.

Secundum suppositum confirmatur.

SECUNDUM confirmandum à nobis quo clarius intuentibus appareat, annotanda sunt experimenta quedam, ex quibus pateat sanguinem in quodocunque membrum per arterias ingredi, & per venas remare; & arterias, vasa esse differentia sanguinem à corde; ad venas, vasa & vias esse regrediendi sanguinis ad cor. Præterea in membris & extremis sanguinem vel per anastomosis immediate, vel mediate per carnis porositates, vel utroque modo transire ab arteriis in venas, sicut ante in corde & thorace è venis in arterias: ut inde in circuitu moveri illum hinc illuc, huc iterum illinc, hoc est è centro in extrema & ab extremis rursus ad centrum manifestum fiat.

Quin etiam, computatione facta, similiter manifestum inde erit de copia, quæ neque ab assumptis

post suppetitari, neque ad nutritionem necessarium requiratur.

Simul etiam de ligaturis liquebit, quare attrahant, & quod neque calore, neque dolore, neque vi vacui, neque ulla antehac cognita causa id præstent, quam insuper commoditatem & usum afferre possint in medicina, & quomodo hæmorrhagiam supprimant aut provocent, & qua de causa gangrenas & mortificationes membrorum inducant, & sic in castratione animalium quorundam, & tumorum carnosorum & verrucarum exemptione uti possint.

Enimvero quia nemo horum omnium causas & rationes recte affecit fuit, hinc fieri solet, quod omnes fere ex antiquorum sententia in morbis curandis proponent quidem & consulant ligaturas, pauci vero recta earum administratione in curationibus suis aliquid adjumenti afferant.

Ligatura autem alia stricta est, alia mediocris.

Strictam ligaturam dico, cum ita arcte undique constringitur membrum fascia vel laqueo, ut ultra ipsam ligaturam nullibi arterie pulgare percipiantur. Tali utimur in membrorum excisione, fluxui sanguinis propitientes; & tali etiam utuntur in castratione animalium, & tumorum ablatione, quia ligatura affluxu alimenti & caloris omnino intercepto, tabescere & emori reticulos atque ingentes farcoses, & postea decidere videmus.

Mediocris vero ligaturam voco, quæ undique membrum comprimit, sed citra dolorem & sic, ut ultra ipsam aliquantulum arteriam pulsare sinat; qualis in attractione & sanguinis missione usus est: nam licet supra cubitum fiat ligatura, tamen arterias in carpo aliquantulum pulsare tacite percipies, si recte in phlebotomia fiat ligatura.

Iam experimentum fiat in brachio hominis, vel adhibita fascia, quali in sanguinis missione utuntur, vel ipsius manus fortiore comprehensione. Fiet autem illud commodius in macilento corpore & cui venæ sunt ampliores, & quando calefacto corpore calent extrema, & major quantitas sanguinis in extremitatibus erit, & pulsus vehementiores: omnia enim tunc evidentiora apparebunt.

Facta itaque stricta ligatura quam arcte fieri potest, ut quis eam ferat tamen, observare licebit primum ultra ligaturam manum versus non pulsare in carpo vel usum arteriam.

Deinde, immediate supra ligaturam incipere arteriam altius suam Diallolem habere, & magis altiusque & vehementius pulsare, & prope ipsam ligaturam atque quasi quodam intumescere, ac fluxum interceptum & transitum inhibuit perumpere & referare conaretur: magisterque arteriam, quam par sit, ibi repletam apparere. Denique, manum colorem suum & constitutionem retinere, solum tractu temporis refrigerari aliquantulum, sed nihil interitum attrahi in eam.

Postquam per aliquod spatium permanit ista ligatura, de repente paululum solvatur in mediocrem, quali ut dixi in sanguinis missione utuntur, & observabis manum totam statim colorari & distendi, & ejus venas tumidas & varicosas fieri; & supra decem vel duodecim pulsationum illius arterie, multo sanguine impulso atque impaço refertissimam manum cerne, & ab illa ligatura mediocri multam copiam sanguinis affatim attrahat

esse absque dolore, vel calore, vel fuga vacui, vel ulla alia antehac commemorata causa.

Quod si vero quis diligenter in ipso illius lotionis momento prope ligaturam digitum ad arteriam jam pulsantem applicaverit, quasi labtus præterlabentem sanguinem sentiet.

Ipsæ porro, & cujus in brachio fit experimentum, à solutione ligaturæ strictæ in mediocrem, plane calorem & sanguinem pulsi ingredientem, quasi femoto obstaculo, illico sentiet, & aliquid secundum ductum arteriarum, tanquam congestum inflatum & sparsum per manum transmissum percipiet, & continuo calefieri manum & distendi.

Quemadmodum autem in stricta ligatura, arterie supra ligaturam distenduntur & pulsant, non infra: ita hæc mediocri contra, venæ infra ligaturam turgent & renitentes fiunt, supra vero nequaquam & arterie minores redduntur. Imo, si venas tumidas non valde fortiter compresseris, vix ultra ligaturam aut sanguinem distendi aut venas distendi conspicies.

Ita ex his cuivis diligentius observanti facile est noscere, sanguinem ingredi per arterias. Etenim in stricta earum ligatura nihil attrahitur, manus colorem servat, nihil influit, neque fit distensio: ipsis vero paululum solutis usque ad mediocrem ligaturam, vi pulsus affatim sanguinem intus trudi, manumque tumidam fieri manifestum est. Nam cum arterie pulsant, ut in mediocri ligatura, sanguis profluit in manum: cum vero non, ut in stricta, nequaquam, nisi supra ligaturam. Cum in stricta, nequaquam, nisi per ipsas influere possit: cujus hoc est signum, quod infra ligaturam tumidiores multo sint, quam supra, & quam dempta ligatura multo esse, & quod compressæ nihil fluxum suggerant: ita ut, ligaturam impedire perionibus regressum sanguinis per venas ad superiorem, easque infra ligaturam tumidas facere & servare, clare pateat.

Arterie vero juxta de causa, non obstante mediocri ligatura, vi & impulsu cordis ab internis corporis partibus foras ultra ligaturam sanguinem trudent. Atque ista est differentia strictæ ligaturæ à mediocri, quod ista non solum transitum sanguinis in venis, sed in arteriis quoque interceptat: hæc, vim pulsificam, quo minus ultra ligaturam se exporrigat & ad extimas corporis partes propellet, sanguinem non impedit.

Adeo ut sic ratiocinari liceat: cum in mediocri ligatura venas turgidas & distensas esse, & manum plurimum sanguine impleri videmus, unde fit hoc? Sane oportet: aut per venas, aut per arterias, aut per cæcas porositates infra ligaturam sanguinem advenire. E venis, non potest; per cæcos ductus, minus, ergo per arterias, secundum quod dictum, necesse est. Per venas influere non posse, patet; cum non exprimi retro sanguinem contingat supra ligaturam, nisi quando ea prorsus ablata subito omnes venæ detumescere & se in superiores partes exonerare, manus dealbari, ac sursum omnis qui collectus erat & tumor & sanguis affatim evanescere conspiciuntur.

Amplius sentiet ipse, cui ita post multum spatium ligatus carpus aut brachium & manus tumidæ pauloque frigidiore inde reddite fuerint, sentiet, inquam, à solutione mediocri ligaturæ frigum

dum quid sursum usque ad cubitum vel axillas obrepere, una scilicet cum revertebat sanguine. Quem ergo frigidi sanguinis, post missionem ejus & solutum vinculum, recursum ad cor usque, in causa fuisse liphymiaz arbitror, quam etiam robustis aliquando supervenire vidimus, maxime à solutione ligaturæ; quod vulgo fieri dicunt à conversione sanguinis.

Præterea, cum statim à solutione strictæ ligaturæ in mediocrem per immisionem sanguinis in arterias, continuo venas intumescere videmus infra ligaturam comprehensas, non autem arterias; signum est, sanguinem ab arteriis in venas, & non contra permeare; & vel anastomosis valorum dari, vel porositates carnis & partium solidarum pervias sanguini esse. Item signum est, venas plurimas inter se communicare, quod in ligatura mediocri supra cubitum facta multæ attolluntur simul & turgent: ex una autem venula scalpello extra sanguini dato, omnes statim detumescunt & in illam unam sese exonerantes subsidunt simul pene omnes.

Hinc uniusquisque potest causas attractionis, quæ fit per ligaturas, & forsitan omnis fluxionis cognoscere. Nam quemadmodum in manu per istam, quam dico mediocrem ligaturam compressis venis sanguinis exire non potest: ita cum per arterias vi cordis impingitur, non potens exire, necesse est ut inde pars repleatur & distendatur.

Alias enim qui fieri potest? Calor & dolor & vis vacui attrahunt quidem, sed ut impleatur tantum pars, non ut distendatur, ut tumefiat ultra naturalem constitutionem, & ab insarctum & arcte impaço vi sanguinem tam violentè, tam subito opprimatur, ut caro continui solationem pari & vasa disrumpi cernantur. Hoc enim aut calore, aut dolore, aut vi vacui fieri posse, nunquam credibile aut demonstrabile est.

Insuper à ligatura contingit attractionem fieri, absque omni dolore, calore aut ulla vi vacui. Quod si à dolore aliquid accideret sanguinem attrahit, quo modo ad cubitum, ligato brachio, infra ligaturam intumescunt & manus & digiti & venæ varicosæ? Quod propter ligaturæ compressionem eo pervenire sanguis per venas non possit, & quare supra ligaturam in cubito neque tumoris aut repletionis signum, neque venarum turgescientia, neque omnino attractionis aut affluxus vestigium appareat?

Sed attractionis infra ligaturam, & tumefactionis ultra naturæ modum in manu & digitis, hæc causa manifesta; nempe, quod sanguis cum impetu & affatim ingreditur, exire vero nequeat. An illa vero omnis tumoris causa (ut est apud Avicennam) & omnis redundantiæ opprimentis in parte? Omnino; quia vi ingressus apertæ, egressus clausæ, unde impleri & in tumorem attolli necesse est.

An hinc etiam contingit in tuberculis inflammationis, quod quousque tumor incrementum capisset, & non est in ultimo statu, sentiat eum loci capillus plenus, præsertim in calidioribus tumoribus in quibus incrementum de repente fieri solet? Et si hæc ita sint, hinc præterea de copia computationem facere, & de circulari motu sanguinis argumentari aptissime possumus. Si etenim in sum? Ego è curru delapsus aliquando fronte per-

cusiebar eo loci, quo arteriæ ramulus à temporibus proreperit; statim ab ipsa percussione, spatio fere viginti pulsationum tumorem ovi magnitudine, absque vel calore vel multo dolore, passus sum; sane propter arteriæ vicinitatem, in locum consilium sanguis affatim magis & velocius impingebatur.

Hinc vero apparet, qua de causa in phlebotomia, quando longius profilire & majori impetu exire sanguinem volumus, supra sectionem ligentem tanta copia à partibus superioribus, ligatura illa non modo non adjuvaret, sed impeditur. Unde infra sectionem fieri ligaturam debere, quo sanguis inhibitus uberius exeat, veriusimilius est, si ex partibus superioribus eo per venas descendens per venas emanet: sed cum aliunde per arterias impellatur in venas inferiores, in quibus regressus per ligaturam præpeditur, venæ turgent & distentæ ipsum majorem impetu per officium elidere & longius ejicere possunt; soluta vero ligatura, & viasque regressus aperta, ecce non amplius nisi guttatum decidit, & quod omnes norunt, & sic vinctulum solvens in administranda phlebotomia, vel infra ligaveris, vel stricta nimis ligatura membrum constringis, tum sanguis absque impetu exire; quia scilicet via ingressus & influxus sanguinis per arterias intercepta est. Modice ergo stricta ligatura arteriarum, egressus liberior datur per venas, quam ligatura soluta.

C A P. X I I.

Esse sanguinis circuitum ex secundo supposito confirmato.

Hæc cum ita sint, constat confirmatum iri etiam illud, quod antea dicebam, nimirum per cor continuo sanguinem transire. Videmus enim ab arteriis sanguinem in venas dimanare, non è venis in arterias. Videmus insuper, vel pene totam massam sanguinis exhauriri posse ab ipso brachio, idque una vena cuticulari scalpello aperta, fit stat ligatura decens. Videmus præterea, ita impetuosè & affatim efflundi, non solum qui ante sectionem in brachio infra ligaturam comprehensus erat sanguis, sed & omnis ex toto brachio & toto corpore, tam arteriis quam venis, brevi & cito evacuetur.

Quare confiteri necesse est primo, vi & impetu suppetitari, & vi impingit infra ligaturam: vi enim & impulsu ejus, ergo & cordis pulsi & robore: vi enim & impulsu sanguinis ultra corde est.

Deinde, à corde provenire hunc fluxum, & per cor transitu facto è venis magnis hac effluere, si militer confiteri necesse est, cum infra ligaturam per arterias ingreditur, non per venas; & arteriæ nupsum sanguinem è venis recipiant, nisi è fuisse ventriculo cordis.

Neque omnino aliter ex una vena, facta supra ligaturam, tanta copia exhauriri ullo modo possit, præsertim tam impetuosè & affatim, tam facile, tam subito, nisi à corde, vi & impulsu ejus consecutio fiat hoc dicto modo.

Et si hæc ita sint, hinc præterea de copia computationem facere, & de circulari motu sanguinis argumentari aptissime possumus. Si etenim in phlebotomia quis sanguinem eo quo solet pro-

rumpere effusionis impetu, per femiorum profuere sineret, nulli dubium, quin maxima illius parte exhausta, lipothymia & syncope advenirent, & non solum arteria, sed & venæ magnæ penè inanita forent. Transire ergo rationabile est, femiora illo spatio tantundem è vena magna per cor in aortam.

Vterius, si quot unciae sanguinis per unum brachium persuant, vel quot in viginti vel triginta pulsationibus infra mediocrem ligaturam trudan- tur, suppetares, daret profecto occasionem cogi- tandi, quantum per aliud brachium interea, quan- tum per utrumque crus, per collum utrinque, per alias item omnes arterias & venas corporis per- transeat; quibus omnibus interim fluxus, qui per pulmones & cordis ventriculos fit, novum continuo sanguinem suggerere debet, & id quidem è venis: necessarium ergo est, circuitum fieri; cum nec suppetitari ab assumptis possit, & longe plus sit, quam partium nutritioni congruus erat.

Amplius observandum, quod in administranda phlebotomia quandoque contingat hanc verita- tem confirmari. Nam brachium quamquam rectè ligaveris, & scalpello debito modo venam secue- ris, aptatis orificiis & omnibus rite administratis, tamen si timor, vel liposychia animi pathemate aut quavis alia causa adveniat, & cor languidius pulset, nullo modo sanguis exhibi, nisi guttatim: praesertim si ligatura strictior paulo facta sit. Ratio est, quia compressam arteriam languidior pul- sus & impellens vis infirmior recludere, & san- guinem infra ligaturam trudere non valet: imo per pulmones deducere aut è venis in arterias co- piose transferre, enervatum & languidum cor non potest. Sic eodem modo & eisdem de causis con- tingit mulierum menstrua, & omnem hæmorrha- giam fedari. Ex contrariis etiam hoc pater; quo- niam redintegrato animo, amoto metu, cum ad se redeunt, jam adaucto robore pulsificante, arte- rias statim vehementius pulsare etiam in parte li- gata, & in carpo moveri, & sanguinem per orifi- cium longius proflire ac continuo ductu videbis.

C A P. XIII.

Terrium suppositum confirmatur, & ex eo, esse san- guinis circuitum.

HActenus de copia pertranscurrentis sanguinis per cor & pulmones in centro corporis, & similiter ab arteriis in venas in habitu ejus. Restat, ut explicemus, quomodo per venas ab extremitatibus retro ad cor sanguis remeet, & quomodo venæ vasa deferentia solum sanguinem ab extremitatibus ad centrum: quo facto, tria illa pro- posita fundamenta pro circuitu sanguinis, fore aperta, vera, stabilia & ad fidem illi faciendam suf- ficientia existimamus.

Hoc autem ex valvulis, quæ in ipsis venarum cavitatibus reperiuntur, earumque usu, & oculari- bus experimentis, fatiis erit aperire.

Clarissimus Hieronymus Fabr. ab Aquapenden- te, perissimus Anatomicus & venerabilis senex, vel ut voluit Doctiss. Riolanus, Jac. Sylvius pri- mus in venis membranæ valvulas delineavit fi- gura figmoides, vel semilunares portiunculas tuni- cæ interioris venarum eminentes tenuissimas. Sitæ

sunt distantibus in locis & vario modo in variis hominibus, ad venæ latera connatæ, & sursum versus venarum radices spectantes, & ambæ (ut plurimum enim duæ) sunt usque in mediam capa- citatem venæ se invicem respicientes atque con- tingentes, sequentium cornibus præcedentium convexæ medio alternatim semper respicientibus, in extremitatibus ita coherere ac copulari aptæ, ut si quid è radice venarum in ramos vel è majori- bus in minores permeare velit, omnino impediatur.





Harum valvularum verum usum Inventor non est affecturus, nec ali addiderunt. Non enim est, ne pondere decursum sanguis in inferiora totus ruat: in jugularibus namque deorsum spectant & sanguinem sursum ferri prohibent. Quin nec ubi- que sursum spectant, sed semper versus radices ve- narum & ubique versus cordis locum. Ego, ut alii etiam, aliquando in emulgentibus reperi, & in ramis mesenterii versus venam cavam & portam spec- tantes. Adde insuper, quod in arteriis nullæ sunt. Notare etiam licet, quod canes & boves habent valvulas omnes in divisione cruralium venarum ad principium ossis sacri, vel in ramis illis prope co- xendicem, in quibus nil tale timendum propter pronitatem corporis.

Nec, uti quidam ajunt, propter metum Apo- plexiæ sunt in jugularibus valvulae; quia materia in somno potius per arterias soporales influere in ca- put apta est.

Nec etiam, ut sanguis in divaricationibus sita- tur, atque in ramos exiles, nec totus in magis aper- tos & capaces irrueret: positæ enim sunt ubi nul- læ divaricationes, licet frequentiores conspici fa- teor circa divaricationes.

Nec denique, ut motus sanguinis à centro cor- poris retardetur solum: tarde enim satis sua spon- te è majoribus in minores ramulos intrudi, è massa & fonte separari, aut è locis calidioribus in frigi- diores migrare, verisimile est. Sed omnino valvu- læ factæ sunt, ne vel à venis magnis in minores moveretur sanguis, & sic illas dilaceraret aut va- ricolas efficeret; vel à centro corporis in extrema sed ut potius ab extremitatibus ad centrum pro- grediretur; ita enim huiusmodi valvulae tenues facile occluduntur, contrarium motum omnino supprimentes. Vnde & sic positæ & ordinate sunt, ut quidquid per cornua superiorum minus transira prohibetur, sed quasi per rimas elabatur, illud con- vexitas subsequens transversum posita excipiat & sistat, ne ulterius transeat.

Ego illud sapissime in dissectione venarum ex- pertus sum, si à radice venarum initio facto ver- sus exiles earundem ramos specillum immitterem quanto possem artificioso, ob impedimentum valvu- larum longius impellere non potuisse: contra ve- ro, si è ramulis radicum versus, facillime. Pluri- bus enim in locis valvulae binæ ad invicem ita po- sitæ, & aptatæ sunt, ut cum elevarunt, ad amussim in media venæ cavitate coherant & extremita- tibus convexis invicem uniantur tam prope, ut ne- que visu cernere, neque fatiis explorare simulam aut coitum liceat. Contra vero forissecus intro immisso stylo cedunt, & (valvarum in morem, qui- bus fluminum cursus inhibetur,) facillime reclina- nantur, ut motum sanguinis à corde & vena cava profectum intercipient, & ad amussim pluribus in locis



locis elevatione clausæ iñheant omnino & supprimant. Adeo ut neque sursum ad caput, neque deorsum ad pedes, aut latera brachii sanguinem à corde moveri sinant, ita enim sunt constituta, ut omni motui sanguinis, qui à majoribus venis aspicitur in minores definire velit, adversentur & obstitant: ei vero, qui à venis exilibus incipiens in majores definit, obsecundant liberamque & patientem viam expediunt.

Sed quo veritas hæc apertius elucescat, ligetur homini brachium supra cubitum, tanquam ad mittendum sanguinem, A A, per intervalla apparebunt præcipue in rusticis & varicosis, tanquam nodi quidam & tubercula B, C, D, D, E, F, non solum ubi est divaricatio E, F, sed etiam ubi nulla C, D, D: isti autem nodi à valvulis sunt. Hoc modo apparentibus valvularum nodis in exteriori parte manus vel cubiti, si pollice vel digito venam comprimendo sanguinem, de nodo five valvula O, submoveris, versus H [fig. 2.] videbis, inhiñentibus omnino valvulis inferioribus alium subsecui non posse, & venæ portionem H, O, infra tuberculum O & digitum detractum H, obliteratam, attamen supra tuberculum vel valvulam O, satis distentam O, G. Immo si ita submoto sanguine versus H, venam inanitam pressione digiti H, retinearis, & altera manu valvula O, [3. fig.] partem superiorem distentam deorsum compresseris in K, nulla vi cogi aut impelli sanguinem trans valvulam O, videbis, sed quanto majori conatu hoc feceris, tanto magis ad valvulam vel tuberculum O, venam turgentem distendi videbis, & tamen inferius vacuum esse H, O.

Hoc cum pluribus in locis experiri quis possit, appareat valvularum officium in venis idem esse cum sigmoïdarium illarum trium, quæ in orificio aortæ & venæ arteriole fabricatæ sunt, videlicet: ut ad amissum claudantur, ne retro sanguinem transeuntem remeare sinant.

Præterea ligato brachio uti prius in A A, & venis turgentibus, si infra tuberculum aliquod five valvulam venam firmaveris per aliquod spatium in L, [4 fig.] & postea sanguinem sursum supra valvulam N, digito M, compuleris, vacuum illam partem venæ quæ est inter L, & M, permanere videbis, nec retro sanguinem per valvulam regredi posse, ut est H, O, [2 fig.] ablato vero digito H, rursus repleti ab inferioribus, & esse ut D, C, [1 fig.] Atque hinc rursus ab inferioribus ad superiora & ad cor sanguinem moveri in venis, & non contrario modo, plane constat. Et licet aliquibus in locis (ubi aut unica tantum valvula est, aut plures, si adfuit, non satis exacte clauduntur) transitus sanguinis à centro ad extrema non videatur prorsus impediri, tamen ut plurimum ita, ut retruli, accidit; vel saltem quod aliqui negligenter fieri vident, illud ex subsequeantem in ordine valvularum vel frequentia vel diligentia vel alio modo compensari apparet, adeo ut venarum via patentes & aperta sint regredienti sanguini ad cor, progredienti vero à corde omnino occlusæ.

Porro, liga ut prius brachium & venis turgentibus, nodique five valvule apparentibus, infra aliquam valvulam in loco ubi subsequeantem invenieris, pollice venam firma ita, ut nihil à manu

sursum sanguinis progrediatur, deinde digito sanguinem ab illa venæ portione sursum supra valvulam L, N, exprime eo quo ante dictum est, modo, & alio iterum digito L, fine rursus repleti ab inferioribus D, C, & rursus appresso pollice identidem sursum exprime sanguinem L, N, & H, O, idemque milles in brevi tempore repete, ac postmodum hoc quod singulis à compressione laxationibus supra valvulam sursum vivit, quantum sanguinem fuerit, supputa, facta multiplicatione per numerum millenarium reperies tantum sanguinis hoc modo per unius duntaxat venæ partem in non longo tempore transmissum esse, ut de circuitu sanguinis, ab ejus celeri motu, te persuasissimum putes.

Sed ne hoc experimento naturæ vim asseri dicas, in longe distantibus valvulis idem fac & observa quam cito ablato pollice quaque celeriter sanguis sursum percurrat, & venam ab inferiori parte repleat, neque dubito, quin satis pro explorato hoc, quod dixi, sis habiturus.

C A P. XIV.

Conclusio demonstrationis de sanguinis circuitu.

I Am denique nostram de circuitu sanguinis sententiam ferre, & omnibus proponere liceat.

Cum hæc confirmata sint omnia & rationibus & ocularibus experimentis, nimirum, sanguinem per pulmones & cor pulsu ventriculorum ejus pertransire, in universum corpus impelli atque immittere, ibi in venas & porositates carnis irrepere, per ipsas iterum venas undique de circumferentia ad centrum ab exiguis venis in majores remeare, illic in venam cavam, & ad auriculam cordis tandem venire, tanta quidem copia, tanto fluxu ac refluxu hinc per arterias illuc & illinc per venas hæc retro, ut ab assumptis suppeditari non possit, quin multo uberiori proventu quam requirit noster; cum, inquam, hæc omnia confirmata sint, necessario concludendum est, circuli quodam motu ac circuitu in animalibus sanguinem agitari, & esse in perpetuo motu; quin ad hoc esse actionem five functionem cordis, quam pulsu peragit, denique motus & pulsus cordis causam omnino unam esse.

C A P. XV.

Sanguinis circuitus rationibus verisimilibus confirmatus.

S Ed hoc etiam subjungere non abs re fuerit, secundum communes quasdam rationationes ista ita se habere & conveniens esse & necessarium. Primum cum mors, secundum Aristotelem lib. de respirat. & lib. 11, ac 111 de Part. anim. & alibi, sit corruptio propter calidi defectum, & vivencia omnia calida, morientia frigida exsistant, oportet caloris locum aliquem & originem esse, quasi lares focumque, in quo nature fomites & primordia ignis nativi contineantur & conserventur, à quo calor & vita in omnes partes tanquam ab origine profluant, alimentum adveniat, concoctio denique & nutritio, & omnis vegetatio dependeat.

Hunc autem locum cor esse, & hoc principium vite,

vita, & eo etiam quo dictum est modo, neminem velim dubitare.

Sanguinis itaque motu opus est, atque tali, ut ad cor rursus revertatur: nam in externis corporis partibus amandatas longe à suo fonte, immotus coagularetur, ut Aristoteles testatur lib. 11 de Part. anim. tum à frigore extremorum & ambientis, tum spiritibus, ut in mortuis, destitutus. Calorem autem & spiritus motu generari & conservari videmus, ut quiete evanescere. Quare ne istud sanguini accideret, necesse fuit, ut semper iterum à fonte & origine tam calorem quam spiritus, & omnino præservationem suam repeteret, & revertendo reintegraret.

Videmus quemadmodum à frigore exteriori extremitates aliquando algeant, nasus & manus & genæ quasi mortuorum livida appareant, sanguis in ipsis (qualis cadaverum locis pronis solet decumbere) livore consistat, & membra adeo torpida & agere mobilia evadant, ut vitam pene amissile videantur. Nullo modo profecto rursus (præsertim tam cito) calorem, colorem & vitam recuperarent, nisi novo ab origine affluxu & appulsi caloris foverentur. Attrahere enim quomodo possunt, quibus calor & vita pene extracta sunt aut quibus meatus condensati & gelato sanguine repleti? quomodo adveniens admittent alimentum & sanguinem? nisi contentum dimiserint, & nisi omnino cor sit, tale principium, in quo cælestes lib. de respirat. cap. 111 est, unde novo per arterias transmissio sanguinis calido ac spiritibus imbutio quod frigiditatem & effectum est resocilletur omneque adeo particule calorem sanguinem & vitam fomitent pene extinctum reparant.

Atque hinc est, quod cæteris omnibus partibus vita restitui, & sanitas recuperari, corde illaso, possit. Corde vero vel refrigerato, vel vitio gravi aliquo affecto, totum animal pati & corrumpi necesse sit; quia videlicet principium corruptum & patitur, & nihil sit, ut Aristoteles lib. 111 de Partib. animal. dicit quod aut ipsi aut cæteris, quæ ab ipso dependit, præbere auxilium possit. Et hinc obiter forsitan ratio petatur, cur à merore, amore, invidia, curis & hujusmodi, tabes & extenuatio contingant, aut cacochymia & proventus cruditas, quæ & morbos plurimos inducant & homines conficiant. Omne namque animi pathema, quod cum dolore, gaudio, spe, aut anxietate humanas mentes exagitat, ad cor usque pertingens & imbi mutationem à naturali constitutione in temperie & pulsu & reliquis faciens, si in principio totum alimentum inquiet, & vires infirmæ, minime mirum videri debet, quod varia genera morbum incurabili in membris & corpore subiret procreet; quandoquidem totum corpus in illo calu, vitio alimentum, inopia calidi nativi laborat.

Præter hæc, cum alimento vivant omnia animalia interius concocto, necesse est concoctionem perfectam esse & distributionem, & provide locum & conceptaculum adesse, ubi perficiatur alimentum & unde derivetur in singula membra. Hic autem locus, cor est; utpote quod solum ex omnibus partibus non solum in venâ & arteria co-

ronali, privato usui, sed potissimum in cavitatibus suis, auriculis scilicet & ventriculis, tanquam in cisternis & promptuario, publico usui sanguinem continet: cum interim reliquæ omnes partes sui ipsius tantum causa & privato usui & in vasis duntaxat sanguinem habeant. Tum etiam quod solum cor ita situm & constitutum sit, ut pulsu suo in omnes partes fecundum justitiam & proportionem cavitatum arteriarum, unicuique particule interventionem, æqualiter dispenfare sanguinem, distribuere, & indigentibus quasi è thesauro & fonte largiri queat.

Amplius, ad hanc distributionem & motum sanguinis, impetu & violenta quadam impulsione opus est; qualem cor præstat facile, tum quia sanguis sponte sua versus illud quasi principium (nimirum partis ad totum, vel guttæ aquæ sparsæ super tabulam ad massam) facile concentratur & coit, vel uti celerissime alias a frigore, timore, horrore & hujusmodi causis aliis solet: tum quia & venis capillaribus in minores furculos & inde in majores ramos exprimitur motu membrorum & musculorum compressione, proclivis est magis & pronus sanguis, ut & circumferentia moveatur in centrum, quam è contrario, etiam nullæ valvule impedimento forent; unde ut principium relinquat, & loca stricta frigidaque adeat, & contra spontaneum moveatur, tum violentia opus habet sanguis, tum impulsione, qualem cor solum eo, quo dictum est modo, præstat potest.

C A P. XVI.

Sanguinis circuitus ex consequentibus probatur.

S Ut insuper problemata nonnulla, quæ ex hac veritate supposita tanquam consequentia deprent, ad fidem veluti à posteriore faciendami non sunt inutilia, & quæ, cum alias multa ambiguitate & obscuritate involuta videantur, hinc & rationem & causas assignari facile patiantur.

Cur, quod in contagione videmus, in ictu venenato, & serpente aut canis rabidi morsu, in lue venerea, & hujusmodi aliis, illa pars particula contacta tamen totum habitum contagio vitari? Sic enim lues venerea, illas aliquando genitalibus quibus contrahitur, primo omnium vel scapularum vel capitis dolore, aliisve symptomatibus sese prodere solet: & vulnera facta à morsu canis rabidi, jam curato, febrem tamen, aut reliqua horrenda symptomata supervenisse experti sumus. An, quia in particulam impressum contagium una cum revertente sanguine ad cor fertur; & inde rediens totum corpus postea inquinat? Possit fieri paroxysmo hinc patet: In tertiana febris morbosica causa principio cor petens, circa cor & pulmones immoratur, & anhelosus, suspensius, ignavus facit; nempe quia principium vitæ aggravatur & sanguis in pulmones impingitur, incrassatur, nec transit (hoc ego ex sectione illorum, qui in principio accessions mortui sunt, expertus loquor) unde semper pulsus frequentes & parvi, & quandoque inordinati sunt; aducto vero calore, materia attenuata, viis apertis, & transitu facto incallescere incipit universum corpus, pulsus majores ac vehementiores redduntur, & fit paroxysmus febrilis: scilicet tunc, cum calor præternaturalis

accensus in corde, inde in totum corpus per arterias diffunditur, una cum materia morbifica; quæ eo modo à natura exsuperatur ac dissolvitur.

Cur etiam exterius applicata medicamenta vires intro exercent suas, ac si intro sumpta essent? Nam constat Colocynthidem & Aloë, ventrem solvere; Cantharides, urinas movere; Allium, plantis pedum aligatum sputa expectorare: & cordialia corroborare, & hujus generis infinita alia fieri. An quia venæ per officia sua ab exterius ad motus absorbent aliquid & intro cum sanguine deferunt, eodem modo, quo illæ in melenario ex intestinis chylum exugunt & ad jecur una cum sanguine appointant. Non irrationabile forsitan est hoc dicere. In melenario etenim sanguis per arterias celiacas, meleniticam superiorem & inferiori ingressus, ad intestina progreditur; à quibus una cum chylo in venas attracto per illarum venarum frequentissimas ramificationes in portam jecoris revertitur, & per ipsum in venam cavam. Sic contingit, ut sanguis in his venis eodem fit imbutus & colore & consistentiæ eadem qua in reliquis, contra quam plures opinantur. Neque sic duos contrarios motus in omni capillari earum propagine, chyli nempe sursum & sanguinis deorsum inconvenerint fieri, necesse est improbabili ter existimare. Sed an non summa natura providentia hoc fit? si enim chyli cum sanguine, quod cum concocto, æquis portionibus confunderetur, non concocto, transmutatio & sanguificatio exinde proveniret, sed magis (cum invicem activa & passiva sint) ex alterutrorum unione mixta & medium quid, ut in perfusione vini cum aqua & oxycrato. Iam vero quando cum sanguine præterlabente multo exigua portio chyli & nulla quasi notabili proportionem miscetur, sanguis naturam suam servat, nihilo secus quam si (quod ait Aristoteles) unam guttam aquæ adjeceris vini doctum, aut è contra, totum non mistum erit, sed vel vinum vel aqua. In venis certe melaëraicis diffectis non chymus, non chylus & sanguis, aut separati, aut confusi reperiuntur, sed idem qui in reliquis venis & colore & consistentiæ sanguis ad sensum apparet. In quo tamen quia chyli quiddam incoctum (licet insensibiliter) inest, natura jecur appoluit, in cuius mæandris moras trahat & plenior transmutationem acquirat, ne præmature crudum ad cor perveniens vitæ principium obruat. Hinc in Embryone pene nullum ulum jecoris esse probat vena umbilicalis jecur manifeste integra pertransiens & foramen vel anastomosis per quam cum vena portæ jecoris jungitur, ut sanguis regrediens ab intestinis foetus, non per jecur, fed in dictam umbilicalem transiens una cum materno sanguine & reverteat à placenta uteri cor petat. Vnde etiam in prima foetus conformatione jecur posteriore fingitur. Nos in fœtu humano observavimus perfectè delineatæ omnia membra, imo genitalia distincta, nondum tamen jecoris posita pene rudimenta. Et sane quousque membra (uti & cor ipsum in initio) omnia alba apparent, & præterquam in venis nihil usquam ruboris continetur, nihil præter rudem & quasi extraneatam sanguinis collectionem loco jecoris videtur, quam confectionem potius quandam vel ruptam venam existimares. In ovo duo quasi vasa umbilicalia inve-

niuntur: unum, ab albumine integrum pertransiens jecur & ad cor recta tendens; alterum, à luteo in venam portæ definens. Etenim in ovo pullum primum ex albumine tantum formatur & nutritur, à luteo vero post perfectionem & exsolutionem: nam intra intestina in ventre pulli contentum post multos dies ab exsolutione luteum reperitur, respondetque luteum nutrimento lactis cæterorum animalium.

Sed hæc convenientius in observationibus, ubi hujus generis problemata plurima proponi possunt de tempore conformationis & principatu membrorum: uti cur hoc prius factum aut perfectum sit, illud vero posterius: cur unum supra aliud & quod principatum gerat, & quamnam particulam alterius causa sit?

De Corde itidem plurima; uti cur primum (Anst. lib. 1.11 de part. animal.) consistat, & habere videatur in se vitam, motum & sensum, antequam quidquam reliqui corporis perfectum sit?

Et similiter de sanguine, quare antea omnia? & qualiter principium vitæ & animalis habeat, & moveri atque huc illuc impelli desideret? & an ejus causa cor factum videatur?

Eodem modo in pulsum speculatione, cur nempe lethales aut salutares sint, quales causas singula coram genera habeant, quid & quare hoc illudve significet aut præsignat? In Crilibus quod & expurgationibus nature, in nutritione & præsertim in distributione alimenti, uti & in omni fluxione; qui denique in omni parte medicine, Physiologica, Pathologica, Semiotica, Therapeutica, cum quot problemata determinari possunt ex hac data veritate & luce, quot dubia solvi, quot obscura dilucidari, animo mecum reputo, campum invenio spatiosissimum, in quo longius excurrere & adeo late expatiari queam, ut non solum in volumine excreceret præter institutum meum, hoc opus; sed mihi forsitan vita ipsa ad finem faciendum deficeret.

In præsentiarum igitur solummodo ea, quæ in administranda Anatome circa fabricam cordis & arteriarum comparant, ad suos usus & causas veras referre enitar. Nam sicuti plurima ubique, quo etiam me convertam, reperiuntur, quæ ex hac veritate lucem recipiunt, & hanc vicissim illustrant, ita istam omnino anatomicis argumentis firmatam & exornatam præ cæteris volo.

Est unum, quod licet inter observationes nostras de hienis usu locum habere deberet, tamen hic quoque obiter annotare non erit impertinens. A Ramo splenis in pancreas deducto, parte superiore, oriuntur venæ coronalis, postica, gastrica, & galstro-epiploica; quæ omnes plurimis furculis & ramificationibus diffeminantur in ventriculo, veluti melaëraice in intestina: similiter à parte inferiore illius rami splenis deorsum in colon & longanoneum usque deducitur vena Hæmorrhoidalis. Per has venas utrinque sanguis regrediens & fecum crudiores, hinc à ventriculo aqueum & tenuem nondum perfectè Chylificatione, illinc crassum & terrestriorem, tanquam & fecibus acceptum fecum reportans, in hoc ramo splenico contrariorum permissione conveniunt attemperatur, & nature beneficio (quæ ambos hos succos propter contrarias indispotiones diffi-

cilioris

cilioris coctionis, permiscet invicem & multa copia calidioris sanguinis à liene uberrime per multiplices arterias (saturientis perfundit) preparatur magis ad jecoris portas adducitur; adeo & defectus utrorumque extremorum tali venarum fabrica abunde suppletur & compensatur.

C A P. XVII.

Confirmatur sanguinis motus & circuitus ex apparentibus in Corde; & illi, quæ ex diffinitione Anatomica patent.

Cor non in omnibus animalibus invenio distinctam esse & separatam particulam. Quædam enim cor non habent, ut Zoophyta live plant-animalia, & animalia quæ sunt frigidiora, exigue corpulentæ, mollioris texture, similis cujusdam constitutionis, ut erucarum genus & lumbricorum, & quæ ex putredine oriuntur, neque servant speciem. His cor non est, quod non habeant opus impulso, quo alimentum in extrema deferatur. Corpus enim connatum & unum abque membris indistinctum obtinent, sic ut contractione & relaxatione totius corporis intro sumant & expellant, moveant & removeant alimentum. Plant-animalia dicta, ut ostra, mytili, spongiæ, & Zoophytorum genera omnia, cor non habent, quia pro corde toto corpore utuntur, & quasi totum cor, hujusmodi animalia sunt.

In plurimis & pene omnibus insectorum generibus, propter corpulentiam exiguitatem dicemere singula recte non possumus, atque in apibus, mulcis, crabronibus, & hujusmodi licet aliquando opus perspicillibus, insuper quiddam intruci, uti & in pediculis; in quibus insuper transitus alimenti per intestina (cum transfluidum sit animal) quasi maculam nigram cernere clare poteris multipliciter illius specilli ope: sed in exanguibus & frigidioribus quibusdam, ut cochleis, conchis, squillis, crustatis, & similibus omnibus inest pulsans particula, quasi vesicula quædam vel auricula sine corde, sed quæ rarius se contrahat & pulsum suum edat, & quem non nisi æstare aut calidiori tempestate discernere liceat.

In his vero ita se habet ista particula, quia impulsu aliquo opus est ad alimenti distributionem propter partium organicarum varietatem aut densitatem substantiæ; sed ob frigiditatem rarius sunt pulsationes, & quandoque non omnino, prout convenientis illis est, quæ dubiæ sunt nature; ita ut quandoque vivere, quandoque emori videantur, & quandoque vitam animalis agere, quandoque plantæ. Quod etiam insectis videtur contingere, cum hyeme latent & quasi mortui occulantur, vel plantæ vitam tantummodo agant. Sed an idem etiam quibusdam sanguineis animalibus accidat, ut ranis, testudinibus, serpentibus, hircundinibus, non injuria dubitare liceat.

In animalibus autem majoribus, calidioribus, utpote sanguineis impulsu alimenti, & cum vi forsitan majori, opus est: prout de piscibus, serpentibus, lacertulis, testudinibus, ranis & hujusmodi aliis, tum auricula, tum cordis ventriculus unus datus est. Vnde & verissimum illud Aristotelis lib. 1.11 de Part. animal. quod nullum sanguineum animal careat corde, quo impulsore validiore &

robustiore non uti ab auricula agitur solum alimentum, sed longius & celerius insuper protrudatur.

Ideo in adhuc majoribus, calidioribus & perfectioribus animalibus, utpote plurimo ferventiori & spirituosius sanguine abundantibus, quo alimentum celerius fortiusque, & impetu majore propter corporis magnitudinem aut habitus densitatem, protrudatur magis robustum cor & carnosius desideratur.

Insuper, quia perfectioribus animalibus perfectiori opus est alimento & uberiori calore nativo, ut alimentum melius conquireretur & plenam perfectionem nasceretur, pulmones illa & alterum cordis ventriculum, qui per ipsos pulmones alimentum trudit, habere conveniebat.

Sic quibuscumque insunt pulmones, illis duo simul ventriculi cordis sunt, dexter & sinister: & cuiusque dexter, ei finititer quoque inest; non è contra, qui finititer, ei dexter quoque. Sinistrum vero ventriculum voco usu, non situ distinctum, videlicet cum, qui sanguinem in totum corpus diffundat, per in pulmones folum. Hinc finititer ventriculus per se cor effecere videtur, & in medio situs, scrobiculis altioribus ita insculptus & majori diligentia fabricatus est, ut cor finititer ventriculi gratia factum videatur, & dexter ventriculus quasi familiaris finititer, utpote qui nec ad conum ejus peringat, & tenuiori triplo pariete fit, & quasi articulationem quandam (ut Aristoteles loquitur) supra sinistram habeat: majore interrim capacitate fit, tanquam qui non solum finititer materiam, sed & pulmonibus alimentum præbeat.

Notandum vero, quod in Embryone aliter ista se habeant, & non tanta differentia fit ventriculorum, sed tanquam in nucis nucleis gemellis, æqualiter penè se habeant, & dextri conus ad finitrem summitatem pertingat, ut cor in his tanquam duplici apice in cono sit. Atque hæc idcirco quia in his, dum sanguis non transit per pulmones, utique tamen de dextro cordis sinu in finitrum, ambo hi per foramen ovale & transitum arteriosum, ut dictum est, idem officium traducendi sanguinem è vena cava in arteriam magnam pariter præstant, & in universum corpus impellunt æqualiter: unde æqualis constitutio. Cum vero pulmones usui esse, & uniones dictas occludi tempestivum est, tum hæc differentia ventriculorum incipit in robore & reliquis exerere, & dexter duntaxat per pulmones, finititer per totum corpus impellit.

Ultra hæc etiam in corde lacertuli ut ita dicam, five carnosæ virgulæ & fibrosi nexus plurimi (quos Aristot. lib. de respirat. & lib. 1.11 de part. anim. nervos vocat) reperiuntur, qui partim separatim diverso modo tenduntur, partim in parietibus & mediastino, altis factis scrobiculis, sulcatim reconditi tanquam musculi quidam parvi contrahuntur. Sunt autem ad roborem & validiorem impulsu sanguinis, & confectionem cordis quasi succutientarii, & superadditi cordi ad ulteriorem expulsiorem sanguinis auxiliares, ut cordi undiqueque se contrahenti (tanquam in navi funium diligens & artificiosus apparatus) in sanguine plenius & validius è ventriculis expellendo undique adjuvamento forent.

Hoc autem ex eo manifestum est, quod in quibusdam animalibus sunt, in quibusdam minimis, & omnibus quibus sunt, illis plures & fortiores sunt in sinistro, quam dextro; quibusdam itidem animalibus in sinistro sunt, in dextro vero nequaquam; item quibus plures in sinistro, quam dextro ventriculo; & plures in ventriculis, quam auriculis; imo aliquibus in auriculis quasi nulli reperiuntur: in Torosis quoque & mulcosis agrestibus corporibus, & durioris habitus, plures; in tenellis vero & foeminis, pauciores.

In quibus animalibus ventriculi cordis intus levissimos, omnino absque fibris, lacertulis, neque serotibus filli sunt, ut in avibus minoribus pene omnibus, serpentibus, ranis, testudinibus, & hujusmodi; perditae etiam, gallina, & piscium maxima parte: in his neque nervi five fibrae dictae, neque valvulae tricuspides in ventriculis reperiuntur. In quibusdam animalibus dexter ventriculus intus levissimus, similiter vero fibrosus illos nexus habet, ut in anserem, Cygno, & avibus gravioribus. In his eadem est ratio, quae in omnibus. Nam cum spongiosum & rari & molles sunt pulmones, ad protrusionem sanguinis per ipsos vim tantam non deficiant, ac proinde in dextro ventriculo aut non sunt illae fibrae, aut pauciores infirmioresque, neque ita carnosae, aut multas emulantes. Sinistro vero sunt & robustiores, & plures, & carnosiores, & mulcosius, quia sinister ventriculus majori robore & vi opus habet, quod per universum corpus longius sanguinem prosequi debuit.

Et hinc etiam sinister ventriculus medium cordis locum occupat, & triplo crassiori pariete & robustiore est quam dexter. Hinc inter omnia animalia non tantum, sed & inter homines similiter, quanto quolibet densiori, duriori, & solidiori habitu corporis est, & quanto magis carnosae lacertosaeque habent extrema membra, & magis austeritate: tanto fibrosius magis & crassius, robustius, & mulcosius habent cor. Idque manifestum est, & necessarium. Quanto contra rariore textura & molliori sunt habitu, & corpulentia minore; tanto flaccidius, mollius, & intus minus aut omnino non fibrosus & encervatus cor gerunt.

Valvularum similiter signiformium & tricuspideum usum considera: quarum istae ideo factae sunt, ne semel immixtus sanguis in cordis ventriculo regeatur. Haec in officio arteriosae venae & aortae constitutae dum sursum elevantur & invicem conjunguntur triquetram lineam, qualis ab hircum morfu relinquatur, effingunt, quo artius obferat, sanguinis refluxum arcant promittus.

Tricuspides in introitu à vena cava & arteria venosa janitores sunt, ne cum maxime impellitur sanguis, retrorabatur; & ea de causa non insunt omnibus animalibus, ut dixi; neque quibus insunt, eadem naturae solertia factae apparent, sed in aliis exactius, in aliis remissius & negligentius, ut claudantur pro majori vel minori impulsione à ventriculorum contractione facta. Ideo in sinistro ventriculo, uti ad majorem impulsione diligenter oculo fiat, duo tantum sunt insit mittere, ut exactissime claudantur & longe in comum per medium pertingant: (quae res imposuit forsitan Aristoteli, ut hunc ventriculorum duplicem, sectionem

ne per transversum facia, existimaret.) Similiter profecto, ne retro in arteriam venosam labatur sanguis, & exinde robur finitri ventriculi exolvatur in propellendo eo per universum corpus, ideo valvulae istae mitrales mole & robore, & exacta clausura, illas in dextro positas exuperant. Hinc etiam necessario nullum cor sine ventriculo conficitur, cum lacunar & fons & promptuarium esse sanguinis debeat. Idem vero in cerebro non semper contingit. Avium enim genera pene omnia nullum habent in cerebro ventriculum, ut patet in anserem & cygno, quorum cerebrum cerebro cuniculi pene magnitudine aequatur. Cuniculi autem ventriculus licet in cerebro habeant, anser tamen non habet. Similiter ubicunque cordis ventriculus unus, ibi una auricula appendet, flaccida, cuticularis, intus cava, sanguine referta; ubi duo ventriculi, duae similiter auriculae. Contra vero auricula dextera inest aliquibus animalibus (non autem cordis ventriculi,) vel saltem vesiculae auriculae analogae; vel vena ipsa, in loco dilatata, pulsum facit; ut videtur in crabronibus, & apibus, & aliis insectis, quae non solum pulsum habere, sed & respirationem in illa parte quam caudam nominant, (unde ipsam elongare, & contrahere contingit modo frequentius, modo rarius, prout antelohi magis videntur, & aere magis indigent,) experimentis quibusdam me possum demonstrare arbitror. Sed de his in tractatu de respiratione.

Auriculas similiter pulsare, apertum esse; quin & esse contrahere, ut ante dixi, & sanguinem in ventriculos conjungere. Vnde, ubicunque est ventriculus, auriculae necessariae est, non solum, quod vulgo creditur, ut sit sanguinis receptaculum & promptuarium (quid enim opus est pulsatione ad retinendum?) sed sanguinis motores primi sunt auriculae, praesertim dextra, primum vivens, ultimum moriens, ut ante dictum est, ideoque necessaria, ut scilicet sanguinem in ventriculum subversus infundat. Qui ventriculus continuo (se ipsum contrahendo) jam ante in motu existentem sanguinem commodius elidit, & violentius propellit, ut cum ludis pilae, à reverberatione percussa fortius & longius, quam simpliciter projecta impellitur. Quin etiam, contra vulgarem opinionem, quia neque cor, neque aliud quidquam seipsum distendere sic potest, ut in se ipsum attrahere sua distorque quicquam possit, nisi ut spongia vi prius compressa, dum redit ad constitutionem suam. Sed omnem motum localem in animalibus primum fieri, & principium fuisse constat à contractione, ne alijus principis: ideo à contractione auricularum conjungitur sanguis in ventriculos, ut ante patefecit, & inde à contractione ventriculorum projicitur & transfertur.

Quae veritas de motu locali, & quod immediatum organum motivum in omni motu omnium animalium, in quo spiritus motivus (ut Arist. dicit libro de spiritibus & alibi) primo inest, sit contractile, & à contrahendo, quemadmodum visus à visis, noto dicatur: & quod Aristoteles musculos cognoverit, & non perperam omnem motum in animalibus retulerit ad nervos five ad contractile, & proinde illos lacertulis in corde nervos appellari, si de motivis organis animalium, & de musculorum fabrica

fabrica ex observationibus nostris quandoque demonstrare liceret, palam arbitror foret.

Quin ut institutum prosequamur, de auricularum usu ad ventriculos implendos, ut ante demonstratum est, sanguine, notandum, quod, quo magis densum compactumque cor est, & pariete crassiore, eo auriculae nervosiores & magis musculosae sunt ad impellendum & implendum. In quibus contrarium est, in iis tanquam vesicae ganguea, & membrana continens sanguinem, apparet, ut in piscibus. In his enim tenuissima & adeo ampla est vesica, quae auriculae loco est, ut super ipsam cor innatare videatur. At in quibus carnosior paulo illa vesica est, perbelles pulmones carnosari & eementiri videtur; ut cyprino, barbo, tinea, & aliis.

In aliquibus hominibus, torosis videlicet & durioris habitus dextram auriculam ita robustam, & cum lacertulis & vario fibrarum contextu interius afflabre cinnamata reperi, ut aliorum ventriculorum robore videretur accipollere, & mirabar sane, quod tanta in hominibus diversis differentia esset.

Sed notandum, quod in foetu auriculae longe majores sunt, quam pro proportionem, quia insunt antequam cor fiat, aut suam functionem praestet (ut ante demonstratum est,) & cordis ibi quasi officium faciunt. Sed quae in formatione foetus observari & aetate retuli, & Aristoteles in ovo confirmat, maximam huic rei fidem & lucem afferunt.

Iterum dum foetus, quasi vermiculus molli & ut dicitur, in lacte est, inest solum punctum sanguinem, five vesicula pullans, & quae universalis venae portio: in principio vel basi dilatata: postea, cum foetus delineatus jam, corpulentiam quandam duriores habere incipit, ista vesica carnosior & robustior facta, in auriculas (mutata constitutione) transit, super quas cordis corpus pullulare incipit, nondum ullum officium faciens publicum: formato vero foetu, cum jam distincta ossa à carnisbus sunt, & perfectum est animal, & motum habere sentitur; tum cor quoque, intus pullans habetur, & ut dixi, utroque ventriculo sanguinem à vena cava in arteriam transfundit.

Sic natura perfecta & divina, nihil faciens frustra, nec cupiam animal cor dedit, ubi non erat opus, neque prius, quam esset ejus usus, fecit; sed iidem gradibus in formatione cufcufcufc animalis, transfundendo per omnium animalium constitutiones ut ita dicam, ovum, vermem, foetum, perfectionem in singulis acquirit. Verum haec alibi in foetus formatione, multis observationibus confirmanda sunt.

Denique non immerito Hippocrates in lib. de Cordis ipsum cor musculum nuncupavit; cum eadem actio, idem officium sit, videlicet seipsum contrahere, aliud movere, nempe contentum sanguinem.

Insuper ex fibrarum constitutione motivaque fabrica, ut in musculis ipsis, cordis actionem & usum licet cernere. Omnes Anatomici cum Galeno annotant, cordis corpus vario fibrarum ductu, videlicet recto, transverso, oblique fabrefactum esse. At in corde alio aliter se habere deprehenditur fibrarum structura. Omnes enim fibrae in parietibus & septo circulares sunt, quales

in sphinctere: illae vero, quae in lacertulis, secundum longitudinem oblique sunt & porrectae. Sic fit, dum omnes fibrae simul contractae sunt, ut contingat & conum ad basin à lacertulis adductum & parietes in orbe circulares, & cor undique contractum esse, & ventriculos coarctari; & proinde, cum ipsius actio sit contractio, existimandum est, functionem ejus esse, sanguinem in arterias protrudere.

Nec minus Aristoteli de principatu cordis assensendum, an à cerebro motum & sensum accipiat, an à jecore sanguinem, an sit principium venarum, & sanguinis, & hujusmodi; cum, qui ipsiolum redargere conantur, illud principale argumentum omittunt, ut non intelligunt, quod cor nempe primum subsistens sit, & habeat in se sanguinem, vitam, sensum, motum, antequam aut cerebrum aut jecur facta erant, vel plane distincta apparerent, vel saltem ullam functionem edere poterant. Et, si propriis organis ad motum fabricatis, cor, tanquam animal quoddam internum, diutius vivit. Quo primum facto, ab ipso potesta fieri, nutrir, conservari, perfici totum animal, tanquam hujus opus & domicilium, natura voluit: adeo ut cor tanquam in republica princeps sit, penes quem primum & summum imperium ubique gubernandi est. A quo, tanquam ab origine in animalibus, & à fundamento omnis potestas derivetur & dependeat.

At amplius circa arterias plurima similiter veritate hanc illustant & confirmant. Cur arteria venosa non pulsant, cum numeretur inter arterias? aut cur in vena arteriosa pulsus sentitur? quia pulsus sanguinis arteriarum impulsio est.

Cui arteriae in fovea tunicae castrae & robore tantum à venis differunt? quia sufficiens impetum impellens cordis, & prorumpens sanguinis.

Hinc, cum natura perfecta nihil faciat frustra & in omnibus sufficiens sit, quanto arteriae propinquiores cordi sunt, tanto magis à venis in constitutione differunt, & robustiores sunt, & ligamentofores magis, in ultimis vero diffeminatibus ipsarum, ut manu, pede, cerebro, mesenterio, spermaticis, ista constitutione similes sunt, ut oculi tunicarum inspectione alterum ab altero internocere difficile sit. Hoc autem iussu de causis sic se habet. Nam quo longius arteriae distant à corde, eo minore multo vi, à ictu cordis per multum spaciū refracta, percellantur. Adde, quod cordis impulsus, cum in omnibus arteriarum truncis & ramulis sufficiens sanguinis esse debuerit, ad divisiones singulas, quali partitus immittitur. Adeo ut ultimae divisiones capillares, arteriosae videantur venae non solum constitutione, sed & officio, cum sensibilibus pulsum aut nullum, aut non semper edunt, & nisi, cum pulsant cor vehementius, aut arteriola in quavis particula dilatatur, aut aperta magis fit. Inde fit, ut in dentibus quandoque & tuberculis, quandoque in digitis sentire pulsum, quandoque non possimus. Vnde pueros, quibus pulsus semper fuit celeris & frequentis, hoc uno signo fabricatice certo observari; & similiter in tenellis & delicatulis, ex compressione digitorum, quando febris in vigore esset, facile pulsu digitorum percipere potui.

Ex altera parte, quando cor languidius pulsant, non

non solum non in digitis, sed nec in carpo, aut temporibus pulsus sentiri potest; ut in lipothymia, hysteris symptomatibus, asphyxia, & debilioribus morituris.

Hic ne decipiantur, monendi Chirurgi, quod in amputatione membrorum & tumorum carnosorum excisione, & vulneribus, sanguis cum vi profluens semper exit ab arteria, non autem semper cum saltu, quia exiles arteriae non pulsant, praesertim si ligatura compressa fuerint.

Præterea, cur vena arteriosa non solum arteriae constitutionem & tunicam habeat, sed cur tam multum in crassitie tunica non differat à venis, quam aorta, ratio eadem; majorem à sinistro ventriculo impulsam sustinet aorta, quam illa à dextro: & tanto molliori tunicarum constitutione, quam aorta est, quanto dexter ventriculus cordis & pariete & carne sinistro infirmior, & quantum pulmones in textura & molitie ab habitu corporis & carnis recedunt, tantum differunt venae arteriosae tunica ab illa quae aortae. Et semper hæc omnia ubique proportionem fervant. Sic & in hominibus: quanto magis torosi, musculosi, & durioris sunt habitus, & cor robustum, crassum, densum, & fibrosum magis, tanto & auriculas & arterias proportionabiliter in omnibus respondentem crassitie & robore habent.

Hinc, quibus animalibus leves ventriculi cordis intus funt, absque villis, aut valvulis, & pariete tenuiore, ut piscibus, avibus, serpentibus, & quam plurimis generibus animalium; in illis arteriae parum aut nihil à venis differunt in tunicarum crassitie.

Amplius, cur pulmones tam ampla habent vasa, venam & arteriam, ut truncus arteriae venosae excedat utroque ramos, crurales & jugulares? Et, cur adeo referti sint sanguine, ut per experientiam & autopiam scimus (monitu Aristotelis, non decepti inspectione eorum quos dissectis detraimus animalibus, quorum sanguis totus effluxerat,) causa est, quia in pulmonibus & corde promptuarium, fons & thesaurus sanguinis, & officina perfectionis est.

Cur similiter arteriam venosam & finistram ventriculum abundare videmus (in Anatomica dissectione) tanta copia sanguinis, & ejusdem quidem, quo dexter ventriculus & vena arteriosa repletur, similiter nigricantis & grumescens? Quoniam illinc huc continenter peragrat pulmones sanguis.

Cur denique vena arteriosa dicta vulgo, constitutionem arteriae, arteria venosa, vena habet? Quia revera, & officio & constitutione & omnibus illa, arteria, hæc, vena est; contra quam vulgo creditur.

Et, cur vena arteriosa tam amplum habet orificium? Quia plus multo deferat quam alendis pulmonibus sit necessarium.

Hæc omnia phenomena inter discendum observanda, & plurima alia, si recte perpensa fuerint, ante dictam veritatem videntur luculenter illustrare & plane confirmare, simulque vulgaribus opinionibus adversari: cum quam ob causam ita constituta sint & facta hæc omnia, difficile cuquam admodum sit, (nisi quo nos modo) explicare.

F I N I S.

I N D E X C A P I T V M

Exercitationis Anatomicae, de Motu cordis & sanguinis.

CAP. I. Cause, quibus ad scribendum Author permotus fuerit,	Page, XLIII
II. Ex vivorum dissectione, qualis sit Cordis motus, ibid.	
III. Arteriarum motus qualis ex vivorum dissectione,	XLIV
IV. Motus cordis & auricularum qualis ex vivorum dissectione,	XLV
V. Cordis motus alio, & functione,	XLVI
VI. Quibus vis sanguinis vena Carvini arterias, vel à dextro ventriculo cordis in finistram deferatur,	XLVII
VII. Sanguinem de dextro ventriculo cordis pulmonum parenchyma permeare in arteriam venosam, & finistram ventriculum,	XLIX
VIII. De copia sanguinis transiens per cor à venis in arterias, & de circulari motu sanguinis,	LI
IX. Esse sanguinis circuitum ex primo supposito confirmato,	LI

X. Primum suppositum de copia pertransiens sanguinis è venis in arterias, & esse sanguinis circuitum ab objectis, videretur, & experimentis ulterius confirmatur,	LIII
XI. Secundum suppositum confirmatur,	LIII
XII. Esse sanguinis circuitum ex secundo supposito confirmato,	LIV
XIII. Tertium suppositum confirmatur, & ex eo, esse sanguinis circuitum,	LIV
XIV. Conclusio demonstrationis de sanguinis circuitu,	LVI
XV. Sanguinis circuitum, rationibus verisimilibus confirmatur,	LVII
XVI. Sanguinis circuitus ex consequentibus probatur, LIX	
XVII. Confirmatur sanguinis motus & circuitus ex apparentibus in Corde, & illi, quæ ex dissectione Anatomica patenti,	LXI

I O H A N N I S W A L Æ I

Med. Doct. & Profess. in Academ.

Batava Leydensi,

E P I S T O L Æ D V Æ:

D E

M O T V C H Y L I,

E T

S A N G V I N I S.

A D

T H O M A M B A R T H O L I N V M,

C A S P. F I L I V M.

Editio præcedentibus auctior.

triculos fluctuare cibum, & eum ordinem permit-
tat immutari.

Eum ulla
compellitur
ventriculus.

Quem recepit cibum ventriculus, etiam si dua-
rum tantum unciarum sit, manifesto undiqueque
complectitur, non abfimi ratione ac plicatas cru-
menas globulum videmus continere, simul & co-
arctatur superius inferiusque officium: quod facto
in vicinia foraminis, immisso minimo digito, filio-
ve, promptum est explorare. Inferius tamen offi-
cium dum deprehenditur plane occultum, con-
cidit potius quam esse confectum videtur, quod
minima pressione ventriculi chylum fiam trans-
fluere. Non raro quoque debilius ventriculus,
officiariaeque ab illa naturali confractione deficiunt,
et tunc solent laxiora sentiri.

Eum inno-
tuas ventri-
cus ducit.

Retentus in ventriculo cibus, totus à cibi, po-
tus, salivæque liquore permadescit: nec ita multo
post porosus & plane spongiosus confpicitur: quan-
doquidem ut vero simile est, is liquor aliquid sub-
stantiae cibi elicit & imbibit.

Incidit humor
acidus.

Paulo post in minima inciditur & quasi discep-
tur frustilla, & tenuis & crassior cibus, imo in ca-
nibus ipse ovorum testæ: quod fine dubio ab hu-
more quodam acido contingit, qui vim dissolvendi
habet. Ita experimur ventriculum cibi mole aut
crassitie gravatum assumpto aceto, succo citri,
oleo sulphuris aut vitrioli, levamen sentire. Neque
id quilibet in salivam aut bilem in ventriculum
regurgitantem referet, qui in calida saliva, bileve
bubula, aliquot horis panem macerari viderit, & ab
his tamen non comminui: in centenis quoque &
pluribus canibus, quos hanc ob causam vivis fecavi-
mus, invenimus tantum in duobus bilem in ven-
triculum confluisse, quorum unus incedam passus
erat per triduum, & in ejus ventriculo, mirandum
visu, biliosa (puma erat ita densa, ita bullans, qua-
lem in lixivio lavantium lotricibus videmus in-
natante.

R. liane.

Acidum autem illum humorem conieciamus ex-
liene in ventriculum venire, quod non alia pars
acida in corpore nostro sentitur, quodque deglu-
tito cocto liene & praesertim fuillo, gravitas quo-
que ventriculi à copia & crassitie cibi emen-
deur.

Pulsus com-
mutatur in
cremorem.

Ita cibus liquori per minima commixtus, tractu
temporis consistitiam tenuioris cremoris hordii
coctione adipiscitur: quam ubi accipit, tum de-
num cibus ad intestina protrahitur.

Alimi cibus,
alio tardius.

Verum enimvero hanc in ventriculo commu-
tationem aequè cito omnis cibus non accipit: per-
agitur ea breviori mora de die, in paucis cibo, in
tenui, beneve masticato; longius tempus expo-
scit noctu, magna copia, crassus cibus, minus
suavis deglutitus: adeo ut dentibus bene commin-
tus in cremorem mutari incipiat, quando is
etiam nullus solidus est qui frustis majoribus est de-
votatus.

Et quam cito
aut tardius con-
cipitur de
tristiora neque.

Lac iusculaque de die, horæ spatio aut citius suam
perfectionem accipit, & nisi aliud impedit tum
quoque distribuntur; quod vel urine emicchio ab
his assumptis, sine ulla sectione, evidenter ostendit:
tardius olera. Panis ratione concoctionis medium
videtur substantiae modum habere, videre autem
est eum prima hora cum dimidia immorari quam
minimum, sequenti hora rarum & proflui madi-
dae spongiae similem fieri, ea elapsa in minima di-

vidi frustilla, & potui permixtum totum liquidum
apparere, mox maxime concoqui, ac tandem quod
est pane concoctum est, inter quartam quintamque
ab assumptione horam per pylorum à ventriculo
ad intestina propelli. Remanere vero aliquid à pa-
ne reliquum & illud sensim debita perfectione
accipere, ut & si quis alius cibus cum pane
forte ingestus sit, qui eo concocti sit difficilior:
quos hoc animadvertimus ordine concoqui, pri-
mum legumina, inde pisces, mox carnes, & ca-
demum intra sextam septimamque horam perfici
& excerni: Bubulam intra septimam & octavam:
etiānum tardius ovarum partes membranofas, &
ovorum testas; ossa in tertium usque diem man-
sisse in ventriculo & interea facta esse cartilagi-
nea vidimus.

Imo in horummet ciborum partibus magna sepe
varietas confpicitur, ut è pane carneque etiam
fi integræ in ventriculo videantur, aliquid tamen
licet exigua copia prima quandoque hora ad ven-
nas lacteas distribuat. Adeo ut quicquid conco-
ctum est, alterius concoctionem nequitquam ex-
pectet, nec ab incocto quoque remoretur, sed
quamprimum excidat & ad intestina transferatur,
imo raro, etiam ante horas fedecim canis comedit.
Hæc autem observare nobis promptum fuit in
canibus, quos, vario post assumptum cibum tem-
pore, vivos fecavimus.

In intestinis chylus colore cineritius est, nec nisi
raro à bilis flavidine tingitur: ab ipso autem jam
duodeno incipit Afellii venas lacteas ingredi, nec is
ingressus in ulla cessat intestinis, quamvis aliquid
in intestinis chyli reperitur, ut rectum ipsum in-
testinum venis lacteis donatum sit, quæ ad affixum
chylum non raro conspicuntur candicare. Et ne ar-
bitrari possemus eum lacteum succum aliunde
quoque ex intestinis venire, venas has lacteas, cor-
pori intestinorum insertas ligavimus, & animad-
vertimus à cavitate intestinorum ad ligaturam re-
pleri evidentem & intumescere, à ligatura vero
mefenterium versus depleri & concidere.

Nunquam autem chylus animadvertitur est ve-
nam ullam in ventriculi corpore, nec ullam mela-
raicam intrare, ut nec fanguis ligatura venæ por-
tæ, cujus ratio postea consistat, in venis mela-
raicis immemum adanctus unquam visus est lacteas
venas ingredi. Vt non aliud apparat, quam natum
venas lacteas deferendo tantum chylus, venas
ventriculi & melafricaas deferendo tantum fan-
guinis destinavisse.

Chylus in venis lacteis semper candidus est,
etiāmix ex chylo cineritius in intestinis, aut bilis
tinctura flavo devenierit.

Per has venas lacteas chylus sursum vergit, quo
id modo, res non satis expedita est. Id nobis vide-
tur maxime verosimile, quod in magnis mastic-
tisque canibus venaticis animadvertimus, vena-
rum lactearum quasdā ab intestinis uno & con-
tinuato ductu in ramum mefentericum, quasdā
in ipsam portæ venam, in cava hepatis quasdā,
paucissimas quandoque in venam cavam prope
emulgentes desinere. Ea enim animalia glandu-
la in Mefenterii principio unicam non habent,
quam Afellius pancreas appellavit, & harum ve-
narum ductum solet obscurare, sed ibi minoribus
ut plur-

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

Integre an
per partes?

ut plurimum quinque, glandulis sunt donatæ, quæ
manifesto intervallo à se invicem sejunctæ, per
id intervallum quibuscumque venis lacteis liberum
transitum largiuntur. Sed cum supra has glandu-
las pauciores venarum lactearum rami, quarum &
quædam majores, quam infra sunt, crediderim prope
has glandulas, venas lacteas in ramos dividi, &
eas ut alibi in corpore vasorum divaricationi in-
servire.

Aliquando quoque venæ lacteæ nobis monstra-
te fuerunt que lienem ingrederentur, sed cum præ-
sentibus ipsis indicibus eas examinavimus accura-
tius, nervos esse comperimus.

Per lacteas has venas delatus chylus permisce-
tur sanguini in mefenterico ramo, in portæ vena,
in ipsoque hepate: quocumque enim loco ligentur
venæ lacteæ semper intumescunt, quia impleuntur
his partibus chylum transmittente, ac soluta li-
gatura eum illis partibus manifeste infundunt.

Rami venæ portæ in hepate, quamvis variis
in locis annectantur ramis venæ cavæ, nullibi tamen
in ramum majorem venæ cavæ aperiuntur, sed
minimi venæ portæ rami in minimos venæ ca-
væ ramos chylum hunc sanguini mistum trans-
fundunt, ut inflato excarni hepate aqua innatante
animadvertere facillimum est. Idem reliquo
chylum sanguini mixto accidere postea demum ma-
nifestum evadet.

E ramulis venæ cavæ in hepate, sanguis om-
nium iudicio ipsi truncus venæ cavæ infunditur:
& manifeste ea supra hepate in vivis ligata ab in-
fluente sanguine intumescit. Ex venâ cava cordis
arterialis dextrum ingreditur, ligaturaque altera
venæ cavæ parte quæ supra infraque sita est ob-
servamus aliquoties, præsertim in angulla, eam
citissime vellesui cap. 10.

E dextro cordis ventriculo, manifeste satis ve-
nam arterialem intrat, & per eam in pulmones intrat.
Aliquid quoque sanguinis è dextro cordis ven-
triculo, per septum intermedium in sinistram ven-
triculum transfundere non ausim asserere, cum alibi
apertas vias, hic nullas inveniam. Refert Petrus
Gassendus, vir diffusæ eruditionis & candidus, Exercit.
in Fluidum. Philosph. part. 3, cap. 17, vidi-
sse se Paganum ostendentem septum cordis inter-
medium per varios mæandros, flexuososque quasi
cuniculos pervium esse: eosque posse inventi, si
stilo in foveam aliquam leviter immisso, eum sur-
sum deorsum & ad latera patientissime contor-
queas & ulterius aditum semper explores, usque
dum ejus extremum invenias. Et revera in-
non raro succedere sumus experti; sed observavi-
mus simul eas vias, eos mæandros nequaquam
à natura factos esse, sed à stilo aut culpe die cultri-
fieri, dum factam viam aperimus aut ulteriorem qua-
runt: caro enim cordis ita tenera simul & con-
sistens est, ut minimo rei perforantis attractu rari-
tum disrumpatur, & cavitate relinquitur, adeo ut
& latera cordis ita poterimus pervia invenire.

Ingressum per venam arterialem in pulmones
sanguinem per arteriam venosam ad sinistram cor-
dis ventriculum redire hinc colligimus, quod li-
genato prope pericardium in pulmone vivo arteriæ
venosæ majori ramo vidimus eum versus pulmo-
nis ambitum indurari & in tumorem attolli, ea par-

te inanità & concidente qua cor spectabat, soluta.
que ligaturæ sanguinem ad sinistram cordis ven-
triculum moveri, idque facillimum est in cuniculis
observare. Hic autem sanguis cum aliunde venire
non possit, ex venâ arteriâ huc debet defluere.

Leonardus Botallus, vir doctissimus, in libelli
de Catharro invenisse se aliam viam arbitratu-
r, quæ è dextro in sinistram ventriculum perpetuo
sanguis eat. Paulo supra Corintheum diximus, satis con-
spicuum reperiri ductum puncta auriculam dextram, qui p-
tium in sinistram aurem recte transire fertur.

Hic ductus nisi progressus sit venæ cavæ ad
arteriam venosam, quem foramen ovale appellamus,
aut alius ductus quem aliquando in ovulo corde
reperimus calami triticeæ magnitudine esse una
auricula obliquo ductu ad atriâ vadere; nisi inquam
aliquis horum fit, difficile est quis fuerit divinare.

Iam adeo ut foramen ovale ubique quidem
æqualiter non occluditur, & sæpe in medio ac-
crefcentis membrana tenuissima & pellucida est,
minimoque flili attractu facile disrumpitur, rarissi-
me tamen in adultis illa ratione aperiri inveni-
tur. Et transiens per arteriam venosam è pul-
mone sanguis membranam illi foramini præpositam
affigit, ut etiam quando connata non est diffi-
cile aliquid illac possit transire.

Obliquus vero ille ductus nobis in ovulo corde
visus, alte sæpe auriculæ substantiam penetrat, fed
rarent proflus ad alteram auriculam fertur. Puta-
mus enim auriculæ ad nutritionem tantum esse,
quæ ramos non solet à Coronaria accipere.

Exiis vero quæ raro accidit, nihil eorum con-
cludendum est quæ perpetuo debent evenire: in
Cordis quippe fabrica non raro ludæ nata. Ita
in bovini cordis septo intermedio superna parte,
secundum cordis longitudinem aliquando finium
invenimus, ad sinistram ventriculum circa mucro-
nem patulum, qui longitudine amplitudineque
digitem indicem æquabat. Cui similem videre
Ariftoleles potuit, cum 3 de Part. cap. 4, afferuit
majora animalia tres in corde ventriculos habere.
Nam maxima animalia duos tantum ventriculos
habent, ut in dissecto balenæ fetu animadvertimus.

Adeo ut videatur sanguis, non alia via ordina-
tum quam per pulmones ad sinistram cordis ven-
triculum vadere.

Ita ad sinistram cordis ventriculum delatus fan-
guis, inde ad arteriam arterialem, mediocres, mini-
masque arteriolas pergit. is enim vivis ligatis mi-
nimus in modum versus cor intumescit, & extre-
ma versus concidunt, ac aperta ligatura manifeste
sanguinem ad ulteriora dimittunt.

Sanguis è minoribus arteriis potest venas in-
trare: arterie enim quibusdam apertis in venas per-
via sunt. Et quo efficit potius per ea oscula
sanguinem posse transire, venam & arteriam in
demoritur canis pede liberavimus ab his, quæ ca-
rum solent vivis impedire, inanivimusque venam
cruralem majorem & eam in his ligavimus, ne il-
lac aliquid sanguinis deflueret. in genu vero liga-
vimus venam hanc simul & vicinam arteriam,
tum digitis sanguinem in arteriis iliacis ad genu
usque adegimus, atque ita inanivimus cruralem
arteriam, vena vero cruralis vifa est manifeste re-
pleri, cumque in venam superne inferneque liga-

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

Non per fora-
men ovale.

tam, ex ejus ramulis nisi parpartum devenire posset, ea vero multum impletur depleturque prorsus arteria. Colligebamus cum sanguinem quo impletur vena per oscula ex arteriis manit esse depulsum.

Eam vero opinionem novam non esse ipse Galenus de uf. pulsus cap. 5 ostendit. Arteriarum venarumque synsphaeses sensum nostrum efficiunt: unde si ipsi sensum parpartum constanter merito fidem abroges, per alia certe quae veteribus sunt prodita eos esse credas, neque in postremis ex hac rei evidentia, si quis namque accepto animalis quovis ex iis quibus ampla manifestaeque vena & arteria sunt, veluti bove, fove, asino, equo, oves, ursis, simia, parada, homine ipso, vel similitum aliquo, magnas multasque illi arterias vulneres, universum animalis sanguinem per eas exhaustis. hujus rei periculum subinde fecimus, & cum semper vacuatas cum arteriis venas deprehendi sensus, verum esse dogma de communibus arteriarum & venarum osculis, & communi de una in alteram transitu nobis persuasimus. Imo recepta communisque opinio est, sanguinem arteriosum naturaliter minimas venulas intrare, quo partes arterioso venosque sanguine nutrantur.

Et revera sanguinem ex arteriis per ea oscula naturaliter in viventibus venas ingredi, haec indicia luculenter attestantur.

Qui in vivis dissectionibus ad eam copiam attendit quae per arterias partibus venisque communicatur, haud facile ab animo suo impebitur, eam omnem à partibus nutritione consumi: praeterit si attendit sanguinem arteriosum satis crassum esse, nec quarta parte esse venoso rariorem, ut sapius animadvertisimus ubi refrigerari utrumque si-

vinus & concreverit. Vade merito cum Harvejo colligi potest communicatum ab arteriis, venis partibusque sanguinem magna ex parte ad majores venas remeare.

Deinde ubi venam in brachio ligato secamus, si venae tumens partem foraminis propinquam quo versus manum est pollice comprimamus, aut similem superiori ligaturam brachio prope vulnus versus manum injiciamus, nihil sanguinis videbis effluxurum; unde videtur colligendum eum à manu venire, qui per factum vulnus exiit. Et cum is sanguis venae sectione saepe ad libras educatur, tantumque in inferiori venarum brachii parte contineri non possit, is eo debet ex arteriis venisse, quae ligatura supra sectam venam occlusa non sunt, ut integer earum pulsus ostendit.

Sed quo id nobis ad oculum liqueret, aliquoties in vivis canibus etiam majoribus, venam & arteriam amplam in inguine ab iis liberavimus quae earum visum impediebant; quod facile fieri potest, nisi musculus subternatur: venam autem illam filo ligavimus, animadvertisimusque eam venae partem quae cavam praefaretur concidere & inaniri, reliquam vero pedem versus admodum intumescere, adeo ut praeter plenitudinem durior ipsa arteria videretur; at soluta ligatura sanguinem mox sursum moveri, & venae duritiem ac plenitudinem admodum imminui. Ligata vero arteria intumescere mirum in modum eam partem quae Aortae vicinior est, concidere remotiore: nec venam tum ligatam evidenter intumescere. Idque saepius factum accidere semper eodem modo.

Compressa vena infra foramen in vena colligitur.

Ligatura vena in vena.

Dissectio vena in vena.

Dissectio vena in vena.

Vide signum pag. lxxij.

FIGURÆ EXPLICATIO.

- A. Crus canis dextrum.
- B. Crus canis sinistrum.
- C, D. Ligatura subjecta arteriae & vena, quae femur firmiter constringitur, expressa in dextro crure, ne literarum linearumque confusio in sinistro crure spectatorem possit turbare.
- E. Arteria cruralis.
- F. Vena cruralis.
- G. Filum quo constricta est vena & est elevata.
- H. Acus, cui filum est trajectum.
- I. Vena pars superior & detumescens.
- K. Vena pars inferior à ligatura intumescens.
- L. Guste sanguinis, quae, & superiori parte vena vulnerata, sensum destillant.
- M. Rivulus sanguinis qui inferiori vena parte vulnerata continuo exiit.

Ne tamen ullus nobis superesse scrupulus posset & animadverteremus simul quid intrus in vena ageretur, denudatam ita venam & arteriam elevavimus nonnulli, & sub iis firmiter ipsam crus ligavimus, ne per aliam quam eam quam elevavimus venam furum ad deorum moveri sanguis posset. Tum demum filo suspensam & simul oculum venam, ut hac figura expressimus, supra filum & infra filum aperimus levi vulnere. Statim autem ex ea vena parte quae à corde remotior esset sanguis rivulose, copiose, & impetu effluxit. Illa vero pars vena quae à filo cor praefaretur paucas tantum guttas destillantes dedit. Vnde nobis videtur evidens sanguinem non deorsum è venis majoribus, sed sursum è venis minoribus ad majores devenire. praeterit cum injecta alia ligatura eidem vena, remotius à corde, è vulnere è quo ita impetuosae exillierat nihil amplius videremus sanguinis effluere. Arbitrabamur enim eas guttas quae è vulnere cordi viciniori laberentur, provenire posse è sanguine quem cum vulneraretur vena contraheret forte, aut quem ex minori ramo vena cruralis supra filum sito continenter acciperet; verum hac causa mox clarior evaderet.

Obvium est idem fene illa sectione in iis expectari, qui conspicuas admodum venas brachii habent. In quibus si uno digito venam prope manum occludas, altera manu sanguinem sursum adigas, rota videbitur vena inanita: quae mox replabitur simulac inferiori vena partem à digito liberares, non si superiorem; ut Harvejus quoque observavit libelli sui cap. 13. Superior enim sanguis ad majores venas vadit, & descensum remota valvula quae nihil facile delabi permittit, nisi eo usque vena dilatata sit ut inter eam valvulaeque majusculum spatium relinquatur.

Cum itaque à manibus pedibusque sanguis veniat, manus autem pedesque sanguinem novum non generent, quem toti corpori debeant suppeditare, nobis non fit dubium quin ex arteriis ibi sanguis continuo & naturaliter venis ingreditur, & ex minoribus venis ad majores eat.

Neque vereor arteriosum sanguinem, simpliciter venarum tunica contineri non posse, quem video in arteriis minimis, & in aneurysmate contineri, ubi arteria unicam tantum tunicam habent. Quod

vero propinquiores cordi arteriae duplicem tunicam acciperent, fieri potuit ne impetu effluens è corde sanguinis arteria laxaretur; ut eam laxari à valido palpitantis cordis motu videmus.

Sed an non quoque ut ex arteriis ita ex maximis venis sanguis ad minores venas fluit? Id videri possit venae sectione indicare quae revulsione gratia instituitur: secta enim vena brachii in plenitudine revelli sanguis videtur, qui è vena cava in azygum, ex azygo pleuram inflebat. Sed nullum indicium est illa sanguinem revelli potest enim secta brachii basitica, sanguis trahi ex arteriis brachii, brachii arteriae trahunt ex axillari, axillaris ex aorta, per ejus intercostales ramulos in pleuram, non vero per azygi ramulos fluxerat, ut mox videbimus. Et certe nisi in plenitudine sanguis per arterias reveleretur, ratio nulla esset quare ad revellendum venam affecti lateris potius, quam dextram fecimus: cum azygos à dextro vena cava latere oriatur, & ut fiat venae sectione xab iij eo latere secanda vena esset, secundum quod latus sanguis in affectam partem fluit.

Sed quid? an non ligatis quibusdam partibus, & saepe brachio in iis quibus id fistula excavatur, brachium quodammodo emacrescit, quod ligata vena ad inferiores brachii partes debite nequeat sanguis descendere? Non est necessarium. potest enim ibi fieri quod ligata sit arteria. Et revera ita fieri hoc indicio est, quod non raro arteria in eo brachio qui fontanella inest, languidius minusque quam in sano pulsare comperitur, inhibito aliquo modo per ligaturam sanguinis spirituumque influxu. Forsan tamen posset & pars aliqua emaciari, ligata tantum vena; quod natura copiosius novum sanguinem per arteriam in partem infundere non possit, qui per venas libere nequeat remeare. Et quavis copiam tum sanguinis arteriae & vena contineant, forsan is minus aptus quo partes bene nutrantur, verum id postea constabit.

Manifestum tamen est in variis quibus sanguinem è vena cava ad majores, à majoribus ad minores venas descendere. Id enim in varice femoris, pedis, & haemorrhoidibus obvium est videre. Verum illa motus sanguinis potest praeter naturam contingere, quod debilitate vena sanguinem sursum non mittant, sed colligant; & quod humores sua gravitate

Nec brachii à ligatura emaciari.

Id non indicat revulsoria venae sectione.

Nec brachii à ligatura emaciari.

Nec venarum.

gravitate

FIGV.



Ex Motu illi
sanguinis.

Ex conti-
nuitate.

Calor.

Ex motu illi
etiam hora
quadrante
distat.

De Motu Sanguinis. lxxv

FIGURÆ EXPLICATIO.

- A, A, A, A. Abdomen Canis apertum.
B, B, B. Diaphragma.
C, C, C, C. Omentum versus thoracem inversum, quo interiores partes magis visui expositæ forent.
D, D, D, D. Lobi tres hepatis nominib. dextrorsum moti.
E, E, E. Portiuncule pancreatis discissi, quo sequentia vasa venient in conspectum.
F. Ren sinister suo involucrio reclusus.
G. Pars sima Lienis superior, una cum adiacente pinguedine.
H. Media lienis pars, circa quam vasa inferuntur.
I. Infima lienis pars.
K, K, K, K. Intestina deorsum mota, quo vasa sequentia in propatulo forent.
L, L, L, L. Mesenterium.
M, M. Arteria splenica.
N. Pars vena splenice trunco vena portæ amexa, à ligatura detumescent.
O, O, O. Portio vena splenice & ejus tres rami inde orti, qui lienem inferuntur, & à ligatura admodum intumescunt.
P, P. Arteria mesenterica sinistra.
Q. Portio vena mesenterice sinistra, trunco vena portæ proxima, à ligatura detumescent.
R. Inferior pars vena mesenterice sinistra jam in ramos dividenda, à ligatura intumescens.
S, S, S. Vena mesenterica ideo plenior & magis tumida, quia vena mesenterica ligata est.
T, T, T, T. Reliquæ mesentericæ, quæ non ita tumide, quia earum truncus non est ligatus.

Vt jam esse planum arbitretur quis sanguinis motus sit, & per quas vias fiat: sequitur nunc inquirendum qualis sit & quomodo peragatur.

Sanguinis illum motum à corde in arteriis, ab arteriis in venas, à venis ad cor esse continuum observavimus, nec ullo momento cum definire aut interrumpi. Et certe cum is fiat, ut mox videbimus, quia cor accipit & transmittit, cumque is cordis motus continuo toto vitæ cursu perduret, sanguinis ille motus non potest, nisi secundum naturam, continuus esse.

Celer quoque sanguinis motus est; ligata enim & compressa arteria venæ, quamprimum admodum intumescit & in duritiem attollitur: eaque à compressione aut ligatura liberata citissime conspicitur sanguis moveri.

Quam cito autem sanguis circuitum suum à corde, iterum ad cor abolvat, præcise definire non possumus. Citius quidem animadvertitur per fieri, nec admodum illi refragaremur qui maximum circuitum & per extremitates, assereret breviori tempore quam horæ quadrante peragi; celerissime enim sanguis vadit. Attamen non ita deservit celeriter, ut cum secunda arteria venæ videamus exire, quod is in remis liberoque moveatur aëre, in corpore vero vas suum attollere, & anteriorem sanguinem propellere cogatur. quare diffusam arteriam præsertim minus remotam a cor-

de, citius inaniri videmus, quam cor novum possit sanguinem suppeditare.

Sed hoc si verum sit, quare singulis horæ quadrantibus febres non redeunt, cum futurus paroxysmus videatur, cum corrupta materia ad cor venit? nunc autem aliæ quotidie, aliæ tertio, aliæ quarto demum die redeunt. Equidem non negaverim id posse contingere, ut corrupta materia ad cor accedente paroxysmus eveniat, ut ejus exemplum habet *Harveyus* libelli sui cap. 16. Non putem tamen id necessarium esse: potest enim & foci aut decidere portiuncula aut elevari fuligo, cor petere & febrem accendere, quomodo videntur pleræque febres ab inflammatione partium oriri, quæ aperta vomica, evacuato pure desinunt. Et ut tales symptomaticæ febres, ita & quædam fieri intermittentes febres possunt, à materia vel in vasis vel extra vasa conclusa, quæ per putredinem vel quotidie vel tertio vel quarto die, in patula vasa regurgitans aut effusans, paroxysmum faciat.

In continuis fateor, quarum materia in vasis majoribus hæreret putatur, difficilior est causam dicere quare singulis circuitibus paroxysmus non fiat. videmus tamen eandem dare posse, quam vulgo dant causam, quare continue, non continenter æquales videantur; quod etiam materia cordi satis propinqua sit, tamen citius paroxysmum non faciat, quam certum putredinis acquisiverit gradum

Nec aliud in-
deant para-
oxysmum fe-
brium inter-
mittentium.

Aut conti-
nuarum.

dum: & eum paroxysmum tamdiu durare, usque dum putrida ea materia fit evacuat, quae cor tangit, aut ei siuos fumos mittit. Verum non arbitrer quomodo ob causam quare paroxysmi febriles certis diebus redeant, quare profusus & abstrusa & ignota est, motum sanguinis velle negare satis celerem esse, qui est manifestus.

Præter celeritatem, sanguis in motu & vehementiam habet, quæ ex his apparet quæ diximus de duritie & tensione quam arteria & vena ligatae acquirunt: nihil enim a tenui liquidaque materia in lumen duritiam tendi potest, præsertim sursum, nisi vehementer in id impellatur retineaturque. sed ea motus vehementia maxima est prope cor, à quo sensum fit minor, adeo ut extremæ arteriole non possint nisi major solito sanguinis impulsu accidat, ut in febribus fieri observamus. Quare & videtur vena non pulsare, quod est impulsus etiam minor fit in his, quam in minimis arteriis; ubi autem ibi abeunt in plures fe ramulos quam arteria dividunt, ubi enim in plura brachia, flumina ducuntur, motus ille impetus imminuitur. Quare ubi quædam vena occluduntur brachia, vel à re compriment, ut in quibusdam tumoribus, vel ab aliquo obstruente ut in varicosis gravitate sua relabente sanguine, animadvertitur denuo impetus ille, & vena pulsare conspiciuntur: pleraque enim palpitantes in partibus, à flantibus provenire creditas, nihil aliud quam venarum pulsationes esse, in venis transparentibus per cutim non raro nobis licuit observare.

Quia autem motus vehementior in arteriis quam in venis est, videtur prima fronte in arteriis quoque celerior, quam in venis esse. non aliter ac homines, equi, aliaque animalia quæ magno fe conatu movent, male sæpe videtur plus promovere. Etenim per arterias protrusus sanguis non continetur potest Anastomoses transire, quod è lato in angulum veniat, unde accumulari in arteriis existunt, quare dimidio dilatationis totoque quietis tempore, perparum ille impetus ad motus celeritatem facit, qui motus interea expeditior per venas est, quod ex angulo in latum & per plures vias peragatur. Ratio autem hic dicta in hoc sanguinis motu celeritatem utrobique æqualem esse debere, nisi quantum hepar cordi sanguinis movi è chylo suppediat, arteriaque nutrimentum partibus largiuntur, aut alias tandem cor humore destituendum. Quod & ipsum sensus confirmat, toties enim pulsata vena cava, toto illo tractu ab hepate in jugulum, ideoque in cor propellit, quoties animadvertitur arteria pulsare & ideo è corde admittere. sed de illo mox plura dicemus.

In ipsis tandem arteriis, sanguis celerius movetur, quando cor propellit; à qua celeritate sensum deficit, quando cor quiescere incipit & potest dilataratur. Imo & in ipsis venis motus sanguinis pulsare corde vehementer est & celerior, quod ut in vivorum sectione observavimus, ita id & animadvertimus aliquoties, quando in brachio vena secaremur, in quo à ligatura non admodum distenderetur vena. Iam dictæ quoque venarum palpitantes non videntur aliunde procedere,

quam quod à relabente sanguine, aliove modo ætatis venis, cum sanguis impetu protrusus transire non possit, is venam attollat, quæ concidat iterum quando is impetus imminuitur, aut vena transfusus sanguini liberorem largitur transitum.

Non arbitrer autem sanguinem qui per arterias v. g. cruales ad cruales venas delatus est femel, cum continuo iis viis deferri, sed cum ubi cor reddit, ei qui ex aliis venit partibus permisceri, atque ita promiscue partibus distribui: sic enim melius nutririi partes poterunt, si semper novum sanguinem habeant, è quo eliceret potest, quod illis maxime ad nutrimentum & robur facit, ita melius crescent plantæ, quæ in eodem & immoto solo semper non feruntur.

Hæc tota ratio est, quæ sanguis movetur. Et quoque, cum sanguini permitti fuit, quæ moventur vitales spiritus.

Animalium spirituum motum sæpe conati sumus indagare, sed non potuimus eum alibi observare quam in musculis, qui videbantur ab iis in latum profundumque distendi, & discedi tempore & palpitare. Nervi enim ligati à ligatura nec tument, nec distenduntur, & discessi non alium motum exhibent, quam quod in se contrahantur. Ligare autem nervos sexti paris qui per thoracem libere vagantur res perquam facilis existit.

Motus vero Chyli per venas lacteas manifestissimus est. Non est autem ut sanguinis continuus, cum non semper suppetat chylus. Quando autem ex intestinis per lacteas venas vagatur, celerius ipso sanguine incedit, & ligatæ venæ intumescunt circumflante. Quam ob causam nec diu in viis diffunditur, nec in cadaveribus inveniuntur; nisi qualis sit, quando aliquod obstaculum chyli movet, fit obiectum. Quod vero ligatæ non intumescant in duritiem, signum esse videtur, non ita vehementem chyli motum ut sanguinis effluat, sed quod cum per minus spatium moveri chylus deberet, non is in motu impetus requireretur.

Sed jam tempus est ut in horum motuum causas & primum sanguinis inquiramus.

Quidquid sit, vel insita virtute ita movebitur sanguis, vel aliquo motu qui ad vectorem, tractionem, pulsionem fit referendus. Propria virtute eo modo moveri sanguinem, nec in sanguine in pelvim recepto, nec in corpus effuso, observamus, quem esse momento corruptum durum est asserere: nec in ulla alia re inanimata tandem spontaneum motum licet videre. Quod autem Harveus cap. 4. annotat, se quiescente auricula, motum in ea sanguinis deprehendisse; id & nos quoque, ut & in quiescente corde sensimus, fed simul eum motum in auricula inditum sanguini à vena cava fuisse, in corde ab auricula, ut statim vidimus.

Vehi hic sanguinem à spiritibus nulli potest indicio comprobari: & ut levitate sua sursum sanguinem veherent, quem hic deorsum quoque moveri & ad latera videmus.

Quare reliquum est ut vel trahatur sanguis, vel pellatur.

Protrudi sanguinem viri quidam ingenio præclarior arbitrantur, quod calore cordis inmensum rarefcent, maiorem locum expolcat, ideoque eum cor dilatate & attollere; cumque nec in dilatato corde contineri queat, in venam arteriosam arteriamque aortam

Vna sanguinis pars non eadem semper via vadit.

Cum sanguine moritur vitales spiritus.

Animalium spirituum motus per nervos effluere non potest.

Sed facile chyli motus per venas lacteas.

Causa autem qua hic movetur sanguis.

Non est via quædam in his.

Nec voluit sanguis à spiritibus trahi.

Nec effunditur sanguis in pleuram.

aortam tali effundi impetu, ut omnes distendant arterias & faciat pulsare. Suae autem opinionis hoc argumentum adferunt, quod cor anguilla aliterve animalis, ubi pulsare definit, si à sublatro calcitrat igitur denno pulsam edere conspiciatur. Sed an is pulsus fieri non possit, quod spiritus à calore vegetior factus, melius ei causæ possit inferre quæ in corde pulsam facit? non aliter ac calefactis in vivorum sectione intestinis musculisque, in quibus tamen nulla ebullitio est, restitui motus videtur. Omnino enim levis tantum quadam rarefactio à tepore quodam in corde est, nulla ebullitio, aut diffusio lubita. Et revera ob rarefactionem sanguinem è corde non exsistere in validis sæpe canibus confpeximus, quorum cor discit mucrone, cum ob effluxum sanguinis dimidia parte non repletur, id eadem, à rarefactione repletum non fuit. Sed accedente constrictione, portio illa sanguis qui in corde reliqua erat, ultra quatuor pedes fuit eiecit, ut in magna frequentia nos & vicini conspiceremur. Vnde evidens est, sanguinem à parte propelli.

Propellitur autem quod ita mutatus sanguis cordis illiusque partibus fit molestus. Si enim cor integrum, aut ejus vivi dissecitque mucro, aliave parti particula, cutellæ aculadive pungatur, quoties pungitur, toties fe quasi naturali motu commovebit, etiamsi jam aliquandiu omnem amissile motum videatur.

Pelli autem à vena cava sanguinem in dextram cordis auriculam manifeste visis dissecit animabilibus confpeximus: in omni enim cordis motu à vena cava primum motus initium est. quod cum dubitarem an non fieret, quia cava auricula cor dique connexa esset, cor & auriculam resecimus proflus in canibus vivis à vena cava, & animadvertimus tamen venam cavam pulsare minimam, & singulis vicibus aliquid sanguinis effundere. Quare & plerumque circa cor vena cava carneas quadam fibras accepit, quas alibi in vena cava hauri invenias: ex autem admodum conspiciue in hominis, bovis, canis cava possunt videri. Motus autem ille vena cavae prope cor evidenter, ut plurimum tamen cum quoque in vivis canibus observavimus toto illo ductu ab hepate & à jugulo in cor, usque.

Auricula dextra quem accepit sanguinem tensionem quadam & constrictione in dextrum cordis ventriculum pelit: nam & in auricula motus constrictionis momento prior, quam in corde est. Et dextro cordis ventriculo ad auriculam usque diffundit, manifeste apparuit singulis constrictionibus aliquid ex auricula in cor propelli, quod & notat Harveus cap. 4.

Ita quidem pulsione præcipue sanguis ad dextrum cordis ventriculum venit. sed an non quoque & in auriculam & in dextrum ventriculum trahitur? Ita arbitramur: parte enim ejus sanguinis quem accipiunt interius alii debent: quod autem alere debet, trahi debet, quo pars eum sanguinem accipiat qui illi est utilissimus, pulsione enim etiam inutile amandatur, ut optime Galenus, ut solet omnia, hæc dicit libris 1, 2, 3 de nat. fac. Tractio autem, ducit non tantum est vicini sanguinis, sed etiam remotioris, ut omnes partes vim eam habent, ne cito alimento destituantur.

Trahitur tamen quoque.

Sed an non quoque cor quia dilatur trahit, metu vacui, ut solemus appellare? Non est verosimile, quia in ejus dilatatione nullus metus vacui esse potest, ut mos fieri evidens.

Vt sanguis ad dextrum cordis ventriculum ita quoque ad sinistram venit, nisi quod impulsione sanguinis concidente pulmone, ex arteria venosa in sinistram auriculam non tam validam quam è vena cava poterimus observare; aliqua tamen manifestæ est. Impulsio autem in utramque auriculam & in cordis utrumque ventriculum eodem momento accidit: nisi in moribundis, in quibus aliquando observavimus non eodem tempore utramque auriculam, aut utrumque ventriculum pulsare.

Vbi autem ita sanguis in ventriculos cordis pelitur, cor nullum oculis manifestum motum habet, sed impolito cordi digito aliquod intrare in cor festinus & cor plenius fieri: quod & observavit Harveus cap. 4. Imo sepragies, aliquando centies pulsasse auriculam observavimus, antequam cordis sequeretur motus.

Vt jam habeamus quomodo sanguis in cor moveatur. Videndum nunc quomodo moveatur in arterias. In Arterias sanguis pulsione movetur: factio enim in arteria foramine dum cor fe constringeret, exire sanguinem vidimus; ita & dissecit à corde aorta aut vena arteriosa cum cor constringeret sanguinem effundi; dissecit cordis mucrone eoque erecto expelli sanguinem & è corde exsistere; dissecit corde medio transversum in systole sanguinem expelli, nec unquam in diastole exsistit vidimus. Quod autem quidam in vivis dissecit fe in dilatatione vidisse exire sanguinem asserunt, in eo fuisse illos falsos arbitror, quod dilatationem eam esse existimaverint, quæ revera est constricito: quod insignis ille Anatomicus Columbus quoque notavit, lib. 14 de Anatomica.

Etenim in motu cordis, oportet ejus constrictionem, quietem, & dilatationem exacte distinguere. In constrictione cordis vis systole, mucro cordis accedit ad basin, ideoque nonnulli elatior fit. Et in his animalibus quibus aorta non bast cordis, fed verius medium nonnulli inferitur, ut in caniculis, anguillis & similibus, bafis quoque cordis accedit ad mucronem. Latera autem cordis quæ collassa dextræ sinistræque spectant propius ad se mutuo veniunt, adeo ut si alterutro lateri mucrone abscideris ut appendeat, in constrictione ad integrum latum, & quasi in locum suum redibit. Latius autem cordis quod sternum spectant attollitur, & quidem præcipue circa basin: atque ita totum cor undique tenditur. Eaque pars vicina bast subata, maxime videtur pectus ferre & quem sentimus pulsare faciem; quamvis & mucro possit, quod magnus ille Anatomicus Rivinus quoque observavit, lib. 6 fuae Anthropicae, cap. 12.

Eum autem cordis motum quem jam descriptimus, revera constrictionem esse, quo nobis cor constaret, cordi aliquando abscidimus mucronem, & aliquando transversim dissecimus per medium; & manifeste vidimus cum eum quem diximus motum ederet, ventriculorum cavitatem minorem fieri, & immisso cordi digito, ventriculos ad digitem sensum confingri. Eum autem quem jam diximus motum cor exterius ostendere dum

Hic motus quoque est voluntarius.

Non confusum est arteria & vena.

Ex illam tam celeritatem.


Sed majore celeritatem habet pectus cordis.

Ex hac causa motus in sinistram ventriculum est.

Constricitoque utrobique eodem momento.

Fe corde in arterias sanguis pelitur, dum cor constrigitur.

Ratio conficitur in cordis.



De Motu Sanguinis. FIGURÆ EXPLICATIO.

Lxxxj

- A. Vena mesaraica vulgaris, portæ rami, cum arteriis mesaraicis.
 B. Vena Lactea discurrentes per mesenterium ad intestina.
 C. Mesenterii portionem: una etiam nervorum mesaraicorum per eam distributionem signat.
 D. Ventriculi fundus.
 E. Inferius ventriculi orificium *πύλος* vocatum.
 F. Intestinum duodenum.
 G. Jejunum intestinum.
 H. Ileum intestinum.
 I. Vena & arteria fundum ventriculi perreptans.
 K. Omenti pars.
 L. Glandula in mesenterii principio, quam *Asellus Pancreas* appellat, in qua rami venarum lactearum non tam multi sunt, ut hic designantur.
 M. Vena lactea in ipsis intestinis à ligatura intumescentes.
 N. Vena Lactea in mesenterio à ligatura tumida.
 O. Valvule in venis Lacteis.
 P. Constrictio intestini superna.
 Q. Constrictio intestini inferna: quibus constrictionibus chylus in venas lacteas exprimitur.

jorem tractu temporis calore pervenit, in qua à frigore condensatus denuo conservatur, atque ita tandem ad generationem vitalium spirituum aptissimus evadit.

Sanguis qui ad nutriendum partes deservit non movetur ex orbita.

Hunc ob finem sanguis in orbem movetur; sed an non sit præterea alibi alium motum habet? E minimis Arteriolis sanguis recta in carnem defertur, ut humorem innominatum, rorem, gluten, casumque constituat: nec remeat unde venit; ne transfusus per carnem sanguis, humores hos agglutinari partibus impedivisset & assimilari.

Fluit hic autem quandoque præcipue, quod ex arteriis in carnem pellatur: Et non raro quoque præcipue casu movens attractio est: Etenim non sine tractione ossa ad sui nutritionem crassiores accipere humoris partem possent, & reliquam tenuiorem humoris partem ad sui nutritionem inemptam in vasis relinquere.

Nec alius sanguinis motus est qui oculis, dentibus, cordis, valvulae.

Sunt quoque qui arbitrantur sanguinem è corde delatum retrorsum cedere & per arterias denuo ad cor redire. Quod illis ideo videtur statuendum, ut causa dari mechanica possit, qua cordis in orificio arteriarum valvulae, decedant & occludantur. Nos equidem præclarum semper Erasistrati institutum æstimavimus, omnia quæ in corpore nostro contingunt Mechanice explicare, sed divinam sapientiam sua metiri temerarium iudicamus. Eas vero machinas esse statuendas quas evidens ratio & potissimum sensus ostendunt. Hic contra sensus observant à corde non ad cor per arterias sanguinem moveri; & in raro languidoque pulsu non ultimo arteriam qua cordi necitur, ut fieri deberet, sed primo intumescere. Valvulas quoque à remeante sanguine non occludi, hoc videtur indicium habere, quod si arteria duobus digitis à corde ligetur, & ea inter ligaturam valvulaque ita aperiat ut libere exire sanguis possit, quare nec cedere retrorsum, nec remeare; valvulae tamen aliquoties bene constrin-

gantur, cor ordinate moveatur, & non nisi in sua constrictione sanguinem effundat. Quamobrem si ulla hic nobis eligenda esset machinatio communem admitteremus opinionem, quæ ut cordis ita & occlusionem valvularum, contractione fibrarum fieri asserit. Ea quippe fibrarum in corde contractio passim obvia in conspectum prodit.

Alia vero ratione sanguinem naturaliter recta moveri per venas à corde, per arterias cor versus, nullum equidem habemus indicium. In gaudio quidem humores extrorsum vergunt; sed id potest per arterias tantum contingere. Et in tristitia humores possunt introrsum per venas tantum moveri; & omnino debent, quod cum pulsus non cesset in hoc affectu, pulsus autem continuo aliquid per arterias extrorsum eat, difficillime possit aliquid per arterias introrsum & ad cor moveri.

Nec in ambobus assistunt.

Præter naturam tamen humores alium quam quem nunc descripsimus motum habent, dum humores levitate sua, vel alio impetu forsium vergunt, vel gravitate sua deorsum descendunt, sed in varicosis est manifestum. Occlusa quoque ea via quæ solet moveri, aliam querere cognoscitur. Ita in Anatæ aliquoties in valis pectoris variegatum sanguinem vidimus subcandidum alium, alium rubrum, qui contracta arteria ad cor & ad cor movebatur secundum arteria: latus diversum: is tamen motus non diu duravit, nec eo motu unquam sanguis cor ingressus est.

Atque his, præstantissime Bartholine, me tibi arbitror de motu sanguinis respondisse. In quem inquisivi scrupulosos, quæ melius humorum naturam & eorum defluxum cognoscere: à quo humorum fluxu innumeris morbi oriuntur. Credidi quoque me posse exactius intelligere quomodo bonus malusque sanguis generaretur, si cognita mihi ea: partes essent à quibus transiens humor immutaretur. Putavi quoque me melius iudicari-

Sed præter naturam aliam est.

rum, quomodo plurimi morbi curari debeant, fit cognitus habere cuius venæ incisio has illasque partes evacuet, et quas pertransire partes remedium debeat antequam ad affectum pertinet quæ pervenire? Occurrerantque innumera per totam medicinam diffusa; pulsuum doctrina, febrim, inflammationem, obstructionemque generatio & cura, aliaque ob quæ desideravi hunc sanguinis motum cognitus habere.

Experimenta autem quibus in hanc opinionem veni, ita evidenter sunt, ut non dubitem asserere Medicos doctos cordatolite impoliter hunc sanguinis motum esse admitturos: in causis tamen nonnullis huius motus quibusdamque circumstantiis non cum possum consensum polliceri: quot

quot enim homines sumus, iudicii quadam dispartate facile in diversas sententias imus.

De fide autem experimentorum dubitare Bartholine non potes qui corum non parvam partem ipse vidisti: adfuerunt autem sapientissime Medicæ Doctores doctissimi tibi non ignoti *Franciscus Sylvius, Ioannes van Horn, Ahasverus Schminerus* in dissectionibus accuratissimi, & viri solidæ eruditionis *Franciscus van der Schagen, & Antonius Pockflaert*: nec adfuerunt tantum, verum ad faciendâ experimenta & manum & consilia contulerunt, quibus hoc nomine plurimum debeo. His vale, ornatissime Bartholine, & me ama. Dabam Lugduni Batavorum, x Kalendarum Octobris Anno cfo 13 cxi.

ALTERA EPISTOLA DE MOTU SANGVINIS, ADEVNDEM.

EA Scriptorum fortuna est, ut etiam cum nolunt porro scribere cogantur: & Adversariis suis respondere, nisi aut sibi, aut causæ quam agunt, malint desse. Mihi certe plane alius intentio *Vir quidam doctus* hac voluit extorque. Quas enim antea vellicaverat De motu sanguinis, hisce diebus peculiari scripto conatus est refutare. In eo scripto non pauca ingeniosa sunt & docta: verum id in auctore desidero quod in Albutio Rhethore Vetteres, qui de omni causâ dicere cupiebat, non quiddid debeat dici, sed quiddid poterat. Eum quoque sanguinis motum qui in vivorum animalium dissectionibus evidens est, sanguinem conatus est observare: prorsus quasi certius res animo concipi, quam oculis posse videri. Verum hac aliæ Theſium auctori *Regio Drake* curanda relinquo, nunc apud Londinenses Medicinæ Doctores acuti ingenii & solidæ eruditionis: Ego ea tantum scaturus sum, quæ motui sanguinis in orbem obscurâ videbuntur. Et primo quidam hic nos doceat venæfectio, de qua digna considerata *Vir Doctus* annotavit.

Venam secuturus Chirurgus vinculum brachio injicit quo vena in tumorem attollitur. In tumorem attollitur vena, non quæ citâ ligaturâ cordi propinqua, sed quæ ultra ligaturam à corde est remota. Eius autem tumoris causa, non est dolor, quo vinculo confictâ pars afficitur: dolor enim felle exiguus aut fere nullus est in parte que ligatur. Et vellicatione, combustionemque acriori dolore affectum brachium, minus plerumque tumens venas, quam à simplici ligatura, habet.

Neque verolimus ut venas intumescere à ligatura, quod per venas à ligaturâ angustior, copiosior sanguis & celerius ab hepate feratur: ut circa pontes alibi arcta flumina rapidius labantur. Fluminis enim defluens aqua circa angu-

sum locum collecta evidenter in tumorem attollitur, à quo decidens celerius vadit. Ligato vero brachio contrarium evenit; non enim hepatis propiniores venæ à quibus sanguis veniret, sed ab hepate remotiores magis distenduntur.

Quare reliquum est, venas ultra ligaturam tumere, quod sanguinis à minoribus venis ad cor redeuntis motus ligaturâ sistatur, quic collectus venam distendat. Sed quo hac de re esse denuo certum possem, in vivis animalibus ramum jugularem cruralisque filo contrinxi arctissime, ut nihil sanguinis transfluere, aperui autem eam venæ partem quæ à corde remotior esset, & sanguinem copiose, celeriter & vehementer effudit. Mox vinculum laxavi & venam dissecui per medium, parique ejus à corde remotior sursum & corpore extracta, continuo & celeriter sanguinem dedit: interea dum venæ pars cordi propinquior; nonnulli elevata ne præ dolore fe concutiens animal facile exprimeret sanguinem; primo parum, mox nihil sanguinis largiretur. Vnde mihi videbatur evidens è venis remotioribus sanguinem ad cordi propiniores venire, nec è majoribus ad minores; nisi forte data via à vicinis sanguinis elaberetur. Tantumdem in venæ sectione brachii unusquisque facile potest experiri: si enim sanguinem qui supra ligaturam est sursum digito adigam, ut vena inanita videatur, non minus tamen sanguinem infra ligaturam videbit effluere; qui per ramum superiorem jam inanitum non potuit venisse.

Sed si ita vena à sanguine distenditur, qui à minoribus venis ad cor movetur, Quomodo à ligatura potest arteria distendi, quam distentam non pauci præstantes Medici referunt fuisse pro venâ distictam? Sane à ligatura non intumescit arteria, nisi qua cor respicit, remotiori vero parte condit aliquid & imminuitur, ut in vivorum dissectionibus centies & amplius sum expertus. A ligatura autem remotiorem distendi arteriam non plane

Sed quid facit quoniam motus sanguinis?

Namque à ligatura intumescit arteria, Colonus & Mecha, cap. 7.

plane auctores voluisse arbitror, verum id tantum intendisse, ubi vena non apparet quæ secunda est, tactu explorandum locum esse, ubi ea possit latere; & è jovea, motu tumoreque sanguinis cum inveniendo: tactu autem invento apparente tumore, non statim iudicandum ibi venam subesse, posse enim habere arteriam quæ nimia ligatura pullum amiserit, quæque ob tunicarum crassitiam non plane concidens, tumorem & quasi inflationem mentitur.

Sed duabus ligaturis intumescit quæ venas, & quare?

Verum insuper si à sanguine ad cor redeunte intumescit vena, cur vinculo ut supra ita quoque in tactu secandam venam injecto, vena tamen intumescit & disticta sanguinem fundit? qui sanguis ex inferioribus objecto vinculo non videtur posse venire. Verum enimvero id non semper accidit, sed aliquando tantum; quando certo intervallo brachium ligatur, atque tum cum sanguinem venæ majores, loco intra duas ligaturas medio, & minoribus venis accipitur, quæ minores venæ eum è minoribus habent arteriis, quæ Anatomici minoribus venis junguntur. Reverta autem illum sanguinem qui intra duas ligaturas effluit, Anatomici ex arteriis venire, id indicio est, quod si majori impetu & calidior effluit, ac facilius citiusque ad ejus effluxum Lipothymia sequatur. Atque hac ligatura ut soleo ubi spirituosum ferventemque sanguinem esse in vitio indicia habeo, jubeoque Chirurgum illas Anatomicos ligaturâ querere: supra enim Anatomicos injecta sistit sanguinis motum, infra vero non remotorum eum, sed calidior sanguis ad egrum tatum exilit.

Sed quid facit quoniam motus sanguinis?

Secunda vena sanguinem effluente quando sanguinis nimis copiose quam antea, aut ab initio non satis confertur liquet, ligaturam laxamus quo sanguis uberius effluit. Laxari autem non videtur ligatura quo sanguis per venas ab hepate veniat. Etiam si enim nihil aut minimum sanguinis supra ligaturam, imo fovea aliqua in vena appareat, promoveri tamen laxatione vinculi sanguinis effluxus videbitur, qui ex inani vena non potest venisse. Verum potest laxato vinculo melius sanguis per arterias descendere & ex eis venas intrare, quod liberiores evadant. Arterias autem ligato brachio sæpe non satis libera ligaturâ testabuntur, qui arteria sæpe pullum ad ligaturam persentiscunt, quem sensum compressa adfert arteria ubi ad carnem allicit. Et Medicus si exploret, sæpe minorem pulsuum in ligato brachio quam in libero persentiscit. Tactare possum, me aliquoties cum vinculum laxaverit digitum carpo applicuisse, & animadvertisse, ubi à laxatione vinculi sanguis copiosior effluere, pulsuum factum esse majorem.

Sed quid facit quoniam motus sanguinis?

At si sanguis qui secunda vena effluit, ex arteriis in venas veniat, quomodo si potest copiosius educi? omnes enim arterie pulsat æqualiter, quare & videtur eadem mensura sanguinem venis largiri: si autem reliquæ arterie tantum suis venis, quantum arterie brachii tribunt & educitur, an non cito cor omni sanguine destitueretur? nullum certe periculum est. tam cito enim diximus sanguinem ad cor venire, quam ab eo pellitur.

Page. lxxxij.

Non arbitror tamen sanguinem æqualiter omnes venas intrare, etiam si æqualiter arterie pulsare videantur: in locum enim vacuum facilius fluit

celerique omnis liquor, in quo nihil est quod adire debet & propellere. Et insuper hic quod evacuat venis sanguis, magis quam à repletis trahitur.

E vena autem secunda cubiti copiosior sanguis, quam è manu fluit, quod omnis ille sanguis qui per omnes anatomice cubiti manufque ad venas venit, per venas cubiti debet redire; per manus autem venas parior, & is tantum qui per Anatomicos manus venit.

E vulnera quidem arteria, sanguis continuo effluit etiam non ligatur. Verum id accidit quo sanguis per arterias vehementius, quam per venas feratur: quæ vehementia arteriam replet, tunicam attollit & distendit, & ea si aperta sit necessario impetu elabitur.

E secunda vena ubi satis sanguinis effluit, eum sistimus sub lato vinculo, quod via pristina jam liberiter queat sanguis deferri. Sin vero accidat ut collecto circa ligaturam sanguini nimis copioso, venæ celerem nequeant transitum largiri; aut ita vultus amplum insidit illum sanguinem qui intra duas ligaturas effluit, Anatomici ex arteriis venire, id indicio est, quod si majori impetu & calidior effluit, ac facilius citiusque ad ejus effluxum Lipothymia sequatur. Atque hac ligatura ut soleo ubi spirituosum ferventemque sanguinem esse in vitio indicia habeo, jubeoque Chirurgum illas Anatomicos ligaturâ querere: supra enim Anatomicos injecta sistit sanguinis motum, infra vero non remotorum eum, sed calidior sanguis ad egrum tatum exilit.

Quem ut sistant plane nostri Chirurgi hodie non raro, paulo infra vultus venam comprimunt atque ita sanguinem sistunt; ne si supra vultus comprimant, statim in vulnere retentus sanguis concrecat & venæ consolidationem remoretur. Hac autem ratione sisti posse sanguinem qui negant, nescio ubi illi debeant dimit mereri, qui in rebis nobis audent imponere. Cum autem is sanguis inferiori parte compressa sistatur, liquet sane cum ex inferioribus venis.

Si vero contingat, non in venæsectione quidem, sed alio infortunio, venam vulnerari ut sanguis sisti nequeat, vena transverſim distenditur: unde, cum non amplius ut antea tendatur vena, sursum & deorsum distictæ partes in carnem trahuntur, à qua carne comprimuntur occidunturque venæ oscula, idque tanto facilius quod per vicinas venas tenas patulæque moveri sanguis his occultis possit, quare & eam ob causam disticta minori arteria transverſim, hæmorrhagia aut inflammationem non succedit.

Quæ cum ita sit, omnibus arbitror liquere ea quæ in venæsectione accidit, aut comprobare circulem sanguinis motum, aut ei saltem non refragari.

Sed cum alia quoque nobis objiciantur, excutienda & ea sunt. Et quidem quod sanguinem per venas non ex arteriis, sed proxime ab hepate venire eo comprobant, quod partes quedam sanguinem accipiant, & ab affluxu sanguinis tumores patiuntur quæ arterias non habent, inter quas pleuram nuncrant. Verum non sequitur si partes arterias non habent, earum venas sanguinem ab hepate, non vero alibi ab arteriis accipere. ut enim diximus sanguinem ex arteriis melenfericis celiacæque venas melenfericas splenicæque intrare per quas in hepate ferantur: ita & alia venæ accipere sanguinem ab arteriis possunt, quem in partem ab arteriis remotiorem possent deferre. Nulla tamen corporis pars iuste molis est, in qua Anatomici conspicuas arterias non & vere agno-

Verum si prius inciderit.

Obstructionem soluit.

In quædam ligaturâ inveniuntur.

non præ dolore.

non à causa.

hinc vena.

Quæ ex arteriis colligitur non ligata effluit.

Laxata ligatura sistitur, minoribus venis, & quare?

Sistitur autem non disticta vena, & quare?

Disticta quæ per medullam vena, & quare?

Sanguinem parva nulla per vena accipere liquet exceptis.

ctiove foveamur, alia cavitatis ventriculorum potest observari. Aft tantum progressivus quidam motus in majori corde animadveritur quod dilatatio conftrictioe evidenter à basi incipiat & fenfim ad mucronem pergat, quamvis totus momento ferme peragatur. Et quo mihi plane constaret interius quoque cor undiqueque conftringi, præficio utriusque ventriculi mucrone, vivo canis cuniculique cordi pollicem indicemque digitum inferi; fenfque manifestò cordis latera digitos ad cordis septum æque in medio, mucrone, ac basi premere: foveas autem, ad fenfum in majoribus animalibus, non majores sed minores fieri. Mox autem remittente conftrictione latera cordis supra infra & in medio laxari, foveasque evidenter majores perfentiri. In fepto autem ipso nullus motus fenfitur, nisi quod à spiritibus querentibus exitum quadam quasi palpitatione videatur. Vbi vero motus finitri ventriculi in moribundis defuit, feptum dextri ventriculi motum fequitur.

In dilatazione tamen cordis, non in conftrictione naturaliter effundit sanguinem volunt, quod in vivorum vulnerato corde in dilatazione exire sanguis conspiciatur. Et hoc quandoque verum est; sed quod inde colligunt fenfus ipsi attestantur verum non esse. Vel enim canis aliudve animal capite thoraceque elevato, demisso ventre, constituitur, atque ita cordi adhuc ingitur vulnus: in eo jam, cum sanguis qui per venam cavam, arteriamque venosam cor intrat, altior quovis cordis vulnere fit, è simul ac intravit, quod in dilatactionis initio est, non pulsus cordis, sed solummodo sua gravitate effluit, quare nec ulla vi ut in arteriarum contingit pulsus in distans propellitur. Sin vero, ut fieri æquum est, canis lupinus, capite ventreeque in eodem collocetur plano, & vulneratum cor digitis erigatur, quamdiu cordi aliquid robur adest, sanguinem quem accepit citius conftrictione in distans ejicit, quam cor totum repletum fit aut dilatatum. Vbi vero cordis deficit robur, & non nisi raro aut profus non se conftringit, quia robustiores sunt auriculæ, & eo tempore etiamnum pulsant, quo cor plane deficit. Sanguis ab auriculis propulsus intrat cor, accumulatur, & quando majori copia ingressus est quam quæ corde contineri queat, exire è vulnere; non impetu quodam ut pulsus effundendum foret necesse, sed leni motu & stillando. Ut fenfus nullum validum motum sanguinis nisi in cordis conftrictione quem animal vertere.

Per venas autem sanguinem ad cor tantum volunt redire, quod impulsus ad partes sanguis, ut aqua cornu infusa, regurgitet sursum, atque ita ad cor referatur. verum jam indicia dedi aut trahi aut à singulis venarum partibus sanguinem propelli: præter quæ & hæc habeo; quod exempto è corpore corde, motus tamen sanguinis, ilique satis celer in venis videatur. Et si vena ultra, etiam lactea, duobus locis ligetur, laxata ea sola ligatura quæ cordi propinquior est, dum partes adhuc calente, semper chylus ad hepar, sanguis ad cor movebitur: qui nec à corde per arterias, nec ab intestinis per lacteas, obiecto potuit obice propelli: nec fluiditate sua potius sursum quam deorsum moveretur.

Sed absolvamus reliqua quæ priores objiciunt: putant fita rapide sanguis moveretur, venas & arterias commode non posse nutrire. At canis postum fedare potest è Nilo bibens & fugiens, hic autem partes ad rivum morantur; & quicquid è sanguine traxere in suam substantiam recondunt, ne à transfuxu humoris elatut.

Sanguini quoque non putant hunc motum plane utilem esse. Eum enim, quia calore nativo abundat, respirazione transpirationeque ventilatur, satis potest conservari. Amplius tamen eum ventilari certum est si celeriter moveatur, minimeque etiam ejus particule eo motu agitentur, ita Lacutris aqua etiam moveatur leniter & supra parte flabellum admittat, corrumpitur tamen; interea dum undique agitata flumina manere saluberrima deprehenduntur.

Hæc ea sunt præstantissime Bartholine, quæ priusbus adjicienda esse videbantur, quo satisfieret illis qui novam recipere opinionem non possunt, in qua obfcuritatis aliquid aut difficultatis observant: quibus sæpe nec animus nec tempus est penitus in eam exactiusque inquirendi. Verum meo judicio neganda non sunt manifesta, etiam si solvere non possemus quæ sunt difficilia.

De verbis autem cavillasse cum nemine unquam libuit altercari. Plurima egregiaque sunt quibus illud impendi tempus possit, quod & sæpe non suppetit necessarii. Querenti quoque derisorii scientiam ipsa sese abscondit, sed studioso veritatis obviam venit & se præbet conspiciendam. Vale Dilectissime Bartholine, ex Academia Batava Leydenf. Kalend. Decembris. c. 10 10 cxi.

FINIS.



Acrio in parte præcipuum, & cur, xviij. b
Anatomico quam necessaria habebant, liij. b
fufam antecedit, xlv. a
quid ea, & quomplex, ibid. & viij. b
est neque, & usuf partium, & membrorum, ejus perfectio duo in parte requirit, xviij. b
Adeps Mefenterij, ejus generatio, ulius communis, in penatis, vj. a
Mefenterij Mefaricarum, viij. b
Albor partis nihil habet ad ufum peculiare, xxviij. a, in fine.
fequitur materie necessitatem, ibid.
Alexander, xxxij. b, in fine.
Alexander Tadius, xvj. a
Mefaricarum, viij. a
quid differat à Mefaricis, xxiij. a
Anatome quid, xviij. b
quor in parte quare confideret, ibid.
Anatomicum oportet credere propriis oculis, xvj. b
Andreas Trevisius, xij. b
Aneurisma circa jugulum, & quid eo notatum, xlv. a
Anguille cor pulsat sine auriculis, xlv. b
Anguille, quid? xviij. b
est Galeno veridima nutritio, ibid.
Appotio, & agglutinato Galeno quid? xxiij. b
Aguapendentes novum inventum, ejus rationes pro ventriculi è chylo nutritione nulle, male negat nil nutrire, nisi per omnia coditionum instrumenta provecum, xxiij. a
Aque potiores edaces, xxvj. a
Archangelus male Gal. impugnat, vj. b
notatus, vij. b, xxvj. a, xxxij. b
refutatus, xviij. b, xvj. a
Arenæ, xxxij. b, in fine.
Aristoteles declaratus, xij. b, xvj. b
xviij. b, xxiij. b
ejus error, viij. a, x. a
quantum fenfibus tribuat, xv. a
novit alia vafa chylo deberi, alia fenfu, xvi. a
venas perquiri jubet in frangulatis, xvj. b
Galeno è Mefaricis, xxiij. b
quid fenfient de officio lienis, xxxij. b
de venarum numero & origine, xxxij. a
Aristotelicorum de officio Lienis opinio, xxxij. b
Aristoteles Mefenterij Galeno quid? v. a
Arteria aorta ad cor ligata & jugulari incifa, arterie inannuntur, venis repletis, li. b

Bfecta cur fanguis cum impetu exeat, xliij. b
venofa cur venas veteribus, li. b
Arteries dilatantur corde contracto, xviij. b
in cadaveribus cur parum, venæ multum fanguinis habebant, liij. b
fanguinem deferunt à corde, li. b
Veteribus venæ vocantur, xlv. a
Arteriarum Mefaricarum nomen, fenfus, magnitudo, numerus, origo, inferius in intestina, cor, & Mefaricis, xlv. a
eum progressus, principium obicurus, quoniam venarum, & cur, actio & ufus, viij. b
cur tam multe in intestinis, viij. b, x. b
de is Erasistrati error, ibid.
cor iis conquisit nervi, x. b, xj. b
an chyli aliquid in fe alliciant, viij. b
non comportant chyli ad cor & venas, x. a
non respondent arterijs umbilicalibus, x. b
per fibras tranfmittant, xxviij. a
Arteriarum pulfus est ab impullo fanguinis, xliij. b
Atrophia à Gicchio glandularum Mefenterij, vj. b, xxvj. a
Auctor Mafogges, viij. b
Finit. Medicarum, xxv. a
Lib. de uf. refpir. laudatus, xxv. a
explicatus, vj. a
refutatus, viij. b, in fine. xxxij. b
Lib. de Anatome vivorum notat, viij. b
Lib. de compag. membr. viij. b
Avenroes, xxviij. a, xxxij. b
refutatus, xxiij. b
Avicenna notatus, vj. b, viij. b
laudatus, xxiij. b
Auriculæ ante cor vivunt & post mortem, xlv. a
cur in fectu majores, lxii. a, b
in ovo unde fiant, xlv. a
funt proutipuarum fanguinis, xlv. a
Auricularum cordis varia confitutio, lxij. a
motus qualis, xlv. a
cordis motum præcedit, ibid.
Auricularas habent aut quid iis analogum quæcumque cor, xlv. b
Auricularis moteri ceffantibus manet in fanguine motus & qualis, lxvj. a

B.

Babinius notatus, viij. b
exculatus, ibid.
Benedictus, xvi. a
Bilis affluencia nihil facit ad jejuni inantem, xx. b
bilis in jejunium vacuatio quomodo fiat contra Fallopium, & Archangelum, xvj. a
Bulus, feu buccæ dulcis, xxx. b

C.

CAlor an instrumentum tractus, xxv. a
quomodo attrahat, li. a
Canum Mefenterium, vj. b, in fine.
Capivaccus notatus, xviij. b
Caro innotinata, xviij. b, in fine.
Carolus Stephanus, xviij. a, b, xvj. a
Carpus, vij. a, xliij. a, xxv. b, xxxij. a, xxxij. b
Cava ab aorta munere & ufui diffingitur, li. b
Cellus laudatus, xij. a
ejus venæ albae, xliij. b
Cerebrum frigidum Metropolis, plurimis venis fcatet, xxvj. a
non femper ventriculos habet, lxij. b
Chyli motus cor inquirendus, lxvj. b
Chylus toris tenuiffimi infar rapitur in Mefaricis, xvj. a
quadruplici motu ab intestinis ad hepar promovetur, xxxij. b
an fanguine craffior? xxv. b
ex valis fuis exiens aliquid quam in hepar corrumpitur, xxxij. b
nihil ejus à ventriculo ad hepar concredi, xviij. a
Chyli motus per venas lacteas facile observatur, lxviij. b
quomodo fiat, lxviij. b
Cibus affumtus primum locum in ventriculo occupat, lxvj. b
eum quomodo ventriculus concoquat, lxviij. a
quomodo coctus diftribuitur, lxviij. b
& ad quos partes, lxviij. a
Cicero notatus, liij. b, xj. b
explicatus, xj. a, in fine. xv. b, in fine. correctus, xxiij. a
laudatus, xij. b, xliij. a, xvj. a, xxvj. a
Ceci ductus in corpore noftro, a. in fin.
Columbus notatus, vij. b, in fine. xliij. a
ejus valvula in Mefaricis, viij. a
defenfus contra Archangelum, xxiij. b
Conftantius Varolius, V. Varolius.
Contingam cor parte contacta illefa totum habitum inficit, lxviij. b
Continuas venis quid præftet, xviij. b, in fine.
Coftæ laudatus, xij. a, xvj. a
improbatus, xxv. b
Cor columbæ moribundum falva refufcitatur, xlv. a
contrahitur undique fed magis fecundum latera, xliij. b
contractum dariufculum fit, ibid.
pectus fenfus, xliij. b
fanguinem protrudit coarctatione ventriculorum, xliij. a, lxviij. b
non vero attrahit, ibid.
ex langum lentiffime pulfat, xlv. a
in frigidioribus, cum moveatur, albidus fit, cum quiefcit rubicundus, xlv. a
xliij. a, liij. b
moteri & quiefcere per vias unde pateat,

INDEX

pateat, xliij.b
 officina sanguinis, liij.b
 quomodo non ladatur, ex tranitu
 nosci humoris, lxxx i j b
 omnia animalia habent, xlvj.a
 quae confringatur, lxxvij.b
 sol microcosmi, lxxv.b
 solum pars princeps, lviij.b
 vita & calor fons, lviij.b
 Cor coelestium qui reperitur, xlvj.a
 Corde nullum animal sanguinem curat, lxxj.b
 pulsare cessante totus sanguis nequit
 exauriri, liij.a
 Cordis fibre omnis generis sunt, lxxij.a.b
 variis intertextae, xxvij.a. in fine
 rectae ab Arif. nervi vocatur, xlvij.b
 cur, liij.b
 mori non convenit exemplum Vela-
 lii de vimineo circulo, xlvij.a
 motum quae simul ordine consequan-
 tur, lxxij.b
 motus proprius fystole, xlvij.a
 qualis ex vivum dilucone, xlvj.b
 quomodo fiat, xlvij.b
 tenio quadam est, xlvij.a
 deglutitio quadam est, xlvij.a
 valdarum usus, lxxj.b
 Cor in fectu oculo est, xlvij.b
 minime oculo est, xlvij.b
 Crusta intestina oblesant, xlvj.b
 Culina corporis imus venter, xlvj.a
 Cuncus non intellect Gal.

D.

D Alechampi in Plinio error, xliij.b
 Deglutitio quomodo fiat, xlvij.a
 Diadoli Mefaricaorum, viij.b
 Distributio actio composita ex tractu, &
 pulsi, xlvij.a. in fine
 Disciplinarum inter se nexu, xlvij.a
 Dolor quomodo attrahat, lxxj.b
 Doloris quodam obiter perfrictus, xlvj.a
 Dulcis bolus seu dulcis buccae, xxx.b
 Durities fibrarum cui usus, xxvij.a

E.

E Leufnia sacra, xxxj.a
 in Embryone constituto voracum
 cordis quae, xlvij.b
 jecoris usus cor nullus, lxxj.a
 pulmones otantur, lxxj.a
 ventriculi duo quasi unus sunt, lxxj.b
 Epicus, xxxj.b
 non est primus auditor vocis, lxxj.b
 tractus canum quam statum, xlvij.b
 Erasistrati error de arteriis Mefaricis, xlvj.b
 de alimentis digestionem, xlvij.b
 cur agatur appellat arterias Mefari-
 cas, viij.a
 incidit homines vivos, xlvj.a
 in fine vidit laeas, sed non a-
 gnovit, xlvj.b
 Exanguia hieme nihil, quod pulsat, ha-
 bent, lxxv.b
 Exanguinem cor lentissime pulsat, lxxv.b

F.

F Ames cur statim a cibo cesset, xlvij.b
 an suctus ejus causa, xxxij.b

Fallopium laudatus, vj.a. xj.a
 male Galeum impugnat, vj.b
 retitatus, xlvij.a. xlvj.a. xlvij.a.
 xxx b
 Febres intermittentes an a Laetis affe-
 ctis, xxx.b
 Febres quae certis temporibus redeant
 aut exacerbentur, lxxv.b
 Fernelius, xxxj.b
 reprehensus, xj.b. xlvj.b
 Fibra in sanguine animalium, partes fi-
 milares et semine, xlvj.b
 Hepatis aquarum, xlvj.b
 cur in eo nulla, ut in corde cavitates
 rectae trahit, transveriae pullant.
 Hermolaus Barbarus, xlvij.a.b
 Hepathis explicatus, xlvj.a
 folius, xlvj.a
 Helychius, liij.b
 Hippocrates explicatus, vj.a. viij.b. xj.a.
 xlvj.b. xlvj.a.
 carnose sole cum manifesto motu tra-
 hunt & pellunt, lxxij.a
 Effluvia, xxxj.a
 Poetus laudatus, liij.b. in fine
 Foramen olei in vena cava ubi & quan-
 do reperitur, xlvij.a
 Frigida omnia an paucis egeant alimen-
 to, xxv.b. in fine
 Frigidus ventriculus plurimum appetit
 cibi, xlvj.a
 Eufchius improbat, xlvj.a

G.

G Alenus notatus, vj.a. viij.b. xj.a.
 xxxij.a. xlvj.a. xlvj.a.
 excusatus, viij.a
 correctus, viij.a
 explicatus, a contradictione vindica-
 tus, viij.a. xj.a. xlvj.a. xlvj.a.
 defensus a calumnia Vesalii, &c. viij.a
 laudatus, viij.a
 perperam citatus, viij.b
 quantum sensibus tribuit, xv.a
 indigens fuit in perquirendis vasis
 chyli, lxxj.b
 frigide disputat contra Erasistratum,
 lxxj.b
 venam omnem statim diffimilarem, xlvj.a
 male Mefaricas vulgares laudare
 comparat, & fugere dicit, viij.b
 ejus insensibilis in explicanda nutri-
 tione ventriculi, & intestinorum in-
 explicabilis, xlvj.a. & feg.
 aut peccat, aut valde populariter lo-
 quitur de speciebus tractus, xlvij.b
 in fine
 non recte fuit de preparatione chyli
 in Mefaricis, xlvj.a. & feg.
 ejus laborum de usu partium duo
 summa capita, xlvj.a. in fine
 non sibi confat de vi venarum ajuvan-
 tium, xxxj.a. in fine
 ejus sententia de lenis officio sola ve-
 ra, xlvj.a
 vix explicat cur nulla in hepate cavi-
 tates, xxxij.b
 Garza, liij.b
 temere a Plinio discedit, xlvij.a
 Glandulae Mefenterii duplices, utrumque
 quae usus, proportio cum vasis, viij.a
 an foveat calorem vasorum, an ab-
 sorbeant humiditatem intestino-
 rum, impediunt ne confringatur
 vasorum ductus, patiuntur scir-

H.

H Emorrhagia, a timore cur fede-
 tur.
 Hepatis vicinia nihil facit ad jejuni in-
 nitatem, xlvj.b
 Hepatis aquarum, xlvj.b
 cur in eo nulla, ut in corde cavitates
 rectae trahit, transveriae pullant.
 Hermolaus Barbarus, xlvij.a.b
 Hepathis explicatus, xlvj.a
 folius, xlvj.a
 Helychius, liij.b
 Hippocrates explicatus, vj.a. viij.b. xj.a.
 xlvj.b. xlvj.a.
 vult Mefaricas trahere a ventriculo,
 vult fieri per eadem anastom, &
 diadoli diversis temporibus, viij.b
 tribut alia vasa chylo, alia sangui-
 ni, xv.b
 lienem hepatis dat vicarium, xxxij.b
 de vena porta, xxxij.b
 Hildon in Anatome primus locuti de-
 betur, xlvj.b
 explicat naturam membri, xlvj.b
 Hominem incidere nefas, xlvj.a
 est veterum quidam fecere, lxxj.b
 Horatius, xlvj.b
 explicatus, xlvj.b. xlvj.a

I.

I Acobus de Partibus notatus, viij.b
 in fine, xxxj.a
 laudatus, xxxij.b. xxxij.b
 Iecur in fetu otatur, lxxj.a
 & posterior gignitur, lxxj.a
 Intestinum duodenum correctum, viij.a
 Intestinum jejunum cur semper inane,
 xlvj.b
 ejus vulnera cur lethalia, xlvj.b
 Intestinorum crusta, xlvj.a
 eorum & lumborum sympathia, vj.a
 an slantur chylo, xlvj.b. & feg.
 cur multo alimento egeant, lxxj.a
 per ea totum expurgatur, lxxj.a
 gracilia veteribus Laetia dicta, xlvj.b
 & cur, xlvj.b
 Iohann. Cosseus V. Costaeus.
 Iovennalis, xxxj.a. in fine

K.

K ubi dicitur qui, xxxij.b
 cur tam cito reddat per urinas
 quae bibere, lxxj.b

L.

L Actes, seu Laetiae venae quartum, &
 ignotum adhuc vasorum Mefarica-
 rum genus, xlvj.a
 an verum dentur, xlvj.b
 an novum inventum, xxxij.b
 quando inventa, & quomodo, xj.b.
 xlvj.a
 in quibus brutis clarissime, in quibus
 hominibus, xlvj.b
 quot de eis explicanda, xlvj.b
 praenoscenda, xlvj.b
 cur his nominibus appellatae, xlvj.b.
 Lactium

Laetium vasis significationes apud ve-
 teres, xlvj.b
 apud recentiores, xlvj.a
 cur laetatur ventribus, xlvj.a
 cur tam cito coelestent in animalibus
 mortuis, xlvj.a
 vivis cum secantur, xlvj.a
 an jungatur arteriis per poros, xx.a
 per anastomoses, xlvj.a
 eorum tymon, xlvj.a
 substantia, xlvj.a
 sunt de genere venarum, sunt partium
 diffimilares, lxxj.b
 temperies, xlvj.a
 temperiem consequentia, albor, re-
 nituit, &c. lxxj.b
 conformatio in figura, levitate, aspe-
 ctu, colore, caris, meatibus, lxxj.b
 valvulae, lxxj.b
 magnitudo, numerus, positio, xlvj.b
 gyri, & plexus in Pancreate, xlvj.a
 communicatio cum aliis partibus, quoad
 originem, finem, & interfectionem in
 intestinis, xlvj.a
 progressum ad hepar, lxxj.b
 a Pancreate an ab hepate oriatur, xlvj.a
 sui generis venae sunt, an porte ramu-
 ad ventriculum non pertingunt, xlvj.a
 videri, xlvj.a
 neque ad Lienem, xx.b. xlvj.a.
 xlvj.b
 earundem actiones, communis, xlvj.a
 quae nutritio, xlvj.b. in fine. & feg.
 non aluntur chylo, xlvj.b
 propria quae est ad nutriendum, lxxj.b
 chyli est ad hepar, xlvj.a
 sensus, lxxj.b
 usus, quos praebet distribuendo chy-
 lo, lingulae, earum partes, xlvj.b
 fibre, xlvj.a
 caro, lxxj.b
 membranae, lxxj.b
 temperies, lxxj.b
 temperiem consequentia tenuitas, ra-
 ritas, xlvj.a
 quae accident: figura, levitas, & aspe-
 ritas, cara & mensus, xlvj.a. & feg.
 valvulae, angustia, contractus, multi-
 tudine, & parvitas, finis, lxxj.b
 interfectionis modus, crusta intestina ob-
 liens quid sit praeterea, item adips-
 in Mefenterio copia, glandulae,
 lxxj.a. & feg.
 usus quos praebet earum cognitio
 Medicis, & Philosophis, xxx.b
 physiologici, xxxj.a. & feg.
 pathologici, & Therapeutici, xxxij.b
 Laetibus nulla cum venis hepatis ceteris
 communio, xxxij.a
 desunt in hepatis carnem, xlvj.a
 sunt vere vena porta, xxxij.a
 complura novorum morborum gene-
 ra asperit, xxxv.a
 sunt in causa chylosi fluxus, item atro-
 phia totius, flosce item quarundam
 febrium intermittentium, & me-
 lanch. Hypochondriacae, & Me-
 lanch. Hypochondriacae, & Me-
 Laurentius notatus, viij.b. viij.b. in fine.
 xlvj.b. xlvj.a.
 ejus rationes contra chylo proprias
 venas nullas, xlvj.b
 Leon. Botallus cur transmittit sanguinis
 & cava in finitum ventriculum quo-
 modo falsus, xlvj.b
 Levitas in parte matricis comitatur, xlvj.a

INDEX

Lenis officium, xxxij.a
 Ligatura cur attrahat, lxxij.a
 quomodo attrahat, lxxij.a
 quomplex, liij.a
 Lipothymia a sanguinis missione quam
 causam habet, lxxj.a
 cur fluens fanguinem sistat, lxxj.a
 Lucerius, lxxij.b
 Ludovici Septalii vera laus, xlvj.b
 Lumborum, & intestinorum sympathia, vj.a
 Lupi Lampridio, & Suetonio qui, xlvj.a
 Luporum laesae, lxxj.b

M.

M Acrobis notatus, liij.b
 Matus actionem suam obient per
 conformationem, xxvij.a. & feg.
 Massae error de venis duoden. viij.b
 de nutritione ventris & intestinorum,
 xxxj.a
 Mestus Fallopiiani in glandulis, & Pa-
 creas, xxx.b
 Medicamenta foris applicata quomodo
 intus vires exsunt, lxxj.a
 Melancholia hypochondriaca an a La-
 etis affectis, xxxv.b
 Membri naturae cognitio in quibus po-
 sita, xlvj.b
 Membranae Mefenterii cur duae, & ut
 duae sectione deprehendantur, vj.b
 & feg.
 Menstrus circa uterum quomodo collig-
 antur, lxxij.b
 quomodo ex utero in caput feran-
 tur, xlvj.a
 Mercatus, xlvj.a
 ejus commentum circa venarum al-
 terationem, xxxij.b
 de fibris carnis venarum, lxxj.b
 Mefenterii, lxxj.b
 Mefaricae, V. Venae Mefaricae.
 Mefenterium, ejus nomina, figura, situs,
 origo, liij.b. & feg.
 connexus, magnitudo, numerus, vj.a
 compositio, partes propriae, vj.b.
 & feg.
 non propriae, viij.b. & feg.
 usus, viij.b. & feg.
 est Gal. triplex, vj.a
 omento simile, vj.a
 item tenui cerebri menyngi, lxxj.b
 Mefaricae, lxxj.b
 Mors quid, lxxij.b
 ejus generis, extinctio & suffocatio,
 liij.b
 Murenarum laesae, xlvj.a
 Mustum quae fit in vino ad vini per-
 fectionem promovet, xxxij.b

N.

N Atura una non nisi ad unum uti-
 tur, xxxj.b
 ejusdem ejusque seu per se actionem admi-
 randum, xxxij.a
 Nervi qui Hippocrati, & veteribus, vj.a
 Nervorum Mefaricorum numerus, liij.b
 situs, magnitudo, xlvj.a
 progressus, interio, principium eo-
 rum, divisionis, originis, usus ra-
 tione, intestinorum: lumborum ar-
 teriis cur contigit, xj.a. & feg.
 de eorum magnitudine error recen-
 tiorum, xlvj.b

Nominis notio quam necessaria, rei no-
 tificum parit, xlvj.b. & feg.
 Nomina nova nobis rebus quot modis
 ponantur, xlvj.a
 Nutricamentum vere, & non vere, xlvj.a
 Nutritio imperfecta, & secundaria
 Massae, & Archangelii explosa, xlvj.a
 Nutritio vera, & perfecta quot Gale-
 no, Nutriti nihil nisi quod proveidum per
 omnia nutritionis instrumenta, xxxij.b

O.

o in is, principium scientiae, xlvj.a
 totum potestate, lxxj.b
 Objectiones contra Laetias chyli diffri-
 butrices remotae, xxxv.a. & feg.
 Oro gutta palpitans ante omnia iusta, xlvj.a

P.

P Anceres insignis glandula, viij.b. xx.b
 cur Mefaricis vasis substantia, viij.a. xlvj.a.
 viij.a. xlvj.a.
 Pausanias & Xenocrates, xlvj.a
 veteri originem lactearum, xx.a
 Patetus notatus, viij.a. xlvj.a
 Pars similis Galeno & Aristoteli quid?
 in parte quot spectanda, xlvj.a
 ejus natura quibus confert, xlvj.b
 Pars diffimilans dupliciter dicitur,
 xlvj.b
 ad partis integratorem eorum, quae
 accident necessitas, xlvj.a
 Partium organi ad actionem edentis qua-
 duplex varietas, xlvj.a
 in parte ad perfectam actionem eden-
 dam quot requirantur, lxxj.b
 Perfusus explicatus, xlvj.b. in fine
 Pellentium duplex genus, xlvj.b
 Pessata quae vi in sanguinem in vena fi-
 cessat, xxxj.b
 in Piscium marium ventriculis succus,
 Lactes veteribus, xlvj.a
 Plantae animalia cor non habent & cur,
 lxxj.a
 Plato, xlvj.a
 tribuit alia vasa chylo, alia sangui-
 ni, xv.b
 lienem vicarium dat hepatis, xxxij.b
 Plautus explicatus, xlvj.b. in fine
 Plinii vulgata lectio defusa, xlvj.b
 Plume Mefenterii cui usus, vj.a
 Polius, xlvj.a
 Pomponius explicatus, xlvj.b
 Praenoscenda de lactibus, xlvj.b
 Praenotio de subjecto in duobus consi-
 flit, xlvj.a
 Preparare non est conferre aliquid fure-
 tur, xxxj.b
 Probi locus explicatus ex Hippocrate, xlvj.a

M m

Polyvites Aristoteli quid, xlvj.a
 ejus necessitas, xlvj.b. & feg.
 Polyvites quid, lxxj.b
 non est vox Epicoe propria, lxxj.b
 Pulvi rudimentum primum quale, xlvj.b
 Pulmones plurimo fanguinem in visis cir-
 cumfluunt, xlvj.a
 vasa ampla cor habeant, lxxij.b
 Pullatione non opus ad retinendum, lxxj.b


A D R I A N I
S P I G E L I I

B R V X E L L E N S I S

O P E R V M

Quæ extant omnium

T O M V S I I.



A M S T E R D A M I,
Apud IOHANNEM BLAEV,
C I O I O C X L V.

ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS
DE
SEMITERIANA

Libri Quatuor.

ADRIANVS SPIGELIVS
LECTORI S. P.



Responsum mihi in Patavino Gymnasio duplex onus, Anatomem scilicet & Chirurgiam docendi impositum esse sciam; atque jam in hoc me pluribus annis ita exercuerim, ut (si standum est amicorum iudicio) jam tempus esse videretur scriptis publicis aliquod signum profectus meorum studiorum Reipub. Litterariae ostendere: tamen longe alia mihi mens fuit cum hos de Semitertiana libros exordirer, & nunc ante alios, quos de Anatomicis & Chirurgicis rebus sum exorsus pertexerem. Nam cum de his multa à Veteribus ac recentioribus exarata esse, atque adhuc indies exarari conspiciam, de ista vero febre nil aliud haecenus fit conscriptum, quod juniorum Medicorum mentem ad ejus paulo meliorem quam tradita est, notitiam & curationem posset illustrare; operae pretium me facturum putavi, si à studiis Anatomicis & Chirurgicis diverterem, & hos quatuor de Semitertiana libros prius publicarem. Scio hoc opus esse, quod potius eos, qui in Gymnasis jam diu Practicam vocatam Medicinae partem profitentur, conscribere deceret. Sed quoniam omnes ubique nil aliud suis auditoribus de hac febre praelegant, atque haecenus praelegerint, quam eam ex tertiana intermittente, & quotidiana continua, vel tertiana continua, & quotidiana intermittente constata esse; & ideo causas, signa, curationem utriusque febris simplicis in ea misceri, non potui manum à calamo continere, quin ego quid de hujus febris natura, ac curatione sentiam, pluribus observationibus edoctus eos commonefacerem: certo sic sperans, me aliquem ex tot, tantisque viris cui publica salus, ac valetudo curae, ac cordi est, ad hasce meas animadversiones curiose perlegendas, & opiniones diligenter examinandas, aliasque meliores edendas pro publico bono stimulaturum.

Non est vero quod quis suspicetur hanc febrem novam esse, aut usque adeo raram, ut in sexcentis febricitantibus vix conspiciatur; vel inauditam, cum fortassis nomen Semitertianae ad aures ejus nondum venerit; aut pro levi aliquo malo habendam esse. Nam Hippocrates & Galenus in suis libris hujus mentionem fecerunt. Ejus quoque meminere P. Aegineta, Aëtius, Alexander Trallianus, Arabum princeps Avicenna, & nonnulli recentiorum, qui seculo novissimo barbari dicebantur. Agathini libri, qui de hac febre Galeno adhuc vivente extabant temporis injuria perierunt. Galenus ipse hanc Romae frequentem fuisse commemorat, & in eo Mauritaniae tractu, qui est prope littus Mediterranei Maris. Frequens etiam nunc iisdem in locis, & in Germania, Pannonia, finitimisque regionibus. Sed, bone Deus, quanam est civitas, quod oppidum, quis ager, quae regio terrae continentis Serenissimi Senatus Vene-

tiarum Dominio subiectæ, quæ nunc ultra decennium quasi patriam hanc febrem non sentiat? Si isti Senatores, qui ob res domi forisque præclare gestas in hac Vrbe maxime cari fuerunt, reviviscerent, & hæc mea scripta legere possent atque intelligere, profecto magna eorum pars iurejurando affirmaret, se non alio morbo ex hac vita sublato fuisse, ut præteream Populi non minimam partem. Cum Gradisca munitissimum oppidum à Venetis obsideretur, cumque in Istriam exercitus duceretur, instar pestis hæc febris magnam hominum multitudinem oppressit, quorum eos, qui ex Patavina, Vicentina & Veronenſi ditione in castra proficiſcebantur, præcipue interiiſſe ipſi vidimus. Ante biennium, cum à Venetorum S. C. (quod præest ſanitati publicæ) nec non à Magno Hetruriæ Duce, & Genuenſi Republ. lege caveretur, ne quæ naves cum mercibus Algeria, Tunetoque Africæ (in qua incredibilis mortalium multitudo peribat) in Italiam venientes in portibus ſuis reciperentur, contagioſa & maligna Semitertiana fuit, quæ iis veræ pestis ſuſpicionem fecerat.

Quamobrem ſi nomen febris Semitertiænæ ad tuas aures nondum venerit, quaſo, non quia raro conſpiciatur, ſed quia raro de ea inter Medicinæ Profeſſores ſermo habeatur, & ideo raro ab iis cognoscatur, id eveniſſe putes. Nam vix audeo dicere, quam pauci ubique locorum, in quibus celebres Medici eſſe videbantur, deprehendantur qui hanc febrem vel nominatenus cognitam habeant. Cum ante multos annos Italiam ad ſtirpium & rerum naturalium perfectiorem cognitionem acquirendam peragrarem, cumque annis ſuperioribus apud Germanos, Pannonos, Sarmataſque Medicinam facerem, & præteritis annis juſſu Sereniſſimi Principis excellentiſſimi Senatus Veneti ad docendum Patavium revocarer, notavi ipſe quam multos nobiles in arte medica viros hæc febris ubique deceperit, & adhuc indies decipiat, quod eam à duplici tertiana ab ipſis vocata non diſcernerent. Probabo hoc noviſſimo exemplo.

Historia.

Ecce benevole Lector quas habuerim cauſas ſcriptionis meæ. In qua ſi nova multa & à communi ſenſu aliena offenderis, ſcire te velim, nihil calumniandi animo, aut obrectandi, ſed de re medica & qui cum hac febre aliquando conſiſtabunt bene merendi omnia dicta ſcriptaque eſſe. Quæ ut multis commodò eſſe cupio, ita te valere.

INDEX

INDEX CAPITVM

Quæ hiſce Libris de

SEMITERTIANA

Continentur.

LIBRO I

- Nomen, Definitio, Genera, Differentia, & Cauſæ internæ continentur.
- CAP. I. Synonyma & eorum ratio, Pag. 1
- II. De veterum & juniorum definitione, ib.
- III. De generibus Semitertiænæ. Quæ propria & impropria, 2
- IV. De differentiis propriarum, ibid.
- V. Quæ ſit Semitertiana Hippocratis, 3
- VI. De quatuor propriarum ſemitertiænarum differentiis; & primum de iis, quæ ab eſſentia deſumuntur, 4
- VII. De differentiis, quæ à magnitudine, 5
- VIII. De differentiis ab accidentibus, ibid.
- IX. De differentiis à more, & aliis, ibid.
- X. De cauſa proxima Semitertiænæ, ibid.
- XI. De humorum putrefcentium in hac febre variis mixtionibus, & quoniam ille, 6
- XII. De numero locorum, in quo humores putrefcunt; an unus ſit an plures, ibid.
- XIII. De locis putredinis intra & extra vaſa, quid ſibi velint, 7
- XIV. An putredo ſit in vaſis, an extravafa, & in quibus, 8
- XV. Intermittentium febrium putredines in vaſis majoribus minoribusque conſiſtiſſe, exemplis declaratur, 9
- XVI. A continuis febribus ſublatoꝝum hiſtorie duæ memorabiles; & eorum diſſectio quem putredinis locum monſtravit, 10
- XVII. Semitertiana propria an ſit ſymptomati- ca, an primaria, & cur eam primariam ſcriptores fecerint, 12
- XVIII. Intermittentem febrem dari ſymptomati- cam, 13
- XIX. De cauſis antecedentibus (humoribus nempe) & putredinem efficienſibus, 14
- ### LIBER II
- Cauſas externas, ſigna Diagnostica, & Prognostica proſequitur.
- I. De Aere calido, humido, & inequali, 15

- II. Viſus ratio apud Moravos Pamoneſque produciens Semitertiænæ epidemicam. Quæ ſit, quæ ſporadicam ſignat, 16
- III. De ſignis diagnosticis univerſalibus, 17
- IV. De ſignis veræ ſemitertiænæ primi ordinis Galeni, 18
- V. De Typo ſemitertiænæ ſecundi ordinis Galeni, & magni hemitritæ barbarorum, ibid.
- VI. De Typo ſemitertiænæ minoris. Locus Galeni correctus, 19
- VII. De Semitertiænæ exquiſitæ Galeni Typo, 20
- VIII. De ſignis hemitritæ ſturiæ primi ordinis Galeni, & quibus ſignis duplex tertiana ab hemitritæ ſturiæ diſtinguatur, 21
- IX. De Typo compoſitæ ſemitertiænæ cum tertiana, 22
- X. De prognosticis, quæ futuram ſemiterti- ænam præſagire poſſunt, ibid.
- XI. Tabidi an hac febre corripiantur. Tabidi vocæ variæ ſignificationis, auctoris ſententia, 23
- XII. Omnem ſemitertiænæ propriam periculo- ſam eſſe. Locus Hippocratis illuſtratus, 24
- XIII. Vtrum brevis, an longa ſit hac febris, 25
- XIV. De criſibus hujus febris, commutatione ſolu- tionisque per alios morbos, 25
- XV. De longiſſitudinis & brevitatibus febris, com- mutationis in alios morbos, & ſpeciei ſu- turæ criſeos præcognitione, 27
- XVI. De ſignis per quæ morituros ægros pleru- que providere licet, 28
- XVII. De ſemitertiænæ peſtilentis Cornelii Ceme- niſe ſymptomatibus, & prognosticis, 29

LIBER III

Curationis maximam partem abſolvit.

- I. Haſtenuſ neglectam hujus febris exactio- rem curationem, eam ratione moris, & motus febris diſſerre, 31
- II. De terna ſectiōe, an hac in omni ſpecie ſemitertiænæ adhiberi debeat, ibid.
- III. De

INDEX CAPITVM.

III. De loco <i>vena sectionis</i> ,	33	nium, recidivarum & commutatio-	
IV. De quantitate sanguinis evacuandi,	34	num in alios morbos complectitur.	
V. Quo tempore <i>vena sit secanda</i> ,	ibid.		
VI. De Scarificationibus, cucurbitulis, frictio-		I. Aer qualis apud aegros eligendus parandus-	
nibus,	35	que & <i>que victus ratio instituenda in</i>	
VII. De Purgatione,	36	benigna febre,	44
VIII. De pulvere Comitris de Harwick, & anti-		II. De victus ratione pro maligna & pesti-	
monio preparato,	37	lenti,	46
IX. De Vomitoris,	39	III. De curatione symptomatum & morborum,	
X. De Clysteribus,	ibid.	que frequentius huic febrī superueniunt,	
XI. De Alterantibus, de obstruentibus, pure-		vel implicantiur, vel post semitertianam	
dini & malignitati resistentibus inter-		comparent, & primum ad capitis dolo-	
nis,	ibid.	rem,	47
XII. De externis remediis,	40	IV. Ad sitim,	ibid.
XIII. De Periapitis,	41	V. Ad linguam asperam,	ibid.
XIV. De maligne semitertianae internis externis-		VI. Pro nausea & cibi fastidio,	48
que remediis,	ibid.	VII. Ad lumborum dolores,	ibid.
XV. De Pestilentem semitertianam curandi me-		VIII. Ad vigilas,	ibid.
thodo per medicamenta interna & ex-		IX. Ad Letargum,	ibid.
terna,	42	X. Ad Phrenitidem,	49
XVI. In Declinatione semitertianarum, Crisi,		XI. Pro Vertigine, Epilepsia, Apoplexia,	ibid.
aut commutatione quid a medico praestari		XII. Ad abii fluxum & Dysenteriam,	50
debeat,	43	XIII. De colicis doloribus,	ibid.

LIBER IV

Victus rationem, curationem sympto-
matum huic febrī magis commu-

Observatio Antonii Sabadini,
Adriani Spigelii ad eam responsio,

ADRIA-

ADRIANI SPIGELII BRUXELLENSIS

DE

SEMITERTIANA,

LIBER PRIMVS;

Nomen, definitionem, genera, differentias, &
causas internas continens.

CAP. I.

Synonyma, & eorum ratio.



X febris maxime nobi-
lem nunc eligo consideran-
dam curandamque, scilicet
eam, quam Graeci *ipar-*
eseia; Latini recentiores,
Semitertianam appellant.
Invenio in Plinii Valeriani
libro xii, cap. 11, scriptum
hoc: *Petio ad Hemitritium,*

Mortiferum magis est, quod Graeci Hemitritium
Vulgatior verbum: hoc nostra dicere lingua
Non potuerit ulli, puta, nec voluere parentes.

Appellatur quoque a Galeno *Phexodus* *apoplex*, id
est, *febris horrida*; non quod cum horrore incipiat
(nam hoc aliis multis accidit febribus quandoque
intermittentibus, aliquando etiam continuis) sed
quod alternis diebus magna accessiones pars hor-
rores assumat. Dicitur autem semitertiana (si A-
gathino credimus, quem scribit Galenus de vocis
huius origine & causa integrum librum olim con-
scripsisse) quod relata ad tertianam non secus at-
que huic per triduum Semitertianae accessiones ac-
cedant. *Nominali*, teste eodem Galeno libro de ty-
pis, cap. iv, ajunt ita nominatam fuisse quemadmo-
dum semicirculum & semiglobum, ipsam tertiani
circuitus dimidio minorem esse afferentes. Alii
vero putant, Semitertianam dici, quo pacto he-
cetes sesquiertianam. Nam quemadmodum ter-
tiana: paroxysmus per duodecim horas durat, sic
semitertianam ajunt duodecim horas tertianae fe-
bre completi, & praeter has alias quoque, quibus per-
durat paroxysmus, nempe dimidium tempus ter-
tiana: quod est sex horarum. Ita ut tota Semitertiana
febre extendat ad octodecim scilicet horas. Theffalus
Semitertianam dicit dictam fuisse ex eo, quod fit
dimidio major, quam tertiana extensa. Galenus,
quem sequor, lib. xi de febribus, cap. xii, et
appellatam arbitrat, quod dimidiam partem
tertiana: & alteram dimidiam quotidianae retineat.
Sic dici semialium cum ad ejus compositionem
pro altera parte asinus, pro altera equus conve-
niant: & semideum, quando dimidia parte deus

monstratur, altera vero hominis forma. Et pro-
fecto vulgus Semihominem nuncupat picturam,
que dimidia parte & maxime superiore hominem
emulatur, altera vero, scilicet inferiore, pisicem.

Quae cum ita sint, interrogare aliquis hic me
posset, cur hac febris non fuerit prius dicta *semihomi-*
teriana, quam *semitertiana*, praeteritum cum tertiana,
quae cum quotidiana conjungitur, per triduum tan-
tum semel conspiciatur invadere, quotidiana vero
singulis diebus? Huic respondemus. Quia ter-
tiana commixta quotidianae longe fit non tantum
Medico, sed etiam astantibus ob symptomatum
vehementiam & febris ejusdem tertianae in pluri-
bus aliis aegris frequentiam manifestior ac notior;
cum quotidiana minus sit frequens in aliis aegro-
tantibus, & saepe in Semitertiana initio latere vi-
deatur, ita ut aegroti haud se febricitare putent eo
die, quo videntur a tertiana liberi, sed levi qua-
dam lassitudine pressi ad domesticas res obeundas
de lecto surgant, vel ad publica officia exercen-
da extra domum vagentur. Quodque frequentius
tertiana intermittens in hac febre prius hominem
adoriat, quam quotidiana, quae saepe post pri-
mum, secundum aut tertium paroxysmum tertiana:
sublequi paulatim solet, rarius illico cum ipsa
tertiana eodem die invadere. Idcirco credo ali-
quem ex peritioribus antiquis medicis prius fuisse
deceptum, qui nondum id febris genus animad-
vertisset, & initio hanc febrem simplicem tertiana:
nam putasse, ac mox subodorata fraude quotidiana:
sublequentis, semitertianam nominasse. Haec
de nominum hujus febris origine & causis dicta
sint satis.

CAP. II.

De Veterum, & Iuriorum definitione.

Admirabitur fortassis quispiam, cur tot homi-
num sententiae de ratione vocis Semitertianae
fuerint. Verum si facile omnem admirationem re-
moveris est, si per eperit quid per Semitertianam
veteres & recentiores intellexerint, non satis con-
stare. Nam ut a Graecis incipiam, Agathinus, teste
Galeno *Libro citato*, cum tertianae speciem, quam
Galenus productam & extensam nominavit (quae
ultra octodecim horas prorogatur, & aliquando
vigintiquatuor horas, interdum triginta sex, plu-
relve perdurat) Semitertianam vocavit ipsam in-
ter intermittentes febres collocans. Archigenes
quoque eodem in genere, intermittitum *Gill-*
cet, cum

De nomine
huius febris.
Puto dicatur
horrida.
Vnde semi-
teriana.

Paroxysmus
huius febris
quasi duo
duodecim.

Cur mihi
saepe dicta
semihomi-
teriana.

Cur mihi
saepe dicta
semihomi-
teriana.

cet, eam pefuit, & ad tertianam ac quotidianam tranfuit. Theflaus febrem, quæ dimidio fit major quam tertiana extenfa, in modum quotidiani circuitus, ut fit horarum vigintiquatuor. Galenus continuam febrem facit, eam nempe quæ ex duabus febribus, tertiana fcilicet & quotidiana, alterutra intermittente vel continua copulatis confat. Si Latios audiamus, Celfumque præcipue, hic videtur proximus effe fententiæ Agathini, dum fe fcribit lib. 111, cap. VIIII: *At ubi id genus tertianæ efl, quod Hemitritæum Medici appellant: quibus paucis intermittentibus fubjungit; porrigiturque febris inter horas vigintiquatuor & triginta sex.* Statuitque paulo poft in ea veram remiffionem. Recentiorum præctici quidam, barbari dicti, febrem ex continua & intermittente compofitam, Semitertianam nuncupant.

Gordonius, quia compofitiones harum febrium poffunt effe multe, ait omnes reduci poffe ad tres fpecies, tanquam ad magis raras. Prima, ex quotidiana continua & tertiana intermittente: fecunda, ex tertiana continua & quotidiana intermittente: tertia, ex quarana continua & tertiana intermittente confans. Ex quibus patet, quoniam Semitertianam fimplicem effe febrem, nempe unam ex intermittētibus tertianis: nonnullorum vero compofitam, eamque continuam.

C A P. III.

De Generibus Semitertianæ, quæ propria aut impropria.

Sed quoniam ad clariorem doctrinam prius determinare convenit, quid nos in hifce libris per Semitertianam intelligamus, tanquam de re magis quam de nomine folliciti, dicemus primum, Semitertianæ vocabulum duplicem fignificationem in fe continere; laxam fcilicet, & ftrictam. Laxa videtur poffe febrium & intermittētium & continuarum fpecies aliquas complecti: ftricta vero, febrem continuam compofitam ex quotidiana & tertiana. Ergo in laxa fignificatione fumens, Semitertianam duplicem ftatuo; impropriam, & propriam feu veram. Impropria, aut intermittens eft, ut tertiana producta, quæ Semitertiana Agathini & Celfi appellanda eft: aut continua, ut quando febris tertiana intermittens, cum quarta continua permifcitur, quæ vocatur Barbarorum major Hemitritæus, aut Semitertiana majoris fame: aut quando tertiana intermittens vel continua cum febre fymptomatica, pleuritide fcilicet, peripneumonia, hepatide, pleuritide, phrenitide, aut quacunque alia, quæ ab inflammatione alterius cum jufvis vifceris orta fit, componitur. Propria Semitertiana, effe febris compofita ex tertiana & quotidiana, de qua potiffimum nunc agere iuffit.

C A P. IV.

De differentiis propria.

Iam à duplici fonte ductas plures differentias propria Semitertiana propotamus: nempe ab iis tertianæ & quotidianæ fpeciebus, quæ huc in effe dicuntur, & ab iis, quæ eidem fuperveniant. Etenim tertiana quæ cum quotidiana componitur, modo intermittens eft, modo continua: &

rurfus quotidiana quæ cum tertiana commifcitur, alia effe continua, alia intermittens. Si tertiana intermittens cum quotidiana continua conjungatur, Galeni vera Semitertiana dicenda eft, & primi ordinis. Nam libro de febribus fic ait: *Hemitritæum dimidium fui ipfius partem habet tertianam, alteram autem dimidiam quotidianam continuam.* Pariter fit tertiana continua cum quotidiana intermittente conjungatur, Semitertiana quoque Galeni appellanda: fed fecundi ordinis, ad alterius diftinctionem. Nam eodem libro fic fcribit: *Vna igitur folæ adiac mixta relinquitur ex quotidiana intermittente & biliofa continua, quæ & ipfa poteft continuam fimul atque horridam febrem efficeret.* Quod fit febris occurrat tertie compofitionis, in qua tertiana continua cum quotidiana continua permifcitur, nequaquam hæc à Galeno inter Semitertianas collocabitur, dum fe fcribit *Iter citius: Non tamen ex duabus continuis, quarum altera biliofa, altera pituitofa fit, poteft Hemitritæus confiftere.* Adjungit caufam: *Quoniam inquit, hæc commixta febrem horridam & quæ multis habeat reduplicaciones non facit.* Placuit tamen nonnullis recentioribus hæc majorem Hemitritæum appellare, & furiarum Galeni Semitertianam: cum tamen Galenus Hemitritæi furiæ nomen ei, quod equidem fciam, nullibi adfcribat, fed furiarum Hemitritæam appellet, in qua humor pituitofus prævalet copia biliofo, vel biliofus, pituitofus.

Eft & quarta compofitio quedam duarum harum febrium, quotidiana fcilicet & tertianæ intermittentium, quam etiam recentiores, Galeni furiarum Semitertianam perperam appellatur cognominem. Nam Semitertiana à Galeno hæc nunquam vocatur, propterea quod omnem Semitertianam inter febres continuas ponere voluerit, hæc vero fit intermittens. Nifi velimus dicere Galenum, quando fcribit libro de typis, intermittētem Semitertianam aliquando reperiri, hanc intelligere intermittētium duarum febrium tertianæ & quotidianæ compofitionem, quod tamen ejus doctrinæ fecundo de febribus traditæ repugnare videtur: *Non igitur, ait, hæc febris Hemitritæus erit, quidem ex numero continuarum Hemitritæus exiftat.* Quod fi etiam in utroque genere (fcilicet continuarum & intermittētium) Hemitritæus collocetur, non hæc tantum, fed multa alia febres Hemitritææ vocabuntur. Ego vero ut clarior doctrina procedat, hanc appello parvam Hemitritæam. Nam & hæc non lecus ac vera Galeni, horrores inducere poteft periodicos, eosque quotidie. Tertiæ vero compofitionis febrem, magnam Hemitritæam appellabimus. Quapropter ex quatuor duarum febrium tertianæ fcilicet & quotidianæ copulationibus quatuor fpecies Semitertianæ propriæ nafcuntur. Prima, vera Galeni primi ordinis. Secunda, vera ejuſdem fecundi ordinis. Tertia, magnus Hemitritæus Barbarorum. Quarta, parva à nobis nuncupata, quam video poffe commode ex Galeno lib. 11 de febr. cap. VIIII, Archigenem Hemitritæum appellare. Invenio apud Hippocratem febriſ cuiſdam factam mentionem, quam *febris quilibet* appellat, id effe, tertianæ naturam referentem. Galenus fic febrem continuam appellat, quæ tertio quoque die inalefcit. Hippocrates quidem Ionicus, teſte Erotiano in Onomaſtice quodam, *febris tertianæ appellari, enphemica cauſa:* Philonides vero Siculus febres, quæ continuæ ſunt, inordinationem

Vera Semitertiana prima ordinis.

Secundi ordinis.

Semitertiana tertia.

Quarta fcilicet Semitertiana.

offendentes: indicare vero inordinationem in finceritate, facta intermiſſione proprium eſt tertianæ. Reſte quidem indicantes inordinationem, non habentes autem incertum medium intervallum, ita nominantur. Quandoquidem multam ſimilitudinem habent ad tertianam. Sunt autem febres, quæ appellantur mixtæ quæſæcundæ, id eſt, Semitertiana parva.

C A P. V.

Quæ fit Semitertiana Hippocratis.

Veritur iam dudum à Scriptoribus, quænam fit febris illa, quam Hippocrates Hemitritæum appellavit, cujus plurimis in locis, at præcipue in libro Epidemiarum, mentionem fecit. Sitne continua aut intermittens, an utriuſque nature particeps dubitatur. Sane autor libri, qui introductorius infcribitur, & Herodotus putatur, Semitertianam modo inter continuas, modo inter intermittētes poſuit, ſecutus fortaiſſis duo Hippocratis loca, in quorum altero pro intermittente videtur haberi, in altero vero, pro continua. Prioris hæc ſunt verba lib. 1. Epidemiarum: *Inter febres quædam continuæ ſunt, quædam interdiu tenent, nocte intermittunt: nonnullæ Semitertianæ ſunt, tertianæ, quartanæ, quintanæ, ſeptimanæ, nonanæ.* His verbis Semitertiana una cum intermittētibus numerari videtur. Ut propter hanc cauſam non mirum fit, Archigenem & Agathinum hanc pro febre intermittente accipiſſe. Rurſus tamen eodem libro hæc ſcripta extant, quæ ſunt poſterioris loci verba: *Erant vero eorum plerique paſſiones ejuſmodi, febres horridæ, continuæ, acutæ; omnino quidem non intermittētes.* Modus vero erat Hemitritæus. Supra quem locum commentans Galenus ſcribit, Hippocratem appellare Hemitritæum horridam, aliquæ continuam, quæ ſunt tertianæ, quotidianæ continuæ permixtæ. Idcirco libro de differ. febr. 11, invehitur in Archigenem, quod naturam huius febriſ non recte adſcripſit, intermittētē effe ſcripſerit. Et Agathinum quoque miratur, quod tertianam productam, Semitertianam appellaverit, & non extenſam tertianam, ut quotidianam & quartanam febres, quas idem extenſas vocabat. Ego vero, qui apud Hippocratem continuam febrem fuiſſe judio genus febres omnes quatuor præſcriptas fpecies contiens, quid aderam pro mea opinione, & pro Galeno defendendo ad eum Hippocratis citatum locum, quo Semitertianam in catalogo intermittētium receſſiſſe: Sane nil aliud, quam quod non expreſſit ibi Hippocrates febrem effe intermittētē dicat, cum ipſam ponat ante intermittētium ſpecies, quas enumerat, tertianam videlicet, quartanam, quintanam, ſeptimanam, & nonanam, & ſtatim poſt continuas, quæ nocte intermittunt, interdiu tenent. Quod ſi quis ſit, qui hic aut alibi Hippocratem habere pro intermittente nihilominus aſſerat, id ei concedemus, modo intellexerit bifariam veteres uſos fuiſſe continui & intermittētis nomine. Nam continuas, inquit Galenus in commento ſupra hunc locum Hippocratis, vocant febres quæſquæ non omnes, quæ ad integratam non deſcendunt, ſed folas præcipue illas, quæ omni cunctis alijs ad judicium mutatione. Ita intermittētes interdiu appellant illas ſoles, quæ in integritatem ſuam: interdiu ead, quæ non ſunt in integritatem ſuam, ſed inſignes faciunt mutationes ſingularum acceſſuum, in initium, incrementum,

vigorem, & remiſſionem. At Medici quidam juniores, quæ nullam magnam mutationem habent auxurgis, non continuas æterum continentes (auxurgis) nemiunt. Continuas autem hæ ſoles, quæ non veniunt ad integritatem, & intermittunt ſingulari acceſſionibus. Hæ vocantur ab aliquibus febres, interin intermittētes. Nam ſunt certe inter continuas & deſcendentes in integritatem medie. Proinde recte ubi cum ſynochi conſentiant, intermittētes appellatur, eam ad integritatem venientibus, continua. Hæ loco differunt febrium Hippocratis ſcribens, aliquas eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētem eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe.

Obſiſſe. Eſt etiam Semitertiana non intermittens.

Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur quomodo hæc dicit, intermittētē reperiri, cum eam ubique ſcribat eſſe, intermittētē eſſe etiam continuas dicit: & ſunt quidem in utroque continui ſignificati continuæ multe. Hactenus Galenus. Iam obſtudet mihi fortaiſſis Galeni librum de typis in quo hæc leguntur: *Eſt autem non ſemper continua, æterum & intermittens reperitur Semitertianæ febris.* Ecce igitur qu

bus febribus componatur tertiana & quotidiana, tamen ut plurimum ad continuam pervenire animadvertitur, aliquo totius morbi tempore per anticipationem paroxysmorum quotidianæ & tardioris regressum tertianæ, vel huius productionem. Hanc continuitatem si Galenus considerasset, omnino parvam Semitertianam ex Semitertianam numero non expulisset, cum & hæc horrores inducat. Igitur ut ad institutum sermonem redeamus, recte & vere hæc scriptum in libro de typis Galenus: *Εν δὲ τῷ αὐτῷ αὐτοῦ, αὐτὰ δὲ διαδοχῶν οὐ διαδοχῶν: quod sic sonat ad verbum, Est autem non omni tempore continua, sed etiam (aliquo scilicet tempore) intermittens reperitur.* Quod adhuc apertius declarat in commentario in primum Epidemiorum. Cum enim prius dixisset Hippocratem ibi numerare diversas species febrium; & sic scilicet, quæ ad integritatem veniunt clare, intermittentes proprie dictas, & alias quæ remittunt, continuas; subiungit: *Tertiana & quartana clare ad integritatem veniunt. At ex Semitertianis quædam utraque interdum clare, quædam altera tantum, curam quæ ad integritatem non veniunt.* Patet igitur Galenum libro de typis verum distinxisse, intermittentem Semitertianam aliquando fieri, esse tamen continuam.

C A P. VI.

De quatuor Propriarum Semitertianarum differentiis: & primum, de iis quæ ab essentia desumuntur.

Quatuor jam enumerata Semitertianæ species videntur potissimum essentia, magnitudine, accidentibus, more, causa proxima, & denique compositionis variæ, duarum febrium tertianæ & quotidianæ modo differre. Nam singule vel sunt exquisite, vel non exquisite, vel magnæ, vel parvæ, aut inter hæc mediæ; vel hoc, aut illo symptomate conjunctæ; vel benignæ, vel malignæ; biliosæ, pituitosæ, exquisite, confusæ, complicatæ. Appello nunc exquistas, quando singularum specierum febres, ex quibus componuntur Semitertianæ, in causis, signis, & idea exacte & perfecte naturam suam observant. Exempli gratia, Semitertianæ primi ordinis Galeni, ex quibus à me nominatur, quando tertiana ex quibus quotidianæ continue exquiste permiscetur. Non exquiste, quando tertiana simplex intermittens vel producta quotidianæ continue non exquiste copulatur: Aut quando tertianæ spurie productæ quæ quotidiana continua exquiste copulatur. Sic quoque ea, quæ est secundi ordinis Galeni, erit exquiste, quando exquiste tertiana continua exquiste quotidianæ intermittenti immiscetur. Non exquiste, quando alterutra febrium, aut utraque spurie exsistunt.

Idem de parva Hemitritæ, & magna dico. Sed Galenus & quotquot ejus doctrinam sequuntur, exquisitam Semitertianam appellant eam, quæ ex quotidiana continua & tertiana intermittente componitur, & pari copia humores putrefactos, ex quibus oritur, habet. Sic etiam Fernelius exquisitam Semitertianam vocat, in qua tertianæ continue quotidiana intermittens jungitur.

Movere hic aliquis dubium posset, an revera distincte dari quæ sit Semitertianæ primi ordinis Galeni

leni exquiste; propterea quod tertiana permixta quotidiana continue, exquiste tertianæ naturam prorsus obsecrat. Ut propter hanc causam Galenus tantum voluerit eam appellare Semitertianam exquisitam, quæ ex simplici tertiana & continua quotidiana componitur. Ad hoc dico, quod quotidiana continue exquiste tertiana intermittens implicari potest. Nam apud Galenum lib. de Crisib. habemus exemplum mulieris Semitertianæ correptæ, una cum alia exquiste tertiana. Forellus, lib. v. Observationum medicinalium, observ. xvi. 1, alterius mulieris admodum biliosæ narrat similem historiam. Si itaque in Semitertianâ contingere potest, ut ei jungatur tertiana exquiste; cur non etiam potest jungi tertiana exquiste quotidiana continua? Nec hoc reclamat doctrinæ Galeni, quando determinat exquisitam Semitertianam ex tertiana intermittente & quotidiana continua componi: quia tertiana intermittens potest esse exquiste magis, & minus. Sed illud hic adjungendum, quod Galeni & recentiorum Semitertianæ exquiste accidere possit, ut tertiana intermittens fit spuria, & quotidiana fit spuria, & ex duabus febribus spuris una Semitertianâ exquiste refuset. Quia in hac fit utriusque humoris, ex quibus oritur Semitertianâ, equalis copie concursus: quod nostræ Semitertianæ primi ordinis Galeni non contingit.

Amplius adhuc dubitari potest, an detur febri continua periodica exquiste, nec ne; propterea quod ejus nulla fit facta mentio apud veteres, ut aliam intermittentem, ob eorum continuitatem. Neque enim febris continua una, altera videtur esse magis aut minus continua. Quod si ita est, Hemitritæ magna à me nominata non recte dicitur exquiste, & non exquiste. Huic objectioni occurrat, si dicamus naturas febrium continuarum periodicarum, longe esse intermittentiæ naturis obcuriores: & ideo nullam esse factam à veteribus mentionem febri quotidianæ vel tertianæ continua legitime & illegitime, vel exquisite & non exquisite. Si quis tamen velit curiosus animo concipere typos & formas febrium intermittentiæ, poterit etiam ex iis continuas quotidianas, & tertianas & quartanas exquiste perolere. Nam quotidiana continua alia est per superingressum paroxysmorum, ut dicunt practici, alia vero simpliciter continua exsistit. Illa non exquiste dicitur quotidiana continua; hæc vero dicitur magis exquiste, quo lentius ad vigorem ejus exacerbatio perducitur, ut quotidiana intermittens. Sic tertiana continua non exquiste exsistit, quæ spurie productæ longissime intermittens horas excedit, aut quæ antequam vera est quies, tertio die anticipando per tres, quatuor, pluresve horas contineatur, ob novum ingressum paroxysmi incipientis cum frigore vel horrore. Sic & quæ exquiste est continua, præterquam quod tertio quoque die exacerbetur sine rigore, horrore vel frigore, cito ad vigorem ascendit, & tarde declinat, nulla integritate post se ulla tempore relicta. Hæc quandoque apertiori loco inter signa essent recendenda, tamen ad probandum & clarius docendum exquisitas & non exquisitas febres continuas periodicas dari, hoc loco ea proferre coactus fui.

C A P.

C A P. VII.

De Differentiis, quæ à magnitudine.

Alterum quod ad quatuor Semitertianarum magnitudines spectat, illæ hic à me considerantur in singulis generibus ratione magnitudinis periodorum, hoc est, brevitatibus & longitudinibus, majoris vel minoris acuminis. Galenus libro de typis tradens differentias, quæ à magnitudine in hac febre desumuntur, hæc ait: *Habet autem tres in magnitudine differentias: nam una, parva; altera, media; tertia, magna Semitertianâ est.* Parva igitur est, quæ circa viginti quatuor horas vertitur; media, quæ circa triginta sex; magna, quæ circa quadraginta octo, quæ profecto continua febri proxima est. Quæ si de Agathini Semitertianâ, ut ex frequentibus verbis appareat, dicta sint, verissima esse comperimus. Nam febris tertiana extensa, alia brevis est, alia media, alia longa. Brevis ad viginti quatuor horas se extendere potest; media, triginta sex: quæ vero ultra, longa prolongatur, usque ad quadraginta octo, horas dicitur. Ita ut omnes hæc differentie amplam quandam latitudinem singulæ adhuc in se contineant. Nam parvâ etiam dicitur, quæ ultra octodecim horas prorogatur, & infra viginti quatuor horas perdurat; ut quæ vigesima hora terminatur: sic & media, quæ ultra viginti quatuor horas, non tamen ultra triginta sex se extendit: longa vero, quæ omnibus horis terminatur, quæ intercidit intra horam trigessimam septimam & quadragessimam octavam. At de veris Galeni Semitertianis, quod continue sint, hæc vera esse nequeunt. Hæc enim scribit lib. x. Epidemiorum, com. 113, text. v. *Aquis sane qui ajunt, si horas quatuor & viginti quis febre faciat, mediam eam Semitertianam habere, in numero habent talem febrem intermittentem.* Sic etiam qui mediam & parvam à magna distare horarum numero ferunt, si student utraque ad integritatem deducere, ab Hippocratis sensu discedunt, nisi in febribus intermittentibus ponant Semitertianam. Nisi velimus dicere, nomen Semitertianæ loco de typis citato à Galeno accipi abusive pro ea tertiana, quæ quotidiane permiscetur, & Galenum meriti magnitudinem Semitertianæ à tertianæ magnitudine cum quotidiana conjunctæ. Ita eveniet ut parvam, quam circa viginti quatuor horas hominem tunc quere statuit, duodecim horas in latitudine quemadmodum etiam alia duæ, complectatur. Siquidem tertianam exquisitam, quæ ad duodecim horas se extendit, & simplicem, quæ ad octodecim, & extensam parvam, quæ ad viginti quatuor horas prolongatur, comprehendere potest. Ita parvâ Semitertianâ erit Galeno, quæ febrem habet quotidianam continuam cum exquisita, simplici, parva, extensa tertiana conjunctam: Media vero, quæ cum media extensa: Magna denique, quæ cum longa extensa copulatur. Hanc videri ex Galeno eodem libro nominare posse Semitertianam extensam, cum tunc inquit *Quædam quædam typi protensa Semitertianâ mentionem faciat.* Verum Galenus, post citata ex libro de typis (quem mendosum aut non integrum esse suspicor) verba, examinans opinionem eorum, & præcipue Agathini, qui opinionis Semitertianæ causam referre conati sunt factâ comparatione ad tertianam, prorumpit in hoc

quæsitum: *Præter igitur horis ad intervallum Semitertianâ signatur? Respondet: Secundum quidem Agathini opinionem, nec horis, nec intervallis. Hæc enim utraque adscriptam habent magnitudinem (duodecimæ & viginti & quadraginta & octo & p. 113). Riccius vertit: utraque enim hæc huiusmodi præscriptam magnitudinem habent. Legendum forte: aut horis, aut intervallis. Hæc enim utraque adscriptam magnitudinem habent. Semitertianâ vero indefinitam habet in latitudine horisque subsequenter constitutionem.*

C A P. VIII.

De Differentiis ab accidentibus.

Ab iis quæ superveniunt quatuor Semitertianæ species, aut eas concomitantur, simplex Semitertianâ, vel complicata cognominatur. Nam si nullus morbus, vel prædicta cognominatur, ad se, quod formæ simplicis præposita, simplex est cognominanda: e contrario vero, complicata ut si Semitertianâ alia febris tertiana vel quartana implicetur. Si pestis adjuverit, pestilens Semitertianâ proprie appellatur. Si strangulationes ab utero, quales Hippocrates observavit lib. vii. Epid. in uxore Apomoti, præter cardiacas & vomitus circa accessiones, si colici dolores aut dorsii, viscerum inflammationes, tabes, & alia ejus generis plura, quæ in secundo libro recensentur, fuerint conjuncta, maligna.

C A P. IX.

De Differentiis à more & alis.

Aligna Semitertianâ non est cum pestilenti confundenda. Habet enim hæc, præter ordinariam Semitertianæ putredinem, quoddam pestis venenum, & inexplicabile ejus seminum. Illa vero, pravos & malignos quoddam moros, ortos ab excellenti quadam putredine. Rursus maligna alia contagiosa est; qualis annis superioribus magnam Italiæ partem invasisit: alia vero, sine contagio. Differt etiam contagiosa à pestilenti. In hæc enim, vera pestis signa cernuntur, in illa, nequaquam. Quamquam enim me lateat quoddam contagiosum, epidemiam, & pestilentem confundere. Porro biliosam & pituitosam appellatur scriptores, in qua alteratur humor putrefactus exsuperat. Exsuperat etiam, quæ ex pari humorum portione constat, quoque in loco consistat. Confusam & complicatam appello, ex Galeni libro vi de Crisib. cap. vii, quando causæ & formæ febrium quotidianæ & tertianæ prorsus aut confunduntur, aut complicantur. Complicationem hæc fieri ait quadrupliciter: Ex tertiana quotidiana commixta: vel ea, quæ quotidie accessione habet continue illi, quæ per tertium continuam est: vel tertiana est, quæ singulis diebus accessione facit: vel quotidiana est, quæ per tertium continua est.

C A P. X.

De causa proxima Semitertianæ.

Duplex statuitur humor putredinem habens, causa proxima Semitertianæ propriæ: bilis nempe excrementitia & pituita. Inter Barbaros quidam

Tet. i.

Exquisite.

Non exquisite.

An vera de
ri possit
Semitertianâ
primi ordinis
exquisite.An detur fe-
bri continua
periodica ex-
quiste.

dam practici duas quasdam improprias Semitertianas, quatuor proprias enumeratis adiungentes (ut eam, quae ex tertiana continua & quartana intermittente constat, & alteram, quae ex quartana continua & tertiana intermittente) melancholicum humorem aut atrabilem putrefactum praedicis duobus humoribus addunt. Ita ut in universum trium humorum varia permixtio omnem Semitertianae speciem constituit, tum propriae, tum impropriae, simplicis atque compositae.

Simplex omnis Semitertiana duas humores ex tribus jam dictis pro causa sua proxima agnoscere dicitur: composita vero interduo duos, veluti cum febris tertiana: exquisita Semitertiana vero adiungitur: aut tres, ut quando eidem Semitertianae quartana se adiungit. Galenus causam docens suarum Semitertianarum, nempe primi & secundi ordinis, pituitam cum bile permixtam esse affectur. Sic enim in lib. de febris inquit: *Si pituita praesens, ex qua febris illam, quae singulis diebus accessione facit, accendi dicebamus, misceatur amara bilis humori, ex quo tertiana gignitur febris, duplex jam causa ad dispositio conjungatur. Cuiusmodi humor affert quotidie accessione: alter vero, tertio quoque die. Permixtum autem hi humores variis proportionibus. Si pituita ac bilis aequalis fiat temperatura, ita ut ambae sint aequopotentes, Semitertiana non modo exquisita Galeni, sed & aliarum specierum excitatur. Si vero flava bilis parva portione exsuperet pituitam, aut hac bilem, simplices Semitertianae exsurgunt, aut non exquiritae. Si vero multum alterius humor abundat, spuria pituitosa vel biliosa cognominatae proveniunt, tantoque a natura simplicis recedunt, quanto humoris alterius copia vincere videbitur. Similem quoque bilis ac melancholicae putrefcentis, commixtaeque proportionem per te ipsum excogitare poteris, ad causam proximam Semitertianarum improprium cognoscendam. Verum quod ad quatuor Semitertianarum propriarum causas propositas attinet, tantum loco differre putantur, in quo consistunt.*

C A P. XI.

De Humoribus putrescentium in hac febre variis mixtionibus, & quanam illa.

Sed de hoc antequam ulterius quidquam proferam, prius curiosius indaganda humorum jam dictorum permixtio est; qualis nempe ea sit in nostro corpore. Et primum hic scire convenit, mixtionis humorum duas esse species: unam, in qua confunduntur non secus atque elementa aut vinum, dum quae infunditur: ita bilis & pituita in tertiana & quotidiana spuris permisceri sibi invicem putantur; alteram, in qua non confunduntur, sed tantum conjunguntur partes cum partibus, quam Galenus lib. 11 de Crisibus, cap. 13, complicationem videtur nominasse. Talis permixtio bilis & pituitae videtur in dysenteria notari, cum pituitae partes in excretis apparent, quibus bilis confunduntur. Existimo ego ex Galeni placitis recte afferri posse, in omni Semitertiana propria utrumque humorum permixtum utraque mixtionem posse praesentiri; siquidem Semitertiana ex spuria quotidiana continua & tertiana producta constat. Nam in quo-

Mixtio humorum duos facit.

tidiana spuria, bilis minor portio cum majori pituita portione suis in locis confunditur. Et in tertiana spuria pituita: minor portio cum majori bilis quantitate. Sed antequam confundantur simul, quod fieri arboris a nostro calore, primum per portiones implicari necesse est. Non enim uno eodemque loco uterque humor generatur: sed in diversis genitus, ex his in unum vel plures conflatur potest, atque hic utroque modo commisceri. Ceterum in improprie Semitertianae aliter evenit. Humores enim five sint unus, ut bilis; five plures, ut pituita, simul aliquando implicantur; sed saepius separati disjunctique consistunt. Is enim humor, qui peripneumoniam facit aut hepatitiam aut aliquam aliam visceris cuiuspiam inflammationem, quotidie noctu magis accenditur; interdum, minus.

C A P. XII.

De numero locorum in quibus humores putrescant, an unus sit; an plures.

Verum de locis, in quibus putrescant humores, quot numero sint & quanam, dicendum est. Nam ut unus esse potest locus, aut plures, ut duo, vel tres. Quod unus esse possit, duo nobis persuadere queunt, natura huius febris, & causa. Nam natura febris videtur esse simplex, quavis singulis diebus suas habeat accessiones in modum duarum febrium. Simplex febris simplicem & unicam habet locum, qui conservat focum putredinis. Ita veteres febris intermittentibus simplicibus unum locum adscripserunt; continuas praeiter alterum his proprium. Quod autem simplex sit, probatur ex duorum mixtione, aliquo dum iam essent febres, & non unica. Imo talis tantumque est febris utriusque, ex quibus Semitertiana fit, mixtio, ut in Semitertiana primi ordinis Galeni ea, quae tertio quoque die tertianam intermittentem emulatur, cum quotidiana febre prorius confundatur: & rigores, horrores, aut frigus uno eodemque tempore in totum permixti compareant. Galenus lib. 11 de differ. febrium, cap. vii, cum dixisset, Semitertianam esse mixtam febrem ex tertiana & quotidiana, & ideo horrorem inferre rigore, qui tertiana solet esse magis proprius, minorem; & frigore, quod quotidiana initio monstratur, majorem, hac addit: *Non abs re huius febris nomen hemitritiae inditum est. Nam ex quotidianae continua & tertiana intermittente tota ejus natura confusa dividitur partem utraque ex dictis febribus retinet. Ex postea eodem libro, cap. vii, subiungit causam confusionis: Idcirco, inquit, tertiana quidem cum quotidiana continua confusa facit hemitritiam, cum neque utraque continua, neque utraque intermittens ejusmodi quaedam febrem generare. Ideoque in 11 de Crisibus Hemitritiam ponit mixtam febrem ex biliosa & pituitosa, non jam invicem complicatis, sed per se totae confusae. Causa quod febris unum esse locum arguit, nempe mixtio duorum humorum aut plurium, quae auctoritate Galeni convincitur, & sensibus demonstratur. Etenim in lib. de differ. febrium hac scribit: *Si pituita praesens, ex qua febris illam quae singulis diebus accessione facit, accendi dicebamus, misceatur amara bilis humori, ex quo tertiana gignitur febris, duplex jam causa ad dispositio conjungatur. Alter quidem humor**

Quod duo loci sint.

Quod unus sit locus.

Aliquando bilis cum humoribus est, aliquando purior.

humor affert quotidie accessione; alter vero, tertio quoque die. Videmus praeterea quotidie in patientibus hanc febrem per vomitum, per feces, bilem & pituitam sibi invicem confusas excerni; & sudores, quos habent praepungens ac viciosis, eorumdem humorum confusionem satis declarare. Quin & in urinis saepe talis quaedam permixtio utriusque humoris animadvertitur. Nam crassae sunt ac coloratae, bullis & spuma coronam solam cingentes, interdum & totam superficiem urinae tegentes, quae, postquam mixtae sunt, non evanescunt, nec diffiliunt, ut in urinis biliosis, quae in tertianis mingi consueverunt; sed permanent interdum in plures dies ob pituitae visciditatem, per serum & bilem commixtae etiam intra venas. Ratione igitur mixtionis factae vel confusum, vel per minutas partes ex duobus humoribus una massa, unumve corpus constituitur, quod unum locum, non bina, putrescent habere necesse est. Quapropter his adhibitis rationibus unum locum putrescentis materia agnoscere oportet in Semitertiana.

Rursus quod duo sint, pariter probari potest ex iisdem rationum fontibus, scilicet ex natura Semitertianae, & causa proxima. Utraque enim duplices censetur. Nam duae febres implicite sibi invicem, ut loquuntur, & quae in diversis horis incipiunt, diversiferae desinunt (tales sunt, quae in Semitertiana videntur) suas habent essentias singulas, & foemque consistunt, tametsi accessioneum partes quaedam eodem tempore concurrant. Finit, inquit, Fernelius lib. 19 Parthol. cap. xv, ex de crisi humidorum non eodem loco positis, sed quorum fusa cuiusque sedes, sua essentia. Itaque secundum doctorem opinionem bina putredinis loca in Semitertiana statuenda: unus, in quo consistit pituita putrescens; alter, in quo biliosus humor.

Potest & hac opinio alter defendi, negando scilicet superius allatam mixtionem humorum, aut confusionem. Nam saepe contingunt quod & nos ipsi vidimus, bilis sincere vomitus in Semitertianis, & pariter dejectiones pituitae purioris, & quae nullam bilis permixtionem arguebant. Saepius etiam accidit fieri diversas plane excretiones, & modo quidem bilis ante pituitam per vomitus & feces biliosas; modo rursus pituitosas ante biliosas, quod indicare manifeste poterant, ex uno loco bilem, ex altero pituitam separatim profusisse.

Revera in hac dubia concertatione, media quaedam via est procedendum, ita ut aliquando unum, aliquando plures statuatur. Si materia ex bile ac pituita confusa putrescit, potest quidem ea pluribus in sedibus consistere, sed tamen utrumque unum in loco consistit. Si vero complicantur humores, possunt in uno loco consistentes putrescere, si generalia loca consideremus, ut intra vel extra vasa; si vero particularia, plura quam unum habebunt loca. Extat super hac difficultate omnium ut arbitror, quod in febribus proponi possunt difficillima Galeni sententia, quae a me haud multum discrepare videtur. Nam libro 11 de Crisibus haec ait: *Quandocumque vero aliqua ex intermittentibus generis, cum continua difficillima & vis explorabilis facit mixtionem. Nam sicuti febris, vis & patientia loca mixtionem recipiunt, vel quia differentia membra propria singula febrem accendunt, ut exempli gratia, lien & jecur: vel quia dispositio mixta, veluti inflammatio*

cum crystallae, aut crystallae cum inflammatione misceantur. Verum quoniam supra diximus Semitertianae putredinem uno in loco consistere, quod confusa sit plerumque ejus essentia & materia, adversario- rum quibuldam rationibus potioribus hac respondemus. Quod si diversis temporibus singulariter febrium, ut quotidianae & tertianae typus observetur, id dico de potentia putrescentis materia procedere, non semper locorum diversorum, in quibus separati humores singuli a se invicem continentur, ut postea adhuc clarius demonstrabitur. Et quoniam per vomitus & feces aliquando compareant excreti humores sinceri, & separati singuli, non tamen inde recte inferatur, hos uno in loco consistere non posse. Quoniam prius confusi concurrunt a natura, deinde a se invicem segregantur, quemadmodum in nonnullis abcessibus contingere videmus. Etenim in initio generationis eorum apparet ex confusis in venis humoribus fieri in eos fluxionem, deinde paulatim alii alique in loco & spacio consistunt, a calore nativo segregari ac propriis sedibus circumfusi. Sic in tunica abcessibus videtur & bilem & serosum humoribus segregatos a pituita in candidos circulos duris ossibus similes concretos, eique circumfluxisse undique. Hi autem abcessus prius a suppuratione originem traxerant, in qua omnes praedicti humores erant confusi. Eodem igitur modo contingit confusos humores segregari a natura, ubi concoctionem aliquam praesentem passus prius fuerint. Sed & alio adhuc modo contingere potest in initio Semitertianae, ut singuli foemque & corpore expellatur: quando scilicet unde a toto corpore in unam partem conflunt antequam confundantur. Ita vidimus a capite distillantem pituitam in ventriculum, pituitum in hac febre vomitum produxisse. Et rursus a quibuldam venis ad jecur detrusa bile, in alvum aut ventriculum confluisse antequam putresceret. Quamobrem cum modo unus locus putredinis statuatur, modo plures, quoniam hi sint determinandum jam est.

C A P. XIII.

De Locis putredinis intra & extra vasa, quid sibi velint.

Cum in febribus putridis, quae primario hominem affligunt, duo putredinis loca generalia a Medicis celebrantur; unus, quem vocant intra vasa; alter, quem extra vasa; prius veniunt exponenda haec notiones, quid sibi velint, antequam locum putredinis Semitertianae indicemus.

Appellatur igitur locus intra vasa, cavitatem nempe, quae continetur in venis & arteriis, in quibus sanguis naturalis & vitalis spiritus alendis omnibus corporis partibus fluit & resiliit.

Differunt haec vasa magnitudine primum, deinde, loco; tertio, connexione. Magnitudo enim ipsa varia; quia vel magna sunt vasa, vel media, vel parva. Magna, ut truncus venae cavae, & ejus quae circa portas est, ramus splenicus & mesentericus dictus, venae emulgentes item jugulares internae, arteriae magne trunci, carotides, emulgentes arteriae, truncus arteriae venalis, & venae arteriales: utriusque venae, & arteriae rami illiaci, & subclavii. Media vero sunt, in quae rami illiaci & subclavii

Quid locus intra vasa.

Vasorum differentia fecundum magnitudinem.

subclavii se dividunt, majores rami ad brachia & crura transeunt, vena jugularis externa; rami majores venae cave per substantiam jecoris transeunt; item arteria venalis & venae arteriales, qui per substantiam pulmonum disperguntur. Parva vero vasa in habitu corporis ubique constitunt, & per substantiam viscerum jecoris, lienis, intestinorum, mesenterii, pulmonum, renum, uterique, ac pudendorum, & habitus corporis exteriores partes diffunduntur.

Loco valet quoque. Nam sunt quaedam cordi proxima, ut quae in thorace continentur majora vasa arteriarum & venarum; item truncus venae cave & arteriae magnae descendentes, cum suis ramis iliaceis & emulgentibus; vena circa portas, & si qui sunt alii rami ab his producti.

Connexio quoque eorum diversa est consideranda, quatenus ad hujus febris causas cognoscendas conducere potest. Quia vel vasa sunt cordi continua (in quo necessario accendi debet calor praeter naturam, qui in febris a putredinis loco fuscitur) ita ut in ejus ventriculos se amplo foramine inferant; ut majores rami omnes jam nominati, qui in thorace & abdomine contenti sunt. Alii vero non sic connectuntur, ut in abdomine vena, quae circa portas jecoris sita est, omnesque ejus propagines, aspera arteria in thorace, omnesque ejus rami per pulmonum substantiam diffunduntur. Haec igitur vasa, in quibus putredinalis materia loco contineri.

Locus vero, qui jam extra vasa dicitur, duplex est: unus, a practicis statuitur in habitu corporis; alter vero, in utroque ventre: nempe thorace, & abdomine. Qui in habitu corporis est, multiplex esse potest; caro, tendo, cutis, membranae, nervi, & si quae sint aliae partes similes, quae venae, & arteriae non sunt. Huc refer spacia intermedia musculorum & aliarum partium. In utroque ventre sunt extra vasa, parenchyma viscerum, membranae, pinguedo, praeterea cavitates naturales, ut quae in capsula cordis est, & inter pulmones & pleuram, in praecordis, fed praecipue in ventriculo, intestinis, folliculo fellis, vesica, atque matrice in femina; non naturales, ut vesicularum, quae in jecoris cava & gibba parte superficiali inter substantiam & membranam ad fluxum humoris generari solent. His adjuget totam abdominis cavitatem, quae est inter peritonaeum & viscera. Nonnulli, tractantes de febris, per intra vasa intelligunt majora, quae inter alas & inguina excurrunt; per extra vasa, extra eadem majora: nonnulli per intra vasa, omnia intelligunt; per extra ea, quae jam commemoravi. Quid igitur fit extra vasa, & intra ea, satis explicatum est.

C A P. XIV.

An putredo sit in vasis, an extra vasa: & in quibus.

Sed an in utroque explicatorum locorum, an in alterutro Semitertiana consistat, jam declarandum est. Secundum quidem Galenum uterque locus effectus hujus assignandus, sed non omnibus propria Semitertiana generibus. Nam in primi ordinis fuit dicta Galeus, putitum intra vasa, bilem vero extra ea in habitu corporis computrescere. Et in secundi ordinis, bilem intra vasa, putitum

extra ea. In majori vero nostro Hemitritaeo, putitum & bilem intra vasa; in minori, utrumque humorem extra vasa. Quia febrium intermittentium materiam extra vasa consistere ac firri, continuam intra vasa, semper docuerit. Haec autem genera Semitertianarum aut ex continua & intermittente, ut duo priora primi & secundi ordinis; aut ex duabus continuis, ut major; aut duabus intermittentibus, ut minor componuntur. Similiter ex Galeni doctrina impropria Semitertiana duplicem fomitem putredinis habebunt, unum quidem extra vasa in habitu corporis, alterum vero in aliqua parte inflammata, ut pulmonibus, pleura, jecore, splene, cerebro, aut aliquo alio viscere, quae symptomaticam antiquorum fuscitavit. Inter recentiores Doctissimus Fernelius, cum statuat omnium febrium intermittentium sedem & originem esse in prima corporis regione extra vasa circum praecordia, circum ventriculum, diaphragma, jecoris cava, lienem, pancreas, omentum, mesenterium; continas vero primarias in vasis majores, quae inter alas & inguina excurrunt, opinatur in Hemitritaeo (per quem intelligit duo prima genera Galeni) focum putredinis esse extra venas in prima regione: inde humoris putrefacti portionem penetrare in venas majores & majorem, quam possit dissolvi per urinas aut sudores (quemadmodum in intermittentibus) sic soluta ex parte accessione manere adhuc febrem quandam inaequalitatem. Sed potius ex ejus jactis fundamentis effect opinandum, duo prima Semitertiana genera in vasis, & extra focum putredinis habere duplicem. In majori Semitertiana, in vasis majoribus: in minori seu quarto, eo in loco, in quo intermittentium febrium originem possit. Cornelius Gemma, eruditione & experientia homini recentiorum Medicorum secundus, cum credidit intermittentes in venis, continuas vero primarias etiam pestilentes in arteriis collocari, symptomaticas seu secundarias in ipsis visceribus inflammatis & spaciis inaniibus, ad quae jecor, vena, arteriarumque ductus & ossa vestra positione pertingunt, putredinis halitum tra continere ad cor transmittunt, concludit Hemitritaei pestilentes, quam exacte describit, praecipuam partem in arteriis, & finitimi ventriculi cordis vicinia laesive, esse aliam quandam seu praecedentem febrem sui subinde, ex venis atque aliunde suscepit. Verum si ejus opinionem ad quatuor nostras Semitertianas species accommodare voluerimus, dicemus, duo prima Galeni in venis & arteriis consistere; majorem vero seu tertiam, in arteriis tantum; quartam vero seu minorem Hemitritaeum, solummodo in venis.

Ex qua sententia sequetur, omnes Semitertianas in vasis, non extra vasa putredinem suam habere, cui conclusio & ego quoque assentior. Nam quotiescumque mecum reputo, quae in curatiobus febrium putridarum, tam intermittentium, quam continuarum; quae in dissectionibus mortuorum abisidem febrium, praesertim a Semitertiana, observavi; toties nil aliud potui agnoscere, quam febrium intermittentium & continuarum periodicarum putredines semper in vasis constituisse, raro extra vasa; & ideo Semitertianae fomitem in vasis, sed ut plurimum minoribus me semper deprehendisse. Erant enim in dissectione cada-

Omentum Semitertiana vasis suam habent putredinem.

veribus inflammationes ex sanguine bilioso & pituitoso factae circa jecoris cavam partem, in ventriculo, intestinis tam crassis quam tenuibus, mesenterio, omento, liene, & saepius in una partium commemoratarum, aut pluribus, aliquando etiam in omnibus, quae celestis mortis causae erant, superveniente gangraena vel sphacelo afflicti loco (etiam si quandoque exiguis esset) partium praedicatarum. Iam qui a me curati fuerint (si non alvi fluxus insignis praevenerat, aut locus inflammationis non esset admodum sensilis, ut jecoris, lienis, pancreatis, mesenterii, omenti, intestinorum) dolores in ventre immanes, continui, certis plerumque horis fe exacerbantes, vel intermittentes aliquamdiu eos affligebant, quod ex inflammationibus ventriculi & intestinorum ortos fuisse ex facto abscessu, sanie pureque, aut bile saniosa, & concocta per secessum vel vomitum redditus, certo sciebam.

C A P. XV.

Intermittentium febrium putredinem in vasis majoribus minoribusque constituisse, exemplis declaratur.

Exemplis (quae inter plurima potiora elegi) illustrior nunc reddantur, quae dixi; & primum quidem intermittentium febrium causam proximam me in vasis majoribus minoribusque deprehendisse: deinde continuas, quae singulis diebus exacerbantur, in visceribus inflammatis habuisse. Igitur a duplici tertiana juvenis cui Germanus legum studiosus jam inde a sex mensibus oppressus, altera decem horas perdurante, altera citius finiente, nullum non, sed frustra praesidii genus expertus erat, praeter venae sectionem. Quam ob causam cum me accessit iussit primo ac secundo die febris natura diligenter perlustrata, utrique hypochondrio manus admoveo, nec ullum tumorem notavi dignum tactu potui animadvertere. Tercio die a venae jecorariae dexteri brachii sectione, quae septem vel octo unciae sanguinis educabantur ante paroxysmum aliquot horis, una febris tertiana, quae nempe eodem die expectabatur, agrum dereliquit. Quae vero adhuc relinquebatur simplex tertiana, binis paroxysmis subsequenter aequae validis agrum molestavit. Post quos cum eodem ipso die, quo expectabatur paroxysmus, horis ante ejus initium septem, venam internam finitri brachii aperiri iussim, & sex adhuc unciae sanguinis educere, levissimus paroxysmus supervenit, nec alius post hunc amplius comparuit. Quo igitur loco materiam duplicis hujus tertianae fuisse exilimabimus, ex quo tam prompte potuerit per sanguinis missionem evacuari, aut de suo loco commoveri? Sane non in alio, quam in vasis. Quamquam enim totum corpus fit transpirabile, id tamen tam brevi tempore efficere non potuisset, ut biliosa extra vasa collecta, per sanguinis missionem intra vasa reperirent. Neque est, quod quispiam dicat, id forte contigisse, ut utraque febris a venae sectione evanesceret, quod in fine mortis esse fuerit adhibere, & sponte, sine ullo remedio, plures morbi sic abire solent. Neque enim mensum septimum ingressi eramus, neque adhuc bona signa concoctionis in

urinis comparuerant, quae concoxisse naturam huiusmodi febrem indicarent. alia febria. Anno millesimo sexcentesimo vigesimo famulus ejusdum nobilis Helvetii, ex gravi dysenteria per quatuordecim dies perdurante, cum febre quotidie circa vesperam exacerbante, in Semitertianam puriam primi ordinis Galeni (quam duplicem tertianam continuam spuriam Medicorum vulgus appellat) esse cum lethargo primam lapsum esse: deinde efflante lethargo intermissis febris evasit, tumore in jecore doloroso ad tactum comparuit, nil proficientibus ipsis remediis, quae interius ad obstructions hujus visceris tollendas praesentebant, & blande ventrem laxare. Quadragimo die, etsi cum urinis meliorem concoctionem, quam antea, monstrantibus, febris cessavit, vires nihilominus, praesertim animales collabi coeperunt. Etiam ad motum erat ager imbecilis. Tum rursus leviter alteratio circa vesperam cum miti & obscura sub noctem mentis alienatione consuebat; nec quidem corpus cibo resiciebatur. Sapor in ore valde dulcis, & carnis fastidium aderat. Die quadragesimo quinto duplex tertiana finiorum redit cum vomitu bilioso, qui antea non erat visus, & nausea in fine paroxysmorum quae matutinis horis affligebat. Quinque postmodum rursus simplex tertiana facta est, quae post binos paroxysmos evanuit. Sexagesimo nihilominus, ut praevideram, mortuus est. Difficili cadaver, non tantum ut fomitem hujus febris inspicere, quem in venis jecoris atque meseraeae consistere semper eram arbitrans, sed ut causam quoque perferretur, ob quam per quinque dies ante obitum ab omni febre inanius visus sit, quantum ea aquali & tardo pulsata, sanorum pulsum quae similis, urinis optimi coloris & substantiam laudabilis, blando calore ac temperato interno exteriorque potui colligere. Inventa in eo est interna ventriculi tunica levi erysipellate inflammatione affecta, jecoris ampla moles respectu maciei totius corporis sanguine sic vacua in venis majoribus, ut cum in magna frusta divideretur, vix aliqua sanguinis portio efflata digna ex ejus majoribus venae cavae & portae propaginibus exiret. Ipse quoque truncus venae cavae, & quae ad portas sita est, valde modicum sanguinem continebant. Sic & pulmones totumque corpus exangue videbantur. Venae meseraeae, & quae ad ventriculum tendebant, quae omentum crassa nigroque sanguine replete erant. Omentum jam extenuatum, & praeter membranas vasaque nil omnino pinguedinis habebat, imo semiputrefactum erat ab inflammatione erysipellacea, seu phlogosi insigni, quae in omnibus venae portae minoribus ramis sanguine continuo adfuit. Pancreas obduerat. Vesica fellea crassum humorem pituitosum cum atra bile permixtum continebat. Obstructus ejus ductus, quae vesica ad duodenum transibat. Omnes illi exigui meatus & ramuli, qui per substantiam jecoris a vesica fellea diffunduntur, & per quos a jecore bilis in vesicam felleam permeat, pariter obstructi erant.

Ex hac historia constare unicuique potest, febrem hanc duplicem tertianam, & simplicem quoque in venis portae quae per jecoris substantiam, mesenterium, omentum, & ventriculum disper-

guntur, præcipuum suum fomitem habuisse: cum nulla alia esset pars, nullus alius locus, nulla cavitas extra venas, quæ biliosum humorem & pituitosum in se continerent: Venterculus esset a bile vacuus, ut saltem interiore sua tunica levi erysipellate affectus. Ante obitum octo diebus, cum altera tertia cessaret, vomitum meræ bilis passus fuit per biduum. Quod contigisse arbitror ab erysipellate ventriculi interno, fluxa in ejus internam tunicam bile æjore per ramum venæ portæ galterepiploicum a recentioribus anatomicis appellatum, cum eam bilem natura per fellis folliculum expurgare non posset. Iecur enim copia bile referunt fuisse propter ramorum folliculi fellis & pori fellis obstructions arbitror, uti & alias venas majores minoresque per corporis interiora diffeminatas. Sed hujus bilis colorem in vasis deprehendi non posse, quod flavus color quando cum atro vel rubro (cujus est sanguis in vasis contentus) permiscetur, comparare nequeat. Quod vero quinque diebus ante obitum sine febre fuerit, factum arbitror ob sanguinis in venis & spirituum vitalium penuriam. Nam in his calor natus non maxime viget, à quo putredinalis calor suum habet fomentum, non secus atque à solis calore is, qui in plantis est, ut etiam in nobis conservatur. Et hæc quoque est ratio, cur sæpe videamus oppreßos febre petentis aut maligna antequam moriantur, pulsus habere ordinarios & quasi febre integros deprehendi, mente, quia alias erant alienati, magis confidere & veluti ad fe redire. Nam ob sanguinis & caloris penuriam in venis & arteriis, spiritus calore præter naturam non accenduntur.

De quantitate quoque dicemus: cum sanguinis liberio è salvatella sinistra manus multos ab ea liberos. Hujus rei testes non ignobiles esse possunt Galeatus, Valescus Tarantanus, Cardanus, & alii. Galenus lib. 111 de *Anatomicis administrationibus*, hujus venæ sectionem in lienis tumore commendavit (dammodo finiam sanguinem fluere, quousque sponte sistatur) in quo quartanam consistere omnibus Galeni affectis notum est. Cæterum cum intumescit lien, non caro lienis, quæ parenchyma dicitur, in majorem molem excrescit; sed venæ & arteriæ, quarum innumerales per hoc vicius propagines disperguntur, adimplentur & distenduntur. Vnde ejus præter rationem naturalis magnitudinis maxima in nonnullis moles cernitur. Quod & aliis quoque partibus molli substantia donatis, & venis atque arteriis quamplurimis accidere quoque videmus, ut articulis. Nam sanguine plurimo interdum adeo distenduntur vasa, ut tam parvas partes ad capitis infantis nuper nati magnitudinem excrescisse viderim.

Elideus de Paduanis insignis præterito seculo practicus in nosocomio Bononiensi cadaver secuit mortui à diuturna quartana. In hujus corde, venis, omnibusque membris inventa sunt frusta magna, longa, alba, pituitosa.

Labet quoque hic commemorare, quod in uxore mercatoris Olmutzensis Andree Hieronymi ejus vidi. Multis annis hæc podagra detinebatur, quæ tandem omnes artus totius corporis invasarat, specie universalis arthritidis cum febre

continua; & jam per quinquennium continuo in lecto detinebatur. Podagra hæc à bile, pituita, ferulo humore plurimo etiam cum portione melancholiz generabatur. Horum humorum fluxu quotidie vel alternis diebus, vel quarto quoque die alienum articulum corporis invadebat. Hanc ingitur mulierem cum ad statum talem trium mensium curatione rediisset, ut quotidie de die surgeret, & in fedili se collocans marito (pecuniam emundis vendendisque mercibus distribuentem) optularetur, rarique in articulos fluxionibus tentaretur, & is ita levis, ut non amplius decumberet, circa finem ætatis ex meo consilio post exactam totius corporis purgationem falsæ chinæ decoctum alteratum cum cichoraceis, & nostræ antiodis podagricæ bolide glutita assumptis, provocatis quotidie tempore convenienti fudoribus. Decimodavo hujus curationis die, ex muliercula cumjudam persuatione, aliquot ceratida calida comedit, & cum aliquo circa ventriculum optime haberet, in quartanam simplicem eo die lapsa est, ob quam feliciter jam inchoatam curationem non ausa fuit absolvere. Hac febre per aliquot septimanas perdurante, ab omni fluxione articuli liberata fuit: at redeunte in pedes fluxione quartana cessavit. Sic quatuor mensium spacio, quo quartana tres recidivæ à me fuerunt notatæ, antequam in totum ab his liberaretur, quæ pauci, nempe tribus aut quatuor paroxysmis consistant, iis diebus, quibus a febre quartana libera videbatur, supervenerunt dolores in aliquo articulo, maxime in genu & pede sinistri; hiisque rursus cessantibus quartana invadebat. Qui extra vasa locum quartane in hac muliere fatigare voluit, quæ mihi indicant causam, cur tacto à partibus externis ad internas, & ab internis ad externas transigere poterit. Scio quidem totum corpus esse transigrabile & porulis multis transigrabile, imo spongiosum undique, ut humor qui extra vasa est, intra ea rapi queat, ac rursus ex iis foras ad quævis alia loca propelli, maxime si aliquo modo tenuis sit, qualis erat in hac quartanaria. Scio præterea, in distributione chyli materiam per exiguum meatum intestinorum in venas & arterias mæseratice deferri, ac hinc per totum corpus distribui. Sed tamen humorem, qui in articulis decubuit (partes valde frigidas) & eos præsertim, qui sunt à corde remotiores & extra vasa circa ligamenta, non censeo tam repente posse in vasa recipi, deinde ad interna viscera penetrare, ac extra vasa profundi, & is iterum repelli in vasa & ad articulos extra vasa deponi: sed in ipsis vasis circa articulos depositum recurrere in vasa aliquos videris aut plurim sub abdomine contentorum (quorum tamen nullus ad tactum mihi humor compariuit) & ad tempus inibi conservari, hinc rursus cum impetu naturæ ad externa loca protrudi existimo.

CAP. XVI.

A continuis febribus sublatorum historia due memorabiles, & eorum dissectio, quem putredinis locum monstravit.

Cæterum neminem eorum, qui quotidiana febre intermittente obiisset, dissecui; sed plures,

plures, qui febre quotidie sese exacerbante, præcipue circa vesperam aut statim post meridiem, in modum duplicis tertianæ continuæ vel semitertianæ, perierunt. In his putredinem in venis majoribus quæ inter alas & inguina excurrunt, sed in inflammato alicujus primæ regionis viscere vel alia aliqua recondita parte, inflammatione paulo minori, quam ut dolore ab agro, vel tactu hypochondriorum à Medico & ægro noceferet.

Historia.

Nobilis juvenis Belgæ, Dominus de Vilers Comitis Hochstratenensis Cubicularius, cum prius in dyenteriam & febrem continuam lapsus esset, quæ quotidie circa vesperam cum levi frigore credebatur (duplicem tertianam tum Medici appellabant, per supergressum paroxysmorum; ego vero Semitertianam spuriam primi ordinis Galeni; erat enim altero die major accessio cum horrore; altero minor cum frigore pene eadem hora) post octiduum, à febre & dyenteria liberatus est, optimis unius coloris & substantiæ ac hypostasi alba, levi & æquali per tres dies sublequentibus. Vnde cuncti rediit febri continua, non sine suspitione alicujus malignitatis. Nam pulsus eam longe minorum (cum essent minime celeres, frequentes & inæuales, quam antea) ostendebant, & lingua nihilominus erat arida, sitis & delirium obscura aderant; parvæque de ventre, quando manum abdomini apprebam vehementius, querelæ. Quarto à recidivâ de rursus per tres dies integer à febre fuit. Vnde recidivâ comparuit, quia cum neque mens, constaret, neque multum febrerit, lingua nihilominus arida existente cum unius faciorum simili, tetano correptus rigidus ac gelidus, ut mortuus nulla respiratione conspicua ab affantibus accensis prius cereis, electo in mensam deferretur. Ego cubiculum ingressus cum ex valido pulsui, quem adhuc mane tetigeram, & virum paulatim lapsu, febrisque lento motu mihi perferre non possem, ægrum mortuum, manum carpo non sine cæchimo muliercularum additum admovi, pulsus vix perceptibilem notavi, justique ut rursus in lectum deferretur, pannis lineis calefactis frictions extremis partibus adhiberetur.

Ab his poli tres horas reviviscere cepit. postero die cavens vici, ne ab intestato moreretur, tabellionem vocavit, dieque subsequenti, qui si recte meminî, vigesimus fuit, vitam cum morte commutavit. In dissecto cadavere reperta sunt intestina tenuia inflammata, ileum qua colo & cæco ad hærebat, sphacelatum. Pulmones quidem male affecti, fed circa inflammationem aut putredinem, unde horum pravam dispositionem, quæ frigida & humida videbatur (à qua temporis tractu pithiæsi & cæchætiæ evadunt, corrupta substantia pulmonum) nequaquam mortis causam esse conjeci (cum similibus pulmonum malo laborantes ad quatuordecim & plures annos sine febricula vitam protraxissent) conspexerim, inspectis post mortem eorum cadaveribus, qui ab alia febre acuta perierant, sed solum inflammationem, quæ intestina à morbi initio occupaverat. Vnde hi circuitus, hæc recidivæ. Vel quia materia inflammationis, quam commovebatur, nisi quando per intervalla inflammabatur putridos vapores per arterias ad cor: vel quia partes principes per intervalla commotæ à

materia, quam continebant, ad intestina protrudebant, & recidivas tales, quales commemoravi, procreabant.

Alia historia.

Similis fere anno millesimo sexcentesimo vigesimo casus contigit in generoso adolescente Philippo Barone Sancti Germani Gallo ac Domini Plesfæ ex filia nepote. Is enim temperamenti calidi & humidum animum fuit ætatis decimum septimum ingressus, quinto Maji, cum antea, dum integra valetudine fui putaret, fuit quando continua premeretur, & suspiciosa esset, de febre continua levi cum capitis dolore in itinere, quo Mantua Patavium tendebat, quæstus est. Febris primam continens viâ est. Sed quarto die periodos habere coepit, naturamque duplicis tertianæ spurie inducere. Circa horam vigesimam primam, id est, tribus ante vesperam quotidie accendebatur, prægræssa levi quidam partium extremarum refrigeratione, quæ alternis diebus erat major, non sine aliquo interdum horrore, Semitertianæ spurie præscriptæ in præcedenti historia modo. Statum accessions protraxit in quartam, quintam, interdum etiam sextam noctis horam. In fine undecimæ hæc febris per quinque vel sex horas prorpsu intermisit. Idem contigit decimatertia. Decima quarta in totum libera febre usque ad decimam septimam, quæ recidivam passus est, valido & longo circa vigesimam horam invadente paroxysmo cum frigore per quatuor horas perdurante, ac febrili calore validissimo tota nocte perseverante. Die vigesima facies cadaverosa, pulsus fere languidi, urinae subjugales, inconcoctæ, lingua arida, nigricans. De millo ventris dolore conqueßus est. Tamen de eo singulari studio sepius à me fuit interrogatus. Animadvertente enim clysteres injectos in faciem educere, sed meram clysteris materiam sine excrementis prout injecta erat statim vel modico post injectionem tempore exire, quod mihi signum inflammationis intestinorum in ejusmodi febribus flet esse frequenter simum. Ab his mentis alienatio die vigesimoquarto successit. Vigesimo septimo, ingruente magno paroxysmo, expiravit. Dissectum à me cadaver fuit, ut embarratibus concideretur. In eo tenuia intestina inflammata vidimus, præsertim tunica eorum interna. Ilei portiones magnam versum colorem prorsus sphacelatum. Interiorum tenuium tunica, qua parte extremities venarum mæseratice terminantur, duris quibusdam excrescentiis carnis, flavo colore ac fusco præditis, pluribus in locis per breviam intervalla dimidia aut paulo amplius spithamæ laboravit, majoribus excrescentiis in ileo, minoribus in jejuno. Iecoris cavæ partis portio inflammata fuit. Vesica fellis loco bilis aqua limpidam, clarum cum exigua portione mucæ & alterius materie, quæ luteum ovi coctum ac nonnihil cum mucoso humore dissolutum referebat, copiose continuit. Porus felleus, qui ex eadem ad intestinum duodecimum perducitur, duorum digitorum transversum longitudine, statim à vesica fellea usque adeo obstructus fuit, ut in solidum corpus confluitum videretur, nec apertum specilli tenuissimi admittiret. Ab hoc obstruendo ductu meatu reliquus felleus apertus, satis ampla cavitate in duodenum intestinum transiit, & ab hoc recto satis tramite in cavam jecoris partem; perque ejusdem substantiam

tiam multis ramulis ac furculis cavis & obstru-
tione omni vacuis transivit. Hinc certa coniectura
nihil confitit, bilem non in vesicam conleclat a je-
core, sed in hofce ramulos ac furculos a natura ad
intestinum duodenum detrusam fuisse: & ob pre-
clusum ejus ad vesicam felleam iter (in qua tan-
tum in penu ad tempus conservari bilis solet) fa-
ctum esse, cum bona valitudine frui se putaret,
ea in jecore ac venis diuturniorem moram traxe-
rit, & sic ultra modum calefacta atra bilis tunc
inducit, aut per ramos mesentericos ad jeju-
num & ileum intestina dederit, eorum interiam
unicam prius leviter exulcerat: inde ex eorum
ulceribus caruncula excreverit, viscosa ob corum
luciditatem pituitosa, quales cotyledonibus ovilli
fetus adhaerere consueverunt, sed paulo rubicun-
diores & ut mihi apparebat primo intuitu, non
expertes cancrose malignitatis. Patet hinc etiam
causa debilitatis tunc intestinorum, ob quam
facile fluxiones suscipere poterint, quae inflam-
mationes erysipelatosas & gangraenas ac sphace-
los procreant: cur quoque tempore sanitatis fere
semper bibendi quidam appetitus adfuerit. Nemp-
e ob levem phlogosim, quam in jecore ob reten-
tum biliosum excrementum, & in tenuibus in-
testinis circa haece carunculas semper adfuisse
putandum est. Pulmones quoque haud erant natu-
ralis coloris utique, sed in locis quibusdam infla-
mati, & colitis utroque in latere annexi. Cerebri
ventriculi aqua limpida pleni, ut & initium spina-
lis medullae: tum cerebri superficies, exterior-
que anfractus ipsa meningi vestiti ac fecti eadem
aquam plurimum in locis continebant. Ceterum
nulla neque in cerebro, neque in ejus meningi-
bus inflammatio notata est. Vena cava & arteria
magna sanguine fere erant vacuae (quanquam ultra
vigniti uncias sanguinis ex variis partibus tempore
curationis haud memini e ductas) ut cum cadaver
difficeream, non fuerit opus filo venam cavam &
portae truncum dum exenterarentur, intercipere,
quemadmodum in aliis cadaveribus fieri solet, in
quibus nullum in sanguis ex praedictis majori-
bus vas effluens reliquis abdominis partibus inquie-
ret. Unde satis liquet, febris Semitertianae vel du-
plicis tertianae continuas per superiorem passu
pylorum, ut Scholae loquuntur, causam in
patroque egrotto non fuisse putrefactum sanguinem
in vasis majoribus, aut bilem putrefactam in in-
testini, cum admodum medicus & vix ad vitam ne-
cessarius in iis contineretur, fed inflammationem
in intestinis & circa jecoris partem; cujus humor
cum effluat biliosus & pituitosus, sua putre-
factione efficit motum, quo singulis diebus alter-
nifque validiori periodo accenderetur.

C A P. XVII.

*Semitertiana propria an sit symptomatica, an
primaria, & cur eam primariam
scripserim fecerim.*

Quapropter cum eas febres, intermittentes
scilicet & continuas, ex quibus Semitertiana
componi dixi, in vasis putredinem habere
comperitum sit, sequitur & ipsam Semitertiana
in istdem putredinem suam habere. Quispiam ta-
men contra hanc sententiam non leve argumen-

tum objicere hoc potest. *Si febris, ex quibus Semitertiana componitur, symptomatica sit, ligatur & ipsa esse symptomaticam non primariam, & per consequens putredinem ejus non consistere in vasis.* Quod autem
tertiana & ea, quae quotidie accenditur, symptoma-
ticae sint, probatur ex eo, quod ab alicujus
membris inflammatione suscitata fuisse videantur,
ut patet ex diffinitione cadaverum propositorum.
Nam si symptomatica sint quae ab inflammatio-
ne membranarum cerebri aut colitis succingentis,
pulmonum, jecoris, lienis, aut partis alicujus ex-
ternae internae vulneratae, quae a bubone & an-
thraxe accenduntur, cur non etiam symptomaticae
dicuntur quae ab inflammatione intestinorum,
mesenterii, mesocoli, omenti, ventriculo origi-
nem habent? Sed & ab ipsa Semitertiana mortui
& aperti non alium fomitem febris ostenduntur,
quam dictarum partium in abdomine contenta-
rum inflammationem. Hanc autem non fuisse sim-
plicem aliquam phlogosim liguritam ab obstruc-
tionibus harum partium, fed veram inflammationem
probat abscessus, gangraena, sphaceli in vis-
vis & mortuis ab hac febre conspecti. Respon-
deo, vasorum & febrium symptomaticarum no-
mine nos multa intelligere posse.

Per vasa enim aliquando tantum ea capimus,
quae majora sunt & inter alas & inguina excu-
runt. In qua significatione multi accipiunt, quan-
do ajunt febres continuas primarias in vasis con-
sistere. Aliquando capimus vasa tam majora quam
minora cujuscumque partis indeterminate, & hu-
moris aut illius visceris. In hac significatione nos ca-
pimus vasorum nomen, quando dicimus Semi-
tertianae putredinem esse in vasis. Nam etiam si
partis alicujus inflammatione accendatur, hujus
tamen partis venae scilicet & arteriae humorum,
ex quo Semitertianam suscitari dicebamus, con-
tinent putrefactum, cujus etiam parti aliqua
fit, quae effundatur extra vasa, & quandoque sic
abscessum pariat, illa tamen portio febre non
accendit, sed quae in extremis vasis partium cavi-
tatem praeternaturalem (quam sibi, velut in abs-
cessibus fieri solet, portio illa humoris putrefacti
parit) circumambientium contineri consuevit
putridos vapores per arterias, quae semper patent
& venas ad cor mittunt, si quando continuo iste
humor putrefactus accendatur.

Per febre symptomaticam aliquando intelli-
gitur Medici febre, quae extra vasa in proprio
aliquo & praeternaturali spacio solet contineri, ex
quo accessio accenditur venae & arteriae qua-
dam continuatione, abique eo quod putridus va-
por ad cor permeet. Verbi gratia, cutis in-
guinis in capite facta sit, ob quam spacio non modi-
co, praeternaturali tamen, concluditur sanguis ex-
tra vasa ob eorum contusionem effusus, qui prius
grumescat, mox putrefact & ad suppuracionem
tendat. Ex hujus putredine contingit continuatione
ne quadam venarum & arteriarum, accendi fe-
bre, quae vere est symptomatica, quia in vasis
non consistit. *Nam si aliquando accipitur febris sym-
ptomatica pro non modo hac, sed etiam ea quae
putridos vapores ad cor mittit per vasa, suscitatos
a partis cujusvis inflammatione vel putredine &
corruptela substantiae, vel insigni aliqua obstruc-
tione facta in vasis. Aliquando capitur febris sym-
matica*

matica pro omni febre, quae extra vasa majora pu-
tratum humorem continet. Quodque rursus
pro ea febre, quae fieri solet ab inflammatione vi-
scerum & partium earum, quarum curationem
nobis veteres propoliunt, ut est quae comitatur
phrenitidem, anginam, pleuritidem, peripneumonia-
m, nephritidem, hoc est jecoris, lienis, & renum
notabiles & per sua declarata signa maxime con-
spicuis inflammationes.

In hac significatione nos capimus febre sym-
ptomaticam, quando supra dicebamus Semitertianam
improprie consistere ex febre symptoma-
tica quae quotidie exacerbatur, & tertiana inter-
mittente. Quapropter valet, quod putant con-
sequens; *si est febris symptomatica, ergo putredo non est
in vasis*, nempe si in prima significatione accipia-
tur febris symptomatica nomen. Sed in aliis signi-
ficationibus falsum est.

Illud quoque hic non est omitendum, quod si
diligenter consideraverimus ex quibus locis & per
quas vias talis humor fluat, qui facit inflammatio-
nem membrorum ex qua Semitertianam suscitari
dicebamus, non alias invenimus, quam vasa ma-
jora, interdu & ea, quae per carnes corporis
disperguntur, quando ab iis humores defuerunt
ad vasa majora, quae inter alas & inguina excu-
runt. Contingit autem in his aliquando, priusquam
deputatur ad membra inflammanda, non levem
putredinem suscitari, aliquando sine putredine in
partem determinatam decumbere ac inibi putre-
scere. Quatenus igitur & in majoribus vasis pu-
treteat & in minoribus, eatenus iis qui symptoma-
tica nominant eam febre, quae in minoribus
vasis putredinem tantum habent partis alicujus de-
terminatae, accipitis erit generis Semitertiana.
Sed appellatione quae Semitertianam primariam an
symptomaticam parum laboro, dummodo constet
eius putredinem in vasis omenti, mesenterii, vene-
riculi, intestinorum, & aliarum ejus partium in-
flammatum me deprehendisse. Veteres autem
atque recentiores plures Medicos hanc inter puras
primarias retulisse censo, quod nulla manifesta
signa erysipelatis conspicerent, aut inflammationis
alicujus membri, ex quo symptomaticam febre
provenire putabant. Neque enim adfuit signa
pleuritidis, anginae, vel peripneumoniae, phreni-
tidis, hepatidis, nephritidis, aut iis quae
febris quae vasa veluti inflammationem con-
comitari consuevit. Signa vero inflammationem
eorum membrorum, quae in Semitertiana ob-
servata fuerit, plerumque omni tempore obscura sunt,
sed maxime morbi initio: quod contingit vel quia
putridus humor prius in vasis majoribus continetur,
& inde ad minora partium determinatur
fluat, vel quod parvam partium inflammationem, &
spacio exiguo in parte affecta circumscriptam.

Verbi gratia, cum jecoris, ventriculi, intestinorum
tantum portunculula aliqua inflammatur, ob
partis affectu obsequium sensum, ut pancreatis, me-
senterii, mesocoli, omenti, cavae jecoris partis &
bubones venerosus haec tempestate quoties occu-
rant, discere unumquodque potest. Etiam appa-
ret nullus tumor comparere: aut quia mens
patientis egrotat; unde aliqua in parte dolorem,
quem alias mente constantes percipere debent,

non sentit: aut denique quod, cum in hac febre
statis peridis exacerbationes fiant, & quotidie &
alternis diebus, omnes auctores haecenus existima-
rent eas suscitari non posse a partis alicujus inflam-
matione, maxime vero intermittente tertianam
vel quotidianam.

C A P. XVIII.

Intermittentem febre dari symptomaticam.

Alenim axioma nunc receptum est ab omni
Medicorum schola; *symptomatica febris omni
in continuam esse genere, neque nulla unquam ipsa esse
intermittens*. In hac sententia, si per symptoma-
tica febre intelligerent tantum eam, quae in
phrenitide, angina, pleuritide, peripneumonia, mag-
nis jecoris lienisque inflammationibus conspici-
tur, non inveniret quod reprehenderem, sed quia
nulla multum horum etiam eas intelligunt, quae ab
obstructionibus & putredinibus partium, & qua-
vis partis alicujus inflammatione fiunt, neque subs-
cribere eorum sententiae.

In Marcelli Donati historis mirabilibus lib. v.
cap. iv. legi, Iacobum Hebraeum periculum vici-
nare transierat in musculum temporalem in-
cidente, septima die supervenientibus rigoribus,
utque ad quadagesimum quantum diu rigore,
& quotidie fere semper sudasse alternatim rigori-
bus succedentibus sudoribus. Fuisse hanc inter-
mittentem febre ad vulnere factam, patet per apho-
rismum Hippocratis quando scribit lib. iv. aph.
xxiii. *Quibus in febribus quoties rigoras fiant, quo-
tidie febres solvantur*. Non ipsi observavimus inter-
mittentem febre in ichade alternis diebus in-
vadentem, & quae ex obstructionibus viscerum
oriuntur tertianae longae & quartanae, tertianae
que duplices, quod aliud fuit eorum symptoma-
ticae.

Desid. Iacotius in comm. ad Coates praenotiones
Hippocratis, scribit se in puella dissecto cadave-
re, quod in levem quandam febre incididerat, ter-
tiana intermittenti haud dissimilem, sine dolore
ventris, in ventre abcessum perruptum, a quo obitu-
ratur praeviderat, invenisse, magna puris quanti-
tate circa uterum repleta, quae ad superiores us-
que partes redundabat, cum intestinorum colore
subigno. Et uno anno observavit in febre tertiana,
cum rigore non ita ordinato, eorum suppuracionem in
ventre, cujus nullum signum memorat dignum
praefectat: unde subito effuso pure supra intestina, aut
intestini ipsi ad sphacelum perducti, improvise sanis
facta est, cum rigore, sudore frigido, animi deliquio,
dolore ventris, & infestatione.

Ex corruptione & putredine pulmonum quoti-
dianos circuitus notavi, non tantum continuos,
sed etiam intermittentes. Hippocrates lib. v. Coas.
car. Praenot. sect. 11, aph. lxxiii, haec docet: *si de
quatinus supra dixerimus, & quod dixerimus de intermit-
tentibus febribus intermittentes plerumque sudoribus
ad suppuracionem febres intermittentes plerumque sudoribus
ad suppuracionem febres intermittentes plerumque sudoribus
ad suppuracionem febres intermittentes plerumque sudoribus*

CAP. XIX.

De causis antecedentibus (humoribus nempe)
& putredinem efficientibus.

Inter antecedentes causas duæ præcipuæ sunt recensendæ, videlicet humores biliosi ac pituitosi, ut plurimum copia peccantes, aliquando etiam qualitate, quæ aptæ redduntur ad suscipiendos tales putredines, quæ typum Semitertianarum efficiunt; & ea, quæ putredinis est opifex primaria, quam alii obstruccionem, aut constrictiorem meatuum cutis; alii vero viscerum interiorum obstruccionem esse volunt. Humores biliosi & pituitosi in venis & arteriis omnibus per totum corpus disseminati possunt contineri, at sæpe in aliquibus, & iis præcipue, quæ inter alas & inguina excurrunt, majoribus. Cum tanta est horum humorum copia, ut in omnibus vasis consistant, febre Semitertiana instans, maxima eorum copia ad interiorum partes, ut ad ventriculum & cavitates intestinorum, aut alias his circumstantes protruditur per vasa majora, quæ inter alas & inguina posita sunt. Quod si minor sit copia, & quæ tantum in hisce jam dictis vasis consistit, in aliquam aut plures earum, quæ à propaginis venæ portæ nuntiantur, decumbit, antequam putrescat, aut cum jam incipit putrescere.

Generantur hi humores biliosi & pituitosi in vasis majoribus, ac quandoque etiam minoribus, partium determinatarum, cerebri, jecoris, lienis, ventriculi & intestinorum cavitatibus. Quando intemperie calida, frigidave laborant, aut nimio ac pravo cibo aggravantur, alique ad hanc inducendam intemperiem cause concurrant. Iam & obstruccionem viscerum, ut jecoris, produciunt copiam bilis excrementitiæ, quæ non habet liberum exitum in vesiculam felleam, & inde per porum suum proprium in intestina. Quod si & est comprimator potius nimio cibo, aut aliis adjacentibus partibus induratis, ut colo intestino, contingit in venis plurimam bilem coacervari, nisi per ramos venæ portæ in intestina tenuia prorumpat per bilium alvi fluxum. Hac ratio est, cur qui obstruccionibus laborant viscerum, hinc febri sint magis obnoxii.

Opportune hic aliquis querere potest, an humor corporis habitum per contagium invadere queat talis febris. Cum enim in hoc massa sanguinea sit nulla cacochymia inquinata, videtur ab hac febre immunis esse talis habitus. Respondeo contagiosis Hemitritæ aliquando etiam invasisse optimum corporis habitum, sed tunc sanguinem putredinis contagio converti in talem cacochymiam, quæ apta est producere Semitertianas biliosas. Tempore pestis sæpe conficitur totus sanguis optimi habitus conversus in bilem flavam, viridem, atram. Eorum qui à vipera demorfi sunt sanguis bilefuit. Argumento sunt excretionem biliosæ, quæ compa-

rent iis, qui superfluitas manent per alvi fluxum, interdum etiam per sudores. Hoc tamen omnibus, ut arbitror, in confesso est, Semitertianam primo & citius invadere ac gravius qui cacochymiam in vasis fœvent biliosam & pituitosam, quam qui ea carent. Novi mulierem viginti quatuor annorum, calidi ac humidi temperamenti, cum subdominio pituita diminitus mensibus, cancro insigni laborantem in clune dextro, progenito ex stercoreato ab impento chirurgo male incisio, dum in domo decumberet, in qua omnes maligna Hemitritæ & pluri ejus familia lethalit afficiebantur, ab eadem febre immunem non fuisse, etiam si per ulcus quotidie multa sanguinis copia & sanies profunderet. Existimasset unusquisque haud fieri posse ut ob tantam humorum pravorum quotidianam evacuationem putredo in vasis aut aliquo viscere generaretur, apta ad Hemitritæum producendum. Et tamen hæc misere per tres menses easdem recidivas & mutationes febrium passa est, quas alie ejusdem domus, quæ superfluitas manere. Id tantum benefici excreto humorum pravorum quotidiana per cancerum cauvavit, quod malignitatis signa obscuriora videbantur.

Sed de priori causa antecedente hæc satis, venio nunc ad posteriorem, quæ duplex est apud aures: cutis meatuum nempe constrictio vel obstruccionis, & viscerum obstruccionis vel eorum meatuum constrictio. Interdum utraque hæc concurret, interdum alterutra. Nam per spiratione corporis impedita, si id cacochymium fuerit, humores in vasis accenduntur atque putrescunt. Imo qui Galenum sequi fecerint, omnium putredinem febrium putredinem prægredi, ac cum ipsa permanere apud retentionem transpirabilem & vaporosorum excrementorum per cutis poros, quæ fit vel quando densatur cutis ab intrinsecis & extrinsecis; vel quando obstruuntur à viscidis humoribus. Disti ab intrinsecis densari ac contrahi, quando aeris aliqua materia vel alterius qualitatit nature molesta stimulat ad excretionem à valida vi expultrice partium externarum & ad partes internas, & præcipue ventriculum ac intestina protruditur. Ita videmus temporibus æstivis purgantia medicamenta & fluxus alvi spontaneos, sudores inhibere, cutique poros ac rotius corporis habitum contrahere. Inter viscera, quorum quoque meatus constringuntur in hac febre, solent à me præcipue numerari intestina & ventriculus in suis cavitatibus: quando pituita affringente aut frigida interna eorum tunica obstruitur, vel cibis adstringentibus refrigerantur. Vasa mefenterica & ea, quæ per jecur & lienem & pancreas transeunt, tum angustantur ob easdem causas, tum obstruuntur; maxime vero fellis porus ad intestinum duodenum transiens, & ejusdem meatus per jecur dispersi. Obstruuntur quoque omnes hi ductus à crassis & pituitosis humoribus.

Causa antecedens
hujus febris
est duplex.

CAP. I.
De aere calido humido, & inequali.

Vanquam omnes morborum cause, quæ externa vocantur, concurrere ad generationem hujus febris queant, duæ tamen sunt præcipuæ, quæ hanc procreant: aer scilicet, & vitæ ratio. Aer, de quo prius sermonem instituo, debet esse calidus & humidus, atque inequalis. Galenus Hemitritæam febrem Romæ frequentem esse scribit, & in Æthiopia, totoque litore tractuque terræ, ubi calum est calidum cum adventitia humiditate. Videtur aliquibus his verbis innuere calum debere prius esse calidum, deinde supervenire ei oportere humiditatem, & sic aerem calidum & humidum facere hanc febrem progignere.

Ego per caliditatem non existimo cum intelligere insignes calores & continuatos, quos squales nonnulli appellant, quia tales non sunt semper Romæ, nec in aliis multis frigidis regionibus, in quibus hic morbus est frequens, Aultria, Pannonia, Moravia, & hisce finitimus tractibus, in quibus veris initio, sole nondum effluante, talem febrem epidemicam incipisse vidimus, & magis veris temporibus, quam æstivis (quibus tamen sol est calidior) continuasse. Et sane calores insignes non solent esse cum multa humiditate, quæ ac prædictis esse debet, conjuncti.

Per adventitiam humiditatem meo quidem judicio Galenus non intelligit aliam, quam quæ accerit à natura climatis cæli. Qualis est, quæ à ventis non naturalibus in aliquam provinciam pellitur, vel à vaporibus à terra elevatis suscitatur, concurrentibus ejus anni constellationibus ad istius humiditatis proventum. Romæ, ratione climatis, debet esse temperatus aer, in Æthiopia calidus & siccus; & tamen calum Romanum æstate & autumno nebulosum est. Narrat nostri navigatores, in insula Divi Thomæ, quæ sub linea æquinoctialis sita est, atque in Guinea Africanæ regno, ubi Æthiopum maxima pars habitat, multis vaporibus & mari per solem attractis, quo tempore sol meridianum verticem tangit, calum nebulosum esse & valde pluviosum, nec ventosum: inde febres continuas ipsi esse familiares, quæ alternis diebus validiores sunt, & ut plurimum per viginti dies

perdurant: advenasque nautas ejusmodi febribus (quas per signa ab aliis mercatoribus relata puto Semitertianas esse) ut plurimum perire. In Aultria, Moravia, Pannonia, locisque his proximis, mane & vespere vapores à terra elevantur, qui si non à ventis mane abigerentur, usque ad tertiam diei partem commorarentur, & præter naturam aerem humectarent in perneciem incolarum maximum. Siquidem sol, validis regnantibus ventis, aerem æstivum (qui valde calidus in his locis non est) contemperantibus, non potest matutinis suis radiis derepente vapores & nebulas discutere. Itaque si quando contingit ventos in hisce regionibus, aliquo anno præter morem ejus regionis fere aliquandiu, tunc etiam accidit frequens & popularis Semitertianarum invasio. Hinc nunc est apud eos, qui Aultriam incolunt, proverbium: *Aultria, veniosa, si non veniosa, veniensola.*

In medio veris & in fine pluvias per quadraginta dies & amplius perseverantes Semitertianas populares in omnibus fere regionibus, tam temperatis, ut Italia, quam frigidioribus, ut Aultria, Moravia, Iliria, Styria, & aliis attulisse observavi statim in principio æstatis. Anno millesimo sexcentesimo vigesimo primo, ab æquinoctio verno usque ad principium æstatis pluvie continuæ erant Patavii, Vicentiæ, Veronæ, Venetiis, aliisque urbibus hinc propensius. In agro Patavino cum pluvie ultra mensuram perdurassent, adeo frequenter Semitertianæ vixit, ut nullam sinceram tertianam observare mihi in centum agris licuit. Omnes, quæ exactas Semitertianæ signa non habebant, obliquioribus anni ejusdem diebus quodammodo invadebant. Et quo magis hæ pluvie perseverabant, eo etiam maligniores hæ febres fiebant, & magis contagiosæ ac lethales. Venetiis tamen eo tempore, quo Patavi grassari incipiebant, non conspiciantur (cum tamen hæ due urbes hanc procul à se invicem distent) sed cum veris finis incipiat. Nam urbs Patavina non procul à montibus sita est. Vnde non tantum pluvius continuus ejus erat, sed etiam à nive in montibus liquefacta, inmentibus extra alveum fluminibus & agros inundantibus, duplicata humiditate inquantur, quod Venetiis non contingit. Nam pluvie est hic quoque frequenter essent, non tamen poterant aerem multum humectare, quod pluvie cadentes in civitatem in mare defluebant, & per æstus maris abluabantur ac deferabantur. Tandem coeperunt etiam Venetiis serius comparere, ob nebulas

aut vias

FINIS LIBRI PRIMI

ADRI

à ventis istis à continentibus propulsas. Verum pauciores, quam Patavi, Semiterianae vigeant, & citius cessant.

Hinc patet causa, cur omnium citissime & frequentissime huic febrì obnoxii sint, qui in vallibus habitant & prope magna flumina, & quae frequenter loca plana & pacifica vicina inundant, & circa magnos lacus ad pascua aedes suas habent: contra qui in collibus ac montibus degunt, magis ab hac febre sint tuti, aut ferius minime maligne ac populariter eae molestentur. Hoc in Austria, Moravia, Pannonia, finitimisque regionibus verissimum esse comperi. Nam maxima harum regionum pars montosa est, aut collibus aspera; pagi & urbes pleraque in vallibus aut planitiebus inter montes liris constructae sunt; quo aquis, quibus indigent ad vitam commodiorem, abundent, & à ventis, qui iis validissimi sunt & asperissimi hyemalibus mensibus, tuti sint. Ideo aeris frequens adest vere & aestate humiditas. Vere quidem, quod è pluvis & nivibus liquefactis, quae solent esse multae, terra supra quam calas adificat, plurimum humiditatem absorbeat. Aestate vero, quia ab hac humiditate plurimae vesperi ac mane excitantur nebulae; quae propter montes, si à meridie sunt, neque à sole; si vero à septentrione & ortu, neque à ventis commodè possunt dissipari. Autumno vero minus ab hac febre in iis locis aegri molestantur, quia Frigus in istis regionibus cum pruinis cito oritur, quae refrigerant & exsiccant adventum aeris humiditatem.

Hippocrates lib. 1. epidem. sect. 11. scribit in Thalo autumnum & sub hyemem Semiterianas plures incolae factas ex tali anni constitutione: Ante autem, iniquens, tempestates non tempestates, sed derepente, aquilonis & austrini multo humide, & praeruptem. In his finibus vero durabant usque ad phœdram & sub phœdra. Hyems autem aquilonis; aqua multa, largae, magna: nives. Plerumque mixta aeri serena: & hac quidem fiebant omnia: frigora vero non admodum intempestiva. Iam vero post brumale solstitium: & quando faciemur spirare incipit, posterior hyems magna erat, aquilonis multa. Nives & aqua assidue, multa, celum procellosum ac nubium. Haec autem durabant, & non remittebant usque ad aequinoctium. Ver autem frigidum, aquilonis, aquosum, nubium. Aestas non valde aestiva fiebat. Et sic assidue stirarunt. Mox circa arcturum in aquilonis aqua valde multa. Haec sunt Hippocratis verba, quibus etiam docere videtur anni praescriptam constitutionem humidam quidem fuisse, sed frigidiorem, quam regionis de more solito comperebat. Hoc addere adhuc libuit ut, quod supra dixi, confirmarem auctoritate Hippocratis, ad aeris constitutionem, quae Semiterianas facit, non requiri magnum aestum, sed insignem humiditatem. Dixi etiam aere inaequalem conferre ad huius febris procreationem, non quidem omni tempore, sed in fine veris; & aestate cum aer incaluit, si enim tunc fiant frequentes tempestates, ut modo fit calor, modo frigus; modo venti aquilonares, modo austrini; modo sudum fit celum, modo ventosum & nubium, quemadmodum in Austria, Moravia & Pannonia cum ibi per quadriennium praxim exercerem vidi (plurimum quotidie è lecto furgens mane, dubitans, quae veste meo die indui oporteret) aperiantur aësti pori cutis, &

Quasi aer ad
procreationem
huius febris
requiratur.

rursus derepente à frigore condensantur ac obstruuntur. Autumno in calidioribus regionibus infestius inaequalitas etiam hac febrem inducit. Vidi qui in cavernis montium & cellas vinarias frigidas aestatis tempore ingressi, atque vinum frigidum bibentes nonnihilque in hoc frigore aëre moram trahentes in hanc febrem incidere.

C A P. II.

Victus ratio apud Moravos, & Pannonios, producens Semiterianam epidemicam. Quis sit quae sporadicam gignat.

Quantum quoque victus ratio conferat ad hanc febrem generandam, lubet in tironum gratiam edocere, productis in medium iis, quae ego in praxi mea dum inter Pannonas & Moravos versarer, observavi. Non enim qui nimio potu vini aut cerevisiae aut aquae utebantur, huius febris erant magis obnoxii, sed qui valde frigido & glacie vel nive vel in profundis puteis plurimum refrigerato. Etenim frequens ejus usus in Pannonia apud eos, qui in humidis & uliginosis locis habitant. Cellas namque vinarias plerumque profundas non habent. Idcirco coguntur tepidum potum aestivis diebus assumere, vel glacie vel nive refrigeratum. Accidit inde caput eorum fieri destillationibus obnoxium in pectus, ventriculum, intestina, aliaque corporis partes; quod ex levi tussis, voce rauca, diarrhoea, sanguinis profluvio è naribus, dolore dorsi, lumborum, scapularum, urina maxime fuscolia conjicere mihi licuit. Quomobrem veracissimum reddidit apud eos aphorismus xxiv lib. v. Hippocratis, qui inquit: *Frigida, quales nix & glacie, peccant inimica, iussu movent, sanguinis profusio & destillationes.* Habent quoque iidem populi aquas crudas non leves nec facile penetrantes ad vesicam. Quia sunt stagnantes, palustres, puteales, ut plurimum à nivibus genitae. Fluviales eorum aquae & fontanae aestivis diebus & autumno ac hyeme ibi optiniae quidem sunt; at ubi ver insit, & pessime, ob nives liquefactas. Ex his plurimum eorum potus, qui sunt tenacioris fortunae: qui vero diutiores, coquant sibi cerevisiam ex tritico magis, quam ex alio frumenti genere, dulcem & nullis vinosis saporibus cum bene defaecata fuerit; ideo vi diuretica, sed crudam. Nam cerevisiarum coctores diligenter ejus cocturam negligunt, majoris quavis gratia. Quapropter haec bibita in praecordis aestu, & copiam pituitae in iisdem partibus congregat. Vnde plurimi sanitati suae consulentes ad aquas crudas & cerevisiam digerendas, alii estu sibi prudenter mane consulunt praecipue Pannonas. At Moraviae aquam vitae modicam mane bibunt qui diutiores sunt ad praecedenda cruditates. Quas tamen ex pravo suo vitae genere magis adaugent. Nam à potu aquae vitae multo cerevisia esse implet in tabernis, maturans horas in iis consumentes. Deinde post prandium vino febricitant, quod in Moravia tractuque Pannonico ei vicino & aliis locis plerique crudum est, ventriculo & intestinis noxium. Nam haec regiones frigidae sunt, tardeque in iis vites florent aëstus, ac citius pruina & frigora autumnii temporibus subintrant. Propterea utque quotannis raro ad perfectam maturitatem perveniunt. Iam & vinum quod uno anno matu-

ruerit,

C A P. III.

De signis diagnosticis universalsibus.

Signa communia pathognomonica nulla in Semiteriana, quae propria & impropria competunt, insunt. Omnia enim quae simpliciter Semiterianae adscribuntur à Scripторibus, propriae conveniunt. In hac enim videre licet alternis diebus febrem magis urgere. Hinc Hippocrates lib. x. Epidem. loquens de febribus in Thalo regnantibus prima tempestate; *Modus, inquit, erat Semiterianus; uno die leviores, altero graviores intercedentes.*

Sed cum multa sint febres compositae, quae alternis diebus sunt majores, nempe tertiana continua, duplex tertiana, tum intermittens, tum continua; & Semiteriana; querendum modo est, quibusnam notis hac ultimam à ceteris distinguemus. Sane à continua tertiana per rigorem, aut frigus, aut horrorem distinguuntur, cum in continua abunt. A duplici tertiana longitudine paroxysmorum & typo quotidiana permixta. A continua conclusa duplici rigore, horrore, & rigore: continua vero per superingressum paroxysmorum, in vasionis modo, quo duplex haec continua tertiana breve habet initium & augmentum, istatum & declinationem longam. At in Hemitritana longa productio augmenti & status, ac declinatio brevior.

Hoc per exempla declaro. Anno milleesimo sexcentesimo primo circa initium mensis Augusti, & in fine mensis praecedentis, cum frequentes tempestates obirentur, & venti frigidi matutinis praefertim temporibus spirarent, Patavium & circumvicinas civitates, pagos, oppidaque circumvicina febris, quae duplex tertiana continua per superingressum paroxysmorum, spuria à Medicis vocabatur. Febris praegresso ut plurimum catharro incipiebat, eructio biliosa cum hac dominio putiebat. Cum insigni horrore ac frigore uno die invadebat; perseverabatque ad octo vel novem horas, antequam ad statum veniret: post quem turbidum sudores oboriebantur crassi & pingues primo, deinde tertianae. Vomitus in augmento pituitosi, deinde biliosi conficiebantur. Post sudores febris non intermittebat, quamquam esset longior remissio cum pulsi molli & debili, atque ita perseverabat parumper ad integritatem proximae accedens, donec alius horrore, aliudque frigus partium extremarum supererit altero die minoris afflictionis, cum minor calor febrilis acciperet plurimis horis paulatim incrementum accipiens pluvomitibus. Quis dicit haec febrem revera duplicem tertianam esse; & non potius spuriam Semiterianam, praefertim cum nulla essent accidentis alterius tertianae eo die, quo minor febris compaerebat; nullus vomitus; sed tantum dolor quidam ac morfus circa ventriculum? Sed praeter hoc unum signum, quod ex inaequalitate magnitudinis paroxysmorum sumitur ex Hippocrate, aliud signum universale non habemus. Nam quod ad continuatorem huius febris attinet, cum ipsi adscripsit Galenus ex sententia Hippocratis, de ea in praecedenti libro fuit secundum meam opinionem determinatum.

Iam vero cibos speciemus & reliquas res non naturales, quibus fruuntur. Ipsorum flumina & piscinae, quibus abundat in vallibus, magnam piscium copiam suppeditant. Itaque piscium ejus ipsi familiaris conditorum cum aromatibus. Yescunt etiam copiose fructibus, pyris, pomis, prunis, sub finem aestatis melopepone nimis maturo, omnibus glacie ac nive refrigeratis superbibentes, hi quidem aquam, illi vero cerevisiam, ditiores vinum. Aestate media multum ipsos delectat cucurbitum in aceto maceratum usus: quo nullum cum vinum vital ad Hemitritana generanda perficeretur, si aquam vel cerevisiam superbibere. Qui crapulam indulgent & copioso cibo utuntur, variis edulis ventrem replent, permittentes (ut cum Horatio loquar) conchyliis turdis.

Somno maxima pars hominum longiori utitur & plurimo, ac praeter ambulationes exercitia pauca habent eujusmodi flexus & etatis homines. Minus praeterea mingunt, quam ratio copiosi potus exoritur requirit. Nec tamen valum propterea lubricum habent. His igitur de causis in praedictis regionibus Semiterianae non epidemicae tantum frequenter visuntur, sed & proflus endemicae existunt. At in aliis regionibus ubi haec febres sporadicae sunt, nascuntur ob pravam & inconsecutam victus rationem, ob quam pituitae & bilis copia in corporibus accumulatur. Animadverti itaque iis, qui ex servitute in libertatem redacti sunt, aut ex paupertate ad divitias pervenerunt, derepente huius febrem periculum impendere. Veluti sunt qui ex monachis sunt abbates, aut clerici qui episcopatum accipiunt; mercatores ex longinquis regionibus divites facti ac domum reversi & otiosam vitam degentes; qui veneri plurimum indulgentes bene comedunt aut bibunt vel statim à venere, vel ante venerem, ut noviter nupti, sponsi & sponsae, & pauperes, qui ducunt uxorem divitem, aut pauperes mulieres, quae cum divitibus maritantur. Nam ex venere intempestiva & nimia ante vel post cibum variis & copiosum multa pituita ex chylo nimis crudo, & bilis ex supercalcfactis vasis in corpore generantur.

Animus quoque eorum à curis liberior longiori somno & frequentiori indulget. Eo tamen nec cibum nec potus propter varietatem digeruntur, sed congruunt quotidie aliquid ad cumulum cruditer & excrementorum in vasis consentium. Notavi biliosam naturam & ad febrem tertianam facile incurrant in horum obstructions, si mutaverint vitam in otium & crapulam, edulis frigidis & humidis crassique fucci, ut laganis, utris, & herbis & aromatibus utantur, in Semiterianam facile incurere.

Historia.

De Signis vere Semitertianae primi ordinis Galeni.

Quapropter ad signa specierum propriæ Semitertianæ, & improprie nunc excurrant.

Vera Semitertianae primi ordinis Galeni signa habet tertianæ simplicis cum quotidianæ continuæ signis permixta. Vt propterea in libro de typis dicit Galenus: *Quæcumque autem omnia tertianam (typum) inspicimus, eadem Semitertianam contingunt. Nam & ipsam generis ambæ fusi participes: quippe qui accessio- nem & remissionum repetitiones per triiduum faciunt.*

Proprium tamen hoc signum addere oportet, quo à simplicis tertianæ accessione distinguere possumus Semitertianæ accessiorem: nempe accessio- nem productionem, & quæ ut plurimum in hac fit per reduplicationem, quam Græci *ἐναυδισμὸν* vocant. Nam antequam una febris ad vigorem veniat (sive ea prius fuerit tertiana, quæ invalens, sive quotidiana) altera febris novo paroxysmo affligere, incipit alteris diebus. Non tamen semper, etiam accessio fit producta, teste Galeno: fit hæc paroxys- mus non reduplicatio. Nam fieri potest, ut tertianæ paroxysmus cum quotidianæ paroxysmo ita inter se confundatur, ut alteris diebus invadant una eademque hora. Accessiorem tamen produci tunc etiam oportet, etsi tertiana simplex com- mixta esset, quod quotidianæ accessio longa esse consuevit.

11. Aliud quoque signum est: nempe perfrigeratio, cum qua solent facillime (ut loquar & hic secun- dum Galenum) venire accessiones.

111. Antiquissimi quidam codices addunt tertium signum, pulsus nempe maxime debilis.

At hoc abesse potest ab hac febre in principio morbi, vel cum nullam habet profus maliginitatem: adest tamen per sepe, ne dicam semper, in augmento & statu.

1V. Quantum signum ibidem Galenus huic febrī assignat, nempe horrorem in accessibus diutissime agros affligentem, ut propterea febres horri- fice appellentur. Nam per totam accessiorem productionem symptoma horrores, vel propter inae- qualem ascensum, vel ob reduplicationem. Nam si brevibus intervallis horrores diu repetant, tunc produciuntur propter inaequalem ascensum febrilis caloris. Si vero per longa intervalla horæ nempe unus vel alterus, fit per reduplicationem, quas ternas plerumque, ut quaternas in Semitertianis febribus adesse scribit Galenus, quod & nos ipsi vidimus. Libro autem de Crisib. 11, accessiorem horridam Semitertianæ exquisitæ propriam attri- buit singulis diebus, sed uno majorem, altero se- quenti minorem. Et lib. de morb. Tempor. horridum insulsum, omnes principii peculiarias notas habentem, præter rigorem, ei adscribit, declarans hec hisce verbis: *Etenim vehementis horrore, vel initium aliquod rigoris, vel parvum rigor esse videtur potest. At exaltatum vigorem, qualis in tertianis quatuorvisque est, huiusmodi febris non accipit.* Nam ponamus pro trioni- bus exemplum in juvene vigintiquinque annorum bilioso, qui autumnii initio ex melonum & alio- rum fructuum elu immoderato, glacie vel nive refrigeratum superbibendo viam, tempore astra-

tis, quo tempestates frequentes erant & venti mo- do austrini, modo boreales, in febrem lapsus est, invadentem primo die cum horrore hora prima post ortum solis, cum pulsu & calore valde ina- qualibus, qui calor ubi ad statum venit hora nona, jam per corpus expansus iterum ad interiora con- trahatur, & pulsus fiant tardiores, rariiores, mino- res, & partes extremæ nonnulli refrigerentur: affluente vero thorace ac ventre, denovo alius hor- ror repetat, quem sequatur post horam unam, vel alteram anxietas, nausea, bilis & pituita vomitus, deinde tota nocte male se habeat. Circa vero pri- mam sequentis diei, vis oborto madore, alius hor- ror, sed minor rursus ingruat, cum partium extremarum refrigeratione & pulsus contractione, atque sic tertio die duplicis febris fiat accessio hor- rifica, unus quidem mane, alterius vero circa ves- peram. Et sic quarto die subsistentem mane una tantum accessio repetat: talesque alternatim se- quentibus diebus paroxysmi compareant, nomen hic febris Hemitritice exquisitæ Galeni typus monstrabitur? Nam alteris diebus cum horrore invadit tertiana simplex, singulis vero cum rigore ad levissimum horrore quotidianam. Decipiat tamen hic non oportet, quod aliquando contingat tertianæ & quotidianæ horrores inter se confundi cum uno eodemque tempore invadant. Tunc per brevia intervalla horrore repetit & diutius tenet uno die, quam altero: utroque tamen eadem hora invadit, nisi singulis diebus accipiet, vel postponat. Siquidem tunc altero die apparebit horrores per longiora intervalla, & paulatim tertianam, quæ commiscetur quotidianæ, vel tardare sua accessione, vel citius quotidianam eadem die invadere. Apparebit in tertianæ accessione, præter rigorem & horrorem nauseam cum cordis motu primis accessibus, si per plures circuitus repe- rit, si per pauciores duos vel tres uno eodemque die, loco nauseæ vomitus biliosus atque pituito- sus, & alia, quæ tertianis circuitibus propria. His distingues hanc Semitertianam à duplici tertiana, in qua etiam altero die solent manifestari eadem signa, quamquam remissiora, rarilimeque eadem hora in principio paroxysmorum.

Cæterum interrogare hic aliquis posset, quo- modo quotidianæ continuæ paroxysmi in Semi- tertianæ exquisitæ cum horrore invadat, cum con- tinua quotidiana sine extremarum partium frigo- re invadere soleat, intermittens cum frigidity? Ad hoc respondeo, *quotidianam continuam non esse illam quam nonnulli recentiorum conclusam vocant, sed productam intermittentem.* Supervenire autem al- teram quotidianam fini alterius, antequam in in- tegratam definat, & propter confusionem bilis pi- tuitæque fieri horrorem.

C A P. V.

De Typo Semitertianæ secundi ordinis Galeni, & Magni Hemitritici Barbarorum.

Quæ secundi ordinis Semitertianæ dicitur Ga- leni, singulis diebus paribus cum frigidity accessiones habet, vel cum horrore; quæ mo- do accidit eodem tempore semper, modo tar- dius singulis diebus, modo citius, quo appellat prædicti anticipantes, ut illas postponentes ac- ciones.

fiones, sequuntur has calor mitis paulatim incre- scens, remittens quidem, nunquam tamen inter- mittens, cum siti fere nulla, pulsu parvo molli non valde celeris in statu accessiorem. Tertio vero quoque die exacerbatur vehementer sine horrore novo ut repetito, aut tam diu, quam in primi or- dinis Semitertianam perdurante, sed breviori & mi- nori: cum quibuldam tamen signis tertianam sim- plicem concomitantibus; ut insigni calore & acri, siti intensa, vigilis, inquietudine, urina rubra; quibus adiunt mentis alienatio, aut furor: ita ut acutissime diebus impanibus ager agrotare videatur. Evadit hæc, tempore præsertim pestilentia, Magnus Hemitriticus, quoties horrores ac frigo- ra partium extremarum accessiones relinquunt. Sed sine his febribus utraque, tum quotidiana, tum tertiana exacerbentur atque remittant quotidie, alterius vero diebus acutissime fiat accessio.

Notandum autem hic pro trionibus, in Semi- tertianæ secundi ordinis Galeni quotidianam cum tertiana continua implicatam primis diebus cum tertiana invadere, deinceps augescere febre si- pervenire horrores. Et rursus vice versa aliquando primis diebus horrore, postea figuræ agros: quod humorum mutationi penes naturam multitudinem & locum adscribere possumus.

II.

Alterum quoque animadvertendum, quod ma- xime iuniores Medicos decipit, & etiam quando- que atate proveclos, in Semitertianis duobus Ga- leni prius oriri febrem quotidianam, deinde post- res, quatuor plerumque dies tertianam supervenire. Rursus aliquando prius tertianam invadere, dein- de secundo aut tertio paroxysmo paulatim per ob- scuros paroxysmos se infinuare quotidianam: at- que inde postmodum nasci, ut commemorata hæc signa non uno eodemque tempore compareant, aliquando duas hæc febres uno eodemque tem- pore distine, vel confunde. Hinc patet ratio, cur hodierni Medici in prognosi frequentissime deci- piantur, & ægri interdum se vel non febricitare pu- tent morbi initio, vel levem febrem sentiant.

Quod etiam Galenus sua tempestate notavit, in- quens: *Sane alias à primo die constituitur, alias à se- cundo & tertio incipit. Vnde maxima deceptioni causa Medici erit, de ipsiusmodi incensatione.* Nam quicquid hodie quotidiana febris ante ter- tianam per tres quatuorve aut plures febres pre- cessit: hic levem quandam lassitudinem ac sitim sentientes, & capitis dolorem, nauseam aut cibi fastidium, febricitare se non putant, cum neque rigor, neque horrore, neque insignis aliqua re- frigeratio extremarum partium quotidie agros mole- lest. Vbi vero supervenit febris tertiana cum horrore, jam tum se febricitare putantes, Medi- corum auxilia querunt: qui ægri si iter consecu- rint cum quotidiana prægressa, ut aliquo vilicere antea fuerint invalidi, maxime pulmonis, ita ut ut- ræque declinant, ut plurimum facta transmutatio- ne in febrem malignam moriuntur. Similiter si fe- bris tertiana prius hominem prehendat uno vel du- to paroxysmo; intermittit autem perfectæ, omni periculo fe vacuum ager arbitrabitur: deinde quarto die leviter fiat, pulsus fit paulo frequen- ter & inæqualior, quam erat tempore integritatis, caput non omnino liberum à dolore aut gravitate, non tamen ipsum surgere prohibeat, quod febris

& hæc & alia accidentia in principio fit obscura; tractu vero temporis repetentibus paroxysmis va- lidioribus, jam Semitertianæ se prodit interdum, præter mentem nec sine admiratione celeberrum Medicorum. Ita ut nonnulli Hippocratæ mentem dæci coarquantur, existimantem febrem tertianam periculo vacare. Itaque qui huius febris natura & typum probe noluerit cupere, eum oportet in minoris Semitertianæ signis dignoscendis plurimum opera studijque ponere.

C A P. VI.

De Typo Semitertianæ minoris. Locus Galeni correctus.

Huius ut plurimum talis typus esse solet. Pri- mo die febris corripit cum horrore, nausea vel anxietate circa ventriculum, sed sine vomitu. Vbi hæc febris per septem vel plures horas perdu- rarit, sudor sequitur: post quem videtur quasi in- tergere à febre laborans, cum nulla videatur notatu digna inæqualitas in pulsu, aut calore præter natu- ram. Tertio die rursus invadit tertiana cum hor- rore, & majori nausea anxietateque, vel dolore circa ventriculum, quod præseverat anticipando accessiorem; deinde, prolongato paroxysmo, su- dor finitur; fit ut reliquo tempore, qui diem quartum continet & integer esse debet, pulsus paulo frequentior conservet (oportet autem hic jam esse in pulsu ægri exercitatum trionem, ut sciat qualis ei esse debet, tum qualis etiam fu- erit, cum esset sanus. Mulieribus cum plenitudine, & qui in hypochondriis antiquæ obstructions habent, pulsus sunt viris & integrum ventrem ha- bentibus frequentiores & minus æquales: deest tamen ipsis semper calor præter naturam) & non- nihil inæqualem, si quis bene perpendat circa præ- cordia levissimum calorem præter naturam, qui levissime videtur sequenti die post meridiem exacerbari. Atque hoc tempore agere neque appetit potum, neque comit refectum. Quinto die, qui ter- tius est paroxysmus tertianæ, omnia vehementiora compareant, anticipant horrores, longior inæ- qualitas, calor cum vomitu pituitæ & bilis, & tunc adhuc magis producta fit febris, quam secun- do paroxysmo; ita ut quæ febris primo paro- xysmo, intra spaciū duodecim horarum, videba- tur terminare suum paroxysmum cum sudore, nunc ulterius vagata paulatim sexdecim, viginti aut triginta horas perduret & amplius, præsertim cum jam confusatur cum tertiana. Manet enim febricula post sudorem, quæ deinde sexto die ma- nifestioribus notis se indicat. Nam circa vespæram levis frigus extremas partes occupat, & interdum etiam levissim horrore, post quem sensim in malam noctem calor sentitur cum levi fimo aliquantulum perturbato, & levi siti. Et sic paulatim utra- que febres inalefcunt, donec tertiana definat, & per aliquot dies quotidiana relinquitur.

Sed cum supra mentio facta fit productionis ac- cessionum in Semitertianæ circitu, notandum est locum apud Galenum libro de Typis, cap. 111; ubi dicit, *quandam typum longam accessionem habere, atque extensam Semitertianam.* Quasi vellet dicere, Semitertianam quandam esse extensam, aliam vero non extensam, & hæc non habere accessio- nem

non productiones, quales alibi Semitertiana simplici ascripsit. Existit tamen ego, codicem eo in loco esse mendosum, ubi sic scribit de Typis: *Secundi vero, qui longam accessionem habent, & parvam remissionem, qualis est quotidiana & extensus semitertiana.* Vel expungenda mihi videtur vocula, *extensus*; vel tertianus pro Semitertianus, in Græco codice legendum. Subiungit causam fidei propositionis. *Hinc solus* (nempe typus extensus tertianus aut Semitertianus) *ἐξ ἀπαυγῆς*, id est, immutatus ab antiquis nominatus est.

C A P. II.

De Semitertiane exquisitæ Galeni typis.

Quæquam omnes propriæ Semitertianæ speciei, exquisitæ & non exquisitæ dici queant, & ideo omnium signa nobis essent proponenda ad excitationem doctrinam, tamen ne confusionem mentis ac memorie tirone perirent, volui tantum in primi ordinis Galeni exquisitâ & spuria tironem exercere. Inde enim cætera aliarum specierum signa facile innotescunt.

Typus exquisitæ Semitertianæ primi ordinis Galeni optimè apud hunc autorem declaratur lib. 11. de febribus cap. vii, in adolescente, his verbis: *Mane quidem, inquit, in prima hora rigorem capiti exquisitæ tertianæ familiarem, adeoque alia omnia ejusdem febris indicia usque ad horam sextam, & repetentium vomitus biliosus, & pauci sudores, inter quos statim homo contraxit se atque horruit, & subinde incipiente annotatione pulsus erat parvus, inæqualis; deinde usque ad horam undecimam, cum paulatim adhuc succederetur, plura quidem signa habebat annotationis propria, pauci tamen intermixti augmenti indicia.* Hinc verò usque ad quartam noctis horam certissime intendebatur: deinde quantum sensu percipi poterat, usque ad sextam noctis horam in eadem magnitudine persequebatur: mox jam manifeste declinabat usque ad octid sequenti horam quartam: in hac enim jam contrabebatur, & annotationis signa ostendebantur frigidioribus factis extremis ejus parvis, parvique exsistente pulsu & jam ad vesperas usque innotabant paulatim, neque horrorem, neque inæqualitatem aliquam præ se ferens: deinde rursus in summo consisteret circa quintam noctis horam: sexta vero manifestissime capiti remittit.

Quod igitur tertio die hora secunda quotidianam annotationem exspectare oportebat, in ambiguo non erat. Non tamen, utram tertiana eandem horam esset servatura, an non, satis constabat. Hora igitur secunda accessus supervenit horrida, quæ celerim ea quæ in primo & secundo die quotidianæ continuæ facta erat, invalesces usque ad horam quintam, aliud rursus post quintam horam fecit initium, in quo aderant omnia similia illi, quæ in secunda hora contrageant, accidentia. Hinc vero rursus promptim invalesces usque ad horam octavam, deinde in eadem horruit: ac paulo post rursus accrescens accessus expedite accendebatur, adeo ut hora noctis quarta jam ad summum pervenerit. Et quid aliud hoc erat, subdit Galenus, quam accessio exquisitæ Hemitritæ duabus eadem hora invadentibus febris? Quoniam quotidiana duabus horis celerim, tertiana autem totidem tardius accedebat.

Adeo ut quicunque facultatem haberet febrium figurarum agnoscendi, tertianæ ac quotidianæ continue accidentia in

unum confusa, manifeste deprehenderet. Nam cum tertianæ insulsum rigor comiteretur, quotidiana autem sine rigore invaderet, mixta ex utroque febris horrorem continuo afferbat, rem quidem rigore minoræ, majorem autem refrigeratione, tantoque hac ipsa majorem, quantum refrigeratione superaret: adeo ut cum ab utroque extremo aqua distet proportionis, horror medius inter ambo, rigorum scilicet & refrigerationem collector: quod quidem maxime fieri consuevit cum extremitatibus confunduntur. Hæc Galenus, qui interpositis nonnullis de etymo Hemitritæ, pergit narrare relictum historice commemorari adolescentis, Hemitritæ laborantis. In adolescente igitur, inquit, quem nostræ narratio posuisset, cum tertia die ejusmodi accessio facta esset, quia in unum tempus conveniebant ambarum febrium invasiones, quoniam quotidiana quidem duabus horis semper preveniebat, tertiana autem differens, die quartæ accessio sole oriente invasit, formam exquisitæ pituitosæ febris præ se ferens. Erat autem secundum proportionis similitudinem quinta ab ipsa accessio circa decimam noctis horam principium factura, quoniam duabus super horis celerim invaserit: biliosa autem febris accessio tertia ab initio, die quinto, hora quarta erat invasura: adeo ut inter duarum febrium initia, hæc horarum spaciunt intercederet: quod & factum est. Nam circa quartam noctis horam decimam invadente accessione, quæ febris pituitosæ servabat imaginem, atque hoc modo usque ad quartam quintam diei horam progrediente, ubi febris biliosa medicorum rigorem secum adferens eadem conjuncta fuit, mixtam subinde formam gerens accessio, biliosa scilicet febris & pituitosa, sequenti nocte circa quartam octavam pituitosa febris incipiens exquisita, de sola totam diem subsequenter ordine sextam occupavit: deinde cum media nocte declinasset, aliud subinde eodem modo fecit initium: deinde cum reliquam dimidiam noctem partem usque ad meridiem diei septima obtinisset, postmodum jam veluti declinabat. At eandem excepit tertiana, quæ cum rigore invasit, quoniam duabus exquisitæ tertianæ invaderet consuevit, atque cum alia omnia fecit eodem modo certissima adferri indicia, vomitus bilis invexit, atque adeo extremis biliosa, & urinas optimas, ac cum jam ad vesperas esset, brevis quidam veluti sudor: adeo ut quicunque febrium species didicisset, ei aperte indicaretur eam remitti ac declinare, neque ultra unam aliam perorandum, aus ad summum duas debere protrahi: nam & in ea declinatione erat quies admirabilis, qualis ante ipsam non fuerat, donec ad quartam noctis horam pervenitum est. In illa centum febris pituitosa, quæ quotidie quidem accessionem, sed duabus anticipabat horis, invasit: cumque totam noctem occupasset, ac totum decemque diem, rursus in secunda hora noctis octava aliud fecit initium: cumque eandem pariter noctem totam occupasset, sequenti die quæ nona erat, declinavit. Eodem vero die circa horam octavam, quoniam duabus horis tardius invaderebat, futura erat tertianæ febris accessio: sed tunc hora nona supervenit, hoc ipso etiam se declinare significans. Sole autem occidente et se affectavit febris pituitosa, more suo anticipando. Et cum noctem illam obtinisset, diemque sequentem, hora decima diei iterum invasit, deinde die undecima rursus hora octava exquisitæ permanent pituitosa: deinde prima noctis hora tertianæ febris, quæ quatuor tardaverat horis, horrida accessio facta est. Deinde sexta noctis hora alvus biliosa excrevit: ac quidem per universum corpus veluti sudores exhalabant, per quos tota declinatio fere ad infirmitatem pervenit: neque jam in ambiguo erat, quin tota febris tertiana omnino desisset.

desisset: pituitosa autem sola remanserat, quæ & ipsa jam remitti incipiebat. Hæc igitur ratione die duodecima non amplius anticipavit accessio duabus, ut antea consueverat, horis, sed hora septima invasit: neque die decimatertia sexta supervenit hora. Sed illa etiam septima hora invasit, quæcum esset dignam ac declinationem ostendens. Quarta decima vero die eadem declinatio mori adeoquum successit, ac hora nona accessio facta est: in urinis autem erant insignia cælestis indicia, solutionem ægritudinis in die decretorio succedente futuram præmonstrantia. Hæc est tota adolescentis Hemitritæ exquisito laborantis historia.

C A P. VIII.

De Signis Hemitritæ Spuriæ primi ordinis Galeni. Quibus signis duplex tertiana ab Hemitritæ spuria distinguitur.

Item signa Semitertianæ spurie primi ordinis perpendantur, & an ea febris, quæ vulgo hic in Italia dicitur tertiana duplex continua per superingressum paroxysmorum, non sit ad notas & illegitimas Semitertianas referenda. Non exquisita habet signa tertianæ exquisitæ, cum quotidiana spuria, vel quotidianæ exquisitæ typum cum tertiana producta; vel quotidianæ spurie & tertianæ spurie, quæ spuria recte vocatur. Galenus & posteriores ejus affectus hosce typos nobis expresse non declarant, præsupponentes eos aut ex typo Semitertianæ exquisitæ jam proposito facile perdisci (facta inter cum & alios spuriarum comparatione) vel per signa, quæ redundantiam pituitæ vel bilis indicant spuriam Semitertianarum signa declarari. Ajunt enim, quando pituita cum bile non habet æquabilem mixtionem, tunc appellari spuriam Semitertianam: si ve bilis magis abundet, si ve pituita superet bilem. Quod idem esse videtur, ac si dicerent, modo tertianam vel quotidianam magis esse legitimam, modo minus: & utramque alio quando spuriam. Nam existente bile minus mæra, tertianam productam generari afferunt: quotidianam vero spuriam, quoties multa bilis pituitæ permisceatur, locis tamen putredinis discrepare, ut alia in venis sit, alia extra venas, quæ putrescit. Ex quo conficitur eas febres, quas nunc duplices tertianas appellant per superingressum paroxysmorum, esse magna ex parte Hemitritæas spurias: item & alias, quæ sunt conclusæ, & uno die sunt leviores, altero vero graviores. Igitur videndum est, quibus signis nos distinguere debeamus duplicem tertianam, cum eam, quæ continua est per superingressum paroxysmorum ab Hemitritæa spuria Galeni primi ordinis.

Profecto, quotidianam à duplici tertiana distinguere solemus typis quibus discrepant, manifeste in principio morbi, manifestissime vero in fine, quando solvuntur. Nam primo quotidiana una fere eademque hora quotidie invadit, si non anticipet aut postpōnat, cum accidentibus quotidianæ plurimis & magis propriis, & quotidie fit major augefcente febre; ubi vero ad statum pervenit, ipsa quoque constitit quotidie, nec uno die major quam altero invadit; in declinatione vero quotidie fit minor & paroxysmos habet breviores, levioribus accidentibus concomitantibus, donec solvatur. At tertiana duplex quotidie neque una

hora invadit, neque æqualiter in augmento paroxysmi utriusque augetur, sed una magis & citius altera ad statum morbi propter cum accidentibus tertianæ magis propriis; & quæ mitior fuit aut prior, prius solvitur ac declinat, altera gravior ac difficilior adhuc perdurante tanquam simpliciter tertia.

Ponamus pro exemplo presbyterium, quem invifissimum amio superiori in fine ætatis prope æquinoctium. Hunc febris primo die, qui erat lunæ, invasit hora una post meridiem (quæ in Italia est decimanonæ) cum calore, deinde circa vespem hora vigesima quarta, horror cum prehendit per mediam horam durans, postea vomit invalefcente paroxysmo bilem & pituitam; hora octava noctis (sæpe quatuor horis ante exortum solis subsequenter diei (qui fuit Martis) febris fuit in statu, deinde circa vespem subsequenter in summa declinatione, ita ut pulsus fere æqualis secundum longitudinem, & ordinatus, paulo tamen celerior quam esse debebat, si prius ad naturalem statum redactus fuisset: die igitur Martis ejusque nocte sequente ad naturalem statum rediit. Circa meridiem tertæ diei, qui Mercurii fuit, calor anticipavit per duas horas, & horror quoque citius invasit, nempe hora decima sexta; quarta vero hora noctis subsequenter, remissa febre, iterum rigor invasit, deinde subsecuti vomitus alique febricitantes signa, quæ tota nocte illa cruciantur ægrum usque in diem Iovis quo plurimum remittit in quartæ diei initium exortens quædam definiebat. Rursus in fine quartæ anticipando per tres horas invasit horror hora duodecima mane diei Veneris invalefcente paroxysmo. Quis hæc febrem pro duplici jam tertiana non habebit? Vocet aliam duas tertianas, unam productam, alteram simplicem, non laboro, dummodo febris progressum & finem animadvertent. Igitur anticipans hic paroxysmus est minor cum horrore invaderet, calor tamen erat major, febricitare accidentia graviora folito præterquam capitis dolor, perdurabat per totam diem, & antequam definiret ad integritatem, hora sexta noctis rigor iterum comparuit major, cum vomitu levi, majore calore ac in diem sabbathi sequentem, (nempe quintæ diei, quæ ab initio morbi computatur), excurrente antequam intermitteret. Die solis hora una ante auroram rediit febris fine horrore, sed cum insigni febre. Deinde hora circiter nona noctis, iterum rigitur æque, validiore subsecute paroxysmo, quam prægressa nocte. Perduravit hic per totam diem sequentem lunæ: in qua circa vespem octavæ tamen diei morbi initium in crura ingressi. Die Martis mane levior incaluit, perduravit quoque alio usque ad vespem, quoniam diem ingressi eramus. Noctis subsequenter hujus diei, nullum initium aliter paroxysmi visum est. Sed mane diei Mercurii circa exortum solis parum rigitur, plurimo calore subsecutem in multam noctem. Die Iovis mane, quo adhuc eramus in decima aut (si quorundam calculationes fovei voluerimus, qui viginti tres horas tantum pro die medicinali numerare volunt) initio undecimæ morbi totius, calor novus invasit, fed levior quam qui martinis horis diei Martis: is circa vespem profusus cessavit, ut æger à febre integer videretur. Die Veneris horis duabus post

Hyllis.

Quotidianæ quomodo à duplici tertiana distinguantur.

prios: quæ tertio die invadebat istdem horis vespertinis, iterum typum primi die observabat. Tum post hos tres paroxysmos, per tres dies omnino à febre immunitis videbar: iam eadem febrium repetitiones animadvertentur, quæ toties suos crificos fecerat, ut jam ad sexagesimum diem ab initio morbi me perduxerint priusquam profusus sanus essem. Et nisi medicamentis blandis purgantibus atque obstruções tollentibus, alvum laxam quotidie tenendo valetudini consilium fessent, proculdubio ad octagesimum febre extendisset, vel usque ad centesimum vigesimum, ut aliis temporibus.

Higien.

Sic anno millesimo sexcentesimo decimoquinto, mense Augusti, in Moravia uno eodemque die minori Semitertiana corripiebantur plurimi incolæ, quorum omnium fere tertiana, cum ad quatuordecim pervenisset paroxysmos, desit; quotidiana continua quodam catarrho concomitata superflue cum suis laudabili enazemate, subsequente alii fluxu modico. Hæc quoque paulo post in tantum remittebat, ut periti Medici judicassent jam à febre liberatos agros: quin Medicis valedi- jam à febre liberatos agros: quin Medicis valedi- jam à febre liberatos agros: quin Medicis valedi-

Aliis à simili Semitertiana febres lente quotidie invalescentes circa vespem statuti horis cum frigore partium extremarum supervenerunt, cum magnis obstruções viscerum, jecoris præsertim, lienis, mesenterii, pancreatis ob abundante putritam à capite ad hæc partes (ut signa quædam ostendebant) dilabantem. Neque tamen hæc febres lente quotidianæ erant simplices, sed spuriæ causis & typo. Nam portio bilis putritæ putrescente erat permixta; & una febris diebus parvis tardius (hora scilicet quarta) invadebat; altera diebus imparibus hora tertia, quarum status in singulis paroxysmis maturinis temporibus prius non elucebat, ut propterea tentatione duplicis productæ longam habere declinationem, & breviora tempora principii, augmenti & status. Igitur ex jam dictis spuriis quotidianis, nonnullis quartanæ contingerunt, si scilicet qui sese non bene in victus ratione gesserant; sed statim redeunte appetitu, plurimo cibo famem, quæ erat plerique talia, pel- lere conabantur. Cæterum pauci ex hac Semitertiana à vita differenter: it tamen qui infirmis, at- requam ea corripiebantur, visceribus erant, & fe- nec & capite inebello prædicti moriebantur, fuc- cedentibus apoplexia vel lethargo. Nonnulli quo- que circa quadragesimum diem fiebant ex levissi- ma apoplexia, & quæ per quadrantem horæ aut mediam perseverabat (plane quomodolibet, qui ani- mo liquant & ad se redeunt) cum stertore tamen paralytici, quibus motus artuum, præcipue bra- chiorum & crurum difficilis reddebatur, superfi- te sensu. Hæc paralyti à paucis Medicis cognos- cebatur. Omnes autem exitimabant, hanc am- bulandi, corpus erigendi & apprehendendi, cru- rum & manuum impotentiam (erat enim utpluri- mum universalis) à virium inbecillitate produ-

ctam, & propterea agris copioso alimento, contra meam sententiam subvenitendum esse.

Albertus tunc temporis Baro à Wallestein ex Semitertiana die vigesimo in quotidianam spuriam, quæ duplex tertiana ab aliis vocabatur, in- cidit. Ex hac die vigesimoquarto levis apoplexia, quæ per medium quadrantem horæ cum vix per- durasset (à Medicis adstantibus profusus syncope, vel animi grave deliquium putabatur: aderat enim debilitas paralyti facta est; quam primo die tantum thestibus ambulandi sublecuta est. Inde cum propter famem supervenientem post apoplexiam, & consilium Medicorum, qui cum à ciborum & virium vitalium inopia debilitatum tantum crede- bant, plus comederet & biberet quam valetudini acquiebat conveniebat, concoctioni scilicet cru- dorum humorum à febre relictorum, paucis diebus omni ambulandi potentia ablata, brachiorum eri- gendi & manus ori admoveandi, dorsum flectendi & erigendi sese, ac erecte sedendi, caput & cervi- cem attollendi, in lecto decumbere coactus fuit.

Omnes enim nervi qui à spinali medulla origi- nem habent, ab humore seroso à capite dilabente per magnum foramen ossis occipitis, à capite quam partem dolebat, erant valde relaxati. Post qua- partem dolebat, erant valde relaxati. Post qua- partem dolebat, erant valde relaxati. Post qua-

Sed & in aliis regionibus ut Belgio & Italia, quando Epidemicæ grassantur Semitertianæ (ut contigit anno millesimo sexcentesimo decimo- septimo, & vigesimo ac vigesimo primo) co- licis dolores post longam quotidianam spuriam aut duplex tertianam spuriam vulgo vocatam, reli- ctam ex Semitertiana, cum eos multo tempore ante prædixisset non sine plurimum admiratione, solverunt morbum. Vñ enim longo edoctus fuit dolores hosce colicos post duplex tertianam vel quotidianam spuriam relictas sequi, quod fe- bres præcedentes hos aut concomitantes oriun- tur ab abscessu plerumque consistente in pancrea- te, mesenterio vel cava jecoris, atque inde jam aliquo modo concocta materia ad tenuia vel crassa intestina depellerentur. Contingere hæc vidimus aliquando quadragesimo die, nonnullis sexagesi- mo, plurimis octagesimo. Interdum colicorum dolorum loco, perperato diligenter corpore & præcedentibus signis concoctionis in urinis cum laudabili hypostasi, diarrhæa accidunt per inter- valla repetentes & per paucos dies continuantes, nec aegros deflassantes, subsistentibus apoplexiis, tenuibus, albis, aquosis. Si dolores colici multo tempore ante crificos tempus comparabant, abs- cessum in colo aut circa ipsum denunciabant. His per alvum pus aut sanies cum diarrhæa tempore crificos

Signa febris
longæ.Recedere,
vel commu-
tationis in
alium mor-
bum.

crificos excernebatur. Nonnullis purulenta mate- ria per urinas excreta in hoc morbo pro pituita & crudo humore habebatur; non sine falsa tem- peratione, quæ afferebat morbi jam per longum tem- pus perdurantis longius tempus, cum finis ejus in- flaret. Sed hos antea graves lumborum dolores ac colici spurii, quos appello cum Fernelio, diu vexa- verant. Quibus sine dolore colico febris Semitertiana aut quotidiana ex hac relicta paulatim sine aliqua manifesta excretionē discutebatur sponte post diem quadragesimum, sexagesimum, vel octagesimum aut ultieris, & plurimo cibo ute- bantur propter restitutum appetitum, hæc vidi semper plurimum à cibo & potu laetos, ac febri- bus frequentibus ob obstruções relictas in pri- ma corporis regione obnoxios fuisse, hypochon- driacos & melancholicos evasisse, si non in periti alicujus Medicis manibus incidissent. Itaque sæpe me auditoribus inculcare soleo, nullam velotie febre- rem plurimum recidivarum, plurimum ac magisve- rum morbum feracem, quam Semitertianam.

Illud quoque observandum in hac febre, quod Hippocrates scriptum reliquit lib. 1. Epidem. omni morbo ac febre evenire: quod nempe quibuscumque agris incipiens florēt & viget maxime, infestiatque gra- vis: circa judicium vero, & in judicio imminuit. Nonnulli miltiter incipit & submisit, sed crescit inde, & exacerbatur: sub judicium vero & in judicio abunde elucet. Quibusdam etiam leviter incipiens augetur & exacerbat, & simul atque aliquandiu viguerit ad judi- cium, & sub judicium rursus fe remittit.

C A P. X V.

De Longitudinis & brevitatē febris, commutatio- nis in alios morbos, & spectat futuræ crificos præcognitione.

Medicum imprimis prævidere ac prædicere oportet, an longa an brevis futura sit hæc febris, & quæ in ea commutationes ac crificos expectanda sint. Ea quæ præcesserunt, quæ conse- quuntur, quæque adfunt nobis ista significabunt. Invalis modus, regio, anni tempus, celi & æ- ris constitutio perpendenda sunt. Nam si lente fe- bres hæc procedat ad statum; nec tertianæ & quodi- tianæ uno eodemque tempore simul invadant, rursus aliquandiu molestaverit modice irritans & sitim extinguit, sine spūto persistat; urinae fit disperso enazemate vel nubecula, quæ initio morbi magis videbantur compactæ, aut modo laudabiliter habeant hypostasim, modo rursus en- azemate vel compactum vel dispersum, aut alter tarde talia laudabilis, longa febris futura est.

Si febris sine signis concoctionis agrum relique- rit & valida aliqua evacuatione per abscessum vel sudores & urinas copiosissimas, aut notabile san- guinis profusum, pro certo recidiva est expectanda, aut commutatio in alium morbum. Et si plurimum octagesimo, quadragesimo, sexagesimo, vel ultra finem suum habent recidive, aut morbi commutatio, etiam si agri foras progre- dianter, & ut fani vivere videantur. Nam & ipse commutationes plerumque suas recidivas etiam faci- unt, ut quotidiana vel duplex tertiana, colicos

dolores, abscessus circa articulos, ut parotides, & qui circa viscera fieri consueverunt.

In Æthiopia & Africa aliisque calidioribus re- gionibus judicatur Semitertianæ septimo vel undeci- mo, vel commutatur in alios morbos, quem- admodum etiam anni temporibus pestilentiis, & vere ac æstatis initio in adolecente, juvenili, ac viridi ætate. In frigidioribus regionibus paulo tardius, præsertim si anni tempora valde inequalia fuerint. Et pluviosa, frigida, tempestatis fre- quentibus læcessita, autumnus inter, & senilis ætas.

Conducit hic etiam considerare species Semi- tertianæ. Nam Hemitertianæ major brevis est: cæ- teræ utplurimum fi ad mortem, breves; si ad fa- lutem tendant, longissimæ, si recidivas & commu- tationes earum temporibus includere voluerimus: alias intra viginti dies veluti aliae acutæ: simpliciter quæ febres utplurimum terminantur.

Conjectari etiam oportet earum commutatio- nes futuras & species crificos. Vernis temporibus plerumque in quotidianam aut duplex tertianam spuriam transire, si fluxus alii insignis, ut copio- sissimi sudores critici aut febres non præveniant, & si nulla malignitas & pestilens aeris qualitas re- gnet. Si vero hæc adfuit, maculis, petechiæ dicit, exanthemata, parotides expectanda. Æstate dy- senteriae veniunt, & quartanæ, si autumnus inter, duplex tertiana vel quotidiana frequenter recidi- vas, quæ tandem sæpe in dolores colicos abis circa autumnum & hyemem, eoque magis quo annus qui præcessit austris frigidus ac humidus fuerit, in temperatis regionibus, ut in Lombardia. Si vina quæ eo anno maturaverunt, omnibus in locis, tan- planis quam montosis, confectam maturitatem adeptæ non fuerint, inde plurimos agros conje- cturandum est altera vina bibisse, & intestina ac ventriculum præter morem refrigerasse. In Mo- ravia corporibus diu vexatis post Semitertianam à duplici tertiana & quotidiana spuriis, magnis lie- mibus & obstruções jecoris aut mesenterii ac pancreatis, frequentissime superveniunt critici do- lores colici. Quæ cuncta sunt ob inequalitatem materię putrescentis ac putrefactæ, transiens de una parte ad alteram per venas & arterias à valida vi expulsiæ nature & peritium recipientium im- becillitate. Hæc profecto Moravorum intestinis inest maxima ob aquas crudas, vina cruda, & vi- dum nimis intestina refrigerantem. Colicos do- lores futuros sæpe prædicti ex medicamentis cali- dioribus purgantibus assumptis, ut pilulis coctis & quæ aloe aut colocynthidem recipiunt, nil pur- gantibus aut minus, quam virtus medicamenti re- quirebat; qui tamen ante dum fani essent optime purgabatur ex lenioribus quibusdam purgantibus medicamentis & refrigerantibus melius hos agros, quomodo foriter purgantibus. Ex alio admodum pur- gantibus, nausea, inappetentia, ciborum vomitu, ut gravitate à cibo ac molestia quadam (quam per- cipiant maxime inter respirandum) mentient cin- gulum, quo agri sibi præcordia & ventriculum per- transiverunt constringi sentiunt; ab ardore quem inter mingendum sentiunt; vel urina rubra, cro- cea, biliosa, oris amarore, siti, inappetentia, vi- giliis, arteriarum pulsus, febre continua quotidie ex exacerbante, veluti quotidiana spuria. Hæc

D 2
enim

culas crassas & glutinosas non solum lingua, sed & celophagus universus cum ventriculo, tandem & intestinorum tunica computruerunt. Hæc, inquit, inter initia sitientis maximopere vinum austerum & rubrum hauerat in uno die prope ad quantitatem librarum sex, unde si illi guttur incanduit, ut nec liquidiores cibos transmittere nedum medicamenta poterit. Ovis illa miserrime fato damnans humana presidia multumque impatiens, quod ne potius quidem accipiendo in acerbissima siti viam aut instrumentum commodum reperiret. Prima hinc alba semper inter calores maximos totius corporis, in qua tamen odor gravis & pisulentus indies agebatur, nunquam fluctans primo furfures quadam, inde pellicula, & postremo pui manifestum, villis, fuscis & tunicis variis intertextum. Aderat singultus, ructus assiduus, cum tanta doloris acrimonia circa præcordia, ut tanquam parturientis miserrime elamaret. Sed post deliria parva ventris torsio supervenit, ac primam scitida, virulenta per solum copiam incredibili profuserunt, inde & sanguis per os, & per posticam cum dolore punctili vehementi, à qua ita per acerbissimos cruciatus extincta est paulo post vigintiannum diem.

In Vinis etiam quorundam hæc scribit se observasse post septimum diem, primo ramenta quedam crassiora tum carne, tum membranosa successe, postea furfurea, demum veluti in atomos comminuta quedam corpuscula, prout putridus calor accessus in carnes aut solidas partes se infinuaverat.

Vidit etiam in quatuor aut quinque, quibus post diuturna deliria velut pui exactum in urinis magna copia subfideret. (Quod & ego sæpe, ne dicam semel, me observasse memini) principio rufum, deinde carminatum, & sanguinolentum; postea album, leve & æquale. Ita, ut variis humoris rudimenta, in locum suum tendentia, pro alimenti specie refulcerent. Erat autem plerique substratum in fundo, sorsim lutescenti, atque ita sensim candidum atque tenuius. Sedimenti crassioris medio corandam amulante, in cuius medio vacuum cum effere, transparebat uri-

na, sine sedimento purulento. Cum talibus urinis scribit agros plene iudicatos. Memini me quoque invivisse generosum Baronem Havirium quandam Moravum Semitertiana correptum, jaceantem sine pulsu perceptibili per quatuor dies per familes urinas iudicatum fuisse. Anno millesimo sexcentesimo primo mulier paupercula quadraginta circiter annorum per maculas nigras, satis magnas in universo corpore dispersas, iudicata fuit, cum jam domo egressa sua munia exerceret, perque plateas obambulans sine noxa huc & illuc Paravi curfaret. Mercatori autem Cornelii Gemmae pustulae nigrae per totum corpus ante septimum oriebantur; quibus deinceps delirium accidit, superveniente circa undecimam ventris profusio, qui deinde sanguinis atrii purulenti foetidi magna copia per os redditu expiravit. Iudicatos etiam quosdam vidi per sudores copiosissimos & per multos dies perdurantes, & scabiem erumpentem per totam cutim, quorum qui unguentis scabiem pelle conabantur, recidivam passi sunt vel Semitertianæ, vel quotidianæ spuria.

Adjungendum hic quoque ex eodem Gemma, quod de matrona sibi narratum scribit, tantam scilicet putredinem circa cerebrum & ejus meningis in dissecta hujus calvaria post diuturnos & vehementissimos capitis dolores notatam fuisse, ut vermiculorum & cunicum copia incredibilis conspecta sit. Hæc pro pleniori hujus febris cognitione ex Cornelio Gemma, doctissimo fuit tempestatis Medico, recensere tironi volui, ut sciret plerisque signis, quæ ad ejus cognitionem & prognosim superius enarravi, apparentibus, etiam variis ad diversi affectus pro corporis cujusque idiosyncraticia, diverso ac vario celi & anni temporum & regionis statu compareant, & alios morbos mentiri videantur, plurimum tum ad febris naturam iudicandam, & ejus futurum exitum prædicandum, confidendum esse.

FINIS LIBRI SECUNDI



A D R I -

SEMITERTIANA

LIBER TERTIUS.

Curationis maximam partem absolvit.

CAP. I.

CAP. II.

Hæcenus neglectam hujus febris exactionem curationem; quam ratione moris & motus febris differre scribit.

De Venesectione, an hæc in omni specie Semitertianæ adhiberi debeat.



Quod igitur hæc febris olim usque adeo frequens fuerit, & hodie quoque talis sit (liquidum quibuscumque regionibus endemia & fuit & est, nonnullis epidemia ob annitemporumque mutationes assignatas, ipsam vero per totum mundum nullis non anni temporibus, sed maxime æstate, autumno ac vere ob immoderatam victus rationem conspicitur) cum deinde tam periculosa sit, funesta aliquando, sæpe contagiosa, ut non focus ac ipsa pestis multa hominum millia invadat produmatque; cumque etiam Medicorum prognostica tam frequenter illuserit hæcenus, & ipsam plane non cognoscentibus etiam nunc illudat, mirum est, neque Galenum in libro Methodi, & de arte curandi ad Glauconem, neque quonquam ex aliis veteribus qui extant, multo minus ex recentioribus ullam ejus curationem tradidisse. Et credo equidem hanc fuisse causam, quod à plerisque neglecta, à paucis visa & cognita fuerit. Sed non satis est, cum compositam hanc dicat esse Galenus, & ideo mixti in ea sint humores, bilis nempe & pituita, compositas ac mixtas ponere indicationes curativas, quales nempe utrique humori conveniunt in tertiana & quotidiana. Verum mehercule opus est diligentius remedia perpendere (per quæ contrariis propositis indicationibus satisfacere debemus) qualia illa sint: quæque longo usu & experientia probata sunt peculiariter huic febris profuturæ, tum qua quantitate, mixtura, quoque tempore adhiberi debeant. Et quanquam tria remedia (communia etiam aliis morbis) genera in hac febre sint præscribenda, chirurgica, pharmaceutica ac dietetica: tamen sine distinctione moris & motus hujus febris recte ea adhiberi non possunt. Convenit enim prius Medico considerare an Semitertiana, quæ curanda proponitur, benigna sit, vel maligna & pelilens.

Quidem venesectionem in omni tertiana commendavit Celsus. Per venesectionem more veterum intelligit eam, in qua ad minus libra sanguinis extrahebatur. Sed primo an in omni benigna, malignave & pelilenti adhibenda sit; deinde, qua quantitate; tertio, quo tempore sanguis in utraque extrahi debeat, diligenter indiget perquisitione.

Quod in nulla harum recte adhibeatur, commodissime sic probari potest. In quibus morbis adeo copia pituitosa materia vel in vasis, vel extra vasa, non convenit venæ sectio. Nam si ad libram & amplius sanguis evacuetur & vena cubiti, refrigeratur corpus, calor nativus & vires labefaciuntur, quæ sunt summopere conservandæ: in benigna, quia plerumque est morbus qui vel ex acuto degenerat in chronicos morbos, vel acutis morbis accidentibus valde prosterantur aegri; in maligna & pelilenti, quia sileo in hac vires deficere consueverunt. Quod autem in Semitertiana tam benigna, quam maligna & pelilenti secundum Galenum sit copia pituitosorum humorum, non opus est aliis demonstrationibus, quam eorum locorum quos in præcedentibus duobus libris citavimus.

Rursus contra, quod in omni Semitertiana adhiberi debeat, his rationibus concluditur. In omni morbo (ajunt peritores Medici) venæ sectanda, qui magnus est. At hæc febris sive sit benigna sive maligna & pelilens, talis est. Magnus enim est morbus benignus, ratione sui generis, causæ & symptomatum. Nam aut prima regio, ventriculus, intestina, jecur, partemque circumvicinæ, aut majora vasa gravem humorum biliosorum & pituitosorum putredinem in se continent, ut Galenus tradit; vel, ut ego observavi, aliquando unum vel plura commemoratorum viscerum, & una cum his pulmones quoque, interdum & cerebrum inflammatione patiuntur: quibus omnibus supervenire plenarie consequitur aliquis acutus morbus, aut aliud grave symptomata ut sitis, vigiliae, inappetentia, dolores, quibus vires magnopere convelluntur. Sed & maligna, præter hæc omnia pravam in se continet humorum venenarumque qualitatem, ob quam solum magnus morbus Semitertiana dici meretur. Quapropter perpendis diligenter omnibus hisce rationibus, Celi consilium in omnibus quatuor generibus Semitertianæ optimum esse reor:

Cornelii Galeni
quædam ex veteribus
tribus de hujus
febris curatione
ne egimus.

Quod in nulla
venæ sectio
convenit febre
venæ sectio
venæ sectio

Quod in omni
Semitertiana
venæ sectio

In quibus
specibus
febris
semiter-
tiana
venae
seccio.

reor: at in eorum speciebus omnibus istud non se-
quitur. Nam in ea quae est primi & secundi ordinis
Galenii, praeterea in majori Hemitritico & Aga-
thini, quando sunt spursae pituitosae, venae sec-
tio non convenit. Etenim secta in cubito vena, e-
vacuat sanguis tenuior & à putredine liberior, cras-
siore, crudiore ac putrido permanente in ventri-
bus & praecordii, seu vasis majoribus. Et quan-
tum ratione caloris febrilis aliquid refrigerium
exspectare queamus ab hac sanguinis evacuatione,
tamen in ejusmodi febre non tam urget calor fe-
brilis, quam crudi humoris concoctio. Morbi praeterea
valde acuti & symptomata his puris & pi-
tuitosis febris non valde accidunt, quae venae
seccionem postulant. Imbecillitas praeterea ven-
triculi, diffidit ciborum concoctio, animi ob utra-
que deliqua venae seccionem prohibent.

In quibus
convenit.

Quamobrem in Semitertianarum quatuor ge-
neribus exquisitis, & spuris biliosis constantibus
viribus & abundante sanguine simplici vel bilioso
laudanda venae seccio, ut in iis, quorum facies est
rubicunda, non pallida, vena ample, urina rubra.
Nam haec vel abundantiam sanguinis declarant,
vel summum ejus fervorem. Quibus praeterea ve-
nae sunt amplae, in his spes est per venam sectam
non posse evacuari etiam aliquid humoris putridi,
qui in vasis majoribus continetur. Sed & ratione
morborum acutorum, & symptomatum, ut doloris
capitis, & lumborum, apoplexiae, epilepsiae,
convulsionis à plenitudine, lethargi, anginae, pe-
ripneumoniae, volvuli, & aliorum id generis hoc
praesidium convenit, quod plerumque vel à summo
fervore, vel ab inflammatione partium originem
habeant.

An in Semi-
tertiana se-
cunda ordinis
Galenii
seccio sit ve-
nanda.

Fortassis quispiam putaverit venae seccionem
etiam vitandam esse in ea, quae est secundi ordi-
nis Galeni, & in quarta specie, quae est Agathi-
ni, seu minor Semitertiana. Propterea quod haec
pituitam (loquor nunc secundum Galenum) cum
habeant in ventriculo & primis vasis melaecasis,
periculum fit, ne crudi & putridi humores à vena
secta in majora vasa rapiantur, & sic fiat major He-
mitriticus omnium maxime periculosus, vel au-
geantur obstructions in viceribus. Testatur enim
Galenus lib. v. de Sani. tuenda, evacuatis venis à mis-
to sanguine facili esse ut attrahatur cruda alia pi-
tuita, quae per alias venas distributa in viceribus,
& in univerlo corporis habitu plures validioresque
excitet obstructions. Ideo videmus quod
Libro de Arte curandi ad Glauconem, nec alibi, fa-
ctam mentionem venae seccionis in curatione quo-
tidiana.

Respondet.

Sed ad haec objectionem respondemus, distin-
guendum esse tempus sanitatis, in quo aliquid praer-
vare cupit à morbis impendentibus ab eo, in
quo jam facti morbi, & praecipue febris habent
putredinem in vasis, & plerumque cum viscere
runt inflammatione. In illo enim (prima regione
crudo & pituitoso humore repleta) metuendum
est, ne sanguine misso ex cubito rapiatur humor
crudus in venas majores & viscera, atque sic ob-
structions vel augeat vel pariat nondum factas.
Nam tunc carnes totius corporis fane, a robore at-
tractricis facultatis pollent (quia plurimum sangui-
nis contenti in vasis consumitur) unde evacuato
sanguine & attrahentibus carnibus duplex fit in

vasis evacuatio, naturalis videlicet & artificialis,
ut quia crudi humores è ventriculo ac prima re-
gione facili possunt ratione vacui in vasis & attra-
ctricis in carnibus robore rapi in viscera & vasa
majora. At in hoc tempore, quo febris praedup-
posita praenititur homo, id non est metuendum;
quia carnes parum attrahunt, interdum etiam ul-
li multa & magna putredo consistit in vasis majori-
bus vel prima regione corporis. Nam robore
attractricis facultatis languent propter febrilem
intemperiem, aut profus privantur; ut in iis, qui
lethali vel pestilenti Semitertiana laborant, propter
infirmam copiam puritudo humorum vis
bilioforum & pituitosorum, aut eorum putredinem,
quam continent in vasis, vel ut nonnullis placet
extra vasa. Quod enim pro alimento iis non con-
venit, quomodo id attrahat ut cedat in alimen-
tum? Quapropter quotiescunque quis venae-
seccionem instituit praeservationis gratia, recte à pe-
rito cavetur ne ea fiat antequam ventriculus &
prima regio cibum concoxerit, aut maximam pi-
tuitae partem digesserint. Sed quod si aliquando
contingeret quempiam insigni plethora abundare,
& crudis etiam in ventriculo humoribus, huic pro-
fecto non differem minime fabricant etiam sangui-
nem ex brachio demere: diminuta enim ex
parte plethora calor nativus partium atque op-
pressus inclius concoquet, nec rapietur crudus hu-
mor ad vasa majora à primis venis. Quia in ple-
thorico corpore carnes plurimo alimento fuit
satiatae. Itaque vel non attrahunt, vel debilitat.
Adde quod plurimum sanguinis in venis continetur,
unde petere alimentum queant, vasa & praeci-
pue vena nimia copia sanguinis liberata me-
tus retinet, & sanguinem contentum constri-
gunt.

In maligna & pestilenti Semitertiana video do-
dis quibusdam viris suspicandam venae seccionem.
Cornelius Gemma scribit in pestilenti sua He-
mitritica observatum fuisse mortuos plures, quibus
venae seccio adhibita fuit, quam quibus omnia. Et
Galenus libro de boni & mali succi cibus scribit, nun-
quam vel raro aulos fuisse Medicos sanguinem de-
trahere in peste, quae Romanis quo tempore inva-
deret, etiam initio morbi essent vocati. Sic etiam
nostris temporibus plurimis in locis tamen sangui-
nis missionem in illa contagiosa Semitertiana, in
qua petulae expectantur aut memnuntur, aut jam
comparent: ut anno millesimo sexcentesimo vi-
gesimo primo & secundo Patavii ac Venetis vidi-
mus. Ratio, cur hoc auxilium fugiant, haec est.
Quod in ejusmodi febre vires statim concidunt;
quarum conservatio omnibus modis est in hac cu-
ratione procuranda. Sed & illud in his maxime
dignum notatu animadverti, corpora aegrotantium
Semitertiana maligna, multo antea tempore dis-
poni ad altam quandam putredinem, quae jam in
vasis viscera claudelino gradu, antequam signis
vis febris se in conspectum proderet. Quod si
jam prodierit febris, etiam vires consent & nulla
adfin praesentis malignitatis signa, qualia sunt à
vulgatis praedictis commemorata, plures parvus,
debilis, inaequalis, maxime urina confusa ac tur-
bida, petiularae maculae incipientes; tamen vi-
nae seccioni ullus amplius est locus, ut ea putre-
dini resistatur eventulando scilicet vel evacuando
aliquam

An in mai-
gna & pesti-
lenti Semi-
tertiana
seccio
venae sit
secunda.

Respondet.

aliquam portionem materiae putridae una cum bo-
no sanguine. Nam tota, quae postmodum latius
serpit, evacuari per venam sectam nequit. Quare
ut venae seccionem, ad praecavendam Semiterti-
nam malignam, optimam in pluribus judico, quo
tempore periculum est ne in aliqua domo vel fa-
milia in plures contagione sua serpat, sic in jam
facta (nisi plethora quoque opprimatur vires) ti-
tutis omittitur, praesertim si initio febris malignita-
tis ea signa jam se monstraverint, quae ego tan-
quam vere malignitatis prodroma recensui. Quod
si valde obscura sint, tunc eam non soleo adhibe-
re, nisi praebat prognostico future malignita-
tis. Sic tam magnum remedium, quod in tam mul-
tis febris indies experitur esse salutiferum, pro-
batur non fuisse.

Memorabilis exempli, cujus in fine primi libri
à me facta fuit mentio, recordatio hoc in loco non
est praeteranda, mulieris nempe pauperulae vi-
ginti quatuor annorum, temperamenti calidi &
humidi, cancrum habentis circa posteriori for-
moris partem quae clunes desinit. Cum enim haec
incidisset in talem affectum ex male incito & ap-
erto febratorem, ut aliis videbatur, aut atheroma-
te, ut mihi persuasi, ad eum abscondendum radicu-
m quo feopulo mediocriter crasso (cum ne
quid musculis, neque nervis affixus esset) eam fuit
cohortatus, oportuno tempore veris, post univer-
salem corporis purgationem. Vlucis erat tam larum
ac profundum & crassum, ex fundo suppuru-
lante, & indies quando ejus portio abscondebat
renascens compositum, ut pileum meum neque
ingredi posset, nec eo integrum cum fuso lato pe-
gum capri. Primum seu recedente famis materia
magnaue ejus frusta quotidie ex ulcere premen-
do eximebantur una cum sanguine, cujus quotidie
plures unciae, saepe ad mediam libram per idem ul-
cus effluiebant. Et quamvis hoc sanguinis profu-
vium per plures menses ita continuasset, nihilo ta-
men fecius à Semitertiana primi ordinis Galeni
servari non potuit, cum in eadem domo omnes
eadem aetate inficerentur. Hoc tantum vidi, ipsam
per sanguinis & humorum evacuationem, quae fie-
bat per cancrum, consecutam fuisse, quod Semi-
tertiana in hac maligna & funesta, ut in aliis ejus-
dem familiae non fuerit. Diuturna tamen & haec
fuit, & plane cum isdem recidivis (cum quibus
alii, qui malignam erant passi) per tres menses vi-
vificata. Hanc historiam pluribus hic repetendam
dixi, ut ex spontanea sanguinis evacuatione, quan-
tum venae seccioni in curanda praeservandaque Se-
mitertiana fit tribuendum pateret. Quod si in bel-
lo vel ob annonae caritatem & pravam victus ra-
tionem, atque aërem admodum pravum multos
milites contingat à tali febre invadi, nulli horum
venae seccio institienda est. Idem etiam in pesti-
lenti Semitertiana faciendum moneo; & magis in
hac ab abstinentium propter acumen morbi &
subitaneam, quae instat, virium prostrationem,
cum in maligna. Patet igitur, neque in omni Semi-
tertiana venae seccionem adhibendam esse, neque in omni
omittendam; deinde in quibus conveniat, vel non.

Necne in co-
muni Semi-
tertiana venae
seccio sit
secunda, ne-
que in aetate
senectutis.

Sed quoniam ab initio argumenta eorum attu-
lerimus, qui in omni Semitertiana venae seccio-
nem vel necessariam vel noxiam sunt arbitrati;

nos autem quidam posuerimus in quibus eam lau-
daviimus, quidam in quibus eam vituperavi-
mus, tempus est respondere eorum argumentis,
qui eam negant in iis, in quibus venae seccionem
laudaviimus, ut in Semitertiana primi ordinis Ga-
leni.

Respondet.

Dicent enim in hac febre virtutem quoque pro-
ferri oportere, & pituita in vasis putrefacta ma-
teriam concoctionemque prorogari vel im-
pediri, quod sanguis, in quo calor nativus consistit,
evacuatur, aëreque extraneo frigidiore infret in venas
per vaforum, quae fit in venae seccione, aper-
tionem.

Verum ad propositum argumentum respondeo,
putrefactam pituitam in vasis accendi, quod vis
vitae vel magna ex parte interclusa habeat,
eam deinde dum putrefacta permisceri cum sangui-
ne in vasis: quatenus igitur materia quae putrefacta, ven-
tilatur per venae seccionem, & copia ejus cum sanguinis
copiam demittit, quae poterat quomodo suffocare calorem,
concoctionis officium, eadem in omni Semitertiana
na primi ordinis Galeni venae seccione venae seccio, aliter
non.

Rufus ad aliud argumentum, quo probatur in
omni Semitertiana sanguinis missionem convenire, quia
scilicet magnus sit morbus, dico; fallam esse hanc
propositionem in pluribus morbis magnis, qui fri-
gidi sunt, & cum virium jactura, venenosa qua-
litate, inopia sanguinis & alimenti. Sed iterum
inflat aliquis, Celsum in omni Semitertiana pro-
posuisse venae seccionem, si vires erant, nulla
habita mentione plethorae, ergo etiam in aliis Se-
mitertianae specibus licebit venam secare, praeter-
quam in jam commemoratis. Dico, Celsum
per Semitertianam omnes eas species intellexisse,
quas recensui venae seccionem admittere; pitui-
tosas Semitertianas exclusisse, quia in his vires non
ferant.

Interrogabit me nunc aliquis tiri, unde ego co-
gnoscam, cum vires ferant, nec ne?

Respondendo, non semper ex pulsu resistenti &
forti, ut vulgus medentium de fortitudine virium
judicat, fed etiam ex tempore, quo conficiamus
naturam indigere ad totum morbi cursum totan-
que historiam, usque ad materiae debitam conco-
ctionem absolvendam. Hoc igitur tempus quoniam
in Semitertianis pituitosis longissimum facile
conferuere, & vires quae paulatim debilitatae sunt
à morbi longitudine, paulatim non modo restitui
debeant, fed etiam diffuciler restaurari queant,
quod à quotidiani cibi debili ac diffucili conco-
ctione sanguinis novus diffuciler regeneretur in
vires, sufficiat tibi indicabit una cum pulsu vi-
rium tolerantiam.

C A P. III.

De loco venae seccionis.

Quamquam in principio hujus libri differentes
de venae seccione communem loquendi mo-
rem ac veterum fervantes, eam intelligamus, quae
in brachii adhibetur venae jecoraria seu comuni;
tamen scire etiam & hoc convenit, non aliquando
de felicitate aliis in partibus in hac febre, in qua
venae seccio convenit, administrasse. Nam in ma-
gna plethora, dolore insigni lumborum & capitis
& mentis

Unde constat,
nam viri
venae se-
ccionem.

& mentis alienatione, venam pedis faphenam aperimus, libra una sanguinis exempta prius, priusquam brachii venam aperiremus. Eligatur plerumque dextrum latus tum in brachio tum crure, nisi aliquis alius morbus sit, qui finistram evacuari possit. *Vasa enim dextro lateri majora sunt & major copia sanguinis, quam sinistro.* In pestilenti Semitertiana si bubones in inguine apparuerint, vena pedis faphena pertundatur: si sub alis, jecoraria aut media, vel manus salvatella.

C A P. IV.

De quantitate sanguinis evacuandi.

Veteres quoties proponunt sanguinis missionem ut dixi, toties intelligunt ad libram utque & amplius, non ea minus sanguinem evacuandum esse, quod existerent sanguinis minorem quantitate plethoram tollere non posse, nec ullam revulsionem vel derivationem in magnis vasis prope ex minori quantitate sanguinis decepta sequi. Sed nostris temporibus unciatim demitur sanguis, præcipue in hac febre. Nam Curtius & Rondeletius quantitate tantum trium unciarum præscribunt, quæ profecto nimis parva est & nulla rati ne proficia. Nam si magno morbi magnitudine æquale remedium convenit, certe magnum remedium non est venæ sectio, in qua tum paucus sanguis demitur. Deinde neque quantum requiritur de morbi materia, tantum tollitur, ut æger aliquantulum levetur. Idcirco nonnulli hodie docti viri veterum vestigia secuti, recte fanceverunt evacuandi quantitatem ex morbi magnitudine & virium robore metiendam esse. Satiùs igitur erit venæ sectionem omittere, quam tam paucum sanguinem profundere. Fortassis quispiam pauci sanguinis evacuationem utilem esse inveniet in viribus languidioribus, ratione ventilationis quæ fit per venam factam. Existimare enim aliquis posset, cum in viceribus & magnis vasis plerumque nascantur putredines, quia corpus non bene perficitur nec ventiletur, per venæ sectionem in parva quantitate ventilarî, ac tanquam aperto alio spiraculo putredinis causæ optulari, oculo inquis aëre & spiritu putridi nonnihil ex foramine venæ expirante, & simul per id vultus refrigerato aut mutato ab aëre externo. Verum si istud est quotidiana experientia, quæ in abundantia sanguinis ejusmodi auxilio nil aperte proficit, ex ultimo nimis exiguum hanc esse ventilationem, ut aliquod evidens auxilium inde sperari possit: nisi repetitis vicibus quotidie aut alternis diebus ad aperta rursus vena sinantur duæ vel tres uncie sanguinis effluere, ut in Hispania prius confuevit, & sic medicis aliqua quantitas repetitis vicibus eximatur, quæ ad libram vel ultra accedat, pro magnitudine plethoræ corporis & venarum. Qui quidem modus detractionis sanguinis convenit in iis, qui facile exolvuntur, rare texture sunt, ore vetriculi superiore biliosi, & frequenter animo delinquentes ex levioribus causis. Hi enim repentinæ evacuationes gravius alis ferre consueverunt.

Verum ulterius queritur, an in evacuatione sanguinis ad libram ex utroque brachio libræ pars dimidia aut paulo plus effundatur fructuosius, quam si ex dextro, quem plerumque eligimus, partitis

vicibus, vel unica vice libra demeretur. Respondere, quod non, nisi aliquid symptomata in finistro latere premat, ut hemierania. si enim non notabilis aliqua quantitas sanguinis ex uno loco effundatur, vasa majora, quæ inter alas & inguina excurrunt, neque evacuari aliquantisper, neque refrigerari ventilarique sufficienter possunt. Nam dum sanguis evacuat ad quatuor, quinque vel sex uncias ex brachii venis commemoratis, in locum sanguinis qui effluit, succedit alius ex vicinis venæ sectæ: venis minoribus & majoribus per musculos & habitum corporis dispersis, ita ut non recto trahitur vena sola, quæ truncus est vicinior evacuetur. Evidens ejus rei argumentum est, quod externarum partium inflammationes & præcævenus, ut frequenter in vulneribus contingit, & curamus, ut in anthrace, per venæ sectionem. Itaque indiget majori copia ut sanguis evacuetur, quam ea, quæ solet in toto illo spacio contineri, quod est inter venam aliquam brachii & truncum venæ cavæ.

C A P. V.

Quo tempore vena sit secanda.

Tempus accommodatum venæ sectionis nobis Celsus proposuit, dum inquit, in omni Semitertiana venam esse initio secandam. Per initium hic non intelligimus primum tempus, quo aliquis incipit fabricantem invadere, neque principium paroxysmi febrilis; sed quod primum est tempus totius morbi, præcedens augmentum, aut hoc ipsum initium & augmentum simul, de quo intellexit Hippocrates lib. xi. aphor. xxxix. quando inquit: *In principio si quid videtur movendum, move; cum vero consistit ac viget, melius est quietem adhibere.* Hic enim Hippocrates morborum tempora, quæ sex alius Galenus recensuit libro proprio, tria tantum videtur complexus, principium, statum seu vigorem, & declinationem quam adjuugo ex prædictorum temporum relatione. De hoc ultimo non facit mentionem Hippocrates, quia in eo non adhibebantur remedia.

Cæterum hic notandum, tempus sectionis vena illud esse melius, quod vicinior est proprie dicto principio febris, quam augmento: neque modo in venæ sectione brachii, sed & aliarum evacuationum, & præcipue purgationis eligendum: quia tunc hinc remedium putredini incipienti felicius resistitur, viresque ad validas evacuationes sufficientes. Raro tamen vocantur in principio hujus febris Medici: quia qui occurrunt, præsertim cum quotidiana prius quam tertio hominem adoriatur: vel quia ægri plerumque initio Medicorum auxilia recusant, maxime quando levi quadam lassitudine vel oppressio sentiant, aut aliqua levi febricula sine ulla gravibus accidentibus laborare, sperantes sic omne malum sponte fine opte Medicorum abutuntur. Vnde postmodum alius non levis error committitur in prophætico sole, nempe quod nos latent veris die decretorii & judicatorii, & intercedentes aliquoties pro criticis & judicatoriis habeantur, atque sic ea signa, quæ in febre contingunt, bona pro malis, & mala pro bonis censentur. Vt plerumque tamen in omni Semitertiana primi & secundi ordinis Galeni, & minori Agathini soleo initium statueret & primum morbi diem, non quo

quo æger decumbere incepterit, sed quo rigore aut horrore vel frigore cepit manifeste mollescere in magna Hemitertia statim quom decumbere incepti. Nam in hac vires lico præsertim animales proferturum, ita ut æger recta incedere vix queat. Quapropter primo die venæ sectio instituitur est, aut saltem iis diebus, qui huic sunt propiores: ea hora, qua vel plurimum remissa est febris vel intermissa, sitque ad minus quinque aut sex paroxysmi ante novum paroxysmum insulsum, quo die quotidiana sola affligit atque remittit. In Semitertiana benigna sexto die, quo sumus in augmento secare venam in brachio possumus; in maligna ultra quantum secare vix audeo; in pestilenti tertium transire non fimo. Nam in peste, qui post primum diem secant venam, si non aliquid grave symptoma vel morbus, ut carbunculus appareat, vel bubo sub axillis vel inguine, vel parotis, raro secatur vena felicitur in brachio seu pede.

C A P. VI.

De Scarificationibus, Cucurbitulis, Frictionibus.

Scarificationes in cruribus & dorso factæ locum obtinent venæ sectionis in adultis, in iis nempe, in quibus hanc adhibere non possumus, propter ætatem, ut est puerilis, senilis; sexum, ut muliebri; tempus morbi, ut quando vocati furus in augmento & non procul a vigore; morem & naturam febris, ut quando maligna: sit aut pestilens; vires denique debiles. Quibus jam initio facta vena fuit & circa augmentum finem vel medium, & ipse est materiam ad cutem corporis tractam in Scarificationes erunt fructuosæ, eduçis quatuor, quinque vel sex uncis sanguinis per adhibitis post scarificationes cucurbitulas. In pueris, omiffa venæ sectione, in principio morbi hoc remedium convenit. Si Scarificationes paulo profundiores sint, quam nunc est communis usus in Germania, tum singulare hoc esse remedium expertus sum. Quippe cum per id majora vasa, vena scilicet cava & arteria magna evacuentur per vasa, quæ ab hisce oriuntur, intercostalia dicta, quorum rami recta ad spinæ dorsii latera transeuntibus lue cute dorsii disperguntur. Galenus libro de Cucurbitulis & Scarificatione, dum pestilentia virentis Asiæ invasisset, multosque perdidisset, meque ait, etiam morbus attingisset, secunda morbi die venissectione fuisse crura scarificari, duasque feri sanguinis libras detraxi, hæc de causa periculum evitavi. Itaque hunc & ego secutus iisdem Scarificationibus cruribus adhibitis felicissime uti incipio, in maligna Semitertiana; necesse modo in adultis, sed etiam in pueris, nec in viris tantum, sed & in mulieribus, præsertim quibus per ætatem & morbos omnes non fluunt amplius, aut non in ea copia, quæ convenit. Laudoque hoc præsidii genus, venæ sectionis præponens, quod capitis morbis valde acutis, Semitertiana maligna laborantes, molementur post casum jam sanguine repletarum sanguiferarum, cucurbitulis sanguinem evacuat quæmus, aut vapore aquæ calidæ ad notabilem quantitate educere, ea non evacuet venas majores, sed minores tantum.

vel cruris esset extrahenda, evacuetur) & à corde ad remotiores partes, nempe crura detrahenda. Quapropter cum in pestilenti & maligna febre per hoc remedium non sit movenda ulla vitalium & naturalium facultatum labefactio, multis modis præfero id venæ sectionis. Sed in benigna Semitertiana venæ sectionem præter scarificationibus crurum in adultis, in quibus adeo indicatio sanguinem evacuandi, quia in hac etiam spiritus vitalis effluit, non tantus est metus, ne vires debilitentur, cum tales initio morbi à benigniori febre refarci non prohibetur. In pueris Arabes & Egyptii Medici acuto morbo oppressis crura scarificant per venæ sectione, vel sanguinis evacuatione per cucurbitulas cum scarificatione dorso adhibitas. Facienda autem est scarificatio non *κατὰ τὸ ἄκρον*, ut vulgus Chirurgorum hoc tempore affuevit, id est, percussendo aut perturbando, sed ut vult Apollonius *κατὰ μέσσην*, id est, trahendo, ut minus sit, vel nil fere doleat. Quod fieri confuevit scalpello pectorali, vel cultro utriusque aciem habente, vel novacula quæ utitur tonfores ad radendos capillos.

Locus autem scarificationum cruris duplex est, furæ scilicet & malleoli. Galenus per crurum scarificationem eam, quæ est malleolorum, videtur accipere, vel saltem alteri prætulisse. Hunc locum etiam Egyptii eligunt, ut est apud Prosperum Alpinum libro de Medicina Egyptiorum.

Tempus autem hujus remedii, etiam si quod principio morbi est, vicinior sit eligendum (ut in venæ sectione) tamen & in augmento, cum capitis morbi aut supervenient, dolores, vigilie, phrenitides, furæ, autem, aurium dolores, vel etiam petiula jam apparent, tutius adhibetur, viribus mediocribus, quam venæ sectio. Scarificationes tres vel quatuor æquidistantes sunt faciende & profundæ, ut cutis penetraret, secundum longitudinem. Aquæ deinde calidæ imponendum est crur scarificatum, ut optime & sine dolore sanguis evacuetur sine cucurbitulis.

Cucurbitula quoque sine scarificatione & cum eadem, utiliter adhibetur revulsioni & derivationi gratia, cruribus circa malleolos & furas, femora & scapulis & brachiis, & ventri, pro diversitate symptomatum & specie Semitertianæ. Conferunt enim magis in febre maligna, in qua dolores dorsii comparent infigens aut petiula, in dorso & cruribus adhibite; & quibus adeo cataphora, vel lethargus, vel apoplexia, phrenitis, dolor capitis ingens, quam brachii.

Sanguifugus in pueris nonnulli solent adhibere venis cucurbiturum per venæ sectione, & venis fedatis in adultis post universalem evacuationem totius corporis per sanguinis missionem & purgationem, quas & ego in iis, qui hamorrhoidales habent aut venas hamorrhoidales admodum latas, approbo: in aliis omnibus non probo; quia etiam post casum jam sanguine repletarum sanguiferarum, cucurbitulis sanguinem evacuat quæmus, aut vapore aquæ calidæ ad notabilem quantitate educere, ea non evacuet venas majores, sed minores tantum.

C A P. VII.

De Purgatione.

Purgationes initio hujus febris que bilem & pituitam purgent necessariae esse, nemo amplius in dubium revocare debet, etiam tunc temporis cruda sint omnia, & scripserit Hippocrates lib. 11, aphor. xxxi, *concocta esse medicanda, non cruda*. Recte enim plurimum scire quales tempore Hippocratis fuit instituta purgationes, & quales hoc tempore instituantur, tum qualibus in hac febre utendum esse duam. Veteres enim, praesertim tempore Hippocratis, validissimis utebantur, ut; *helleboro, colocynthide, grano gaidio, scammonio, elaterio*, quod Cnidia scholae sectatores usurpabant. Galenus enim in exegefi vocum Hippocraticarum, elaterium exponit medicamentum non solum ex aggregati cucumere factum, sed igitur omne quod deorsum per ventrem purgat. His igitur & similibus valide purgantibus, sed peculiari & obsoleto quodam modo permixtis & exhibitis utebantur, quae etiam in parva quantitate dabantur, corpus nihilominus commovebant, & a concoctione naturam abvebant, quod ex crudioribus urinis, quae postea die mingeantur, ex aliis excrementis durioribus subsequenter facile animadvertere.

Quare recte scripsit Hippocrates lib. 1, Aphor. xxiv, *In acuti affectibus raro etiam in principii medicamentis purgantibus uti oportet, atque hoc agere diligenti prius facta praemeditatione*. Si enim materiam fibrilem turgere observabant, hoc est, perulenti quodam veluti motu huc vel illuc concitari, timentes ne ad aliquam partem principem rueret, eam illico purgabant sine mora, si talis erat morbus, qui septimo die suam historiam effere abfolvitur. Vnde libro quarto apud Hippocratem exat aphorismus decimus talis: *Pharmacum purgans praebere oportet in valde acuti eadem ipsa die, si turgent. Tardare enim in talibus malum*. At in iis morbis, qui simpliciter acuti sunt, ante quartum diem, quando decimo quarto aut undecimo crisis est expectanda, undam purgans, si vigesimo aut decimo septimo, etiam post quartum, nempe quinto vel sexto. Igitur cum Semitertiana peracuta futura fit, quae raro observatur alio quam petis tempore aut cum eam morbus aliquis peracutus ab initio conconiterit, non dandum erit medicamentum purgans secundum doctrinam Hippocratis, nisi eodem ipso aut saltem ad summum secundo die, cum vero acuta & decimo quarto fit terminata, nunquam praeterito quarto dabitur, nec post sextum vel septimum si vigesimo.

Sed & illud quoque adjuvandum, veteres istos nunquam venae sectionem instituisse, aut perquam raro in talibus morbis (quod tamen magnus evacuationibus vires eorum raro partes inventient) solo clystere contenti. Sed nostro saeculo multum ab eorum curandi modo jure optime differimus. Nam postquam blandiora pharmaca a posterioribus Graecis & Arabum schola in medicaminum inventa sunt, ut *castia, mel rosatum solutivum, syrupus ex infusione horum violarum & rosarum, manna, salsa lena, rhubarbarum, agaricus* in parva quantitate, & adhuc ex Indis nova quotidie exportentur, quae sine ex-

agitazione corporis humores peccantes ex primis viis expurgant, non multum commoventes sanguinem & humores in venis aut habitu corporis constitentes, non ad amussim observatis Hippocratis regulis secamus venam in hoc morbo, ut in aliis febribus, & praebemus purgans medicamentum (quod qui volunt fervare doctriam veterum rectius leniens appellant,) in peracutis & acutis morbis etiam in augmento, hoc est, etiam post quartum vel septimum tutissime. Et ego testari possum me animadvertisse in remediis hifce purgantibus, multis symptomata & morbos acutos me praecavisse, nec ullo modo interturbatam crism, etiam si die decretorio porrigeretur & repetitis vicibus ante vigorem morbi, imo etiam in vigore vice clysteris in modica quantitate functa fuisset. Longeque tutius arbitror nos ius uti in omni Semitertiana, quam aliquo veterum valido medicamento omnia venae sectione, aut praemissa, & omisso pharmaco, quod illi tenuius agere nutrimentum, & ideo vias a validis his ambobus evacuantibus citius languentesque hoc sustentare non poterant, nos vero paulo plenius. Quidquid enim a cibus ingessit excrementi in tenuibus intestinis quotidie colligitur, aut a majoribus vasculis ad primam regionem depellitur & inde ad intestina, in futuram obstructionem, ad evacuum tutissime per ea, quae jam recensimus, five illa fit concocta (nam etiam in morbi principio aliquid de praefacta jam materia concoquitur, quod ad partes solet plerumque deponi, etiam si pus putrefactum quam concoquitur) five cruda materia & in parvis viscerum vasculis & vel extra vasa majora minoraque consistat. Fit haec cum multa pituita & capite destillas per oesophagum, internam intestinorum tunica obstruat, & sic obstructions viscerum doloresque colicos & alios morbos parit. Eum cum multa quoque bilis a vichu parco pravocae ab omni corporis parte ad jecur, lienem & mesenterium, inde si viae sint patulae ad ventriculum, intestina tum tenuia tum colon deferunt. Vfus quotidianus me docuit *rhubarbarum, senam, agaricum* atque *alopecuorinum* initio omnis hujus febris datam plurimum profuisse, castigata refrigerantibus & viscera deobstruentibus commissa, ut *cichorio, gramine, fencho, borragine, hierace, elon-drilla, endrivia, sero caprino, herede decocto*, additis *castilio veneris, castula, agrimonia, betonica* in pituitosa magis Semitertiana. Sed & *scordium* in ea, quae magnitatis & petis aliquid praedictum praemonstrabant, addebam, & *cardium benedictum* & *clor*; quoniam & haec ipsa medicamenta purgantia per se putredini magno pere resistent & pestilenti quoque lui.

Rusticos, qui altos Moraviae montes incolunt, vidi in hac febre & in quotidiana tertianae duplici non alio sibi remedio mederi quam *agarico*, quod inter venenorum antidota prout Dioscorides & apud eos copiose provenit in trunco laricis arboris altissime, & optima notae. Nam Moravia Sarmatiae vicina est, in cujus regione quae Agaria dicitur & quae sub eodem climate (si fides veterum Geographis habenda est) quo Moravia sita est, optimum nasci scribit Dioscorides. Mandant autem hoc ibi rustici, atque inde per se unus alterius drachmae poudere devorant. Haec volui hic recen-

Vti etiam
passatur age-
rius.

hic recensere, ne mihi contradicant aut irascantur amplius illi, qui agarico in substantia dato timorem Medicis & maxime thronibus incutere solent, docentes agaricum in substantia venenum esse. Nam per alvum non subductam tremorem & resolutionem induxisse, aliis vero suffocationem perhibent. Agaricum fene Aetius posuit inter ea, quae homini ob commoditatem in usum veniunt, aliquando vero pericula inducunt. Sed de agarico malo haec intelligenda sunt, nequaquam de agarico bono, quod tantum abest ut inducat paralyfim vel tremorem, ut potius ea mala hoc ipso in substantia dato sub forma pilularum (correcto tamen, ne ventriculum fulviveret) felidiora, solum alteratum do superbebendum, ut si specus earum calid refrenetur, meliusque procedat operatio. In bifloris Semitertiana sola infusione *solorum fene* utor in *sero caprino* alterato cum *cichorio*: vel *syrupo rosato solutivo* & *mellis rosati solutivi* una *unciam duabus*; *manne electae unciam unam*, cum *decocto florum & fructuum*, vel *tanaridarum* in *sero caprino*. Vel conficco bolum ex *capite adjecto pulvere solorum fene*, & *sorum violarum* cum *granis quatuor spice indica*. In omni autem Semitertiana pestilenti primo die aut secundo purgandum cum antidotis, prout sunt acute. Quod si vero acutissima fuerit, omisso purgante & quasi neglecta Semitertiana, statim pestilens qualitas cum sudorificis antidotis expugnanda: deinde purgandum.

C A P. VIII.

De pulvere Comitris de Harwick, & Antimonio preparato.

Invexit nuperime in medicinam chymicorum schola pulveres duos purgantes, quorum alterum appellant pulverem Comitris de Harwick, alterum vero antimonium preparatum.

Comitis praedicti pulvis componitur ex optimi *scammonii* *crassulini* triti, & super chartam bibulam tenuiter & aequaliter expansi & liquati per *lignum* *factum* cum *sulfure* *ignitis carbonibus* *infecto*, *cauendo* *ne comburatur*, *drachmis novem* & *antimonii* *duabus*, *nitri* *ad albedinem calcinati* *drachmis sex*, *cremoris tartari*, *quem crystallinum appellant*, *drachmis tribus*. Variatur ab hifce Medicis chymicis horum ingredientium medicamentorum proportio, pro humorum & temperamentorum varietate. Quoties enim plus bilis inest in corpore, plus indunt *scammonii*, quibus vero plus melancholiae & pituitae, plus antimonii & cremoris tartari.

Adulatis dantur ab octo vel decem grannis *scammonii* usque ad octodecim & viginti grana, pro virium robore; antimonii preparati modo praedicti, a granis sex usque ad quatuordecim vel sexdecim, cremoris tartari a granis duobus usque ad sex & ultra. Datur hic pulvis initio paroxysmorum *semel*, bis, ter & saepius, donec febris desinat, in omni aetate, anni tempore, sexu, gravidis, molatilis vomitu, & alvi fluxu crudaque materia existente, praegressa vel penitus omiffa venae sectione. Facile assumitur & sine nausea, & citam tantumque curationem peragere historis eorum, qui quotidiana, tertiana & vera & notha, nec non & febribus continuis laborantur, ab internis inflammationibus, pluribus docuerunt. Hoc remedium

Agaricum
non est in
substantia
venenum.

Dolus.

Pilulae.

Pulvis Comit-
ris de Har-
wick.

Ejus dosi.

praefandum. Vbi enim pituitosa fuerit, moderata refrigerantibus & incidentibus ac detergentibus esse utendum. Veteres utebantur *oxymelitis diluto*, quo & ego aliquando utro, alterato tamen *cichorii betonica*, tamen *radice perfoliati*. Vel dari potest *jussulam alteratam* isidem herbis addito *senecio*, data prius ante potionem uncia una *symplicis acetosi simplicis*, vel *oxymelitis simplicis*, cui interduum aliquot guttulas *optimi aceti* addo. Si non satis acetosum appareat *oxymel*, ut solet apud nonnullos pharmacopolas, qui carent bono aceto ex optimo vino factio.

Vel & aqua *cardui benedicti*, & *cichorii*, *betonicae singularium unciarum & mediam*; *symplicis de duobus radicibus unciarum unam*; olei *viridulis guttas duas*, vel quantum sufficit ad acorem. *Misce*. Poiones he non debent excedere uncias quatuor. Sed si jussula alterata vel decoctiones herbarum loco aquarum stillatarum porrigantur, debent esse herbis potentia. Nam a nimio potu humectatur praeter modum ventriculus, impletur caput, & porpori affectus, si adhibentur, graves evadunt, aegrius a vilicem calore distrahuntur in venas, ac opus sum in pituitosam materiam exerceat. In horum medicamentorum penuria milites in Pannonia antidotum circumferre jubebam, cujus drachmam unam dissolutam cum medico aceto & cum decocto *cichorii* uncias tribus vel quatuor porrigebam.

Antidoti calensis a me vocati hac esse descriptio: *℞ cardui benedicti, verbena, cichorii, pulgii, betonica, chamaedry, melisse, absinthii, centaurei minoris singularium manipulum medium. Seminis acetosae, portulacae, violae portulacae, ana drachmas duas. Seminis cumini, feniculi, carvi, ana drachmam unam. Salis niri preparati scrupulos quatuor. Corticum mali citri exterius flavorem exsiccatum drachmam medium. Fiat omnium pulvis, & cum melle desumato in forma opiata fiat electuarium.*

Serum caprinum vel alterius animalis depuratum, vel destillatum per balneum animadverti hic plurimum obesse, praesertim cum liposifera affectionibus adfuit vel expectantur.

In biliosa praescribere foleo sequens jussulum: *℞ symplicis simplicis, acetosissimi citri ana unciarum mediam, aquae cichorii, cardui benedicti ana uncias duas. Vel huius loco detur jussulum pulli non salitum alteratum cum cichoreo, senecio, endivia, cardui benedicti, ana drachma una cremoris tartari. Si aeger valde sitiat, dabitur commodae serum caprinum depuratum cum oxymelite vel acido citri ad libitum duas vel tres. aut aqua hordei recentis facta cum guttulis aliquot spiritus viriduli ad convenientem aciditatem, quousque bilis fervor retusus sit, & calor aliquantum quiescit. Quod si non admodum magna sitis adfit, fiat jussulum ex aquarum stillatarum endivia, cichorii, senecio, cardui benedicti ana uncias quatuor, cum drachma una *specierum aromaticarum resati*, & exsiccatum uncias duabus, colati omnibus per mantem *hippocrati* ut sit potus infans clarescit, de quo sepelem vel octo uncias praescribi possunt in vigore paroxysmi tertianae & quotidianae. In pauperioribus veterum utro remediis iunctissimis oxymelite magis & minus diluto, prout adest copia pituitae vel bilis, dando libram mediam in vigore febris & principio declinationis. His obstructions viscere quando adfuit, & pororum cutis aperiantur: ut jussulis alteratis & jussulis praescriptis non indi-*

geamus. Aliquando solo jussulo, cui drachma una *florum chamomeli pulverati in seipso fuit*, usus sum fructuose. Nam teste Galeno *flores chamomeli omnem febrem tollunt praeterquam eam, quae ab inflammatione oritur*, cui tamen non parum prodesse scimus.

Miores Semitertianae & quae diuturna videbantur, decocto *salse parille & radicis chinae*, immixto paulatim paroxysmo in nobilioribus personis post purgationes convenientes fulsumus. *℞ radicis chinae unciarum mediam, salse parille unciarum unam, aquae libras quatuor, bulliant in vase duplici per quatuor horas lento igne addendo in fine radicem dentis leonis unciarum mediam, aliquando medicum carnis addendum, & alternis diebus novum parabatur; bibebat de eo omni tempore. Dabam hoc decoctum hora una ante paroxysmum ad sudores fine violentia provocandos, itragulis cooperto aegro.*

Potio ad Hemitritanum Plinii Valeriani recipit *Cruci denarios duos, nardi duos, absinthii pontici duos, emulae tres. Quia omnia cichorii: & cum opus fuerit, addit coctum diuulsum cum aqua calida. In talibus igitur persistendum, quousque totius morbi tempus apparuerit, quod vigorem appellamus, ad iunctis etiam externis remediis ejusdem scopi.*

CAP. XII.

De Externis remediis.

ECORI fomenta aquae mēiones & cataplasmata decernantur. In pituitosiori Semitertianae, *℞ succi cichorii libram unam & mediam, absinthii libram mediam, aceti rosati uncias duas. Misce pro fomento spongias adhibendo.*

Vnguentum fitale: *℞ specierum aromaticarum resati drachmam unam, olei rosati completi novies tot in aqua dissolutum cum medico aceto uncias tres, cere alba parum. Misce pro linimento.*

Cataplasma, recipit aqua *cichorii partem unam, vini rubri austeri partem semis. Misce ad ignem, & adde pulveris florum chamomeli, absinthii ana unciarum semis, olei rosati uncias tres, aceti rosati unciarum unam & mediam. Misce pro cataplasmate.*

In biliosa, fomento, quod constat ex aqua vel succo endiviae vel cichorei permixto cum medico aceto, & succo absinthii, vnguento fentalino vel rosato *specierum aromaticarum* coratillo cum drachma una olei de absinthio, praefero cataplasmata. Quia nec cito exsiccatum & humectant, concoquunt, digerunt, refrigerantque plurimum, ita ut nunquam meminimur me ejusmodi remedium jecori in hac febre, ut in alia quacunque biliosa applicuisse, cum non statim postero aut tertio ad summum die evidens auxilium attulerit, fiti immittit, & urinis redditus jam flavioribus. Vt loco balnearum, quorum jam in febribus usus obsolevit, hac cataplasma ad me felicissime subsistunt.

Horum unum, quod familiarius est, *Recipit farina hordei libram unam, sursum modice novem tritici uncias tres, aqua endiviae & cichorii stillatae ana quantum sufficit: ad ignem misce, & adde pulveris rosmarini unciarum unam & mediam, absinthii unciarum mediam, niri pulverati drachmam mediam: olei rosati completi uncias tres. Misce f. s. a. Cataplasma.*

Obstructions meatuum cutis, frequentissimi putredinis fomites, quae semper adeo confueverunt ob crassum lentumque humorem & ambients

florum chamomeli pulverati in seipso fuit.

Decoctum chinae & radicis parille.

Potio Plinii Valeriani.

Pomum acetosae.

Cataplasma.

Cataplasma ad libitum.

Rosmarini vel triduum vici.

bientis refrigerationem, aperienda sunt, fordes cutis limum detergentibus, attrahentibus ex alto, & attenuantibus eluenda; ut his libera fiat totius corporis transpiratio, cessetque putredo vel paulatim deficiat. Igitur madefat cutis totius corporis panno lineo madefacto cum sequenti aqua.

*℞ tartari vini albi pulverati & exsiccati libram mediam, niri pulverati & ad ignem exsiccati uncias tres. M: ponantur in olla munda ad ignem, & cum charta accensa inflammantur, ut totum comburantur in nigrem carbonem, superinfunde aqua fontanae & succo citri vel pluviae libras duas, colatur per mantem *hippocrati* vel filtratam. Postea abluantur fordes cum panno lineo madefacto in aqua tepida, & fiat ita inunctio. ℞ trochiscum florum chamomeli, vel florum chamomeli pulveratorum quantum sufficit, dissolve cum oleo chamomelino communi, vel parato eo modo, quo subjungam, ut fiat linimentum, quo totum corpus erit inungendum.*

Inimentum.

Trochisci chamomelini.

Oleum chamomelino.

Constat ex resatu viridibus.

Cataplasma ad libitum.

Rosmarini vel triduum vici.

Nam quod attrahend humores ex alto id praesent in tanta humorum copia & putredine, verisimile non est, cum parva portio horum humorum educi per vesicantia queat, nec nili sit, qui in exihibus venit cuti & carne proximis vagantur.

Q. Serenus Sammonicus de Hemitritia remediis ita inter alia cecit:

Nonnulli meminerunt ad eum prodesse leoni, Esitimo percutio eo corpore toto, cum digerendi & emolliendi curem, attenuandique humoris virtute polleat, & cichorii tumoribus fit apicissimus. Profecto Plinius leoni adipem cum rosaceo quotidianis febribus mederi scribit. Ejus loco oleum vulpinum, vel adipis vulpini substitui potest, vel canis rubri.

CAP. XIII.

De Periapitis.

INVENIO & a veteribus in curatione hujus febris non fuisse omitta periapiti. Pellus in eo libro quem de *Lapidum viribus* inscripsit, tradit adamante suspensum Semitertianas febres exingere. Memini cum effem in Austria, incidisse me in maxime illustrem virum Gondacherum a Liechtenstein, qui nili naravit se, cum efficit natura & temperamento prorsus melancholicus & capite admodum calido, ac ad maniam propenso, non potuisse longo tempore somnum capere sine insomniis turbulentis perpetuis, solo adamante auro incluso frontis foras brachio supra cubitum, quo loco fonticuli hifce temporibus inuruntur, alligato in forma armilla, ita ut adamas tangeret semper nudam carnem ab hifce molestis plurimum liberatum. Erat adamas plenus & latus duorum vix graniorum pondere.

Idem ad febres arundas, quibus alias erat valde obnoxius, praecipue tertianas collo quoque suspensum gerebat lapidem lazuli: nec interea dum hoc portaret, se a febre aliquid allevaret. Smaragdus teste Alberto Magno collo suspensus sanat Hemitritanum. Q. Serenus tale habet:

Caravum atque crinum curio comestisse feli, Nec debitis illi viridibus misere commisit feli, Talia languenti conducunt vincola collo, Labalque digerunt, miranda potentia, morbos.

Qua autem ratione citando, ut periapiti vires suas in nobis exercent contra raptum vulgi in *Epistolis Anatomicis* claris & amplis latinis docuit. Et in commentariis in *Petli libellum de viribus lapidum* lingua Italica conscripsit.

Sed an ea omnia, quae a scriptoribus periapitis attribuntur vera sint, accuratissima in singulis digere obsequium, quos ea tantum, quae scimus, sic docuimus, quando contingant, ut sapientis animus facile possit acquiescere.

CAP. XIV.

De Maligne Semitertianae internis externisque remediis.

Hec quae jam recensuimus, benignae Semitertianae conveniunt: Quod si maligna sit aut expectetur, eadem conveniunt, & quae alicui putredini & contagiosae resistunt. Ideo jussulis & jussulis alteratis uncia una aquae cordialis miscenda erit.

Adipis leonis.

Adamas citri contra febres valentia.

T. idem lazuli contra febres.

Smaragdus.

42

da erit. Peculiariter *scordii* medicum aceto incoquantur, vel aqua cum qua *osymel*, vel aqua multa paranda est. Dentur aquae cordiales ante cibum hora una, aut pulvis de *hyacintho*, vel si initio lumbrici adsint & alvus fluida. *cornu cervi* usque preparatum cum aqua *scorzonera*, terra sigillata ana scrupulis duos, margarinarum preparatarum drachmam mediam, specierum de gemmis frigidis scrupulum unum. M. cum frupo de corticibus citri, si pituitosa fuerit; sin biliosa cum frupo pro acido citri, & sunt boli numero quatuor. Capiat duos singulis vicibus, hora una ante cibum.

Si alvus adstricta est, *cornu cervi* incoquantur, *corvulinum*, *rhabarbarum* paribus portionibus, praeparandum ad drachmam unam cum aqua grauinis. Etiam paulo ante paroxysmum in omni febre malignitatis futurae notas praefere se ferente confuevi dare. *terra sigillata Tocayensis*, vel sigillata orientalis, vel *Silestace*, *cornu cervi* usque tenuissime triti ana drachmam unam, salis *absinthii* scrupulos duos, pulueris *trochiscorum caplae* ana drachmam mediam, Misce pro tribus diebus, dentur singula cum aqua cardui benedicti usque tribus vel quatuor. Datur a me pauperibus in pituitositate Semitertiana pulvis *baccarum hederae* ad drachmam unam, cum mirti graui fere, *trochiscorum caplae* graui tribus, & uncii tribus aquae cardui benedicti, vel calendulae, vel *endruve*.

Cordialibus exterius praeueniendum cor fomento, quod habet aquae rosarum stillatitiae, borraginis, mellissae aquae uncias tres; specierum cordialium temperatarum drachmam unam, croci grana quinque, aceti vel vini alii unciam unam, Misce & cum panno coccineo foveatur tepide.

C A P. XV.

De Pestilentem Semitertianam curandi methodo per medicamenta interna, & externa.

Tempore pestis febre ingruente cum horrore, illico Hemitritaeam suscipiaberis, non expectato tertio die statim antidotis est expugnanda lues pestilens, postea tractanda ut benigna.

Omissa igitur venae sectione, si corpus non fuerit valde pectoratum, & magna pravorum humorum sabura lateat in primis regionibus, capite vel electuaria lenitiva, aut alterius purgantis fuma nominati uncia una cum antidoti nostri vel alterius drachma media porrigatur. Sin indigere venae sectione videbitur propter corporis plethoram, nullo apparente pestis charactere, eodem ipso die cum vires consentiant sanguis detrahatur ex cubito, si charactere sanguinis adsuerit, ut carbo, vel rumor bulbi, & circa pectus, collum, caputque ex eodem etiam: si vero in inguinibus, laphena incidenda ejusdem lateris; & si maculae vel exanthemata per cutem corporis effluerint in principio, quod rarius contingit, ab ea desistendum.

Ceterum si non appareant necessitates purgandi aut venam secandi signa, illico antidota sunt praebenda, & si in perseverandum, quousque pestem huic febrim adiungit evicerimus. Neque hic per varia antidota vagandum: sed quae iam experientia confirmata sunt huic febre plurimum profuturum, ut theriacum, mithridatum, diafordium Fracaforii magopore laudo, variis modis castigata pro intensiori & remissiori colore.

Diafordium Fracaforii recipit *cinnamomi*, *casie*

Adriani Spigellii

lignae, ana unciam mediam: *scordii* unciam unam, diadami *Cretici*, tormentillae, *isfote*, *glibani*, *gummis arabici* ana unciam mediam, *opii drachmam unam* & mediam, *styracis drachmas quatuor* & mediam, *acetosae* (malum fenum quam herbam) *drachmam unam* & mediam: gentianae unciam unam & mediam: boli armeniae, terra sigillata singulorum tantundem: pipere longi, *zingiberis* ana drachmas duas: mellis albi de *staphis* libras duas & mediam, *vinum armaticum* libram mediam, *fasciari* rosati libram unam, Misce.

Cornelius Gemma in Hemitritaeam pestilentem; quam scribit praecessisse veram pestilentiam, satis frequenter se ipsum scribit diafordio, cujus compositio infanti theriacae ex variis & contrariis invicem fermentatis constat. Habet, inquit, pro basi *fordium* (omissis simplicium ponderibus quae quilibet peritus artifex pro suo ingenio adijcere poterit ex ejus verbis sequentibus) inde dictam *compositum*, *absinthium ponticum*, *epithymum*, cum resis *Alexandrinis* habet & *semina plantaginis*, *nucis pinii*, *melomum*, *lactuca*, *papaveris albi*, *erratia*, *cucurbitae*, & paulatim in minori proportione, *radicum gentianae*, *angelicae*, *zedariae*, *psendodillii*, *nucis myristicae*, *macis*, *croci*, *pipere albi*, *myrris*, *cinnamomi*, *corallinae*, *rhabarbari*, *xyloides*, *gummis beliziani*, *massichis*, *boli armeniae*, *camphora* pro parte aquales: cum aliis odoratis & indoratis, ut *masse*, *osse de corde cervi*, & similibus paucis, quae mira proprietate vitalem spiritum atque animale recreant, omnibus exceptis saccharo & vino adeoque digestis in formam optati. Mirum in modum ea confectio venenis, serum corruptelae, & morbis pestilentibus relictur: sudores atque urinas extemplo provocat, vires contractas citius expectantiae redintegrat.

Frequenter usu venit, ut aegri purgatione & antidota statim quam assumpta sunt vel paulo post revocant. In hoc casu praedicta cum succo limonium aut granati acidi, aut aceto rursus porrigenda ad repetendam, donec retertatur, cum succo retineant, exigua fere saluti superest.

Nunquam me fecit antidotus mea, cujus drachmam dedit cum aceto endiviae vel cardui benedicti: tantumque eo profeci, ut non modo semper prima vice retineatur, sed, fed etiam nauseantem ventriculum eo corroborari, & inappetentiam ciborum abegerit, sudoribus venenum ad cutem propulsa.

Compositio ejus est talis. *scordii drachmas duas*, *poli montani*, *pingetii*, *diadami Cretici*, *albena*, *prassii* albi, *origani*, *calamennae*, *hyssopi*, *centaurii minoris*, *eschulae*, *chamaedrys*, *cardui benedicti*, *chamaepitys*, *spica nardi* ana drachmam unam: *Semini albi*, *cymini*, *carvi*, *perovisii*, *feniculi*, *cardui benedicti*, *citri*, *danci*, *isfote montani*, *oxalidis*, *ruae*, *ocimi*, *hormini*, *thlaspi*, *baccarum lauri*, *hederae*, *juniiperi*, *seminis paeoniae maris* ana scrupulos duos: *radicum aristolochiae rotundae*, *imperatoriae*, *gentianae*, *diadami albi*, *asari*, *valeriana* ana drachmam mediam: *radicum angelicae*, *petasitidis* ana drachmam unam: *storum calendulae*, *verbasci uniculis*, *caryophylli altilis*, *beronica* ana drachmam mediam: *zingiberis*, *nucis muscatae*, *caryophyllorum*, *pipereis*, *croci* ana scrupulos duos: *lactymae cervi* (si haberi poterit) drachmam mediam. *Cinnamomi electi*, *myrris*, *castorei*, *styracis*, *calamite* ana drachmam unam & mediam: *mellis boni* quantum satis est, ut fiat Optatum.

Aqua

Aqua pro peste
& Hemitritaeam
pestilentem.

Aqua pro peste & Hemitritaeam pestilentem valde expertam in nolo compositum Vienneis extra portas, quod Lazaretum vocant, anno millefimo sexcentesimo decimo tertio, & hoc prioribus cum effem Vienna: *baccarum pipereis viridis*, *solorum ruta* ana manipulos decem: *theriacae Venetae*, *angelicae* ana drachmas decem: *radicum pimpinellae drachmas quindecim*: *boli armeniae*, *radicum levistici*, *valeriana*, *aristolochiae rotunda* ana drachmas quinque: *Myrris*, *castorei*, *galingae*, *camphora*, *nucis vomicae* ana drachmas duas & mediam: *Crocus drachmam unam*. Quae contemnedenda sunt, contemnedenda & incandescant, & in optimi aceti vini albi libra una, aqua vitis libris media infunduntur omnia, permixta in phala vitrea bene clausa quiescat. Et in aqua fervida per quatuor horas pone, ne nimium bulliat, mox in alio vitro transfundatur ad usum.

Decodum
salis.

Maquam auxilium falsae decoctio deprehendi propria experientia, optimis rationibus ad eam allecitur, prorsusquam in locum Cornelii Gemmae incidendum, in quo magnis laudibus hoc remedium esset istidem prope rationibus, quibus & ego permotus. Testimonium ejus notatum dignum hic describam. Dicit (inquit) non potest, quam multos curaverim, uno decocto *Zoraparrillae*, si quando in diploide vel usque dupli paratur: sic enim spiritus illius substantia non exhalat, sed per reflexum continens, cum potius totius corporis denso permiscetur: atque tum contra pestiferos morbos sive venena validius profigit, quam per principii nostrorum corporum reforandis mirabiliter concepti analogiam. Nam quidquid alii statuunt de caliditate nimis climatis, eundem vel in ardentissimis febribus, naturae oppido bisulsi, ventre purgato paululum, ac statim a crisi primo rudimento, plus centies usus fui: ac rationem citius successus ubique felicitas confecta est. Nec aliud habui rationis fundamentum quam Galeni methodum in exploranda simplici facultate, quae ita sepe composita a natura dicit, ut nomen simplicium praenostri compositis ac peccatis omnibus essentur. Videbam in illa radice spem primo solidam, atque decoctum etiam pingue quiddam recreantem, & calori humido confectum: sequitur hunc amaritudinem lenissima sensum se aperient tum abstergendis usque atque visceribus oportuna. Postremo tentandi diutius etiam alie demerita operum explicat, calor non vult, neque falsus & mordax, sed subtilis voluerit, ut in recessus altissimi partium solidorum possit vel momento temporis pervenire. Quomodo quia morbus compositae naturae, hoc paulatim conquiri, roborari, alia veluti fecerit, absterge, dispellat, dissipi, aperiri, usque ad minutissimas corporum partes: quia rursus conservanda virtutis prima ubique est indicatio, quod hac per se Medicum curationem quasi ex accidentibus perficiat: idcirco me aberrare non posse sciebam, si hoc insigni divinum munere tanquam locis ipsius manibus hydram immansissimam oppugnarem. Quod certo sciam in hoc uno medicamento & nutritum quidem vim inesse mirabilem, & facultatis deleterie vinacem, abstergeat ac patetidine curavimus. Imo, ut verbo dicam, in sunt ad usum custodiam principii utriusque semina non obscura: alterum, quod in solidis partibus substantiam humidi primigenii possit reficere: alterum quod cum spiritum calorem aetherem resaturae, quanquam dubio procul non omnibus aquae conveniat in eadem specie morbi, quin quantitate, qualitateque rerum ratio sit una in calculum adhibenda. In multis etenim adjunctis majorem partem radicis plantaginis, eringii, asparagi, caryophyllatae, in alia lignum aloes, cinnamomum aut aliud quidquam, uno sub-

inde decoctum ceteris parum duntaxat ipsius rassa, quo velut additis aliis, quod reliquum foret, celerius multo vel in corpora penetrare vel in externam circumferentiam permeare. Sed ego falsae, ut dixi, decoctum cum cithoraceis altatudo in de simplici Hemitritaeam china. fed ante potum ejus premitto antidota, reliquumque curationem evicta malignitate cum hoc decocto abfolvo. Pauperibus in falsae decoctum radicem granum porrigi potest.

Externis quoque remediis pugnamus et ad verus pestem, ut deo *scorpionum Mathioli*, ugendopulantes arterias crisi tempora, collum, carpos manuum, circa umbilicum & microthoracem cartilagineum, & circa cor eadem innuocui facienda, applicandum quoque pannus coccineus madefactus vino non valde potens, vel aceto usque rem commorata distillat. Quomodo si ad manus ea non fit, tum olea *scorpionum* communis cum drachmis duobus mibridatis vel theriacae *Andromachi* erit permiscenda.

C A P. XVI.

In Declinatione Semitertianam, crisi, commutatione quid a Medico praestari debeat.

Sed ad benignam Semitertianam revertantur, quae debet esse tanquam norma & regula altum, ubi ea in vigore confluerit videndum est, an crisi morbus fit habiturus & qualem; deinde quam commutationem fit factura cum eo natura in alium morbum, an recidivam facturus sit, nec ne, an sponte solvetur. Hae omnia commodum ut praevideant quidem, a me in praecedenti libro sunt quam plenissime explicata.

In crisi perfecta quae rarissima est, nil tentandum, in imperfecta adjuvandum naturae conatus, atque per quas vias natura ducit humorem morbificum cum aliquo levamine aut facili tolerantia per eas etiam ducere oportet & promovere. Per urinas, diureticos; per alvum, blandos dejectorios; per sudores, fudoriferis; per abcessus, maturantibus. Atque hoc tempore maxima & praecipua indicatio est concoditionem naturae una adjuvandi: quoniam cum paulatim & veluti per partes concoditur, id quod concoxit, etiam separat & excreta. Quod vero adhuc crudum est, retinet.

Sed quaerit hic aliquis, an quod exercent naturae ante perfectam crisiem & abscidant, non possit concoctioni relictae adhuc materia obesse? Dicitur Hippocrates lib. vi. *Epidem. sect. 11*: *Quae congaque oportet, conclusa esse oportet*. Itaque requiri hic videtur indicatio potius laxas partes, per quas natura exercent humores concoctos, adstringendum, ut melius concoquat. Quocirca non videtur opus in crisi imperfecta dejectorios, fudoriferis, diureticis, sed concoctioni totius incumbendum.

Respondeo, hic signa concoctionis esse inspicienda in urinis, & alvi excrementis; quae si fuerint laudabilia, atque superare signa cruditatis longae, adjuvandum erit naturae exercitibus conatus. Si vero tantum leve appareat signum concoctionis ac veluti ejus initium, concoctioni erit incumbendum. Morbum, in quos ex hac febre est transitus, natura debet esse Medico quam diligentissime perspecta; eorum, qui commotiones sunt curationem in sequens iterum habet trademus.

F 2

A D R I -

& regio, & ipse cibus, quo delectatur ager. Nam si hic parum nutrit, sapius offertur, quam si multum: tenuior enim citius plenior concoquitur. Hæc igitur quoque in definienda cibi quantitate sunt consideranda. Nam pueris & adolescentibus, quorum corpora crescunt, plus dare oportet, & etiam bis in graviore die: senibus femel sufficit, & minus quam proportio magnitudinis corporis postulat. Qui famem facilius tolerant, semel in die graviore cibentur. Qui statuta longiori sunt & graciles, crura habent longa, bis cibentur, sed pauciore cibo pro singula vice; breviori statuta praeditis & quadrato corpore, femel & copiosius; quod in illis celeris cibus & excrementa ad alvum transiunt, & minor fit ventriculus, in his contra. Hyeme & vere atque etiam autumni parte, quæ hyemem attingit, plus & saporis porrigitur omni morbi tempore, quam æstate. Si regio fit, quo multum digerit, ut septentrionalis aliqua, maxime Belgii & Germanie tractus prope Oceanum, & Scythia, quæ est maxime vorax, plus quam in aliis regionibus cibi porrigatur, & bis in die graviore. Effe quoque Africa cœlum Celsius commoratur, sed quo multo die ager abstinere recte videtur. Contra in Ægypto & Asia multis partibus famem homines facilius tolerant; sic ut in ea regione quadratunam illam famem, quam olim febricitantibus initio Medici præcribent, facile tolerare poterint. Alperior & altior montium incolæ magis voraces sunt his qui in planitie habitant. Ego & illis bis cibus die graviore offerendus & copiosior, his semel tantum & copia minori.

Sit igitur pro exemplo Semiteriana acuta laborans, vigintiocto annorum, temperamenti parumque calidi & humidum, Patavii in patria civitate decumbens, famem facile tolerans. Huic in die graviore semel porrigitur cremorem hordei unciarum octo vel decem pondere, aut alium ex cibis commemoratis. Quod si non facile possit famem tolerare, bisque propterea fuisset cibandus, singula quoque vice uncias sex præbere cremoris hordei, aut liquoris panatellæ, deinde interpositis horis quinque eandem dosim liquoris die graviore, crassioris die leviori.

Quibus horis
fuit cibandus.

Horæ autem, quibus quotidie sunt ægri cibandi, eligende sunt, quibus videbitur universum corpus æqualiter esse digestum, ut nullius (utor Galeni verbis lib. de Crisima, cap. vi) aut frigoris, aut caloris rationem inter se corpora partes dissentiant; id est, quando jam declinare febris incipit. Contingit aliquando in hac febre, ut pedes magis caleant toto reliquo corpore, idque in declinatione, quando natura pellit calidiores fuligines ad partes externas. Igitur etiam tunc corpus inaequalem calorem conceperit, a cibo non est abstinendum, dum animaverit utinam eandem ejus febris esse peculiarem declinationem.

De somno.

In somno notandum, ut in principio paroxysmi ægrotus ab eo abstinere, procurandumque ut is in declinatione febris obrepat, quæ in hac febre post medium noctem plerumque contingit. Quod si nullo tempore somnum capere possit, præterquam initio paroxysmorum, & cum facile toleret, sinendus est ager ut tunc dormiat.

Optima in hac
febre esse videretur.

Namquam in hac febre ad suppuriferam, quæ opium conti-

nent, veniendum est, ubi spacio vigintiquatuor horarum vel una vel altera hora dormire animadvertitur. Morbo enim ad judicationem tendente expectandum est longissimus somnus. Quo tempore quidquid somni naturæ antea detractum est, hoc ita reficitur ut præ nimio somno lethargici evasisse videantur.

C A P. II.

De Viçtus ratione pro maligna & pestilenti.

Alis igitur victus ratio, qualem recensui, in benigna Semiteriana insinuat. Id. Quod si pestilens fuerit, multum mutanda; si vero maligna, media via erit procedendum. Igitur aer cubiculi, priusquam ager in eum deferatur, exsiccandus est, igne in medio cubiculi accenso, & constructo ex lignis odoriferis cyperi, juniperi, lauri, qui non tantum, ut plerique faciunt, sed copiosam flammam edat. Deinde olla aceto plena eodem loco carbonibus ignitis superponenda, cui folia pulegii, rosamarinii, ruta, origani, radices angelicæ, & petasidii indita sint. Acetum, in quo pulegium & radice angelicæ macerata fuit per noctem (sepis naribus, spongia eo imbuta vel linteo tito, admoveat oportet. Vngere mentum & narium foramina antidoto nostro vel alio, cui modicum acetum permixtum sit. Sed & barbam si vir sit, eodem inungere optimum erit, quo expiret aliquid in circumstantem aerem, qui postmodum ab egroto per os attrahitur. Aut vino malvatico aqua rosarum tertia pars addatur, & stillatim cadat super lapideum molarem ignitum aut filicem.

Trochisci pro
digestione.

Pastilli seu trochisci pro suffumigio paucis carbonibus ignitis injiciendi, ut paulatim consumantur, nec valde comburantur, ut Ladani purissimi drachmam unam, styracis calamitæ, benecini ana drachmas duas, myrrhæ electæ, ligni albes ana drachmam unam & mediam, pulvis corticum mali citri, caryophyllorum, cinnamomi electi ana drachmam mediam, gummi Arabici dissoluti cum aqua rosarum modico quantum est satis, fiant trochisci parvi, adde amburi & moschati dissoluti in eadem aqua gramum unum. Pauperiores utantur bacca juniperi in ignem projectis.

Potus fit syrupus acetosus simplex, aut hydrosaccharum aromatizatum speciebus cordialibus temperatis, vel de gemmis frigidis, vel de hyacintho, seu aquarum endriviæ, foronæ, cardui benedicti ana libram mediam; aqua sivealiis, in qua drachma una cornu cervini & eboris macerata sint, libras quatuor, pulegi rosati uncias quatuor, succi limonum uncias duas vel tres pro gustu. Melle, si pituita aliqua pars prævaleat, syrupus de corticibus citri uncia una vel altera addatur, aut syrupus de mentha. Si deest focus limonum, substituantur pauperibus septentrionalibus succus herbarum, oxum cerdarum acidum, succus acetosus depuratus. Si phrenitides aut insignes aliquorum viscerum inflammationes non adlinit, dandum est vinum aqua endriviæ, vel cardui benedicti, citri, fragariæ, eulii, foronæ dilutum, addito modico succo limonum, aut mali citri aut aranci. Nam ab his officium ventriculi roboratur, & vapores, ne ad caput ascendant, a partibus infernis prohibentur. Si potens valde fuerit vinum & subdile, quod æger nauseam movet & subvertit ventriculum, succi acidæ præscriptorum aliquid addatur. Si vero austerum ac debile, ab hoc abstinatur.

abstineatur. Cerevisia tenuis etiam pauperioribus concedi potest, calefacta tamen, & in qua bacca juniperi aut aliquot femina cymina leviter ebullierint. Dabitur calida vel refrigerata cum modico succo limonum. Cavere tamen oportet ab omni potu glacie aut nive refrigerato vel perquam gelido, quod partes spiritales eo non parum offendantur. Procurandumque etiam ne sitim ægri valde tolerant: quia vires ejus tolerantia labefactantur. Sic & modus habendus est, ne etiam nimium bibat, quod possit cruditates augere, nec a valore confici.

Cibus,

Cibus quoque hic debet esse plenior, quam in benigna Semiteriana: & pestilens adhuc paulo plenior, quam maligna postulat: Quapropter summo prope cavendum Medicis, ne in pestilenti Semiteriana victus rationem insintant, prout in aphorismis præcepit Hippocrates. Bis & ter quaterve in die dandus est cibus, minorque singulis vicihus quantitate, sic ut non oneret naturam & vires conserventur, quæ in hoc morbo dererente concidere consueverunt. Atque non solum in declinatione paroxysmorum, sed etiam in principio paroxysmi si syncope vel animi defectu ægrum affligat aut lipothymia, porrigantur forbitiones ex jure pulli cum acetosæ succo, vel pulvere manus ejusdem, aut cremor putææ cum mannis christi perlato dulcoratum, aut ovum sorbile cum panis frustulato præbendum in vino aqua acetosæ diluto intincto: ut lactuca & acetosæ coctis in jure carui semper in initio paroxysmi tenuiori uti victu, ut forbitonibus jam dictis, in declinationibus paulo pleniori, ut solidiori cibo, contusis caponum cum emphaco aut succo mali aranci. Carnes quoque concedende sunt caponem, perdicem, vituli, pipionem, turdorum cocta cum capparibus aceto conditis dictis Genueisibus, vel floribus mali citri & aranci, vel fructibus eorum omnibus in aceto prius maceratis. Dari etiam possunt carnes assæ, si æger mandere poterit, vituli, caponem, perdicem, turdorum, & aliarum avicularum montanarum. In stato capiat juris glaciati tria vel quatuor cochlearia facti ex pedibus vituli in aqua coctis, vel carne vitulina & capone cum vini albi modico, cum corticibus & palpa mali citri aut eorum floribus aceto maceratis, coctis omnibus usque quo tabelleant, addito sili finem aceti momento, & saccharo perlato, ac cornu cervini assæ. Consummata etiam laudamus caponem & carnis vitulina. Ius expremum ex carne capiti femiassata, ut in Galliis fieri consuevit cum succo mali granati acidi vel aranci.

C A P. III.

De Curatione symptomatum & morborum, quæ frequentius huic febre superveniunt, vel impleantur, vel post Semiterianam comparent.

Symptoma varia morbosus acutus ac diuturnus huic febre supervenire aut subsequi, aut cum ea nasci plerum in secundo libro recensuimus, quorum quædam artus comparent, quod tamen ne dicam frequentissime conficiuntur, ut capitis dolor, sitis, lingua arida, nausea cibi, fastidium, lumborum dolor, phrenitides, vigilie, lethargi,

vertigo, epilepsia quasdam species, timor Germanis dicta, alvi fluxus, dysenteria, colici dolores, recidivæ, & mutationes in febrem dyentericam, tertianam, quotidianam, quartanam, abcessus. Horum pene omnium quancum exacta fatis curatio videatur a recentioribus tradita, tamen peculiariter remedia, quibus ad ea tanquam arcanis hæctenus felicissime usus sum, opere pretium duxi in gratiam tyronis hic adjungere.

De Dolore capitis.

Primum ad capitis dolorem, præter cucurbitulas cruribus aut scapulis cum scarificationibus adhibitis, confert etiam balneum vesperi pedibus administratum, in quo sequentia incoquenda sunt. *vel solum ruta, verberna, salvia, florum* (si defint) *solum sambuci ana manipulum unum; florum chamemelii, meliloti ana Manipulum unum; salis nancias duas, sursurum tritici manipulos duos.* Assise. Fronti cum stuppa cannabina diligenter baculo confusa, ut fiat mollis, adhibendum oxyrrhodium. *vel rosolaci unctam unam, aqua rosarum unctam unam & mediam, aceti rosati vel sambuci unctam unam, alburnum eui unam, pulvis caryophyllorum, majorana ana drachmam mediam, verberna singulas duas.* Assise. adhibetur tepidum hyeme, ætate frigido tito fronti, si aut & tempora late obfudet. Addege interdum solem melleo perficimus res vel quatuor, vel malorum armentarum diligenter contulorum cum suo rubro exteriori cortice ad majorem diffusionem. Pauperibus solia mali persica fronti fructuose applicari consula.

Esti pedum.

Oxyrrhodium
non fuit
applicandum.

C A P. IV.

Ad sitim.

Pro sitis extinguenda os aqua non valde frigida saepe collatur. Plurimum ad hanc facit cataplasma ex farina bordei, succo cichorii, oleo rosato, quod supra descriptimus; utroque hypochondrio late adhibuit. Ossa prunorum damascenorum coctorum in ore detenta, & ipsa pruna comesta: pulpa citri aut aranci acidi pulvere sacchari cuncti asperso, macerata in aqua rosarum vel endriviæ.

Cataplasma.

Hemitritæo depellendo trochiscus apud Plinium Valerianum libro tertio: Et ad febricitantes ut non sentiant ardorem stomachi & febris, & ad solis ardorem nimium: Recipe succi ghyrrizæ (quo recentior, eo melior) drachmas sex; seminis cucumeris hortensis quatuor, tragacanthi duas, quæ tres singillatim, & permixta cum albo ovorum, & facies catapota. Hæc defrutilla quoque ad sitim maxime faciunt, etiam tantum in ore detineantur.

Cap. 4.
Trochisci
Valeriani.

C A P. V.

Ad linguam asperam.

Linguam asperam, etiam si fauces & guttur aliquo modo inflammata sint, ita curabis. *vel muciaginis seminum psyllii & gdonæ extracæ cum aqua violarum in qua ghyrrizæ perlato per horam macerata sit uncias duas, eo tingatur pannus lenis, & superponatur lingue, postquam ablata est cum aqua bordei, in cuius singulis libris salis nitri drachma una dulciter, prius addita una vel altera gutta olei caruati. Dedi aliquando pyropianum drachmam unam seminis psyllii orientalis ex aqua communis vel pernicæ nancis tribus; maximeque profuit, quando suspicio erat*

inferant manum vel digitos & extrahant, statim deglutit pullus. Quare summa diligentia & cura est opus, ut habeatur: siccatur in umbra & in pulvere teritur. Sunt qui ei alia medicamenta & aromata admiscunt, qualia ad morbum caducum valere ajunt scriptores practici. Hujus loco lichenae equorum in pulverem redacta substatuantur.

Scio vertiginem, epilepsiam, apoplexiam a variis causis oboriri posse, & harum magnam partem una cum febris Semitertiana causis implicari, ad quae praescripta remedia non semper conferunt. Quoniam tamen plerumque ab his causis oriuntur, quibus hac remedia plurimum succurrunt, idcirco ea praescribere hoc in loco non sum gravatus, ut unicuique magis tanquam experta in promptu essent, donec accidentum causa melius sit Medico diligenter perspecta. tunc si alia fit causa per se subsistens, ea talibus remediis est profliganda, quae a doctis praecipis proponuntur.

C A P. XII.

Ad alvi fluxum & Dysenteriam.

Alvi fluxus & dysenteriae blande & cum summa prudentia primum tractandae. Prohibendae enim ne aut nimium fluant, & sic vires debilitentur, aut brevadiutringantur. Periculosum namque. Quibus natura ad tabem vergit, ut angustio thorace praediti, & graciliores, & praedurus est lien vel jecur, citius sisti debent. Et his majore cum diligentia initio procurare, ne cum impetu quodam validiore fluxu oborto vires illico deiciantur. Denuo igitur flos de stillatum ad libram unam cum uncis duabus aqua fragariae, vel uncis tribus emulsionis seminum melonum facta cum aqua hordei: julecula alterata cum plantagine, cichoreo, fenicho, pileosella, quatuor seminibus frigidis, aqua beate virginis thermalis librae duae cum succo cichorei uncis duabus in primo cyatho, & alia ejus generis. Multi tanquam ab oco resuscitantur decocto salsa parille alterato cum quantum aeger velit. Multis quoque profuit jus carnis alteratum cum radice alcae, vel floribus conyzae minoris. Considerandum praeterea, an peltiens feul malignus & contagiosus sit fluxus aut dysenteria, nec ne. Nam talis in hac febre tempore autumnii integros magnosque exercitus militum depopulare nonnunquam consuevit ob fructus, quos comedunt plurimos, & carnes recentem macatas. His magnam adiutorium est recens heriaca drachma una cum cervisilla calida propinata, aut jure alterato cum cichoreo, plantagine, cardus benedictus, vel bulbus, qui a terra sigillata, carum cibus assil singulorum drachmam unam: seminis plantaginis scrupulum duos, specierum de hyacintho drachmam mediam, vel lapidis beccar grana decem, cum succo cichorei aut conspersa rosarum, sunt boli pro quatuor cicibus sumendi mane & vespere media hora vel paulo plus ante jus alteratum.

Perquirendus est etiam aeger, an ei es amarecat, nec ne. Nam quibus in ore amaritudo est, his purgatio blanda instituenda. Vt sero caprina depurata cum scrupulis rosarum solutivi uncis duabus in primo cyatho, vel aqua beate virginis libris duabus, in quibus pulpa tamarindorum uncia media dissoluta sit.

Si adstantium aut amicorum precibus aut aliis necessitatibus, quae protinus ventrem fistendum esse persuadent, ad miraculum usque tibi satisfaciunt placenta quae fit ex pulveri florum conyzae drachma una cum ovo integro hoc est, albo & luteo ejus diligenter commixti & in sartagine fricti cum butyro vel oleo olivorum. Datur hac ad comedendum tribus diebus continuus mane jejunio ventriculo horis quatuor ante prandium.

Venter (ut externa remedia quoque attingam) ungendus oleo rosato omphacino completo, vel oleo cydoniarum & masticino. Placenta ex ovii ventri applicetur, & ova integra, id est, cum albumine & lacteo diligenter cantusa numero sex: pulveris conyzae media vel minoris (flores eligo magis, quam folia) drachmas duas, Melle & cum oleo olivatum vel masticino in sartagine igni admodum fiat placenta, quae linteo raro ac tenui involuta late per totum abdomen & calide applicetur, fascia prohibendo ne decadat. Vel omentum castrati superponatur in oleo rosato & masticino tepidis, in quo prius flores conyzae ebullierint, blande ne comburatur calefactum.

Et quoniam dysenteriae tenefimus praecedere vel concomitari solet omnibus modis, ut is mitigetur & sedetur, erit studendum. Lacte igitur recentem multo cum medice saccharo postquam bis terve alvus est abluta, suffumigium ano extrinsecus adhibendum, quale est quod sequitur. Pulveris menthae drachmam semis, rosarum rubrarum florum verbosici, masticis, olivani una scrupulum unum, melle vel melle masticis scrupulum medium cum resina thebainica, flori roschachi pro suffumigium. Pauperibus quoque ex resina pini, vel thebainica, resina cyperi vel tartari, vel melle piceae cortice fiat suffumigium.

Fomentum quoque cum spongis madaefactis decocto calido sequenti adhibendum supra os facrum exterius, ita ut ad anum perveniant spongiae madaefactae & ipsam cooperiant. V. foliorum bursae pastoris, foliorum & florum thapsi barbati singulorum manipulos duos, florum rosarum rubearum manipulum semis, corticem nucis piceae unciam mediam. Vini rubri medicis & anseri libras sex, bulliant ad horam lento igne, & colentur pro fomento.

C A P. XIII.

De Colicis doloribus.

In prioribus libris dictum est colicos dolores praeter morbis hanc febrem maxime concomitari, vel subséqui: imo quoties aliqua crisis expectanda est, hodie praeter ceteris crificos modos esse magis expectandos.

Per colicos dolores intelligo eos, qui non tantum tenuia (quos post Hippocratem ceperunt proprie ileum & dolores iliacos appellare) fed & crassa intestina (quos colicos proprie nominant) obfideri consueverunt, & quos utroque Hippocrates semper uno nomine proprio, scilicet ilei nobilitavit in suis aphorismis. Neque tamen omnes intestinorum dolores tam tenuium quam crassiorum, sed eos praecipue quos Dioscorides magis proprio nomine dignatus est appellare colicos paroxysmos, id est, dolores intestinorum periodicos. Nam ab aliis doloribus intestinorum hi differre videntur, quod illi magis continuus sint, quousque vel a natura superentur, vel naturam

naturam superent: hi vero redeant per paroxysmos magis, ut aliquando animadverterim agrotos, qui in imperitis Medicos inciderant, vel malam vicibus & medicamentorum rationem erant fecuti, per biennium ab hac febre soluta colicis paroxysmis molestatos fuisse, quorum pluri circa vespere exacerbantur quotidie, veluti quotidianarii cum febre continua quotidie fe exacerbante vel invadente post intermissionem febris, tanquam novo paroxysmo. Sic & quidam alternis diebus exacerbantur aut invadunt tanquam tertiani, alii plurimum dierum intervallo. Et rursum vidimus eos, qui per plurimum dierum intervallo repentes, multos dies continuos agros misere affligant, circa vespere nonnihil acrius molestantes, mane vero nonnihil remittentes, deinde per octo, decem aut plures dies proflus intermittentes.

Horum dolorum causa.

Oriuntur hi a composita plerumque phlogosi vel inflammatione intestinorum. Hanc nobis apertissime demonstrantur cadaverum dissectiones. In omnibus enim quotquot unquam aperire potui, veram inflammationem confeximus, quae modo ileon vel jejuni intestini partem aliquam, modo vero colon tantum, saepius cum incipit eam quae intestinum colon cum ileo necit partem obfide. Vidi etiam quibus omnia & ventriculus erant inflammata una cum omento & mesenterio. Vidi aliquando & mesenterium tantum inflammatum cum levi tenuium intestinorum inflammatione. Multos qui moriebantur ab his doloribus, gangrenam hunc partium aut sphacelo mortuos: quae modo exiguum intestini jejuni vel ilei colive partem, modo magnam tenebant. Et plerumque quoties una cum doloribus colicis (qui Medicos plurimos & nobiles in arte in principio latent propterea, quia sub specie alterius morbi plerumque habeantur, aut clandestino quasi ac blando introitus eos decipiant) Semitertiana invadit cum dolore lumborum, animadverte hanc magis praeter ceteris malignam & lethalem fuisse, perissequae ex ea homines propter gangrenam intestinorum, & aliquando etiam ventriculi maculis quibuldam lividis in eo deprehensis, ac si ab hausto veneno facti fuissent, comparentibus etiam peticulis vel ante vel post mortem, vel insignibus maculis aut vibicibus lividis in dorso, quales & pestis tempore observantur, maxime quando anthracis internum aliquid viscus, fed intestina praecipue obfesserant. Dixi causam horum dolorum esse inflammationem compositam, non simplicem, tum ratione essentiae, tum ratione causae. Est enim inflammatio erysipelacea, vel erysipelas inflammatorium, quod a bile praedominante sanguinem crassum & pituitosum originem habet. Non nego tamen, quod ab erysipelate simplici aliquando oriri possint. Nam in dissectione cadaveribus alimenticam & ventriculi interiorum tuicam, quae villis continet, florido quodam plus quam decet rubore coloratum vidimus, nequaquam aliam intestinorum tuicam eo colore infectis, bilem vidimus flavamque reverantibus, & meram bilem excretam fuisse ante mortem. Erysipelas autem ut in externis partibus summam cutem obfideret, sic in internis viscerum superficiem internam

vel externam. Deponit autem natura ad intestina ejusmodi humores propter validam vim expultricem, simulatam a copia biliorum & pituitosorum humorum aliquando coctorum (ut quando dolores colici sunt critici, quales inclinant febre Semitertiana aut ex hac nata quartana, duplici tertiana, aut quotidiana solent comparere quo tempore sunt abitura) vel adhuc crudiorum, quales in initio vel augmento Semitertianae oboritur.

Propellit autem expultricis facultas ad intestina magis, quam ad alias corporis partes convenientes, propter tres causas. Prima, quia aegre per habitum corporis & citis poros tales humores depellere potest, quia etiam biliosi in venis sunt, & plurimi quoque pituitosi humores; tamen pituitosi iis permixti suo lentore & visciditate citis poros obstruunt, adde, quod efflate etiam ab aere externo plurimum ac repente refrigerato tales pororum cutis obstructions multum augeantur. Indicium huius rei non minimum est, quod balnea quae meatus cutis referando definita sunt, non mediciorum tales colicos juvare soleant. Quod temporibus frigidis, ut hyeme & autumno maxime ingruant, aut agros crudelius affligant. Quod denique adhibitis externis medicamentis refrigerantibus, adtingentibus & repellentibus dolores articulum inflammatorii & podagrici praecipue oboriantur.

Secunda causa est proptentis ad intestina natura, quod per urinas peccantem materiam expellere nequeat. Renes enim tantam humorum copiam fecerunt ac suscipere non possunt. Nam saepe intemperie calida laborant renes ob consensum inflammationis, quem habent maxime si colon fuerit inflammatum. Sed & pori ureteres aliquid do inflantur & accenduntur propter intestina tenuia, quae ipsis incumbunt, inflammata. Substantia deinde renum cum pituitoso biliofeco sanguine nutritur, papillares arculas, per quas transit urina, infarcit. His igitur de causis, cum renum facultates naturales langueant, non mirum est, si aliquando contingat ab hisce doloribus urinae suppreffiones excitari, per quas nil a renibus in vesicam calat, quod cathetere immisso in vesicam, & nil urinae per eam exeunte certo scivimus.

Tertia causa est, quod intestina sint veluti naturalis cloaca, per quam pituitum & bilem natura commodissime solet detrudere. Iam & hac facilius humores in colico laborantibus suscipiunt, quod calores naturali plurimum sint labefacta, qui hocce humores copiosos nequit digere, neque concoquere, ut antea solebat, multo minus per fluxum vel diarrhaeam expellere, humorque calidus defluens non statim apertam inveniat viam, ut in catervatim intestinorum depellatur. Vbi enim ad interiorum tunicas pervenit, eas magis contrictas & obstrictas deprehendit, & sic biliosus humor cum pituita permixtus in substantia intestinorum manet conclusus, unde putescit una cum portione sanguinis & inflammatur.

Argumentum huius rei certissimum est dysenteria vel alvi fluxus, qui si superveniat dolori colico, cum solvi. Si vero dysenteria aut alvi fluxus in Semitertiana, aliquando intemperie curati fuerint, in hunc dolorem colicum transeuntur.

Vnde constringitur intestinum luteum rubeum tunicis &c.

Porro constringuntur intestinum interiore tunicæ, & obturantur oscula venarum mæsericarum, ac labefactatur eorum calor natus, partim a causis iuteris, partim a causis externis. A causis iuteris, ut a copia pituitosorum & biliosorum humorum, a pontica horum qualitate, crassitie, & lentore, quæ plerumque sunt ejus pituitæ, quæ interiorum intestinum cavitatem implet, & interiori eorum tunice superficiæ oblinunt valideque adhæret. A causis externis, ut cibis & potu stipulato, vino austero vel acido ut pergolano Patavinorum, vel alio crudo & ex uvis immaturis factis, fructibusque acerbis. His igitur si quispium diu & continuè utatur, solet in hunc affectum facile incidere. Idcirco apud Pictones Gallorum & plerisque Germanos apud quos vina non plane maturescunt, hic morbus est frequentior quam apud alios calidiorum regionum. Biliosa materia in venis generatur ut & pituitosa, quamquam maxima hujus pars a capite destillet in intestina, & scilicet quæ internam intestinum superficiem obstruat. Quamobrem illi, qui destillationibus & obstructionibus mesenterii laborant ac folliculi fellis, magis quam alii colicis doloribus infestantur. Incidit in non paucos, & eosque in hac arte peritissimos viros, qui exiguum hujus morbi cognitionem, ne dicam nullam ab initio cum ingredebant mihi habuisse videbantur. Horum enim maxima pars in multibei sexu pro uterinis affectibus habuerunt: in virili vero pro dolore ventriculi (quia multis nausæa & vomitus supervenerant) aut dolore nephritico, quoniam in lumborum alterutro & maxime dextro dolore infirmum æger percipiebat. Hos ad ejus cognitionem nunc igitur paucis ut dicam, tempus est, desumpsit potissimum a loco & excrementis.

Horum dolorum figura.

Nam modo infra umbilicum, modo supra vel circum ipsum, vel à lateribus tantum versus dextra & lumbos tantum dolor percipitur, modo vero per totum ventrem: ut plurimum autem dextro lumbi utrinque, aut eorum alteruter, sed frequentius dexter, qui dolor fe postmodum extendit ad anteriorem regionem ventris supra umbilicum ut plurimum, & circa ventriculi regionem per transversum veluti cingulum cingens & coarctans partem ventris, quæ utroque hypochondrio subest. Quia colon, quod hoc loco est positum per transversum vel ventriculo, fere semper afficiatur, ut ideo colicus potius quam iliacus aut chordaplicus dici mereatur. Præter hæc advertendum, quod excrementa per alvum aut non reddantur, aut ægre admodum. Squidem à primo clystere (si à natura prius non sint) sponte faeces ex alvo ante excluduntur prompte faeces exeunt. At si secunda vice post aliquot horarum intervallum, alius communis injiciatur, nil redditur præterquam clyster cum pauca pituita, quam à tunica interiore coli intestini abstrahit vel detergit. Si vero clyster purgantia, quæ conveniunt, receperit, evacuat quidem bilem & pituitam, & dolores vel cessabant vel evadent mitiores, plerumque tamen aut redibunt aut exacerbantur.

Recidivæ signum satis certum capere soleo ex molestia quamcumque seu pondere, quod tamen fine dolore percipiunt ægri, & circa lumbos & per transversam ventris supra umbilicum regionem in-

fra mucronatam cartilaginem. Et major fit hæc gravitas ab assumpto cibo: quia tunc ventriculus dilentus à cibo & potu colon intestinum magis premit. His accedit (si æger debitum potus quantitatem observaverit) urina rubra, acris à bilis portione perenes una cum urina pertransfuit: quæ interdum tantum ardorem inter mingendum excitat, ut ægri videantur calculo renum magis, quam colico dolore laborare, correspondente nixi opinionis dolore alterutris lumborum, vomitibus biliosorum & pituitosorum humorum. Præter hæc sentitur ab ægris oris amaror, sitis, inappetentia, vigilie, articularum pulsus, interdum & præcordiorum calor cum febre continua plerumque quotidianæ spuræ & aliquando duplicis tertianæ nothæ typum observante, quæ nil præcaveantur, ad tabem agros & mortem aliquando deducunt, nisi per maturum abscessum materia ad alvum deturbetur. Nonnullis epilepsia, catoches, apoplexie, motus convulsivæ falsæ paralytes præcedere, sapissime subleque confueverunt, eæ nempe in quibus motus auster illezo sensu manuum, pedum, brachiorum crurumque, & aliquando alterutris totiusque lateris. Vidi qui præter oculos & labia oris nil aliud movere poterunt. In Moravia, Austria, Styria, Carinthia, Pannonia aliisque Germaniæ frigidioribus locis id mali genus post colicos dolores spectatur. Similiter & apud Pictones Gallorum, & fere in calidioribus regionibus raro admodum, etiamfi Romæ tempore Pauli Æginetæ populum graffaretur pestilentis modo.

Aliquod tamen obcurum paralytice prædicæ vestigium in me ipso & aliis ante quinque annos à colicis doloribus Patavii viro expertus, quando epidemici hic erant & vicini uribus. Neque enim ambulandi potentia nobis erat proflus sub lata, sed summa quadam difficultas, quæ ægri cruribus insisteret & ea transferre tanquam majori pondere prædita percipiebatur. Hanc multum temporis in cognitione hujus morbi hallucinantes cibo & potu copiosiore frustra tollere conabantur.

Oritur hæc paralytis (omitto quidquid alii hæc de re opinati sint) ex bile ex intestinis per arterias ad nervos perente translata, sed quomodo hoc contingat, & per quas arterias, in *epistolis Anatomicis* ex professo docebo.

Nunc ad curationem me confero, quæ debet esse & prudens & diligens. Nam hæc modo longa, modo brevis futura est pro humorum varietate, virium caloris nativi intestinumque robore & modo curandi. Sed & periculosus est morbus quoque tempore superveniat, & graves ac periculosas ac diuturnas post fe aliquando relinquit repetitiones, nisi radicalius extirpetur. Vidi qui multis remediis duritia tentatis per triennium in læto continuo decubuerunt, multos per medium annum, quosdam etiam per viginquaginta annos & amplius, cum pro alio morbo curarentur, tota vite tempore ex Semitertiana in colicum dolore transmutata, vel una cum hac incipiente etiamfi à febre curati essent, singulis fere mensibus vel annis colicis doloribus miserissime molestatis, quando vina austera & pontica bibissent. Et quoniam aliquibus octuagesimo die à Semitertiana initio, cum qua dolor colicus invaserat, abscessus in colo

Causa paralytica hujus dolorum supervenientis.

Horum dolorum prognostica.

colo intestino vel mesenterio oborti fuissent, per quos hic morbus perficere solutus credebatur, tamen colicas peritiones per mensium intervalla & annorum repetitione supervenisse animadvertimus.

In curatione talibus indicationibus imprimis est satisfaciendum. Si namque sunt dolores, prius mitigandi peculiaribus remediis, materia inflammationis est evacuanda, repellentibus, digerentibus, purgantibus per alvum, acris & pontica obundanda, crassa attenuanda, viciida ac lenta incidenda ac detergenda, prohibendaque, ne amplius talis generetur, & quæcumque in corporis venis exsistit similiter educenda est, derivantibus per urinas, revellentibus per cutis totius corporis meatus, ne amplius ad centrum corporis conflant. Sic enim fit, ut hic dolor non facile redeat, aut si redierit, minor quotidie evadat. Si in abscessum inflammationis terminata sit (ut plerumque in admodum extenuatis ab hoc malo aut diu vexatis) expectari debet quadragesimo die ab initio ejus curatio, quam jam præcribam, raro octuagesimo, vel si una cum Venis duorum priorum ordinum Galeni Semitertiana oborta sit die octuagesimo.

Quoties igitur mitigandus est dolor, toties videndum an una cum Semitertiana inceperit, & jam finis in principio accesserit, vel multo post id, tendente ad judicationem vel transmutationem febre. Nam si vires constant & corpus aliquo modo sanguine abundet, initio sanguis ex brachio detrahendus, cucurbitula scarificata & non scarificata artubus adhibenda, ne major fiat ad intestina humorum fluxus, deinde cucurbitula magna super umbilicum affigenda est. Quod si vero tendente ad judicationem tertiana supervenerit, dolor mitigandus omnia venæ sectione, solis cucurbitulis extremis partibus, & una supra umbilicum adhibitis contenti esse debemus, reliquaque adjutoria interna & externa administranda, quæ ex pharmacis desumuntur.

Plurimos juvit omni tempore potus, qui & *olei amygdalarum dulcium uncias tres, melle calidioris uncias duas, vel saporis rosarum solutivi uncias tres, juris puli, in quo saporis chamemelii dissolvitur unciam unam, vel quantum sufficit ad manum dissolvendum.* Nobilis etiam medicina est, *oleum olivarum, quod per multos dies & menses supra infusum rosarum solutivum stetit, cum pure vel decocto mercuriali & radicum albeæ.*

Alvum enim per plures dies lubricat & lenit dolores. Sed cum multis ægris solet adesse vomitus vel nausea, ob quam præscripta remedia in ventriculo continere non facile possunt, ideo aliud præscribere consuevi, quod habet decocti *storacis chamemelii cum pure carnis vel tenui cerevisia uncias quatuor, specie-rum diacymni drachmam unam & mediam, butyri recentis uncias duas. Nixæ & bibas calide & repetat horis febris convenientibus, quousque plurimum sit mitigatus. Cornu cervi usum in tenuissimum pulverem tere, nec aqua rosarum, ut fieri solet, ablatat, dentur hujus drachmæ duæ cum decocto sanguinæ, aut aqua cardui benedicti. In pulveris stercoris lupini albi in crepulis vegetis (eligendum præ cæteris, in quo ossa animalis devorati ad huc integra continentur) alvum mediam, mellis quantum sufficit, sunt pilule scrupuli unius pondere. capiat duas vel tres singulis vicibus longe à pastu, mane & vespere. Canis*

quoque alibi (ossa tantummodo comedentis) stercus eodem modo sumptum optimum est adjuvatorium.

Et *intestinum colon lupi mirabilem edit operationem, si una cum suo stercore excisum, in camino suspendatur ut fumo paulatim indurecat, & deinde ablato stercore intestina in pulvere em redacta drachmæ unius pondere propinentur & jure carnis.*

Pulvis ad colicam nothæ. *seminis cymini, carvæ, silis nitri ana partes æquales. Nixæ, drachma drachma & jure carnis.*

Opia colica nothæ, *seminis juniperi seminum, bacorum hedera drachmas tres, seminum ammei, carvi, cyminalia drachmas duas: seminis erysimi drachmam unam & mediam, nigellæ drachmam unam, castorei semina drachmam, vel hujus testicularum equinorum excisatorem drachmam unam, silis nitri, cornu cervi nisi tenuissimum sit, ana drachmam unam & mediam: cineris mariorum crinaceorum assorum drachmas duas, opii drachmam semis, cum melle depumato fiat opia. Oleis drachmæ duæ, vel una cum dimidia. Et quoniam plerumque horum calidiora sunt, tenat ut febriant, aut interius inflammationibus quantum convenire videantur, tantum sciendum est, non hife nos uti oportere, nisi cum admodum urgent dolores, ut si magis mitigandis fit incumbendum quam febri propellenda, quæ plerumque solet ab intestinum inflammatione non mediocriter fore. Eligenda ex his magis temperata, si Semitertiana biliosa fuerit, si vero pituitosa, calidiora præferuntur.*

Aliquis fortassis posset existimare, his remediis aperi inflammationem, qui eorum caliditate tantum inveniunt. Sed si scire debent, quadam dirigendo & discutendo plurimum inflammationibus opulari, & calidos humores ad articulos vel ambitum corporis propellere, quodam per urinas eos derivare, quod cum hactenus Medicorum plerisque lateat, in causa fuit ut existimarent mirabilem jam quorundam commemoratorum viri experti ad profligandos vel mitigandos colicos hosce dolores, occulta & imperitabili proprietate id peragere.

Cæterum si dolores sint tolerabiles, quæ Semitertiana comitem habent, aut jam mitigati finit, solis clysteribus & externis medicamentis ventri adhibitis curationem abfolvo.

Clyster ad colicam mihi familiaris in Semitertiana pituitosa. *seminis pægonii unciam unam, novarum pægoniarum unciam mediam, caricas pingues duas, pruna nautica, quæ semper in aqua solvuntur ana unciam mediam: seminis carvi centisi ana drachmas sex, cymini drachmam unam: storacis chamemelii, mellis ana manipulum unum. Bulliant in aqua sufficiens quantitate ad libram unam, per unica tantum ebullitione, in fine adde ægri drachmam unam, solvitur sine unciam mediam, colature adde mellis rosati solutivi uncias quatuor, silis nitri scrupulum unum. Nixæ pro clystere tepide injiciendo, ut diu detineat.*

Clyster alius in Semitertiana biliosa. *radicum albeæ unciam mediam, solivum malvæ, parietaria, mercurialis, violariæ, storacis chamemelii ana manipulum unum, seminis lini & semineci ana drachmas duas, bulliant ad libram unam in sero lactis, colature dissolve discatoloni unciam mediam, mellis rosati solutivi uncias quatuor, olei violacei uncias tres, stercoris canis albi ossa comedentis*

comedentis subtilissime pulverati drachmas duas. Misce pro chylere. Interdum injecti in magnis inflammationibus clysterem ex ancio octo vel decem olei rosmarini compleri & decocti fenugraeci libram mediam salis nitri drachma una. Sine ulla purgantibus ac detergentibus; interdum ex puro oleo, aut qui ex lacte & saccharo rubro paratur cum butyro recenti & albo graeco. Et hi clysteres quo diutius in ventre continentur, eo cum majori sanore reddunt excrementa.

Retina.
Cecaplyna.

Exterius applicandum toti ventri calidum cataplasma ex pane macerato in lacte recenti multo, cum oleo rosato, atque in suo calore per horas viginti quatuor est conservandum: vel fiat cataplasma ex farina seminis lini in decocto radicum altheae cum butyro recenti, addito pulvere cymini & oleo rosato. Quae praesente biliosa febre sunt adhibenda. Saepè vidi ab hiis applicatis alvum lubricum redditum fuisse humoreque concoctos à natura excludis. In simplici Semitertiana & pinitofiore fomentum praefrattissimum, quod & lumbis dolentibus adhibetur. *℞. florum chamemeli, mellitis, foliorum trifolii aut huius olei florum senti una manipulum unum, fursorum tritici manipulos tres, seminis lini & fenugraeci ana unciam unam, feminis carvi, cymini, una unciam mediam.* Misce. ponantur in facculis ex tenui linteo factis filo interduendis & ea magnitudine, qua ventrem & lumbos tegere queant, hi in cerevisia calefacta vel decocto radicum altheae, florum malvae & florum chamemeli calido exprimendi, & ut singulis horae quadrantis quando refrigerati sunt, mutari quantum quatuor habeantur aut ad minus duo, si venter tantum solus sine lumbis venit fovendus. Quibusdam nimis graves hi facculi videntur, ideo loco horum spongias fovendus est locus in decocto calido herbarum omnium, quae facculos indigebantur, expressis aut madefactis.

Cl. Cyclamin.
ma. preparata.

Potest etiam fieri fomentum cum lana succida oleo rosato & vino simul calefactis & mixtis. Vngatur deinde venter oleo cyclaminis, quod hunc in modum parare solent, valet etiam plurimum ad sedandos dolores pleuriticorum. *℞. florum cyclaminis recentium libras quatuor, olei communis libras duas: bulliant per horas tres in olla munda, donec comburantur florum dua librae, oleum nigrum apparebit inde fortis facta expressione, alia florum libra in eodem oleo per tres horas coquantur, & posita facta forti expressione, oleo residuo iterum servetur una libra florum sic incoquantur, expressum tandem servetur ad usum.* Tota regio umbilicalis hoc oleo perungatur supposita charta carulea bibula. Valet & oleum carvi arte chymica destillatum, ita ut leviter umbilicus & partes ei vicinæ inungantur.

Interfissum lupi instar cinguli circumligatum ventri, nobilè est remedium. Atque haec omnia praesente Semitertiana possunt adhiberi ad dolores mitigandos.

Quod si post Semitertianam relictis fuerint colici paroxysmi, qui agrum multo tempore torquent aut torquent, si quidem qui adhuc recentes sunt, plerumque citius solvuntur: qui vero jam aliquandiu hominem per intervalla affluerunt, & ad maciem ac talem deduxerunt, debilitatio jam viribus & paralyti praesente, tardius & magno labore tolluntur: interdum vero lethales sunt & neurgiam curandi. Nam bilis jam crassifaceta aegre medicamentis & praeparatur & expurgatur.

Et viris difficulter convenienti cibo recreantur: quia calor nativus viscerum inservientium nutritioni languet, & qui concoctus est propter mentem obstructiones, quae tabidis jam ad marasmodum ductis adesse consueverunt, propter abscessus induratos circa venas & arterias menteries haeret. Verum comperi in huius colici curatione majorem difficultatem curandi, quam quo tempore Semitertiana esset conjuncta. Nam tum ratione febris optima instituitur victus ratio, etiam ad hunc pellendum, refrigerans sollicit & humectans, attenuans, inciens atque detergens. Sed in hoc ejusmodi victus solet ageris & multis altantibus, uno plerique etiam Medicis esse suspensus, credentibus dolores esse ventriculi imbecillis & praegressu tenuiori cibo, & refrigerati ab aquae copia hausta in Semitertiana. Quare persuadent Medicis ut vinum concedant & cibos calidos aromaticos conditos, & quia debiliores sunt, plenior longe quam antea victum, siue quotidiana jam facta sit, aut alia quavis febris lente quotidie hic facta vespere exacerbantibus, qualis hunc dolorem colicum solet faepe concomitari; siive duplex tertiana facta sit, siue quartana, quam post annum & amplius critice plerumque solvi per colicos dolores lassissime vidimus, (cum tamen alia quartanae, quae per se oriuntur aut ex duplici quartana per alios modos plerumque solvantur) unde postmodum contingit hos aegros non sanari, sed diu marcere paulatim consumpsisse & vita discedere. Purgantia medicamenta dissuasi, & quod si forte praebantur quae sunt optima, quia tamen interdum possibile est colici doloris recidivas prohibere, & quia ignorant motus esse colicos, ut & tertio quoque die & quarto, & singulis diebus flos occidente gravius affligant, putant statim afflantes Medico curativas indicationes mutandas esse. His molestiis & verae curationis impedimentis obviam ivi solis praedictionibus. Nam & colicos futuros multo antea tempore cum praedixissemus, & jam praesentes quem typum fervarent, etiam si optima quaeque ex arte & usu essent à me praescripta ad morbum expellendum, me cum typum non posse vincere, effectum tamen, ut quotidie evadant minores paroxysmi, aut si tertio quoque die exacerbarentur, factum me ut mitiores quam antea alterantibus diebus fiant, aut cum recidivae plurimum dierum erant expectanda: mitiores fore recidivas, non modo mihi magnam fidem apud aegros peperit, sed in neminem incidit qui meis remediis ac methodo curandi apud maxime barbaras nationes non diligerent fervarent, & tandem spolia quadraginta dierum ab omni recidiva liberaretur, quem curatorem me speraveram.

Praescribam prius victum talem, aquam hordei magistrallem pro potu. In prandio panem jure carnis madefactum cum modica carne vitulina elixa, vel caponis, gallinae, pipitonis. Cum hac lactucam coquebam, interdum pruna damascena. Vespere cremoris hordei libram mediam cum modico saccharo & pulvisculo cinamomi, & addebam aliquando duas uncias emulsivae, seminum melonum facta cum aqua hordei magistrali, & hunc declinant febre noctu porrigebam. Quod si esset brevis ejus paroxysmus addebam ovum forbile. Si parva febris & symptomata à colica indispotione, coquebam ovum forbile in aqua

Potum ordinis.
pini.
Culinar.

Virginitas.

Penis.

Retina.

Stricta libra.
cur hic videntur.

aqua & cum panis modico comedendum dabam. Interdum duo ova forbilis in aqua fervida rapta coquebantur quousque albumen esset coctum molli permanente vitello, haec cum pane modico & eodem jure, in quo ova erant cocta addito butyro recenti aegro porrigebam. Si quando colici paroxysmi inquebant, eos mitigabam externis & internis praesidiis jam supra enumeratis, ubi mitiores videbantur purgabam corpus per epicuram alternis diebus aut quarto quoque die digressum solent, & elixaria & sacra rosam, diacatholon, si in bolo medicamentum volebant. Si vero potum expetebant uno ex his medicamentis, quae agrorum & seminarum recipiunt, quae libro superiori ad purgandos Semitertianarios scripsi.

Vt autem una à doloribus colicis quantopere fieri poterat, praeservantur, aut quando hi vitari non poterant, mitiores brevioresque redderentur, & sine tabe ac paralyti abirent praeter ceteris hunc potum commendabam. *℞. pruna damascena duo, urvae passularum drachmas tres, radicum polyposi unciam semis, herbarum agrimoniae, capilli veneris, fumariae, citrulli, sonchi, dentis leonis, longissae singularum pugillum medius, feminis caribani contusi unciam unam, bulliant ad uncias quatuor, colatura infunde per noctem foliorum semine drachmas tres, agrarii trochiscati in petia ligati drachmam unam vel scrupulos quatuor, florum cardui pugillum unum, foliorum malvae (ad tormina mitiganda, quae solis fenne excitant) pugillum unum, croci (ingredietur & hoc ipsum omne medicamentum, quod sedat dolorem) grana duo, fiat expressio & cinis adde mellis rosati solutivi uncias duas, manus unctam, ut sit citius descendat. Dabam aliquando & hunc potum sine manu vel sumpso rosato mane, & hunc vespere horis duabus ante coenam injici curabam clysterem ex herbis emollientibus & anodynis, in quarum decocto sub finem, quod reliquum erat ex apozemate laxativo praescripto, injicere jubebam & fieri unicam levem ebullitionem, ut quidquid esset residui purgant in agrico & fenna clysteri committeretur, & sic crassos humores ad colon lapsos, si forte & ob vim debilem assumpti mane purgantibus apozematis de suo loco non moverentur & per alvum excluderentur, commodè educeret. Quod si aderat metus futurae alijus paralyseos, pulveris castorei drachmam unam addebam. Diebus autem intermediis, quibus non subiebat hoc aut ei simile aliquid purgans medicamentum, dabam duas uncias syrupi diaforetic ex descriptione Andermachi, aut scrupulum pulli non salutum alteratum cum omnibus herbis apozema praescriptis, ac laxantibus & eorum correctivis. Mirabiliter multos juvit pulveris eleos drachma una & media, vel duae cum jure alterato propinando summo mane. Dedi etiam cum maximo fructu pulverem Comitis de Harwich, cujus dimidia drachma addita semel tantum portorata flex horis ante prandium vel ante coenam horis quatuor aliquando repetita cum jure prunorum vel carnis simplicis recidivas in totum profligavit, plerumque hic mitigavit ut minores & rariores postmodum reverterentur, levique negotio eodem vel alio pulveris in totum tollerentur.*

Ab hiis simplicibus vel diacolocymydis abstinentiam semper, quod animadverti ab aloe humores accendi & dolores exacerbari: Maxime quando in colo in-

testino precipuus est dolor. Venas enim ejus intestini dilatando novum humorem affluxum procreat.

Cetera quoque multa purgantia medicamenta valida, quae colocyntidem (nisi magna pruritus copia intestinorum internam cavitationem aut vasa melerica obfederit) vel helleborum vel camomillam non caligant ut in pulvere eleos, vel Comitis de Harwich, hic valde suspecta esse debent quod ad locum affectum à toto corpore trahant humores, & sic magis intestina inflamment, ideoque longe molestius purgant, & aegrius quam blande purgantia attractos humores educant. Multos novis in Germania & Pannonia, ut qui praescripto familiarium Medicorum assumentibus valde purgantia medicamenta, ut in medicamentis probe suo officio fungerentur, in duplici ut appellant, uno quandoque triplici dosi, & haec tandem ego accessit non sine omnium qui tunc aderant admiratione simpliciter commemorato apozemate vel diaprunum solutio cum manna copiosissime purgabam. Atque ex hoc cognoscere, si non falso praedicabam multos dolores colicos instantes nisi praecaveantur, vel eos antea fuisse. Quod si aliquando contingat propter penuriam lenientium & blandorum purgantium ad fortiora nos cogi, praemienda sunt prius die antecedenti externis fomentis, cataplasmatibus commemoratis refrigerantibus, humectantibus & anodynis ac concoquentibus intestina, & ordinaria dosi, hoc est, simpliciter medicamenta praescribenda sunt. Sic enim & haec fortis longe melius & tutius opus fenum abolvunt. Aut balneis prius corpus praeparatur ex aqua lominis calefacta & alterata radice altheae, solis malvae, parietariae, violariae, florum chamemeli & mellitis, praeterea sive sive, medice, trifolii pratensis, florum senti qui in stabulis equorum solent reperiri, aut in alveo in quo ponitur stercum quod equi comedunt aut boves.

Haec eadem balnea quotiescunque faciunt dolores colici, magno sunt auxilio, uti & illud quod ex mero oleo paratur, & aliud quod ex aqua lominis fit calefacta candefactis igne flicibus, quia omnia ad dolores praecavendos in diebus, quibus vulvis jussula alterata vel vacat à purgationibus solent adhiberi, intermittere vel inclinare praesens si addit (dimmodo vacet à Semitertiana) paroxysmo horis duabus ante cibum. In Labro vel Semipucio debet per horam desiderare, quod in te tantum aquae vel etiam olei continet, quantum ad mammam usque sedenti potest pervenire. Purgato corpore sic ut maxima pravorum humorum copia educta esse videatur, etiam dolorum ac recidivarum metus quasi in totum sublatis fuit, intestina ne facile iterum ejusmodi fluxiones fluctuant, corroborari debent. Conferret in hunc finem prandium aequale Tututiane in agro Pistoriensis aut aliae aquae thermales sulphureae & nitrosae, quae per alvum magna ex parte ducuntur, in Germania praestantissime ad acidula, maxime quae prope Franciscum ad Muncum scaturiunt, & illas in Gallia, quae sunt prope Aquas mortis praestantissimas comprehendunt. Apud Bigerones ut audio, & Nivernenses, Pugenles, Causenses & in Perinatis montibus tales exstant.

Ruspipozzi fontes maxime pro hoc malo commendantur.

Cir & ceteris
calida purgantia.

Balnea.

Aqua thermales.

Macro.
Stricta libra.
cur hic videntur.

mandantur. Singularum aquarum modum peculiarem per affumendi petere oportet à Medicis, qui prope ea loca habitant, & hinc aquas frequenter intuntur.

Ego in Italia aquam Tetrutianam hoc ordine propinare confuevi ad hunc affectum. Primo die duas huius aquae libras porrigo, parum calefactas, secundo duas libras cum dimidia, tertio tres, quarto mediam adduco libram adde, quinto aliam dimidiam. Sic quando ad quatuor aut ad summum quouque libras pervenerim (nunquam enim hac dosim transgredier) paulatim iterum diminuo quotidie dosim, quouque ad duas libras perveni, tum ab ejus usu desisto, qui ad decem vel duodecim ad summum dies perdurare consuevit.

Quod si ad tres septimanas aut sexdecim dies continuare potum huius aquae expediret, tunc quando ad summam dosim perventum, in ea per sistendum per quatuor vel quinque dies, & sic rursum paulatim declinatae quotidie dosi finem facere.

Primo die præbeo simplicem: quod si non moveat alium, postero die vel tertio, & sic alternis diebus continuando in primo cyathio dissolvo unciam unam mannae vel mellis rosati solutivi uncias duas:

ut enim fiat dejectoria, magis laudo quam ut per urinas transeat, venas enim ac jecur accendere consuevit. Tota aquae quantitas quotidie summo mane ebullienda est quinque horis ante prandium & una hora inter bibendum absumenda. Itaque ubi ager surrexit ac lavit sese, obambulabit parum, mox sumet primum cyathum, qui mediam plus minus libram capit, & ubi hac descenderit rursum paulatim obambulando, ut ventriculum pertranseat, alium cyathum haurire debet, & sic horum, nec plus nec minus in præscripta aquae quantitate ut dixi consumere.

Aquas acidulas in Germania alio modo præbent Medici. Nam ab uno tantum cyathio incipiunt, & paulatim quotidie uno cyatho augentes aquae ebullientes quantitate ad quindecim & viginti cyathos accedunt, inde rursus descendunt, quotidie unum cyathum diminuentes donec ad unum pervenerint, tum desistunt, atque sic dies triginta & quadraginta insunt in potu acidularum. Quod si forte in primis diebus observaverint, quando ad aliquam dosim aquae ebullientes notabilem pervenerint, neque per alvum neque per urinas aquam transire, paulatim diminuentes dosim uno cyatho desistunt, nullo medicamento neque dejectorio neque diuretico adjuvantes aquae transire vel per alvum vel per urinas. Efficit tamen longe conducibilis, ut statim à notabili aliqua quantitate inciperent, scilicet una libra vel altera, & sic citius curationem absolvent, efficientes aquam modo dejectoriam cum manna una vel altera uncia, vel duabus syrapi rosati solutivi, vel media uncia electuarii lenitivi facto bolo & deglutito sine nebulis media hora antequam primum aquae theriacalis cyathum hauriat, modo diureticam immiscendo primo cyathio uncias duas emulsionis seminum melonum facta cum aqua fragariae. Aquae enim hæc erit per venas transeunt, eas tamen non calefaciunt, sed potius refrigerant præcalcfactas ac roborant.

Ab aquarum thermalium potu utendum est balneis aquarum thermalium ut in Patavino agro

D. Petri & Aponensium, vel Lutis thermalibus ventri admotis per horam quotidie fere aut bis in die horis tribus ante prandium & cenam.

Commendo hic Luta D. Petri in agro Patavino, vel Montis Ortensi, vel Borbonensium in Gallia, D. Salvatiani in Pannonia. Debet hic Luta esse modice calefacta vel à sole vel ab igne, vel proprio calore sulphureo loci unde extrahitur. Abstergo ventrem cum aqua thermali à loco detracto undio fieri debet oleo vulpino toti ventri superligata stuppa cannabina. Eodem etiam oleo membræ paralytica inungantur.

C A P. XIV.

De spūrio dolore Colico.

Dolor colicus spūrio interdum est Semitertiana, na tendente ad judicationem nonnunquam provenit. Diciturque spūrio, quoniam neque in venis mæstacis intestinorum, neque in substantia, nullo minus in cavitate, sed in partibus intestinis vicinis, ut circumstante cavitate doloris causam habeat; fallatque Medicos, quod eo fere modo ac ordine agrum cruciat ac eo loco, quo dolores colici veri circa ventrem.

Sed tamen differre nonnihil mihi loco inter fe verus & spūrio dolor colicus videtur. Nam spūrio infra umbilicum inferiorem abdominis partem vel imum ventrem occupat; verus autem eam, quæ supra & circa umbilicum est, aut totum ventrem. Continuis hic spūrio mihi semper compariit, sed circa vespertam crudelius agrum affligens, & quandoque alternis diebus, uno levius altero gravius. Quartanas non secus ac quotidianas & tertianas agere Semitertiana productas hoc malo finisse certis circuitibus, parique accessuum ordine.

Materia biliosa acris fervida non expers (ut opinor) alijus pontici, & uplurimum purulenta est causa proxima huius affectus. Hæc quo loco consistit, scire perquam difficile est. Quod enim curat in intestinis cavitate, neque in eorum venis mæstacis consistat aut substantia, indicat evanescit, quia neque per clysteres, neque per medicamentum purgantia vel alterius generis per assumpta mitigari unquam possunt. Jam diu opinatus fui intra peritonæum & musculis abdominis, vel intra tendines obliquorum descendendum & quatuor corporis integumenta hic subfistrata consistere, sed quoniam neque fomentis, neque emplastris, aut inunctionibus ad colicos dolores & alios mitigandos accommodatis leniri animadvertēbam, & circa locum vesicæ dolores (qui neque ad tactum exacerbantur, neque tumorem supra sumum locum monstrant) plerumque consistere, cum interdum sic affligere ut difficulter reddatur urina, frangurum aliquando obortam, purulentam, quæ materia per urinas excretionem per multos dies perseverantem, postquam dolor terminabatur, non potui alium materiam locum invenire quam cavitatis abdominis illam partem, quæ est prope vesicam, hoc est, inter peritonæum & vesicam atque intestina vesicæ adiacentia.

Confirmavit hanc meam opinionem nuper me casus ejusdem juvenis civis Patavini vulnerati sclopeto circa spinam medice lumborum vertebræ, & exente globo post transversos processus vertebrae

vertebræ ruptos trium digitorum spacio à latere umbilici per ventrem: quo loco cum consisteret sub communibus quatuor integumentis, à me excisus fuit. Transactis viginti diebus cum per vulneris foramen posterioris magna puris copia exiret quotidie, per anterioris vero nil profusus ex abdomine exiret, collecta materia purulenta: portio circa omentum ad vesicam descendit & dolores colicos spūrios excitavit, qui reddito plurimo pure per vesicam una cum urina modo cessabant, modo mioteres evadēbant, & interdum trinarium meatum dolore inter mingendum insigni affligēbant. Quapropter exiitandum etiam est in febre Semitertiana vel aliis ab hac ortis, & quæ ejusmodi dolores colicos spūrios faciunt, abscessus aliquos in abditis locis latentes ut in omento vel meleniterio tandem perruptos deponere materiam purulentam in abdominis cavitatem, & sic eam paulatim subfudere versus ossa pubis inunquē ventrem.

Er. Quoniam querit exitum per partes sensiles, quales sunt vesica, & intestina, idcirco illorum locorum continui solutionem solvi, transcurare per poros substantia vesica in ejus cavitatem potius, quam per ramos iliacos, propterea quod hi undique pinguedine & membranis sunt plurimum tecti.

Curatio hujus doloris est colici veri curatione difficilior & plerumque longior. Nam omnia fere externa internaque remedia, quæ ad colicos prædico scripsi, spernit, & quadragesimo die plerumque sponte solutus vidi per purulentas mictiones, non admodum congrua observata victus ratione, præterquam abstinentia vini. Comedebant enim pisces loco carnis, quam ob febris Semitertianæ & aliarum diuturnitatem abhorrebant. Erant tamen pisces facili digestibiles, ut Lucius, Cyprianus, & Mulus. Prodest hic venæ sectio in talo, aut in scapulari, cucurbitulæ utrique cruri adhibita fere etiam scarificatione. Nam quamvis hæc remedia chirurgica materiam non evacuent, quæ inter peritonæum & intestina vesicamque continetur, tamen unine difficultatibus & phlogosi vesicæ ac partium circumstantium, ob quam dolores graviores fiunt, plurimum opitulantur. Quidam ex confilio barbotensis in Germania balneo aque fluvialis, in qua sturnus chamæceli & crescentii (nasciturum aquaticum vocant) aliquot manipuli antea incocti erant hunc affectum fulsiit. Omnia quæ per se assumuntur diuretica, non purgantia efficit debent (nisi forte propter insignem corporis adhuc relictam cacochymiam, putere Comitris de Harvich, vel fecibus elestæ uti lubere) quod materiam per intestina agere, per vesicam facilius destruat natura, quæ in hoc opere est adjuvanda.

Quapropter laudo insula alterata cum vinea peruvina, perichymo, fragaria, agrimonia, pimpinella, equisetio, nasturtio aquatico. Præbeatur in jure pulli gallinacis semini crysmi pulverati drachma, aut cum syrupo de duabus radicibus, & malo, vel è capillo veneris fiat electuarius. Inungatur inus ventris oleo vulpino, cui olei cymini per clymiam desistat aliquas guttas admixta, vel tertia pars olei de scorpioidis. Prod. & oleum de scorpioidis per se, & quod ex pulvis fit floribus. Sacculus præterea ventri admotus ex fale, furfuribus, milio, lini semine cum semine

C A P. XV.

De Recidivis.

Quanto tempore recidivæ sint in Semitertiana metuenda, si non fiat in aliam febrem vel morbum transmutato, secundum libro diximus, in huius fine subnectemus, quod sunt à Medico tractandæ, si prius de causis nonnulla fuere præstatis. Omnes enim eum in ea versatur opinione, recidivæ fieri à generatione novæ materie morbosæ, quod falsum est. Nam illi qui non præbuerint occasionem per externas & internas causas generandi materiam novam, ut per errores in victu, nihilominus in recidivas incidunt, quamvis hæc sint minores quam illi, quæ post errores in victu vel alias causas externas succedunt.

Quapropter censendum est hæc provenire à relicta cruda vel non integre concocta, sed ex parte tantum causa morbosæ: verissimumque effe aphorismum Hippocratis, in quo inquit, quæ reliquuntur in morbis semine cruda recidivas facere. Sed quomodo hæc generentur per proprietatem materie morbosæ non concoctæ, quæ singulis annis pro tali constitutione & varietate temporum anni variare foleat, ut modo ter invadant, modo bis, modo quater & sæpius, modo per paucos paroxysmos, modo per longos, aliquando per quodidanas, sæpe per duplices tertianas, id apto exemplo declarabo per bubones venericos, tanquam affectus externos, quos sæpe hoc tempore hic videmus ortos ex sanguine, bile & pituita. In his enim difficilis est suppuratio. Itaque primis sex aut septem diebus febrem accensum cum horrore vel frigore. Dein hæc indies invalefcit una cum inflammationem concomitantibus signis & accenditibus, postmodum his decrefcenibus diminuitur & intermitte integræ ac perfectæ. Inde rursus febris invalefcit cum signis suppurationis jam secunda vice à natura tentata, tum iterum secundo & febris & inflammationis accidentia abeunt; manent tamen durities & tumor in inguine tanquam materia morbosæ relicta. Itaque & tertio & quarto quasi quidam paroxysmos natura aggreditur inceptam suppurationem, quæ tandem si vincat ad suppurationem perducit; si vero succumbat, transmutatur materia biliosa quæ expectabatur in aliam materiam & alium tumorem, vel evanescit atque diffunditur. Eodem plane modo contingit etiam in Semitertiana, ut materia febris certis periodis in valis vel visceribus contenta nullo de se producatur vapores putridos, qui cor molestant & accendant, rursus alio tempore eos producat, deinde delitescit, donec iterum novus calor ex putredine suscitetur, qui irritet naturam ad expulsiōnem vel concoctionem per affluxum sanguinis & bilis. Ideo concocta jam materia in Semitertiana nullæ recidivæ fuit expectandæ: veluti pure facta nulla febris recidiva est metuenda in abscessibus inguinum difficultat ad suppurationem venientibus, five sit pus exullum, five adhuc in proprio spacio conditum.

Quamobrem ut ad recidivarum curationem veniam,

veniam, diebus quibus ager vacat à febre, victus ratio convenit sanorum similis, ita tamen ut à vino abstineat, & ejus loco aqua hordei magistrali fruatur: aut in fine cibi offam è vino maturo sumat, modicum vini superbibendo.

Cibus sit facilis digestionis & boni nutrimenti, attenuans, detergens, & qui quam minimum calescat.

Solent agri statim à febre cum liberati esse videntur insigni fame premi. Itaque curandum est ne nimio potu aut cibo se implicant, à quo postmodum & inappetentia procedat & virium prostratio, quae propter futuras recidivas hic conferuanda, imò augenda sunt.

Alvus alteris diebus clystere eluatur purgante, & ex his compositio quae ad dolores colicos propofimus, ut facis propiciamus in tempore, & insignes viscerum obstructions atque apostematam interna quantum fieri potest praecaveamus. Vbi

jam febris rediit, rursus ad praescripta huic febrì remedia erit redeundum, ita tamen ut diligenter advertatur, an nonnihil à pristina natura Semitertiana decesserit, nec ne: Nam prout magis vel minus recessit, pro eo & victus ratio & alia praesidia pharmaceutica erunt mutanda.

Si mitis facta est, & sit Semitertiana quarti generis intermitteps, vel duplex tertiana spuria, non admodum acutis morbis vel symptomatibus comitata, nil aequè prodesse animadverti, quam decetum salsa & china cum cichoria alteratum, & datum quotidie ante accessiones. Stragulis prius agro superpositis, ut si fieri potest sine ulla violentia sudor promoveatur: qui si non primis diebus, saltem sequentibus paulatim prodire consuevit, alternis diebus injecto clystere. Sic sensim digeritur febris Semitertiana aut quartanae, tertianaeque duplicis vel simplicis diuturnae, quotidianave ex hac genitae diuturna & molestissima recidiva.

FINIS LIBRI QVARTI



Ad

Ad Perillustrem & Excellentissimum

D. ADRIANVM SPIGELIVM,
in Patavino gymnasio Professore Anatomico
Chirurgumque primarium,

ANTONII SABADINI

Observatio Medica.



Reverendissimus Pater D. Flavius à Padua Abbas meritisissimus S. Mariae Pratalee, temperamenti calidi & humidis, corporis quadrati, pulchro colore dignatus, magna sua vite parte delicata victus ratione usus, viniisque vinoforibus ac meraciori-

bis summo peregrinatus, nunc sua aetate quinquagesimum sexum agens annum, die septima Octobris extra monasterium animi oblectandi gratia cum sese contulisset, hora diei vigesima prima quadam membrorum frigoris sensatione correptus de febre dubitans sine cena decubuit: quatuor post horas calor febrilis invasit, qui ad sextam horam noctis usque manifeste perduravit: noctis reliquo satis commode quievit. Surgente sole curra Pratalem venit, tota die liber à febre: in prandio usus est panatella & ovo forbili, & vini oligophori modica. Simili cibo cenam gessit. Tertia die hora decima quinta, iterum frigore, sed potius ut dicebat, tremore hypochondriorum correptus, bilem citram tenorem evomuit, pulsus concentratus cum anxietate lumborum, ac enormi dolore acerrimo symptomata usque epistemicorum, & accedente paroxysmi statu remiserunt hora vigesima prima, qua hora per alteratum cichorei, borraginis, endiviae, acetosae, seminum citri bibiti, accedente declinatione hora noctis secunda canevit panatellam cum emulsione seminum melonum & pistanum hordeaceam, & parum juris alterati destillati: nocte quievit.

Quarta die accepit medicamentum ex syrupo rosati solutivi unciiis tribus, mellis rosati solutivi, mannae electae ana uncia una, decoctionis cichorei, endiviae, acetosae, seminum citri quantum sufficit. Multas sedes habuit biliosas, flavas, spumosas & graveolentes. Sine febre tota quarta fuit isdem alimentis nutritus: noctem inquietam transiit: ante diem accepit per alteratum cum ovi vitello. Aetate quinta die hora decima quinta invasit iterum febris isdem ac intensioribus symptomatibus, quae minime topicis cedentia ad vigesima primam perduravit: per solium accepit, & tertia noctis hora canevit. Nox quiesca fuit. Sexta morbi die curra accessit monasterium S. Iulianae de Padua, & cum aliquantulum in cubili requievisset, sine ulla Leffonis sensu ex itinere, Perillustri & Excellentissimo D. D. Eques Antonius Niger accepit, qui pulsum tangens intermittentem esse febre affirmavit.

Quotidie ab epoto leniente habuit sedes biliosas: eadem die hora decima sexta salivella dextera manus scissa fuit, sanguis usque uncias quatuor circiter extraximus: ad vesperam usque bene habuit, qua hora Excellentissimo D. D. Niger, Sylvaticum, salis, pulsum aliquantulum celerem irroverunt. Noctem quietam habuit. Septima die hora

decima sexta accessit invasit isdem symptomatibus, gravioribusque: maxime vero lumborum dolor urgebat, & anxietas. Excellentissimi praesentes vomitoria propinquant ex oleo amygdalarum dulcium, aqua cordiali, & syrupo acetolo simplici, non evomuit: in accessione surrexit ad alvum exonerandam, correptus est symptomata convulsio oculorum ac manuum: vi deportatus in lectum mortuus est: urine semper tenues cum suspensio recidivas fuerunt. Scito cadavere, quod multa pinguedine repleto erat, ventriculus & orificium inferius inflammatione atrii coloris in tunica interiori laborabat: cordis ventriculus dexter multo sanguine melancholico repletus (mortis immediata meo iudicio causa) levis nota solum subsistat (mirabile ac novum visum) sula signataque in sua tunica tanquam in vesica continetur, vena arteriaque omnino deperdita: ramus vero splenicus multo limbo ac retro sanguine plenus: reliquae vero partes, quae quidem vidi, omnino suam naturam servabant: jecur incolore cum cognito, tum substantia: cystis felleis parum mutata in magnitudine sed parvis vid momentis.

Haec sunt, quae mihi dicenda erant, ut voluntati tuae satisfacerem. Quae si non in ordine ac methodo declarata fuere, ut res passula, indulge tantillum juvenilis meae aetatis ac ingenii tenuitati. Quod si autem ejusmodi historiam nunquam alias tibi videre aut diligentius considerare contigerit, rogo te atque obsecro, ut infra scripta dubia mihi enodes, cum summo peregrinatus meum agitent.

Primum. Quare intermittens tertiana febris quarta accessione hominem jugulat, cum Hippocrates lib. IV, Aphor. XLIII contrarium docet.

Secundum. Quomodo possit dari febris tertiana sine jecoris affectione, quod directe repugnat doctrina Galeni lib. I ad Glauconem.

Tertium. Cur potius in tanta affectione lienis non sit orta quartana, quam tertiana, cum Galenus eodem libro hoc idem asserat.

Quartum. Vnde lien receperit illam colliqutionem. Circa quod mea opinio est, quia jecur optima temperamento erat constitutum: & fortiter expultricem habebat, cujus indicium erant multae urine, albae, tenues, quae erant partes tenues vini: pari autem crassa ab ipso jecore transmittitur ad lienem, qua ibi immorante sua viscositate, ac calore fusionem hanc humorum & totius substantiae produxit. Mihi summo peregrinatus erit ex te scire horum dubiorum explanationem. Et si aliquando aliud à me quod possum, cupis, impetra & inferiam tuis commodis libenter. Vale & me tui amantissimum ac observantissimum discipulum semper habe.

Die decima octava Mensis Octobris, anno millesimo sexcentesimo vigesimo primo. Pratulae.

H 2

A N T O .

ANTONIO SABADINO

suo, medico Excellentissimo

ADRIANVS SPIGELIVS

S. P. D.



Aximas tibi gratias ago, mi Sabadine, quod nulla interposita mora historiam Reverendissimi Abbatis Pratae Flavii Patavini ad me miseris. Metuendum enim erat, ne si in aliud tempus prorogasses, scribere ea quae tibi mihi quae maxime notata digna videbantur propter occupationes varias e mente exciderent. In fine historiae quatuor quæstiones mihi proposuisti. Singulis eo ordine, quo proponis, respondebo tibi, si prius de morbi natura, quo hic Reverendissimus Pater extinctus est, quid ipse sentiat aperuerim.

Nam tertianam dicis esse simplicem; ego vero unam ex compositis Galeni, quam ipse quidem Hemitritæam vocat, ego vero in libro de Semitritæa Hemitritæam primi ordinis Galeni, ad differentiationem alterius apud eundem Galenum, quae est secundum ordinis. Barbari Hemitritæam minoris faciem hanc vocant, constantem nempe ex continua quotidiana & tertiana intermittente. Hanc spuriam, nempe biliosam fuisse arbitror, atque malignam seu pestilentem. Quod enim non fuerit tertiana simplex, patet ex typo ejus, quem hæc febris habuit. Neque enim invasit cum rigore, neque integre paroxysmus terminatus fuit cum sudore, neque diebus paribus omnino a febre liber fuit, ut quarta & sexta: at secunda tantum liberum a febre ponit. Quod vero fuerit Semitritæa primi ordinis Galeni, significare tibi possunt notæ tertianæ intermittentis, quæ solent ei adesse, quæ cum quotidiana vel continua, vel intermittente implicari consuevit: imprimis horror, quem ego intelligo per hæc tua verba, quæ scribis, *primus die paroxysmi hora vigesima prima quadam membris frigoris sensatione correptum de febre dubitavi, sine causa ducitur: quatuor post horæ calor febrilis invasit*. Sane in secundo paroxysmo hunc horrorem statim & majorem. Tertia die, inquis, *hora decima quartam a stertem frigore, sed pituita ut dicebat tremore hypochondrii corrupta bilis citatim tenem ecomit*. Et rursus quinta die narras eandem febrem invasisse tertio majoribus symptomatibus præscriptis, & aliis: & septima die eadem hora quartum paroxysmum supervenisse hodie adhuc febrilioribus accidentibus. Frigoris enim nomine hic abusus es pro horrore, ut & nos aliquando solemus vulgi sermone loquaces. Sed cum frigore quotidiana invadit, non tertiana. Iam vero cum nullus quod fudor in fine paroxysmi seu declinatione mentionem facias, quid aliud videris confirmare, quam hanc tertianam esse ex earum genere, quæ aut præfagire solent Hemitritæam, aut esse præsentem. Et enim duo hic abs te notari velim. Primum est, quod in hac febre Hemitritæa modo habetur tertiana, quæ cum sudoribus declinat, sed tamen ad

integritatem non transit, si continua ipsi adfuerit, & id primis tantum paroxysmis; modo vero ne vestigium ullum sudoris monstrat ullo tempore declinationis, nisi forte ultimis paroxysmis aliquando, cum est abitura, quod raro contingit & nisi iis annis, in quibus anni tempora servant naturalem suam constitutionem; quia ut plurimum recidivas faciunt aut imperfectas crises, mutationem in alios morbos graves aut febres. Sudores enim critici, qui in simplicis tertianæ singulis paroxysmis comparent, in Hemitritæa neque tam copiosi sunt, neque adeo repentes, ut in simplicis tertianæ, fed vicidiores, crassiores, interdum & graveolentes, præcipue in primis paroxysmis comparent: sunt deinde & in minori copia, quam in simplicis tertianæ, tardiusque prodeuntes, nec semper per totum corpus. Pectus enim & caput tantum sudore madefacta non semel vidimus, interdum & ventrem, artus vero nequaquam. Aliquando tantum caput, quod longum morbum & periculosum (etsi nulla symptomata præva adfuerint initio Hemitritææ) propter variam praxidæ & morbi huius in alios graves & periculosos transmutationem denunciat. Porro sudoris in hac febre, aut nullus, aut tardus, aut vicidius, & per totum corpus, vel non diffusus causa est quotidiana instantis præsentive putredinis, cujus calor præter naturam omnem conatum naturæ aut prorsus impedit, aut debiliorem reddit.

Alterum deinde nota, nempe ad constituendam Hemitritæam non semper tertianam & quotidianam uno eodemque die ac hora invadere. Sed aliquando tertianam prius invadere non modo horis, sed etiam diebus, quæ maxima est deceptio Medicorum causa. Et rursus vice versa quotidianam aliquando nonnullis horis, quandoque etiam aliquo diebus tertianam præcedere. Illud tibi notum arbitror cum in plurimis tibi hoc anno obfervaveris licuerit, uti & in præsentis casu: hoc vero si nunquam adhuc occurrerit, sepe observabis, cum ubi nunc es, diutius eris permansurus, aut in populo aliqua civitate praxim exercitaturus. In hac enim nobilis statim ab initio morborum Medicos accesserunt, in quo hæc ad unguem observantur: pauperes vero non nisi ab augmento aut in statu morbi, quo fit ut in nosocomio Patavino S. Francisci in quo diligentissimi adstantes ægrotorum officio aliquandiu cum honore functus es, etiam si pauperes plurimos invases, id tibi non comparuerit.

Cæterum ne ab instituto latius recedamus, jam tempus est ut & quotidianam huius tertianæ fuisse adjunctam tibi ostendam. Pares dies inquisitiones eam arguunt, quarta nempe & sexta circa vespertinem sunt febres, quæ in febribus quotidianis transigunt, & sexta pulsum inæqualiter celere invenimus transigere, & sexta pulsum inæqualiter celere invenimus transigere, nempe quo tempore erat in medio augmento aut ad statum vergebat, oculo antea principio

principio quotidianæ existente. Quippe quod tardius motus est, & multis admodum in febribus curandis exercitatus integritatem mentitur; quam per hæc verba etiam intelligere mihi videtur sine febre tota quarta fuit. Et morbi quinta die post febrem tertianam paroxysmus, tertia, inquis, noctis hora cænavit: non quæta fuit, sexta morbi die curæ accessit manifestior S. Iulius de Padua, & cum aliquantulum in cubili quietis accepisset sine ulla lesionis sensu ex itinere Perellivum & Excellentissimum Eques D. D. Antonius Niger accessit, qui pulsum tangens intermiscentem esse febrem affirmavit. Similiter cum in sexta ponis pulsum celere circa vespertinem, nullamque inæqualitatem aut ordinis pulsum facis mentionem, opinor quod non adesse omnino vel non adeo manifeste perciperetur veluti solent in pulsu tertianæ. Nam & illud quoque te scire velim, lentarum febrium & occultarum pulsus nos sæpe decipere, maxime vero quotidianæ in Hemitritææ principis & remissionibus; interdum quoque in intermissionibus futuræ recidivæ, cum vel maligna fuit, vel expectatur, vel jam facta est. Recordaris tunc Celsi dictum: *Pulsus venarum credimus fallaciæ semet rei*. Plurimi sunt hoc tempore nobiles doctrina viri, qui in febre pulsum inæqualitatem semper querunt, quæ ex putredine scilicet ortum habet: ubi vero pulsum celere, & frequentem deprehenderunt tantum, ibi febrem adesse negant. Ego vero adversus eos in omni tempore paroxysmi finis periodicæ pulsum inæqualitatem non puro requiri. Aliquando enim in declinatione & principii prima parte febris quotidianæ celere tantum pulsum & frequentem deprehendi ob lentum febrius motum.

Hæc mea sententia cum a communi tot ac tantorum Medicorum doctrina abhorreat, maximæ quidem sed tamen utilissimæ controversiæ inter me & alios Medicos coram ægris occasione dedit, negantibus illis febrem in iis, in quibus ego eam adesse affirmarem. Nec potui doctos hocce viros alius rationibus in meam sententiam trahere, quam signis, quæ a siti, lingue ariditate, urinis rubicundis, calore præcordiorum & pectoris diffundebantur, quorum modo omnia, modo quædam comparebant. Cunctis tamen aderat calor præter naturam, qui adnota manu pectori & abdomini, atque artærie circa carpum percipiebatur. Nam in omni febre necessario requiritur calor, qui præter naturam dicitur. Itaque ex his conclusionibus aliam febrem periodicam diebus paribus clanculum irrepisse: & quod hæc fuerit quotidiana inde probatur, quia sane alia tertiana intermittens vel continua non fuerit. Typus enim utriusque huius febris defuit. Nam debebat veluti alia cum rigore invadere, vel horrore & nausea, vel bilis vomitu, aut quoque monstrare in principio aliquod insignis acumen, celere motum, lingue ariditatem, qualem in febre tertiana intermittente habere solemus, aut manifestam continuitatem & exacerbationem sine rigore, cum siti, urinis rubicundis, pulsum frequentem, celeribus, inæqualibus manifestissime, & difficili tolerantiam ægri, si tertiana continua fuisset. Restat igitur, ut quotidianam continentem fuisse dicamus, eamque per superingressum paroxysmum: cujus quidem principium in die pari per pulsum contractionem & parium

externarum levissimum frigus curiosus quispiam, qui de ea prius dubitabat, observare potuisset, at die impari in hoc ægro nequaquam, quod typus quotidianæ & tertianæ simul quodammodo confusum eodem fere tempore concurrerent. Et quantum nocte subsequente tertianæ paroxysmum quietus debebat, quam noctibus parium dierum, non tamen idem dicendum est, eum a febre quotidiana liberum fuisse, quia hæc non molestatur ægri gravibus accidentibus omni tempore, sed aliquando certis diebus, cum quid bonum aut malum præfagire solet, ut hic quarta & sexta.

Porro superius statui Hemitritæam nostram fuisse spuriam Galeni primi huius, hoc est, biliosam. Quia non possum ponere hanc fuisse exquisitam, quod in hac diebus paribus horrores manifesti non comparuerint, neque imparibus horrores majores & reduplicantes, quam paribus, qui Hemitritææ exquisitæ semper adiunt. Quia in nostra Hemitritæa horrida tantum fuit die impari. Sed & illa ex pari utriusque humoris bilis nempe & pituitæ putredinis permixtione genita esse dicitur a Galeno: hæc vero majorem partem bilis continebat, quod ex iis, quæ per vomitum & alvum excreta fuerunt, manifestari potest. Animadverti Hemitritæam primi ordinis Galeni exquisitam in spuriam transmutatam fuisse biliosam vel pituitosam: & ea, quæ erat spuria, in exquisitam sæpe in duplices tertianas, aliquando in quotidianam, tum hanc rursus, ubi tertiana intermittebat, tum hanc duplicem tertianam. Cujus mutationis causas, si ex Galeni placitis elicere volerimus, non sunt rejiciendæ in alias, quam in humores, qui modo copia, modo qualitate variant. Nam sæpe contingit, ut prius a biliosis humoribus sese natura exoneret. Est enim hic humor & ratione tenuis subtilis, quæ soler esse prædix magis fluxilis, quam pituita, & ratione serioris atque acrimoniae magis naturam ad expellendum provocat. Unde cum pituita crassior remaneat, sit Hemitritæa magis pituitosa, quæ vel in quotidianam spuriam vel in tertianam spuriam degenerat. Quod si vero putredine pituita prius evacuetur, quam bilis portio putrescens requirit, transmutatio fieri solet ex Hemitritæa exquisita in biliosam vel duplicem tertianam. Hæc dico, ne statim hic arguas. Hæc Hemitritæa, quam vocas, aliquando in quosdam habuit signa duplicis tertianæ intermittentis post aliquos dies, vel Hemitritæa exquisitæ: Ergo & nunc talis esse dicenda. Nam hæc propositio non est vera ob didas causas, quia ego non nego, quod si Reverendissimus Abbas superius manifestet, hæc febrem non transmutari potuisse in duplicem tertianam vel Hemitritæam exquisitam, vel quotidianam. Sed dico nunc non aliam esse, quam quæ jam a me descripta est.

Addidi huic Hemitritææ malignitatem, dum ipsam malignam quodæ dixerim. Fuit enim figuram a te animadvertum, dolor nempe lumborum & dorsus insignis in primo tertianæ paroxysmo, in secundo insignior, in tertio & quarto usque adeo fixus, ut nullis remediis quibus mitigari prius videbatur, cedere postmodum videretur. Hoc in hac febre & in duplici tertiana continua, & in prima quotidiana longa experientia edocuit, tum plenius in initio harum febrium malignitatem præ-

Hæc febrem
fuisse malig-
nam.

Non omnem
febrem esse
cum pulsu
inæquali.

ter obferves non ex astrologorum ephemeridibus vel ex eorum in Calendariis prædictionibus, sed autopsia, deinde in aegris febricitantibus notes, ex quibus in quæ fiant mutationes: ita revera difces & prævidebis, quod ex sexcentis Medicis nullus ingenio industria & arte potuit, & apud ipsos & ægros plurimum autoritatis tibi indies comparabis, probeque difces in una bile pro varietate annorum aliam atque aliam putredinem ex circuituum commutationibus & accidentibus consistere.

Sed ut ad institutum redeam, & tertio tuo quaesito satisficiam, scire nostra interest in liene quoque ejusmodi bilem constituisse, depositam prius à vasis majoribus (nempe trunco venæ cavæ & arteriæ magnæ) nec non à jecore hic factam æruginosam, præssam ex parte, & sua acrimonia lienis vasa exchisse: copia vero disrupisse, ac sibi proprium spacium fecisse, sicque extra venas & arterias prolapsam sanguinem putrefactum fuisse, inde tertianam potius, quam quartanam ortam. Quamobrem non eam incicias, quartanam aliquando à bile progenitam exemplo crasseos quartanæ, in qua meri humores bilioli per alvum redebuntur. Hanc autem bilem non potuisse sensibus animadverteri, nisi quis forte eam gustare voluisset. Nigredo enim sanguinis omnem alium humoris colorem obliterat & occultat, præsertim bilis flavæ & æruginosæ.

Ve propter hanc causam in arteria magna & vena cava existimem multos humores contineri, qui tamen conspici propter sanguinis ruborem nequeant. Quoniam autem ramuli, qui ad nutriendum ventriculum à splene originem habent, vel à splenico ramo ad ventriculum commodissime bilem, quam lien continebat, deponere potuerit: ideo contigit, ut ventriculus atrii coloris inflammationem in interiori tunica conceperit maximam & convulsionis & mortis causam.

Ex his præmissis facile erit ultimo quaesito respondere, videlicet, quod Lien colliquationem acceperit ab insigni putredine, quo sanguis extra vasa existens statim capit laborare, qui non potuit esse in majori copia, ut solet in aliis, in quibus præter modum lienès distenduntur sine disrptione vasorum: quia in iis non est tanta acrimonia, quanta in hoc humore biliolo fuit; & majus spacium in aliis, quam in hoc. Obæis enim viscera, quæ in abdomine continentur, præcipue lien parvo temporis spacio in insignem molem augeri nequeunt. Est enim laxa ejus substantia, mollis & plena venis arterisque, ob quas facile patiuntur à compressione vicinarum aliarum partium. Hæc mihi succurrebant, mihi Sabbadine, quæ tuis quaestis in tanta temporis angustia respondere mihi visa sunt. Vale. Patavii.

Vide Lien
colliquationem
superioris.

Responso ad
quaestum tertium.

Quartanam
nominatam
quam fieri ex
bile.

FINIS.



ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS
DE
ARTHRITIDE,
LIBER SINGVLARIS.

ARTHRITIDE,

LIBER SINGVLARIS

Articulus
quid.**D**E Articulorum dolore acturi,
principio monendum per articu-
lum intelligi debere Articulationem
sive Coniunctionem
duorum ossium per *ἀρθρῶν*
vel *συνάρθρῶν*. Per *ἀρθρῶν*
facta articulationem, motum edit
manifestum, ut in humero, co-

xendice, cubito, genu, aliisque. Per *συνάρθρῶν*
quæ sit articulationem, motum habet obscurum, ut in
carpi & metacarpi ossibus. Circa has articulationes
dolor factus, *ἀρθρῶν* Græcis appellatur, Latinis,
morbus seu dolor articularis; Barbaris, arthri-
ca passio, & gutta, quod guttatim destillatio seu
fluxus in hoc malo fiat. Alioquin articulus, quem
Græci *ἀρθρῶν* vocant, omnem significare speciem
articulationis constat apud Galenum libro de Of-
fibus; ubi omnia articulationum genera recenset.
Non ideo tamen si quis circa futuram capitis ali-
quando doleat, vel circa dentes, ea parte, qua
maxillis iunguntur, dolor articularis dicendus est.
Dicitur etiam morbus hic iuncturarum, stricte
sumpto morbi nomine pro dolore. Nam luxatio
alioqui morbus etiam est articulorum vel iunctu-
rarum, sed in situ.

Definitio.

Est autem *ἀρθρῶν* vera, dolor partium articu-
lorum, ex intervallis per defluxionem humoris ac-
cedens. Per articulorum autem partes, non tan-
tum intelligi extremitates utriusque ossis, quæ
mutuo coniunguntur; aut ligamentum, quod con-
iungit interius, & in articulo tum coxendicis tum
humeri rotundum est & sensus expers: sed omnes
eas partes, quæ exterius has ossium extremitates
amplectuntur, ut sibi invicem coniungantur me-
lius, nempe ligamenta externa, periostium, mem-
branas, tendines musculorum, musculos ambi-
entes nervos, ipsasque musculorum extremitates.

Articulus in
propria dicitur.

Hæc enim cunctæ in dolore articuli maxime pa-
tiuntur. Dixi in definitione, ex intervallis per de-
fluxionem humoris dolorem arthritidis accedere,
excludens una cum Galeno cum dolore articu-
larem, qui fit à siccitate, cuius fecit mentionem
Hipp. lib. 111. Aphor. xvi. Hic enim improprie
arthritidis appellatur. Dixi, defluxionem fieri per in-
tervallum, quod in omni arthritide est necessarium,
quæ jam confirmata est. Quod si vero quispiam
podagra corripiatur, & intervallo nullo redeat do-
lor, tamen dicenda est arthritidis, nisi ex intervallo
providatur.

Differentiæ.

Differentiæ doloris articularis statuuntur varie.
A materia dolorem causante, dicitur arthritidis bi-
liosa, pituitosa, sanguinea, melancholica, mixta.
A qualitate venenata huic materiae implexa, dicitur
arthritidis Gallica. Sed communis differentia

furnitur ex articulis variis, quos hic morbus solet
affligere: sic quæ pedes exercet, podagra dicitur;
quæ manus, chiragra; quæ articulum coxendicis,
ischias; quæ genu, gonagra; cæteros articulos si
quando dolor infestat, nomine caret, & communi
arthritidis appellatione gaudet. Cæterum sub quo
affectu præter naturam arthritidis teneri possit, non
est multis verbis investigandum curiosius, cum
dolorem esse dicamus, qui est de genere sympto-
maticum: at si respiciamus affectum dolorem fa-
cientem, hoc est tumorem ex distensione partium
articulorum per humorum defluxum factum, mor-
bum esse dicemus, nempe tumorem cedemato-
sum, vel ut plurimum, inflammationem improprie
dictam.

Sub quo affe-
ctu præter na-
turam.

Causa conjuncta ab Auctoribus recensetur va-
ria: quidam autem nudam intemperiem, aut etiam
ventositatem statuunt, ut Guainerius & Gradius:
Græci, Latini & Arabes, humores. Atque ex his
iterum Recentiores quidam unicum statuunt; ut
Fernelius, frigidum & pituitosum, vel ferocum ac
tenue, qualis tempore frigido è cerebro per na-
res solet effluere. Cæteri una cum Græcis plures
humores acculant; & vel quatuor simplices, bi-
lem, pituitam, melancholicam, & sanguinem, qui-
bus etiam posset addi ferocis humor, vel mixtos
ex his. Siccitatem aliquando generare ischiadem,
testis est Hippocrates. Cur igitur non potest ea-
dem generare alias arthritidis species? Partes enim
similes similibus morbis sunt obnoxie. Verum
Alexander Trallianus cum ait, non solum ob ma-
teriam influxum in articulos fluxiones fieri, sed
etiam propter nudam qualitatem calidam vel fri-
gidam, & ad hæc siccitatem vel humiditatem sub-
inde fluxiones concitare, videtur exilimare, arti-
culorum seu partis affectu intemperiem non esse
causam proximam doloris arthritidis vel solutio-
nis continui, sed tantum concausam, quæ faciat
debiles articulos. In omni enim fluxione necesse
est partis imbecillitatem adesse, & humoris abun-
dantiam. Sed & partium imbecillitas non à sola
dependere intemperie mihi videtur, sed ex ampli-
tudine valorum, venarum scilicet & arteriarum,
& laxitate partium circa articulos. Quæ vitia vel
ab ortu genita sunt in nobis, & tum fit arthritidis
hereditaria, accedente humorum copia; vel postea
sunt, à causis evidentibus laxantibus & emol-
lientibus vincula & articulorum membranas, ut
sunt contusiones, balnea, Venus, & vinum immo-
deratum, illudque in balneo vel statim post pos-
tum, quemadmodum in Germania fieri solet. Porro
humor hic, qui est causa continens, non consistit
in eo spatio seu ea cavitate, quam constituunt
ossium duo extrema quando sibi invicem con-
iunguntur,

Causa con-
iuncta.Intemperies
an causa pro-
xima arthriti-
dis.Imbecillitas
articulorum.Hereditaria
arthritidis.

Sola humori
in articulo.

guntur, quemadmodum multihactenus fonnatur; sed fere femper in membranis, tendinibus ac vinculis externis, a perilio originem suam habentibus, offium extrema ac mulculorum tendines neceatibus. Idque cognoscitur manifeste sic se habere ex nodola podagra & chiragra, in qua topus seu humor jam in calculum concretus aperta ruptate cute, plerumque eruitur & digitorum articulis, externo vinculo, ut scribit Fernelius, integro atque illeto. Præterea, si materia in cavitatem internam articuli fluere, nullus vel admodum obtusus excitare dolor, quod hoc vinculum neceatibus interius offium duo extrema ex offe oriatur, nullumque sensum habeat; & ideo, quia cum offis cartilagine connascitur, *χondρον* dicitur nomen apud Græcos accepit. Sed unde & per quas vias humor hic dilabatur in has articulum partes, ex veterum & recentiorum scriptis cognoscere perquam est difficile. Nonnulli enim à capite fluxione fieri putant; alii, ab hepate, non vero, ab utroque. Eorum qui à capite fluxione fieri afferunt, unus ab internis capitis partibus, ipsoque cerebro per spinalem medullam, vel infundibulum, vel ossa vertebrarum, vel per mediam spinalem medullam substantiam & sic per nervos in articulos derivari censet; alter vero, à capitis externis partibus & extra calvariam positus atque per summam corporis sub cute deorsum decurrere in articulos; & hæc postrema opinio fuit Fernelii, non infirmis fulta rationibus, sumptis ab iis signis, que solent arthritidem præcedere. Præcedunt enim capitis contractus, somnolentia, dolor externus, & qui contractu, præsertim in versis capillis excutitur; tumor in capite cedematofus, interdum ut cera mollis, citi præsertim ad occiputium subiectus, citi densa nec calvæ propius adhærens; atque idcirco idem Fernelius, ejusmodi tumorem pituitofum, tenuem & serofum sub cute capitis densa cumulari ac repere per venas jugulares externas à partibus infernis. Qui vero ab hepate fluere materiam dicunt per venas in articulos, his rationibus nituntur. Quod crises fiant in febribus continuus per articulum doloris; quod in arthritide frequenter conspiciantur inflammationes citi articulos, quod fieri non possit, si à capite juxta Fernelium fluere humor intrapericranium & cutem. Non enim potest femel extra venas consistens, venas rursus intrare. His addo alias, quod videmus per hæmorrhoidum ac mensium purgationes restrictas, podagras & articulares morbos tum viris tum mulieribus evenire. Dicebat enim Hippocrates lib. vi, Aphor. xxix, Mulier podagra non laborat, nisi eam menstrua defecerint. Videmus ortas nonnullas podagras à sanguine & bile, cessare vel præservari venæsectione. Sed mea opinio est, tum à capite tum à hepate fieri posse fluxionem. Et à capite quidem, per venas & arterias; raro per locum sub cute, ut putat Fernelius; nunquam vero foramen vel medullæ, quo spiritus continetur (paralysis namque fieret in deflexione) vel nucleæ, supra membranam extremam spinalem medullam in nervos transfrangere, & per eos in tendines mulculorum decurrere. Nam humor intra calviam & supra meningem non fluctat, expurgarique si adesse, posset per nares, ut omnis humor qui in cerebro conti-

A vena in
partes.

Ex supposito
ne aliquo
evacuanti
ortu podagra.

netur, per nares & palatum pellitur à natura commodius. Fernelius cum docet sub cute capitis congestum humorem tanquam deorsum ad articulos currere per summa cutis, nullo argumento id mihi videtur probasse, nisi fortassis per laxitatem nostræ cutis, & dolorem quem agri percipiunt extra procecti in frigidis regionibus & jam extra arthritidem perpelli (crassiore reddita materia ac tardiore ad motum) è cervice vel per humeros in cubitos & manus, vel per dorsum in coxendices, genas pedefque sensum devolvi, sensu interdum frigoris oborto, quo corpus omne perhorrescit. Sed quia in multis arthriticis hic dolor non semper observatur, etiamdiu eo cum morbo conficiat fuerint, & materia dilabens crassior facta sit, credendum esse materiam non in omni arthritide, si quando ea à capite defluit per humeros vel dorsum in subiectos articulos, repere per summa cutis subiecta vel summa cutis ipsius, sed per venas & arterias jugulares non solum externas, sed etiam internas (per quas ab infernis partibus, jecore præsertim, ferociter humor in capitis externas partes, nempe cerebrum, jermare in internam cavam & arteriam magnam, vel ejus magnos ramos sub jugulo constitutos, atque sic in articulos devolvi: quod nullus fane mentis negabit, qui modo intellexit per ampla hæc vala in vivo corpore repentinum ac facilem fieri fluxum ac refluxum humoris; quique observavit, ante universalem totius corporis vacationem, ab externis remediis manus vel pedi applicatis materiam refluxisse ad partes nobiles & febres continuas excitasse, multoque celebres insuper in arte medica viros, qui podagram secundum communem medicorum opinionem periculo vacare temere pronuntiaverant, eventum mendaces fecisse. Neque etiam est credendum, humorem hunc tenuem & frigidum Fernelii, initio levioris arthritidis mole tam exigua in manus pedesque ac totum unum digitum tantum illabentem, vel usque adeo esse frigidum, ut digeri à Natura non possit citius, quam in pedes à capite per tam longum spatium descendat; vel eam esse per summa corporis cutis laxitatem, quæ tam celeri motui & concoctioni vel digestionis materie per poros repugnanti conveniat. Qui enim hunc simplicem ac frigidum semper esse contendunt ex sensu cum descendit à capite frigoris oborto, quo totum corpus perhorrescit, non videntur observasse, materiam calidam sæpe sensum frigoris inducere, cum sensiles partes tangit. Si erysipelas insister in pede vel alia parte, antequam per febrem calida & biliosa materia expellatur ad partes, corpus perhorrescit, vel frigore aut rigore premittit; febrequè tertiana, quæ à bile stimulante partes sensiles, originem habent, initio sine accessibus cum horrore, rigore, ac frigore invadunt. Porro negandum non est, non per venas modo materiam ad caput repere in arthriticis, sed etiam ab aliis inferniis partibus in ventre contentis, ventriculo nempe intestinisque, vaporibus fuscitatis caput repleri, pituitofamque materiam per palatum à capite dilabi in ventriculum, mox in venas neferas eas rari, ac in jecur & venam cavam protrudi nam cum aliis humoribus, ac sic quoque per aliam viam, quam per arterias & venas labi à capite in articulos.

Centra
velum.

Innominati
fluxione
fluxione.

Centra
velum.

Podagra
per
sua
via.

Frigit
ex
ca
lida
materia
quoniam
erit.

Centra
ante
dentem.

Caput
ex
sua
via
ar
thritide.

articulos. Sed hæc via non est usque adeo conveniens tam celeri motui, qualis interdum in humore arthritico turgente solet animadverti. Cæterum ex rationibus, quibus Fernelius probat caput esse arthritidis semper originem, probant hoc tantum, quod in arthritide caput quoque offendatur, quod & in febribus ladi sæpe cernimus, ex capitis gravitate, somnolentia, dolore, non tamen propterea dicimus febrem à capite oriri: sed illud vel per consensum affectuum aliarum partium infernarum ladi; vel propter plethoram & pravum humorum copiam. Hæc enim oppressa natura tentat omnia, per quam exonerare se potest, eos per venas ad caput, renes, alvum, cutis spiracula pellendo. Quare concludimus raro aliam, quam quæ fit per venas & arterias à capite vel jecore fieri fluxionem in articulos, quod etiam sensum commode demonstratur. Videmus enim, antequam fit dolor in articulis, venas in membris, ad quæ futura est fluxio, nempe in manu vel pede, distendi ampliusque reddi, quo signo semper podagrici cognoscere solent inflare dolores: ita ut Fernelius non recte fenserit, à dolore quem jam in articulo excitavit humor qui influxit, trahi materiam inflammationis postea vel alterius tumoris, qui fere semper comparat, causam. Nam si hoc ita est, cur venæ ante dolorem tumet ac turgent, si expectandum est dolor à materia extra venas existente? Nunc autem quærat quispiam, quid fit cur, si humor per venas fluat in articulos à capite & jecore, non statim in omnibus arthriticis in extremos articulos ruat, vel in eo spatio consistat ac hæreat, quod est inter articulum & articulum. Nam dum fluat, verbi gratia, in brachium, prius in humeri articulo consistit per aliquot dies, vel in cubiti articulo, non in spatio quod est inter unum & alterum articulum. Atque ubi per aliquot dies ibi hæserit, si non sponte vel à medicamentis digeratur, tum demum ad inferiores partes transit. Res hæc à nemine, quod equidem sciam, satis considerata, majori indiget inquisitione. Fernelius, in articulum naturam, causam retulit. At enim, decursum fluxionis fieri in solis articulis, ibique materiam subsistere & hæere propterea quod illi compacti sint denique: non item in melioribus regionibus, quod amplè sint & laxæ; intelligentiam amplitudinem & laxitatem meatuum cutis, quæ circa articulos minor est, quam in intervallo medio inter duos articulos. Ego vero existimo, quod cum per magnas vias fluat materia hinc & inde in minores ramos, tamquam per fluvios in rivis, non solum pellatur, quorum extremitates in artus à natura pelluntur; in his, cum propter arctos meatus & frigidam partem naturam nequeat decurrere, vel alia coctione, in angustioribus quam per quos transit, cancellis coercita dolores in partibus sensu exquisito præditis pariens, quæret refluxum per eodem ramos, per quos in articulos invasit, in majores venas, per quas deinceps ulterius in inferiores articulos per ramos minores nutritioni inferiorum articulorum inservientes protrudunt.

Causæ ante cedentes sunt duæ præcipue, copia humorum commemoratorum in venis tam capitis, quam aliarum partium existentium, & artuum

imbecillitas; quibus addit Rhales tertiam, robur scilicet partis expellens excrementa, nempe jecoris atque capitis. Alterutra enim, vel ut plurimum ambe hæ partes principes in omni arthritide præbent humores, tamquam fontes totius mali, quibus aliquando associata cernitur ventriculi imbecillitas, orta ex humidissima, aliquando etiam frigida interperia. Caput humidifimum copia gignit excrementa, & si una frigidum fit, pituitosa, dulcia, aquosa: fin calidum, pituitosa, fassa, acria, præsertim si jecoris caliditas cooperetur. Iecur præterea plerumque impende calidum est, quod non modo copiosus vapores ex ventriculi excrementis in cibis cerebro suppediat; sed & ipsum vel sanguinem copiosum, vel atrabiles ac falsos humores generat, ac in venas defert. Externe autem causæ sunt omnes eæ, quæ plethoram & cacochymiam venis inferunt, partiumque principum intertemporem fovent, quæque imbecillitatem articulorum generant, ut fane vita ociosa vel cum paucis laboribus & exercitiis, nimia ciborum nec cuique temperamento convenientius repletio; potus vinorum generosorum multus, præsertim in jejuniis; Venus, balnea; si hæc adduntur concitantes motus, ambulationes, equitationes, præsertim flatum à colli, insueta frigida potio, animi affectus omnes, prolapus, confusio, luxatio, & si quæ sunt alia, quæ partem debilitant. Retenta excrementa, quæ vel per menses, ut mulieribus, vel per hæmorrhoidas, vel sanguinis profusum è naribus expurgari consueverunt, nonnulli inter internas causas communerant. Sed ex causis externis, vinum & Venus principem locum obtinent. Atque ideo Poëtæ Græci podagram Bacchi & Venere filium esse fluxionem. Hippocrates libro vi, Aph. xxviii & xxx ait, Eunuchos podagra non laborare, neque pueros ante usum Venere. Nam Venere non modo corpus laxum redditur, & artus debiliores, sed omnia vasa sunt ampliora. Et licet eunuchi podagra laborare dicantur, id contingit ex intemperantia vite aliisque causis externis. Sic Seneca in epistolis invehitur in mulieres, quod propter luxum, Hippocratem mendacem fecerint. Sed omnibus illis, quas cognovi, mulieribus podagra laborantibus, etiam menses fluxerint, diminute tamen fuebunt. Extat apud me questio non inane, quæ, podagrici generent podagricos. Communis medicorum scholæ respondet cum Hipp. & Gal. quod partum fecerint vitæ in partum imbecillitatem generant. Exceritur namque auctore Hipp. semen genitalis ab omnibus corporis partibus, à sanis fanum, à morbis morbosum. Horum tamen ratione, quævis antiqua, non plane mens mea quiescit. Probatio enim, quæ demonstrat semen defluat vitatum, neganda. Non enim femur defluit ab omnibus corporis partibus, à sanis fanum, à morbis morbosum. Nam à testiculis, in quibus elaboratur, diutius in partibus, & citius tempore excernitur, à testiculis vero attrahitur materia feminis & spiritus à vasis magnis, nervis scilicet magna & vena cava, per quas sanguis & spiritus vitalis funduntur in omnes corporis partes, non vero mittitur à partibus & tantum ab istis vasis recipitur & asservatur donec per coitum excernatur. Quocirca quod podagrici generent

Centra
exte
na.

Podagra
Bac
chi & Venere
filia.

Cum podagrici
generant
podagricos.

Quoniam
non
generant.

generent podagricus sit, quod materia sanguinis in podagricis fit podagrica; quemadmodum & spiritus, qui in arteriis continetur, scilicet vitiatas à pravitare humorum in massa sanguinea existentium, ex qua spiritus vitalis elaboratur, & corporis omnes partes alimentum capiunt.

Signa diagnostica.

Signa vero diagnostica satis patent ex definitione. Nam adest dolor circa articulos, modo acris, modo mitior cum pondere & gravitate membri, modo pungens, modo magis obtusus, modo profundus, modo in superficie, aliquando abmixto, ut tumor, scilicet cum tumore simplici vel nullo, prout eff natura humoris, qui ad articulum confluit, vel simplex vel mixta. Hinc apparent tumores inflammatorii, cedematosi, erysipelatosi, duriores, molliores, fluctuantes, & ex his compositi atque permixti. Qualis vero sit causa conjuncta, an humor, an simplex intemperies, manifestabit quoque sua signa. Nam humorum effe indicant tumores in articulis, tum coleres tumores, atque dolorum speciem, juvenia item & lœdenta. At qualisnam fit, simplex an commixtus humor, qui in articulum influxit, non modo ex his, sed etiam ex causis internis, eorumque signis fiet manifestum, ad quas cognoscendas inspicere oportet causas externas, & inter hæc imprimis vicus rationem que præcessit, anni tempus, aeris constitutionem, ætatem, habitum corporis, intemperiem partium principum.

Signa arthritidis.

Siguitur sanguis arthritidem causet ob copiam, pars affecta tumorem habet ingentem circa cutem, & venæ tumēt, calor in parte tumida effe moderatus, cum insigni rubore, pulsus percipitur profundus, dolor extensus, veluti in aliis inflammationibus parique pondere pars gravatur. Ea que foris fecerit applicantur, sive valde calida sint seu frigida, lædunt (quamquam sint aliqui, qui à refrigerantibus juvari scribant) ægrique assiduo exacerbationem sentiunt; & quidam per circuitus irritatione vexantur. Urinæ eorum fulvæ sunt, substantia mediocres, cum hypostasi vel nubecula vel contento albo, ætas temperamentumque corporis & partium principum, verum tempus, regio temperata apta generationi copiosi sanguinis, præcessit vicus ratio, quæ boni fut succi, maxime alentis & sanguinis copiam generantis. His nonnulli addunt alia signa, sudores nempe modicos in facie, in fronte vel capite; gravitatem, formoleantiam, quandam perturbationem in sensibus, intellectu & cogitatione, corporis lassitudinem sine labore precedente, & si quæ sunt alia, quæ indicant plethoram sanguinis.

Signa febriæ arthritidis.

Quod si bile fiat, nullus secundum Trallianum tumor in parte affecta effe conspicuus, cutis color subrubor ipseatur, qualis in erysipellate, calor ad dolor acris, sine pondere vel gravitate membri, articulus dolens læditur à calidis, juvat à frigidis applicatis, ut auctu talia, sive in potentia, exacerbationes abundantur de tertio die in tertium, febris in ipsa accessione succedit valida, cum siti & insigni rigore, urinæ conspicitur flavæ & subfulvæ, splendentes, substantiæ tenuiores, acrimoniae participes. Vicus ratio præcessit, quæ bilem geuerare abundanter potuit, ex acris & attenuantibus cibis falsisque, animi affectiones, iræ, vigilæ, mercores, curæ, fatigationes, ætas juven-

nilis adest cum temperamento corporis calido & sicco; æstivum tempus, & calida regio.

Quod si à pituita oriatur, tumor apparebit circa articulum cedematofus, hoc eff, colore subalbido aque inter cutem similis conspicietur, & cavus ad digitum compressionem, ac latus; dolor aliquando fortis, aliquando mitior, quotidiana exacerbatio notatur, quæ omnia paulatim iriunt & augentur, & per plures horas durant, brevemque intercedentem habent, immo nec unquam integre remittunt, tardiorque fit fluxio, unde tumor paulatim augetur: calidis ægri juvantur, læduntur à frigidis: adest senilis ætas, temperamentum frigidum & humidum, & talis æs, tempus hyemale, percipitur aliquando frigoris sensus. Vicus ratio præcessit refrigerans & humedans, balnea à cibo, vita ociosa ac deses, urinæ crassissimæ, aliquando perturbate in iis reperiuntur.

Quod si vero ab atra bile contingat arthritidis, tumores conspiciuntur duriores & nigro colore præditi, frigoris sensum quandoque habentes, & afficiuntur in profundo corpora, veluti atterantur & scalpantur; redit circuitus exacerbationum de quarto in quartum, mediocres magnitudine & impetu: adest ætas confectis ætatis & inclinatis ad senectutem, temperies corporis calida & sicca, aeris constitutio, regio, tempus autumnale; edulia quæ copiam bilis atræ generare poterunt, vel ipsam melancholiam; lassitudines immodicæ; urinæ tenues initio & aqueas, postea vero atiores quam naturales requirunt, modice crassæ, cum contentis ad fulcum colorem vergentibus, aliquando vero mixtum, subcrenatum & fulcum, ut Paulus & Aetius ajunt.

Sed raro à simplici humore fit arthritidis, plerumque à mixto oritur, & præcipue à bile & pituita, & tunc nonnullis ea vocatur pituita falsa, cujus indicia sunt mixta, scilicet tumor cedematofus cum calore & rubore, acrimonia in cutis superficie, urinæ variæ, modo aqueas & tenues, modo crassæ & turbidæ. Similiter fit causa arthritidis fit commixtio aliorum humorum, tunc quoque mixta apparent signa. Verum diligenter animadvertendum est, quod quandoque hæc signa non possint decipere, quod etiam ab aliis notatum video. Nam in permixtis humoribus color membri, & caliditas non decipit. Si enim bilis cum pituita permisceatur in articulo, tunc ad circumferentiam facie bilis fertur, & idcirco in cute rubedo cum flavidine & calore cernitur. Ex quibus non eff exsistendum, dolorem articulum cum hisce signis erysipelatis vel inflammationibus, fieri tantum à bile. Sic enim contra contingit, ut si bilis interius dolorem efficiat, & pars affecta exterius cernatur vel aeris vel medicamenti exterius frigidi applicati vi, alba vel livida, non propterea materia erit arthritidis causa: uti, si cum flos pituitæ dolorem efficiat, articulus vero à medicamento calido applicato, vel aeris caliditate, vel alia extrinseca causa rubet, atque calet exterius, non redde dicetur pituitam effe bile permixtam. Humor præterea, inquit Guainerius, subsistens in profundo membri, membri superficiem plerumque non mutet, & sic membri color tunc nullum tibi indicium daret. Contingit, inquit idem, ut humor frigidus ad juncturas defluat dolorem intenfum faciens,

cujus

Signa pituitæ arthritidis.

Arthritidis ab atra bile mixta signa.

Arthritidis vero à simplici tumore oritur.

Signa febriæ arthritidis.

Diætesis in febri.

Error in explanatione.

Arthritidis febriæ signa.

Arthritidis à pituita.

cujus causa febris fiat, causabitur infomneitas, pulsus velox erit, & urina tincta, dolori succurrere intendens, sanguinem, & spiritum in multa qualitate ad locum illum mandabit, quæ ex causa locus effe rubet tunc atque calet: quæ omnia calidæ materie sunt signa, est frigida fit in causa. De colore igitur membri, caliditate seu frigiditate, nisi perverset, confidendum non erit. Occurrunt enim fæcæ plurima, quæ tam caloris seu frigiditatis, quam caliditatis membri causæ esse possunt, contra tamen materie peccantis naturam. Cum igitur signa talia fallacia fæpe sint, ad alia dicta recurrendum erit. Alius autem in applicandis localibus error fæpe contingit. Nam hora paroxysmi interdum applicari frigida consueverunt, quæ aliquoties supponebatur dolorem remittunt, materia tamen frigida existente, quam hujus de causa pro tunc fortitan calidam judicamus. Contingit interdum, quod materia calida existat & fæpæ resolvatur, & sedent dolor, ex quo ad pauca respicientes, materiam istam fuisse frigidam facile judicaverimus: hinc ergo patet, quod in casu nostro ex juvenibus & lædentibus esset per se judicium fallax. Ne igitur hos in errores tam hora paroxysmi quam quietis incidat, particularia quæ supra te docui, diligenter percrutare, & super quem humorem plura concurrunt, cum in causa fore judica. Hæc ille.

Arthritis vero gallica fit, cum partium excrementa sensum colliguntur, sine defluxione admodum manifesta; & cognoscitur, quod fiat sine tumore, sed cum dolore totius periosii: dolet caput, vel sternon, vel omoplate, est nullum aditus ulcus manifestum vel intra vel extra cutem, quod nonnullis deinceps scribitur autores. Patiuntur hanc pituitosi, statim post bubones venereos non suppuratos, sed repperctos vel propter intemperatam adhibita remedia, vel usum vini statim à putridoribus: multumque exsicantibus juvantur. De nocte & temporum mutationibus exacerbatur vel excitatur, maxime flante austro, & modico lecti calore. Signa vero arthritidis est simplici intemperie orta, vel ex flatibus, sunt apud Guainerium & Valecum de Taranta.

Ita etiam Petrus Salius Diverfus lib. de Affect. part. cap. xvii, cum per nomen arthritidis intelligat omnem arthritidem impeditum motum & dolorem, arthritidem à fæccitate (quam nos pfeudoarthritidem nominabimus) oriri putavit antiquos arthritidem Hipp. lib. de internis affect. qui, ubi coxendicum dolorem à bile generari affirmavit, pariter eundem dolorem à fæccitate articuli generari testatur est: per fæccitatem non intelligens intemperiem fæccam partium solidarum articulum ipsum constituentium, videlicet ossium, ligamentorum & tendinum, sed consumptionem ejus glutinosæ humiditatis, quæ naturaliter nutritur, & ad faciliorem motum subungitur articulus ipse. Talem humorem continue natura articulis subministrat, nec exsiccat ad motum inepti reddantur. Cum autem (inquit Salius) contigerit humiditatem hanc aliqua ex causa, quæcumque ea extierit, exsiccare, tunc articuli motus impeditur, difficultasque in motu ad dolor una succedit. Hujusmodi affectum, si in coxæ articulo fiat, vocat libro citato Hippo-

crates ischiadem coxendicumve dolorem, perina de ac vocet eos, qui à fluente generatur materia. Quem eundem affectum ego non in solo coxæ, sed in quocunque alio articulo gigni posse animadverti, hincque fieri alteram arthritidis differentiationem notavi, si per arthritidem omnem articulum dolorem & impeditum motum intellexerimus. Consumpta enim ea humiditate, quæ ex natura præscripto articulos subungit & humectat, coguntur ac in unum compinguntur articuli: unde ad motum inepti ac impotentes redditi, dolore ex quocunque levissimo motu cruciantur. Tales articulum dolores in constitutionibus fæcciosis Hippocrates lib. i. i. i. Aph. xvi. fieri monebat. Quoniam ut docebat Galenus, in ejusdem aphorismi commentatione, immodicæ aeris fæccitates articulum humiditatem consumentes, eos ad motum difficiles ac impotentes reddunt, doloremque hinc nonnunquam invehunt. An autem tales affectus vero vel nomine arthritidis comprehendantur, visus eff negasse ibidem Galenus; cum tamen rem indeterminatem reliquerit: qui cum de nominibus parum sollicitus fuerit, ideo hæc ex parte, quæ circa nomen arthritidis, non circa ejus effentiam versatur, neglexit. Si autem nos per arthritidem morbum in articulis à materia fluente factum intellexerimus, tales dolores ac articulum impedimenta vel nomine arthritidis non erunt recedentes. Si vero omnem articulum impeditum motum ac dolorem pro arthritide accipiamus, hi proculdubio arthritidis nomine vocandi erunt. Quam sententiam Hippocrates lib. cit. de affect. internis clare admittit, pariter coxendicum dolorem hunc ac eum, qui à materia articulos occupante causet, appellans. Quæ dolor à sola humiditatis naturalis articulum consumptione dependet: quoniam quandocunque illa naturalis humiditas abundaverit præsentemque fit, non adeo insigniter exsiccat poterunt partes articuli solidiores, ut hinc impeditus motus aul dolor succedere queat: deficiente tamen hac humiditate ac supra modum exsiccatæ, nonnunquam ipsam communicantur hæc exsiccatio partibus ipsius solidioribus: & hoc potissimum, cum à causa externa & valida ortum ea haberit: hincque admodum exsiccatæ supra articulum tendonibus & partibus nervosis, in hac affectione consueverunt aliquando, ut notavit Hippocrates, succedere convulsiones, quas quandoque sequuntur & febres, quæ ratione doloris & cruentatis accenduntur. Hæc de nomine & effentia hujus affectus habet Salius: nunc causas recensens, inquit: Quæcumque humiditatem articulum naturalem reficere & consumere apta sunt, ea omnia talem coxendicum dolorem, talemve arthritidem causare poterunt. Vnde & diurnum ac vehementem exercitium flos factum, ut habet Hippocrates lib. de affect. intern. & fæccitates aeris immodicæ, ut habet libro i. i. i. Aphor. xvi. possunt effe eorumdem causæ: pariter & vitæ exsiccatæ hoc idem causare poterit; quoniam hinc consumptis humiditatibus internis, etiam illæ, quæ ad articulos naturaliter defluere solent, multoties consumuntur: cujus ratione, ut recitat Hippocrates vi. Epid. sect. vi.

qui

potest si abstinio pedes obducas, adeo efficax est, ut non amplius podagra infestet.

Lentissim.

Purgationes erunt instituendae pro peccantibus humoris varietate. Si enim arthritis biliosa sit, bilem purgantia erunt danda, praegressio leniente vel ex flore cassia aut pulpa tamarindorum; vel ex syrupo rosarum laxativo cum foliis fenae, vel solutio cum rosis pallidis infusis, permixta manna. In purgatione humorum biliosorum advertunt practici, permiscenda esse medicamenta bilem purgantibus ea, quae & pituitum educunt. Quod tamen non video esse necessarium, cum omnia haec, quae purgant bilem, debilitet quoque purgent pituitum. Ita preparatis prius humoribus per tres dies hoc julepo; Rec. syr. de violis unc. j. aquae cichorei, endiviae, fenchii, vel lactuca ana unc. iij.

Preparanda.

Misce pro tribus dosibus. Potest cum praedictorum herbarum decocto etiam praebere decoctum tamarindorum & bebbent. Vel detur per tres dies, singulo mane juleculum alterum cichorii, endiviae, lactuca, solatior, portulacae, fenchii, dente leonis, cucurbitae, prunorum, bebbent. Palschiana notat, in dolore magno absque syrups & coctione evacuantem esse bilem, quamvis non sit turgetur proprie. Nam quemadmodum, inquit, in vehementissimo dolore narcotica sunt necessaria, quae dolorem curant causam non auferendo: ita coactae vacuandae sunt humorum dolorem pariter vehementem sine concoctione, quia est majus auxilium nocumento. Alioquin Actio visum est, non esse prius evacuantem, quam acrimonia humoris humectata sit & temperata. Purgentur deinde de eleuario & succo rosarum cum lenitivo vel diacatholico, vel si potio esse debet; Rec. Rhubarb. electi drachm. ij. spice scrap. v. fiat infusio in aquae cichorei vel endiviae unc. iij. colat. adde syr. ros. q. unc. ij. elect. diacathol. succo rosarum ana drachm. jfs. M. F. potio. Vel fiant pilulae ex elect. & succo ros. drachm. ij. rhubarb. electi. drachm. jfs. cum syr. ros. fol. q. f. Sed hic oritur quaestio, an in solidiori forma convenienter medicamenta in arthritis biliosa? item, an arthritis requirat medicamenta purgantia & longinquis partibus? Quod pilulae in purganda arthritis magis convenient, videntur probare illi, qui existimant in arthritis omnia, quando damus medicamenta purgantia, ea praescribenda esse, quae ex longinquis partibus trahunt, cujusmodi sunt, scammonium, turpethum, hermodactylus. Nam quae in solidiori forma dantur medicamenta, ex longinquis partibus generosius trahunt, quam quae liquida sunt. Hinc praescribunt pilulae aureas, quae multum scammonii recipiunt, vel pil. ex hermodactyl. minor. drachm. j. vel scrup. iij. vel elect. & succo rosarum, ut nos fecimus. Contra vero formam pilularum hic minus convenire ajunt respectu materiae peccantis, nempe bilis, quae liquidius tutius purgatur quam solidis; deducta enim aliqua bilis fincioris quantitate ad ventrem magis torquet agros sua acrimonia & ficitate, unde requirit purgantia, quae etiam humida sint & acta & potestatem, quantum fieri potest. Huic difficultati respondeo, quod oportet distinguere arthritidem, si conjunctum habeat symptomata doloris acerbissimi; tunc oportet potius lenius & leviter purgantibus primas regiones, dare aliud medicamentum, quod

In forma solida an conveniant pilulae arthritide.

Purgantia.

ex articulis vel longinquis partibus educat. Vbi vero non est magnus dolor, qui etiam externis leniter placandus est, prius validioribus erit opus, sive in portione, sive in pilulis. Sed si in forma solida capienda sint medicamenta, potius unam vel alteram horam aliquid juris alterati cichoreo, endivia, lactuca, cucurbita superbibit potest. Extat in biliosa arthritide magnis doloribus nobile purgans, quod dicitur Hermodactylata, cujus variae sunt descriptiones, sed haec egregia, quae Fallopius testatur dolores gallicos optime leniri. Datur a nonnullis in omni genere arthritidis, statim initio ad sistendum fluxionem ad drachm. j. ad drachm. jfs. fenum mane & jure carnis pingui; & haec est ejus descriptio: Rec. Hermodactyl. turpethi ana drachm. iij. dactylid. drachm. jfs. zingiberis drachm. j. malthicis drachm. fs. facchari drachm. vj. M. fiat pulvis. Ejusdem farinae elect. caryocottum Bayri, sic dictum, quod caryophyllus & costum recipiat: Rec. Hermodactylorum alborum, ad corticibus diligenter purgatorum, dactylid. ana drach. ij. costi, cumini, zingiberis, caryophyllorum, ana drach. j. costula cribrentur, & cum syrupo facto ex melle & vino simul coctis, fiat Opjata. Datur ad drach. ij. ad unc. fs. aut drachm. vj. cum nebulis, aut vino albo non potenti & austerio, fumino mane. Admucant auctores hermodactylum cum melle, malthicem, zingiber, aliaque similia, quoniam teste Tralliano lib. x. i. § de Antid. quae nomina dolorem levant, efficiunt, ne ii, qui hermodactylis utuntur, crebrius fluxione, ut aliquo contingit, irriterent. Alii etiam euphorbium admiscuerunt, arbitrati hermodactylis refrigeratiorum quippiam habere & narcoticum; alii id negant ob insignem cum virtutem purgandi: sed falsum esse arbitratur Trallianus. Omnibus enim, inquit, qui bibenter venit, ut eo die stomachus cibis qui offeruntur, non oblectetur. Idonea igitur sunt, quae cumino, zingibere & pipere participant; & malthicis ipsius, quae stomachum offendit, resistunt, sed nullum adeo, ut aloce ipsi adjecta opitulari potest. Observandum est praeterea quod ego facio femper, ut cum praeservari debent ab arthritide agroti, in purgationibus non utamur iis, in quibus ingreditur hermodactylus. Non enim opus est educere humores ex iis partibus, in quas adhuc nec deciderit (nisi antiqua & nodosa sit arthritidis, quae per frequentes accessiones suos habet dolorem recursum) & ideo finis contenti iis, quae venas & caput, si consentit, purgant post leves primarium viarum purgationes. Aliqui hic tempore accessions abstineri volunt a praescriptis validioribus medicamentis, & non nisi levioribus esse faciendam purgationem, vel validioribus in minori quantitate, & recte. Nam fortes purgationes humorum copiam insignem a partibus ignobilioribus & externis trahunt ad partes nobiliores & internas. Unde contingit aliquid nonnullis ab insigni purgante in febrem ardentem malignam incidisse atque fuisse, mirantibus amicis in morbo periculum, in quo nullum alias solet esse. Ideo in arthritide biliosa caute elect. purgantem, & (ut nonnulli recte monent) tempore accessions instantis oportere necessarium lenissimum medicamentum ad contrahendum dato, ut triphera perica, quae lenissime evacuat citra agitationem humorum, ut, ne magis

Hermodactylus descriptio.

Caryocottum descriptio.

Purgatio in longinqua.

Vomitio in pituitosa.

Purgatio in arthritide periculis.

irritetur

irriteretur defluxio. Atque eo etiam assero me plurimos blandis medicamentis saepe repetitis & temperatis, vel non multum calefacientibus curasse feliciter, quos jam defluxio in pedes & alias partes detinuerat, ut cum proba victus ratione uterentur, non amplius malum redierit. Nec mirum: non enim cum humorem, qui jam in articulis defluerat, per purgantia tollere curavi. Etenim natura sua sponte, levioribus medicamentis paulatim ab onere & multitudine pravorum humorum, qui sunt in venis & prima corporis regione allevata, insurgit ad expulsionem reliquorum sua vi expultrice, quam paulatim per omnem corporis viam extrudere molitur; per sudores scilicet & halitus factos per cutis poros, per quos etiam discutitur materia in articulos fluxa; per urinas, unde videmus eos, qui a suo paroxysmo incipiunt convalescere, copiosius mingere quam consueverant, ubi vero morbus incipit, minus quam potius reperi, per intestina in qua maxima humorum pars per venas iterum depellitur, quae si multa sit & confertum fluxu, alvi sequitur fluxus: si vero modice confluit, non sequitur, sed a medicamento facile depellitur; & ideo non sunt semper vel singulis diebus praebendae purgationes, etiam si sit corpus cacochymum, ut in omni arthritide fere esse solet; sed singulis fere quatuor diebus vel pluribus, ut denuo biliosa ea etiam pituitosa materia, ex aliis corporis partibus ad ventrem confluens per venas, prius iterum colligatur in prima regione corporis. Quod autem natura vim quandam fingularem semper habeat expellendi pituitum & biliosum excrementa per alvum ex omnibus corporis partibus, probatur exemplo infantum recens natum, qui cum nondum quidquam comederint, copiosissima excrementa pituitosa, biliosa atque adusta, in ventre dum adhuc essent in utero matris collecta, ab omnibus corporis partibus per duos vel plures dies expellunt. Quod si autem arthritis fuerit languinea, eadem illi purgatio decernenda, quae biliosa. Sanguis enim inflammatur & in bilem vertitur, ferumque redditur acrius, si in corpore praeter naturam copiosius continetur. Itaque bilem & ferum purgantia erunt danda. Pro pituitosa vero arthritidis purgatione, vomitus, si aegri constituto ad eum apta sit, in primis decernendus est, per longa intervalla, modo a cibo, modo a stomacho vacuo, sint autem vomitoria blanda & tutiora, ut oxymel, prius sine; & deinde cum raphano, post cenam alium sumptum, & parvo intervallo aquam calidam post sumptam vomitum facere, auctor est Octavius Horatianus. Nam in ventriculo a valido medicamento pituitosus humor attractus, periculum inducere potest. Si valentius quaeramus proderit oxymel cum jure carnis pinguis vituli vel pulli non salci, addito oleo amygdalarum dulcium vel decocto hordei cum butyro recenti. Forestus laudat magis vomitum in ischiatica, quam in chira, propter diversitatem magis convenientem. Actus etiam in biliosa arthritide vomitum praescribit, ex aqua tepida cum aceti exiguo, vel syr. acetoso permixto. Dantur pilulae ex hiera cum agarico, vel aloephagine, & de agarico, vel assaerete, cum infusione agarici in oxymelte, aut melle rosaceo solutivo & decocto betonicae & polydii. Nam agari-

cum, teste Plinio, facit ad articulum dolores, si cum aceto multo pari pondere sumatur. Alibi namque etiam scribit, oxymel sumptum simpliciter credi articulum morbo confectis prodesse. Extenentur & deteguntur per quatuor vel quinque dies humores melle rosaceo colato, vel oxymelte, syrupo & betonica, & fluxade (ante perfectam purgationem a diureticis semper abstinento, quod notum quidem, calculo renium & vesicae affectos ex usu longo diureticorum ex arthriticis rogis evadere) cum decocto betonicae, florum rosamarinii, salviae, iuae, stachados, ligni guajaci & aliiis eorundem, aromatizatis cum pulvis diarrhodon abattendi drachm. fs. pro singula dosi. Postea eadem purgantia repetantur, vel capiat pil. imperialium scrup. iij. vel elect. dianciorum drach. iij. vel pilularum fetidarum & arthriticarum vel sine quibus drach. j. Si fuerit melancholica arthritidis, confert pro leniente dare elect. lenitivum & diacathol. cum trochiscis de violis sine scammonio. Si atra bilis fuerit, decocto ephymii, fol. fenae, polydii, florum cordialium, fumarie, lupulorum; cum syrupo rosaceo solutivo. Preparanda. fiat cum syr. de fumarie, scolopendria, & succo buglossae, vel violarum cum decocto fumarie, boraginis, ceterach, lupulorum, polydii, mellificae. Purgatio fiat cum elect. diacathol. & confectio Hamech, vel diaphanum. Vel fiat potio, quae Rec. Herb. fumarie ceterach, capilli veneris, mellificae, florum cordialium ana manip. fs. glycyrrhizae, polydii, uvarum passul. ana unc. v. coquantur in aquae suff. quant. ad unc. v. addendo in fine ephymii unc. fs. vel drach. iij. decocto per cribrum colato addantur caliae fistulae, vel mannae calabrae unc. v. confect. Hamech, diaphenicon ana drach. fs. syrapi violacei fol. unc. j. M. pro potu, capiat in aurora. Deinde alterius diebus, quia hic humor est rebellis, detur decoctum ephymii ad drach. ij. in ferro caprino cum drach. ij. cort. myrobolanorum indorum infusum in ferro caprino per duodecim horas. Vel singulis diebus, & per septem dies, capiat decoctum hellebori nigri preparati ad drach. j. in feri caprini cum floribus violarum & buglossae alterati, libra una. Vltimo dentur pilulae Indae, & arthriticae, ana scrup. ij. Sed raro contingit ab atra bile arthritidis, plerumque ex mixtis humoribus originem trahit, & propterea mixtae debent esse in purgationibus praescribendis intertentiones, hoc est, danda erunt medicamenta purgantia, quae & bilem flavam, & atram, & pituitum purgent simul.

Purgato corpore, partium principum intemperies corrigatur ea ratione, qua in eorum morbis a praescriptis est traditum. Nonnulli statim veniunt ad ea, quae nervos & articulos roborant, interius remediis; externis vero pugnant cum parte affecta, ejus dolorem mitigando, & debilitatem corroborando: facti statim, facta purgatione, accedunt ad usum resinae theriacinalis, quae nervos mundat, alvum solvit, jecur, lienem, renes, pulmones, & intestina abstergit: dant magis singulis septimanis facta concoctione drachm. fs. cum aqua ivor lotam, hybernus temporibus praecipue. Fernelius, si humorum, inquit, reliqua sumendis digerenda, dissipandaque videbuntur, in id apta erunt simplicia, quae ad cerebri affectus supra attulimus

Lentissim in melancholica arthritide.

Preparanda.

Purgatio.

Corrivi.

quandoquidem nervorum eadem atque cerebri est ratio. Proprie vero, & particulariter ad artum dolores, hec commendantur; helenii radix, & irisidis, chamæpitys, verbaſcula duo, calamenchtha, acori radix, centaureum minus, hermodactylus in apozematia aliavē compositiones aptandus. Herba chamædrys, inquit Innominiatus, in pulvere tenuissimum redacta cum aqua calida paragoricum est. Dosis sit drach. ſs. vel j. Dioscorides chamædrys decoctum, betonicum herbam in vino amomi aut androsaces, aut mel decoctum cum aqua, succum est centauro minorē, arthriticis assumpta subvenire dicit. Juvarē item & efum vitæ, de quo & infra dicemus. Extant apud Alexandrum Trallianum, & Plinium Valerianum antidota, quibus in totum quempiam liberari promittunt: ea mane quinque vel sex horis ante cibum debent assumi per annum, cum optimo vitæ regimine. Sed in causa calida nō magis puto convenire, experientia edoctus, quam pulverem foliorum cicorii sylvestris, mense Maio collecta, & in umbra exsiccaturum: ejus datur drach. j. vel scrup. ij, cum jure carnis pulli non saliti, mane quatuor horis ante prandium, & vesperi cum vitæ dormitum, vel absque cœna, vel cum cœna parca: hoc vidi in biliola podagra incipientes jam fluxiones ita cessasse, ut minor paroxysmus redierit, & breviori tempore duraret, duobus vel tribus diebus continuus assumptus. Verum in causa frigida, vel mixta ex frigidis & calidis humoribus, conducent fomentum antidota prædictorum autorum, diacoralium Tralliani, Theriaca Andromachi, & Mitridatum, tum etiam antidotum alexipharmaca contra litem gallicam Fernelii; de quibus drach. j. per annum & hyemem fumere satis est, superbibendo mane unc. iij, vel v, aque communis tepidae. Antidotus podagrica nostra, Rec. Trochisc. de vipera, fol. centaury minoris, chamæpitys, betonica in umbra cum charta siccaturum, ana unc. j, chamædrys unc. j, rad. gentianæ, aristolochiæ rotundæ, pæoniæ, bardanæ, ana unc. j, baccarum lauri, myrrhæ, rhabarbari electi, spicæ nardi, ana unc. ſs. caryophyllorum drach. ij. In pulvere cuncta redacta serventur in vitro bene clauso, vel cum melle depurato fiat electuarium ad formam opiæ: dosis in pulvere scrup. j, opiæ drachma una, superbibendo aquam tepidam. Haustulae regiæ radicem drach. j, pondere potam dolores podagræ sanare Plinius auctor est. Quidam offium humorum cinerem, vel alterius animalis quadrupedis à drach. j, ad drachm. ij, dant secundum Rhalem ex aqua communi. Guainerius insuper jubet chirragicum fumere ossa manus; podagricum, pedum, ex syrupo convenienti. Valet & pulvis stomachici vulturis, vel pulmonis vulpis, sæpe bibitus ex syrupo de iava, vel cichorea. Verum mihi imprimis placet ita vitæ purgatione non tantum pro curatione paroxysmorum, sed etiam pro præservatione impoſtumorū decoctum falſæ, chinæ, atque ligni guajac, alteratum cum iis, quæ & roburant partes internas, & humorum peccantium reliquias (quæ recidivas facere conſueverunt) tollant digerendo per sudores, ac per victum exſiccando intemperiem quoque partium corrigant. Idcirco si bilis abundans arthritidis causa est, decoctum chinæ opitulabi-

Cicorii folia
ſive ſiliæ.Andromachæ
antidotum
ſive ſiliæ.

Chinæ decoctum.

tur, alteratum cum cichorea, endivia, plantagine, ſoncho, quibus nil eorum indendum est, quod vel nervos vel articulos robore dicatur: quod ea quoque calore impediunt jecoris refrigerationem, quæ in hoc casu procuranda est, ad prohibendum materiæ biliolæ regenerationem. Imo multi curati sunt solo cichorio vel dente leonis, vel ſoncho; datis eorum per quadraginta dies fucis ex jure pulli non saliti, vel concisis herbis, & ad spissitudinem pulvis coctis, ac comestis pro jentaculo summo mane: quibus mire jecur ab obſtructionibus & intemperie liberatum vidimus. Externis prædictis dum sumitur simile aliquid decoctum in præſervationis cura, erunt articuli iis corroborandi, quæ mox recensentur. Capere decoctum poterit per triginta dies cum victu neque admodum exſiccante, neque multum humectante, neque valde tenui. Comedat carnes vitulinæ, vel gallinarum & caponum afflas, panem bene coctum.

Quod si autem dolores necessitas, vel initio paroxysmi dum purgatur corpus, vel post purgationem dum capitur decoctum chinæ fuſorificum, topicis cum mitigari poſſent, fomentum cum panis lineis sæpe ſæpius renovatis imbutisque ac marinis lineis sæpe ſæpius renovatis imbutisque ac marinis lineis, quædam supra dolentem partem emulgeri jufferunt cum magno levamine. Poſſunt & alia lacti permisceri in eundem uſum; ut farina hordei, panis medulla, oleum violaceum, roſaceum, humbucorum, unguentum populeum, ut fiat cataplasma: quod fiet validius, si lactuca, fempervivæ, portulacæ, cicorii, folatril folia, vel aqua coquantur, vel lacti permiscantur, una cum mucilaginibus ſem. pſyllii, althææ, cydoniorum, extractis cum aqua roſarum, vel folatril, vel plantaginibus: quæ mucilagine quoque per se ſolæ conveniunt illiæ. Sed cum admodum refrigerantibus caute progrediendum; itidemque notandum, ut quando lac cataplasmatibus inditur ad ſedandum fluxiones, ne pars ſeroſa, quæ vim habere dicitur anodynā, evaneſcat, vel lac fiat coctioe acris, & calēſca atque emplaſtica, quæ relinquatur, ſua additione magis noceat. Foreſtus, loco ſalutis credimur obolendo partes affectas, dolorem intensissimum mirum in modum ſedavit. Idemque reſert Simonem quendam Leidanum, lenticulum palustrem & flores chamomelæ decoctis in lacte, addendum parum farine hordei in ſine in modum cataplasmatibus, & appoſuiſſe ad ſedandum dolorem cum maximo miraculo, in progreſſu vero plus farine hordei addidiſſe. Vtor quoque interdum Fernelii fomento ad podagræ chirragæque podagræ præſcripto ex aquis ſillatitris roſarum, plantaginibus, ſolatril cum aceti quadrante, quod reprimat fluxiones, & collectam materiā quodammodo diſcutit. Plinius, radicem cucumeris podagricis decoquit in aceto pro præſentaneo remedio: item ramenta corticis cucurbitæ recentis ad podagræ refrigerandam. Opitulatur etiam frequenter experimento ovi luteum cum oleo violaceo ſubactum, vel aquis ſillatitricis prædictarum herbarum, aut earundem fucis: præterea pulpa caſſiæ ſilulæ cum ſucco ſolatril vel aqua, juxta

Avicennæ.

Vitis aqua
ſillatitricis.

Vitis aqua.

Topicis.

Vitis aqua.

Avicennam, æſtate frigide cum panis lineis, hyeme tepide applicetur. Dicitur & aqua ranarum ſillatitricis, & oleum mirabiliter hic prodeſſe, tum experientia quorundam, tum Plinii auctoritate; qui lib. xxxi i ſcribit oleum articularibus morbis utiliſſimum eſſe, in quo decocta eſt rana & ipſius inteſtina. Plinius Valerianum muſcum, qui in aqua naſcitur, tritum & impoſitum commendat, & limum aquaticum cum oleo ſubactum. Apud Moravos Olmutiensis nobile nuper hoc experimentum didici pro ſedandis illico doloribus podagricorum. Rec. herbam barbicapram, quæ alias dicitur ulmaria aſud vulgum & Brunſellio Primonon; ea cum ſuis radicibus floribusque deſtillatur, & in aqua hæc panis linei madaſacti impoſitur podagricis, vel cum penia ſillatitricis articulo dolenti, juvatque plurimum, nec citra rationem. Cum enim adtingitur dicitur & refrigerare; articulo calidis fluxionibus reprimendis & ſillatitricis plurimum conducere poſſet. Sutor quidam Vienneſis natura bilioſus, podagra circa magnam pedis pollicem atrociter corripit, multis remediis fruſtra tentatis, tandem omni dolore liberatur cataplasmate ſæpius de re renovato ex ſtercore vaccino recenti in fartagine cum butyro friſco, quo poſtea & alios ab immanibus doloribus ſanavit. Dioscorides in Euporſit, ſive parabilibus, ſtercus bubulum calens impoſitum podagræ; & ſtercus caprinum tritum cum axungia & veteri capillo adſu. Experius fuiſſe piſcis cyprini inunctum proſiſſe podagricis. Sed communiter in omni fere arthritide à quacunque cauſa oriatur, ſoleo feliciter uti (ſi quando poſſet applicari) cataplasmate ex vicio & panis medulla factis. Si ſit cauſa calida vinum rubrum capio, cui addo oleum roſaceum: ſi frigida vel mixta, vinum album cum pulvere florum chamæmelis, ſurſuribus bene tritis & oleo roſaceo. Hoc autem cataplasma ex pane & vino non modo omnem fluxionem repellit, ſed & influxum humorem non mediocriter digerit: imo inſtante paroxysmo, ſi manibus vel pedibus applicetur, prohibet chirragicam vel podagricam fluxionem, quamdiu adhæbetur parti debilitata, ut in multis experiri ſumus, tum præcipue in Principe de Lichtenſtan anno 1613. Barbari quidam, emplaſtrum ex ſcordio in aceto cocto, vel mixto cum aqua, omnibus podagricis conferre ſcribunt. Notandum omnia ea, quæ podagricis in cauſa calida applicantur, ad tollendos vel mitigandos dolores, æſtate frigida, hyeme tepida eſſe adhibenda.

Dolores autem intolerabiles, nec prædictis remediis mitigati, narcotica requirunt, cum ea tamen cautela, ut ſimilitaque ſint miſiores reddit ſtatim à narcoticis abſtineatur, quæ etiam in exitu quo doſi erunt præſcribenda. Longior enim eorum uſus & in majori quam conſuevit copia contrahendo humorem inſluxum, ac in topophos vertens, motus articularum perdifficiles parit & tardos longo tempore, & ſenſum obtuſum; unde ablato calore, calēſcentibus erunt partes fovende, roborande ac ſecandæ. Igitur narcotica in tali cataplasmate pererunt adhiberi: Rec. far. hordei utric. iij, medullæ panis tritici unc. j, lactis q. ſ. ad ignem parvum miſce, donec coctat ad conſiſtentiam mellis, cui addæ olei roſacei unc. j, vitellos

ovorum ij, opii ſcrup. j, cui & drachma feminis hyoſcyami addi poſſet, & ſcrup. ſs. catore, ad corrigendum opium, præſertim ſi aliquis humor pituitoſus permixtus eſſet. Ronelectus crocum impoſoner: quia ubi opium vel hyoſcyamus vel mandragora ingreditur medicamentum, croco corrigat. Palchafius hoc cataplasma laudat in doloribus intolerabilibus à cauſa calida. Rec. far. hordei ſine fuſſure, medullæ panis ana p. j, ſol. hyoſcyami, malvæ, violarum, ana M. j, florum chamæmelis, corticis papaveris albi, ana p. j, ex his decoctis fiat cataplasma, addendo oleum humbucorum, & papaveris, ana unc. j, opii & croci, ana drach. ſs. quo cataplasma ſuper folia lactucæ, ſuppoſito panno lineo diſtendatur, & forinſecus impoſitur ſuper cataplasma folia betæ. Poſt uſum horum narcoticorum vel anodynorum refrigerantium calidis fomentis, ut decocto pulegii, falviæ, origani, calaminthæ, centaurei minoris & ſimilium in aqua vel vino, loci dolentes trīguntur ac corroborantur, ne frigiditas nimia adhibitorum quidquam noceat. Porro arthritidis, quæ eſt à ſanguine iſdem anodynis tractatur quibus ea, quæ à bile fit, niſi quod in hac, quæ à ſanguine fit, refrigerare conveniat cum minus humectantibus & relaxantibus. Vnde eligenda ſunt, quæ exterius applicantur, refrigerantia, cum iis quæ nonnulli exſiccant & adſtringunt, & moderate quoque diſtendunt. Parietaria in aqua vel poſca cocta foveantur pedes. Nam hujus herbae decoctum teſte Aſulepio mire ſanat podagram, ſi pedes eo foveantur. Conducere etiam cataplasma ex lacte, pane & oleo roſaceo omphacino cum ſucco ſempervivæ. Vel Rec. far. hordei, fabarum, ana unc. ij, coquantur in vino & aqua ad conſiſtentiam cataplasmatibus levigati, addendo in ſine olei roſacei unc. ij, pulv. foliorum parietariæ drach. ij, Miſce. Coquantur & aliud cataplasma ex medullæ panis in poſca cum oleo roſaceo & pulv. florum chamæmelis. Omnis etiam generis inflammationi conducit medulla panis aquæ frigide immerſa, & cum oleo communi ſubacta in formam cataplasmatibus. Emplaſtrum expertum apud Plinium Valerianum extat, quod ſemper nobiſcum ferre poſſimus; Rec. ceruſæ & ſpumæ argenti ana unc. ij, ceræ punice unc. ſex, axungie porcinæ veteris colatæ lib. i, ceruſam flos & ſpumam in thebaico mortario tandiu teras donec in pulverem redigas, ceram autem & axungiam ſolve, & pulverem totum paulatim admicebis, & levato cacabo immittes manum, & agitatibus tepidum donec omnia ſolvantur, & ſic in patellam fundes, ut congelet, ſerventurque munde, & cum opus fuerit maxilatum cum oleo roſaceo impoſitur.

Repetentia.

K 3

dolere incipit, in femore. His enim locis tritum vel quatuor digitorum transversum latitudine pannus leneus unguento confectus, vel cataplasmate, vel linimento imbutus circumcirca imponitur. Pulvis confectus albumine ovi & aceto exceptus circumducitur. Vel cataplasma ex fructibus liti arboris (guajacum Patavinum dicitur apud Herbarios) nondum maturis, pyris sylvestribus, malis coroneis, forbis, cornis aut corundem succis, exceptis pulvere myrtillorum, balauftiorum, fumach, radicis bifortæ, additis bolo armenia vel sanguine draconis, farina fabarum & lentium, scacia, hypochilide, portione acetii & olei rosacei omphacini, myrtillorum, cotoneorum, ne nimium & statim arefcat cataplasma. Item Rec. boli armenia orientalis unc. j. fs. lithargyri argentei unc. fs. fucci mali granati acidi vel cydoniorum, acetii, olei rosacei omphacini, ana q. s. M. fiat linimentum forma nutriti. Ceterum ubi materia non amplius influit, sed quæ influit crassior facta fuerit, coquequens ac digerens cataplasma impo-
nendum est, cum refrigerantibus castigatum. Tale est, quod Rec. rad. althææ & malvæ ana unc. ij, parietariæ, violariæ, malvæ, florum violarum, melioli, ana m. j, coctis in aqua & contusis additæ farinae hordei unc. ij, farinae feni. lini & fenicigæ ana unc. j, vitellos ovorum ij, olei rosacei & chamæmelini ana unc. j, fs. M. fiat cataplasma. Post coctum usum apponi potest diachylum simplex, vel diaplasma emplastrum cum oleo amygdalarum dulcium vel liliorum alborum mollificatum. Alexander Trallianus articulis statim, inflammatione tentari incipientibus, cataplasma inducit, quod ex cortice mali punici & rhoe obsoniorum diliger in vino coctis, addita polenta & semperivo parat. Ad ejus imitationem ex Galeno Bayensis mirabile esse dicit hoc cataplasma, quod Rec. corticum mali granati M. ij, coquantur in vino ad mollitudinem, postea Rec. fol. sempervivi, cy-
marum rubi ana M. j, contusa cribrentur & adde far. hordei non maturi M. j, cum sufficienti quantitate vini prædictæ decoctionis fiat cataplasma coctis omnibus parum: imponatur articulis æstæ, frigide, hyme, tepide. Aucta inflammatione fovet Trallianus cerembrocho dicto fomento, quod constat ex fapæ partibus duabus, rosacei ana, & ceræ modico, ut fomentum crassius efficiatur, quod exceptum lanis succidis imponitur hyme, tepide, æstæ, frigide. At si in profundo fuerit inflammatio natri paululum & olei dulcis, loco rosacei, fapæ admiscet. Quod si dolor alius remanserit cataplasma imponit factum ex foliis braccicæ coctis lavativique diliger, in quibus fex acetii, ovorum lutea duo, & rosacei paululum addicetur.

In pituitosa arthritide post universalia conveni-
decodum falsæ & ligni Guajacini, prout vel minus est calefaciendum, & arthriti est fin-
ferior. Nec est inconveniens decoctum radicis
bardanæ, cum incidat, discutiatur, fusoderum fit,
& urinas moveat. Applicatam enim foris radicem
tritan potaginis succurrere, dolores sedando,
testis est Dioscorides. Refert Forester, Vastellum
Pensionarium Mechliniensem cum in lecto de-
cumbere ex doloribus articularum, ut nulla memo-
ria movere posset, bibisse cerevisiam, in qua radix

lappæ incocta erat: qua epotâ, cum hollis reme-
diis à medicis curari posset, plurimum minxit lo-
tium album inlactis, & à doloribus liberatus
fuit. Rondeletius dicit le multos vindicasse ab hoc
morbo, vel portione aquæ, quibus per defluxio-
nem fiebat, & frequenti vomitu, vel purgatione
per alvum. Puto aquæ potum in causa pituitosa
fieriore nullo pacto convenire, quod conco-
ctioni ejus resistat, quæ in hoc malo est perquam
necessaria: nisi calor natus sit satis viget, qui eam
concoquat ac per se digerat, interea dum corpus
ab excrementis vacuum tenetur, quod fortassis
fecit Rondeletius frequenti facto vomitu cum
aqua tepida. Idem autor ad corpus humidum ex-
ficandum dat drachm. j. hujus pulveris sequen-
tis, hora matutina: Rec. cineris priapi tauri & cra-
ni hominis, ana drach. ij, galangæ drach. j, fa-
chari canti drach. ij, M. deinde reverterit ad pi-
lulas purgantes ex agarici trochiscati & rhabar-
bari ana drach. ij, rad. aristolochiæ & quinq. queso-
lii, ana scrup. j, galangæ, caryophyllorum, fipice-
narii, ana scrup. fs. malaxentur cum succo braf-
sicæ vel rosarum, & fiant pilule de quibus capiat
semel in hebdomada drachmum feni, vel singulis
diebus pilulas duas. At instante paroxysmo abstin-
endum à medicamentis purgantibus, sobria victus
ratione præscripta & quiete. Non antequam infest
paroxysmus per aliquot dies, nempe octo vel de-
cem, non cesset à ratione alienum tenem vel de-
rationem instituire, & postea sic purgare. Quod
vero spectat ad externa præsidia, si materia jam
fluere ad aliquam partem incipit, defendere eam
oportet defensivo supra articulum, in quem fla-
xura est, apposito, & cataplasma statim inducen-
dum est pedibus vel manibus confectum ex pane
vinque & lixivii modico cum portunculâ falsis,
ut si quæ materia levis irreperit, exsicetur, dis-
cutiatur, prohibeaturque ne alia inflat. Quod si
verum jam fluxerit in partem, multis anodynis vel
uti in causa calida non censeo esse opus, quod po-
dagra à causa frigida non ulque adeo doleat. Sæpe
arthritici à pituita contingit, ut cedemata post
dolores sedatos remaneant, quæ optime disci-
tuntur fomento ex fale torrefacto fapæ renova-
to quod non fuit in topoth materiam concre-
scere, ut Trallianus observavit: vel potest fieri
fasculus ex fale torrefacto, milio & fursibus,
quod calido locus affectus sæpe foveatur. At si ex
bile & pituita permixta fit arthritis, anodyna sint ex
calidis & frigidis temperata. In podagricis do-
loribus, cum calore aut frigore præter naturam,
Fallopium utitur hoc emplastro, quod valde dolo-
rem fedari scribit: Rec. olei rosacei, chamæ-
meli, anethini, & lumbicorum unc. ana unc. ij, furis-
rum, pulv. florum chamæmel, farinæ hordei, ana
M. j, cespis unc. j. fs. acetii unc. j. fapæ unc. x. M.
& coque in fargine ad formam emplatri, quod
calido locus fovetur, postea illinitur fove cassæ.

Valent etiam quorundam testimonia hermoda-
ctyli pulverati & cum farina hordei & vitellis ovo-
rum in massam redacti, quæ massæ extensa fuper
lineum pannum loco patienti callis applicetur, per
modum emplatri. Ægineta & Trallianus thy-
mum, origanum, faturejam, & calamintham in
aceto acerrimo decoquunt probe, quo aceto ad-
huc calido affectas partes non modo semel aut
iterum,

Rondeletius
pulvis.Foris im-
ponitur.Emplastrum
italicum.

iterum, sed sæpius & frequenter super infundunt
& foveat, fatenturque permultos sanatos per-
fekte fuisse, quibus non modo à pituita, sed etiam
à bile erat podagra infesta. At Elidæus de Padoa-
nis, ut ex m. didici, in causa frigida vel mixtis
humoribus biliosis & pituitosis laudat oleum myr-
rhæ. Ad podagram & omnem tumorem nervo-
rum, herbe plantaginis folia trita & cum salis mo-
dico impofita, optime facere certum est quorundam
experimentis. Ad omnem speciem podagræ
aut guttæ, suffumigium cum foliis urticæ vivæ ab
aliquibus celebratur. Herbam betonicam decoctam
ad tertias, & aquam potui datam, ac per-
eque illam tritam & impofitam, mirifice dolores
tollere notatum invenio inter experimentatores.
Quantum valeant caules rubei, foliis suis ad ignem
calefactis & impofitis apud Forestum legitur, qui
recitat nonnullos his fapæ renovatis, dolores non
modo tolli vel leniri, sed & eisdem humores re-
solv. Obliunt nonnulli folia prius butyro recen-
ti & ita applicant, alii simpliciter sine ulla in-
guentis. Idem Forestus hoc unguento plurimos
ab arthritici doloribus liberatos recenset. Rec.
fipites duos sambuci decem vel duodecim digi-
torum, à quibus extrahatur pulpa interior seu me-
dulla intus latus, demum impleantur rursus cra-
fo fale, & luto utrique foramina figillantur, ne
fal exeat, postea in tegula nigra fapius circum-
volvendo comburantur, & fiat pulvis, cui addatur
olei lavendulæ & rosacei tantum, quod sufficiat
& coeat in unguentum, quod loca affecta perun-
gantur. Emplastrum præterea laudat Lucae
medici Delphensis in arthritide ab omni causa, quan-
quam in frigida magis convenire videatur. Hoc
Rec. ficum seu caricarum pinguium quantum
volueris, contundatur & cum semine finapius
contusito, pane albissimo trito & cocto, atque ra-
dice lepidi Germanicæ præstet Kraut, & axungia
porcinæ, concinentur emplastrum. Trallianus scri-
bit se quandam novisse, solo finapi in frigidorum
humorum defluxionibus, dum maxime urgerent,
accessiones feliciter dolore liberasse. Admisce-
bat ei frequenter caricas, & cum aceto in empla-
strum formabat. Sed in usu (ad quem aliquando
pervenire non cogit pertinacia dolorum, qui in-
terdum immutari nequeunt, nisi aliquod acris
ipsum admoveas) ejusmodi acrium ut sunt finapi,
euphorbium, cantharides, allium, & alia quibus
ad phenigmos utitur, observandum, ut cum mol-
lientibus permisceantur, ne tenui humore attra-
cto quod crassius est in articulis relinquatur & im-
pingatur, nimiumque exaffentur humores à po-
tenti fecandi & calefacendi virtute. Dioscorides
in Parabilibus, ad podagram commendat sambuci
folia cum caulibus trita, additis maribus & adipi.
Experimentum regi cuiusdam chirurgi, inquit Mi-
zaldus, adversus chiragras & podagras: Habe mani-
pulum arthemisæ, deservafecto in oleo dulci oli-
varum, dum decrescat ad tertias, & eo dolen-
tem locum innunge, senties brevi tempore dolo-
rem fedari. Qui plura cupit, ea apud insignes pra-
cticos reperiet fere innumera: apud Dioscoridem
& Herbarios non pauca. Sedatis jam doloribus
reliquitur humorum sunt resolvende, ne in totum
paucitatem, præsertim ex iteratis fluxionibus, con-
crefcant. Inter ea remedia, quæ supra podagræ &

arthritidi convenire inter anodyna recensimus,
non pauca leviter discutiunt mixtaque habent vi-
res, tum humorum reliquias dissipandi & exsic-
candi, tum dolores mitigandi, ut alio non fit opus.
At ex iis anodynis, quibus partes affectæ Refrigan-
tiantur, ad accendas inflammationes & ardorem
humorum compescendum; vel quæ leniunt, tem-
perant quæ foveat calorem, sine humorum ali-
qua insigni diffuffione pro humorum reliquiis ab-
sumendis, inter leviora conveniunt olea liliorum
alborum, chamæmelinum, vulpinum, cui addi po-
test, ut fiat validius, modicum aquæ vitæ: vel
oleum irinum, rutaceum, lumbicorum, cum gutris
aliquot spiritus terebinthina refinæ in causa
frigidiore. Valebit etiam unguentum anferis à Ga-
liacno delcriptum, adeps viperinus, oleum viperi-
num, quod fit ex libra una olei antiquissimi, cui
incoquitur viperæ una cum ruta manip. i, hoc
pars affecta illinatur. Sanat egregie & est reme-
dium Abolay. Ex cinere cyclaminis cum aceto
& melle factum emplastrum, dicitur esse mirabi-
le: item ammoniacum cum fapæ vini vel cinere
calum. Stercus caprarum cum hordei farina &
oxymelte in forma cataplasmati impofitum, dif-
cutit egregie, & dissolvit etiam incipientes nodos.
Cinis farfartius aut ex braccica cum axungia &
oleo convenienter illinitur. Nam cedemata dif-
cutit, & articulum molli, contusionibus ac do-
loribus mire prodest. Experimentum Plateri &
aliorum: Rec. limacis ex cochleis demptas xxv,
granorum ebuli recentium, vel loco corum hivaæ
& falsis ana q. s. in vase mudo vel vitro furtus per-
futo primum ponatur limaces, tum grana ebuli
cum fale, & repetatur, donec totum fuerit im-
positum; hoc in loco obscuro vel cella vinaria flu-
pendens vas suppones, quod excipiat liquorem;
qui fupta pannos lineos difcutens podagræ appo-
nitur in declinatione, tophum non fuit fecere
& extrahit brevi ex alto humorem multum.
Laudatur etiam oleum guajac, præsertim in lue
gallica, arthritidem pariente. Ceratum quod sem-
per ad usus servetur; Rec. ammoniaci in aceto
dissoluit unc. fs. cineris caulium rubeorum, fipiti-
um sambuci, ana drach. j, sulfuris drach. fs. falsi
scrup. ij, olei chamæmelini, liliorum alborum, ana
unc. j, ceræ flavæ unc. j. fs. M. f. ceratum. Quod
fi non remanserit, inquit Mercatus in articulis
imperviat, atque ad incurabilem duritiem
perveniat, utendum diachalcitide à principio, cum
modico fapæ capillo, vel oleo & cucurbita, vel
potio fola.

Ad corroborandos articulos confert imprimis
ufus vinaceorum, tempore vindemiarum per dies
triginta: item balneum in multo, dum adfuc-
ret. Arnolus de Villa nova & Leonellus Faventinus
commendant epithema ex filio cannabinæ
fue fluppa in lixivio decocta. Plinius radicem can-
nabis in aqua coctam, podagras & articulos con-
tractos mollire scribit. Balneum nostrum, quod
reliquitur humorum ex articulis auferuntur, luxa-
tione ex fluxionibus & ligamentorum relaxatione
restituuntur, Rec. lixivii medicis farmentorum
vitiium vel offium humanorum vel aliorum anim-
um quadruplum in cinere cum combustorum, vini
rubi chalybeati, herbarum ivæ, chamædyros
abstinthii, falviæ, centaurei minoris, florum rorif-
marini,

Oleum va-
perinum.Oleum Gu-
liaci.Articuli di-
rhorantia.Balneum Gu-
liaci.

marini, rosarum rubrarum, chamæmeli ana M. ss. furfurum tritici M. j, bulliant cuncta in vino parvo, deinde cum lixivio permisceantur, pro balneo pedum & manuum: genu vero & humerus spongibus in calido balneo madericis foveri poterunt, vel filtra (ubi minor est quantitas decocti pro balneo) in prædicto decocto sine expressa articulis alligari etiam post balneum, vel sine balneo. Hoc pacto etiam administrant veterem urinam humanam mirabiliter profuit videmus abique balneo, solo fomento, etiam adhuc perflantibus insignibus doloribus, fortassis ex consilio quorundam barbarorum, qui scribunt: In urina hominis patientis, vel alterius hominis valde fene calefacta intingatur pannus albus non coloratus, & loco dolenti calidus applicetur. Possunt in calida podagra in lixivio coqui plantaginis & rubi folia, cortices granati, balauftium, absinthium, sal & nitrum, folia myrti cum vino rubro, & falsis cortices. Post hoc unus locus poterit oleo lentici & myrino, rosaceo, omphacino in calidioribus, vulpi & mastichino cum salis modica quantitate, vel si causa sit frigida, Rec. olei lateribus, vulpi ana unc. ij, olei mastichini unc. ss. M. pro linimento. Nonnulli decocto simili, quod pro balneo descriptissimum, supra lapidem molarem vel pyritem, vel ferri scoriâ candentem inperfo vaporem excitant, & partibus affectis suffusum parant; quod pannis circumquaque obvolutus ne quod expiraret, tamdiu applicant, donec partem affectam sudorem moveant. Atque ego in capite Ictericâ, postquam sudaverit per viginti dies, cum decocto ligni guajaci & falsæ, plurimum profuisse vidi. Nam cum in fine curationis a balneo, quod pedibus nimis calido adhibuerat, iterum nova fluxio in pollicem majorem finitri pedis influxisset circa vesperam, articulum ubi rubebat, igne aff, apposito statim emplastro diapalma appellato, & cum crederem crustam decessuram & periculum materiam paulatim exituram, nullum scidum, nec ulla crusta ab unctione decessit, sed tertio die tumor pollicis evanuit & crassa, quæ exsita erat, sicca permansit, ut statim quo vellent poterit incidere; quod proculdubio contrigit ab istis sudoribus, quos excitaveramus vaporibus decocti rosarum, salvia, betonica, absinthii, centaury marini, & florum chamæmeli cum vino & lixivio facti. Dederam autem hora una matutina, antequam assumeret decoctum sudoriferum, per multos dies mentem amittentem, quæ distillationes etiam fesebantur. Sed & simplex partium lotio, cum sale vino plurimum fert opem. Item luta naturalis ex balneis, qualia sunt apud Patavinos D. Petri & D. Bartholomæi post ædes, & D. Helenæ. Possunt etiam balnea præparari ex thermis, quales in Italia & alijs plurimis regionibus scaturiunt, ut thermæ S. Philippi, quæ dicuntur esse aluminosæ: in villa Corosena prope Lucam, quæ sulfureæ, aluminosæ & nitrosæ esse perhibentur: prope Pisas circa montem S. Iuliani, quæ aluminosæ & sulfureæ: & alia in Germania & Pannonia, de quibus consule auctores, qui de hisce naturalibus balneis scripserunt. Possunt etiam ad horum naturæ imitationem fieri artificialia ex sale nitro, alumine, sulfure, vel bitumine. Verum in horum balneorum usu hodie maximus error, & præsertim in Germa-

Luta naturalis.

Balnea artificialia.

nia committitur. Etenim jam nos invaluit, quia nonnulli agri videntur quoddam a fluxionibus capitis & catarrhis corporis, articulos ex parte corroboratos, luto & sacris & biliosis humoribus exoneratos, quod cognoscunt ex cutis rubore, qui solum per aliquot dies in usu balnei comparere cum pruritu fere molesto, ut quis fere podagricus & arthriticus statim nulla facta corporis præparatione vel levi purgatione adhibita, balnea naturalia & artificialia ingreditur. Quæ sane pessima est consuetudo. Nam etiam corpus ab aliqua humorum ferorum quodlibet liberatum esse videatur, & partes corroborata; tamen cum partium principum intemperies non auferatur, ab horum balneorum tali usu obstructiones viscerum, & præcipue mesenterii & pancreatis non referuntur, articulo rum venæ laxiores redduntur a tepido balneorum calore, hinc contingit ut paulo post usum balneorum brevi intervallo arthritici frequentius & ad plures partes fluxionibus tententur, favioraque symptomata redeant, regeneratis denuo aliis humoribus sese committentibus cum iis, qui adhuc a balneo in venis erant relictis. Quocirca in arthritide universalis, quæ paulatim ex longo tempore repetentibus sæpius & invalescentibus fluxionibus originem habuit, à prædictis balneis abstinendum suadeo, quod partium principum languor vix unquam hisce restitui queat, nec etiam aliis internis auxiliis: neque etiam in arthritide biliosa tentandum puro ejusmodi prædicum, quod corpus, sanguinem, articulos & jecur maxime accendat: neque post purgationem solum & cum simplicem, quod reliquæ pravorum humorum non semper balneis evacuantur totæ, sed in arthritide, quæ unam vel manus vel extremos artus, vel fere universalis est sed non antiqua, conflata ex mixtis humoribus, prædominante pituita cum multo fere, facta diligenti totius corporis purgatione, evacuatis per ludificæ & diuretica vi antidolorum maxima humorum saburra, ne quisquam ad articulos adhuc facile confluit, corroboratque visceribus & obstructione liberatis, balneis præscriptis commode utendum esse moneo. His conditionibus Aëtius & alii, quando arthritici balnea commendat, præscribi voluerunt. Ludovicus Mercatus solviquevis balneo humores, & effeminari articulos laxioresque reddi putat, quantumvis resolutoria aut adstringente vi polleant. Quippe plus prævalere dicit aque humiditatem & teporem aut calorem, ad humorum fuscoem & articulo rum laxitatem, quam possit aque aut mineralis, aut cujusvis alterius medicamenti vis ad resolvendum. Quod fane falsum est, monstratque Mercatum balneis naturalibus raro usum; forte quod in Hispania rarè fieri thermæ. Existunt enim nonnulla naturalia, quæ constant ex commemoratis mineris, quæ potenter excipiant & resolvunt, præsertim si sulfureos habeant vapores permixtos, vel naphtham, vel bitumen & nitrum. Nam & hydropicos hisce a ventris & corporis mole liberatos frequenter vidimus spatium quadraginta dierum, cum probò victu præparato. Hoc anno c. 130 xiv, illi fuit Dominus Philippus Comes ad Rhenum Arthriticus & multis capitis fluxionibus obnoxius, & Iohannes de Molart

Consili

Error Germanorum in usu balnei.

Alvi pressio cum ex balneo.

Balneo aquæ dulcis pro caliditate arthritide.

Centra Mæti.

Modis administrandi balnea Tralliani.

Consilii militaris apud Cæsarem Præfex podagricus, cum balneis cujusdam chymici artificialibus ex fale, alumine, spiritu sulfuris & nitro uti vellet, spatio triginta dierum bis terve usu balnei in alvi profluvium prolapsus fuit, quo multa biliosa & pituitosa reddebant. Nam et si his venæ a tepore & humiditate balnei ampliores & patentiores redderentur, vis tamen aluminis constringendo cutem & articulos & habitum corporis carnosum, illa fluentes humores compescebat in venis, ut ab habitu corporis ad ventrem eos, si qui a calore balnei in venis funderentur, coegerit & diarrhæam excitaret, cum tamen corpus antea satis congruenter a me esset purgatum. Sic & alius quidam cum a balneis & luto ita corroboraretur penes articulos, antequam partium principum imbecillitati esset prospectum, post aliquot septimanas accumulata nova materia, incidit in lethalem febrem. Nam cum non amplius illa materia ad corroboratos nimium articulos aque ac ad imbecilles anas fluere posset, pedes puta & manus, ad interiora regressa partem nobilis invasit, febrique continuæ atque lethalis causam præbuit. Possunt igitur optime exterius balneis medicatis adstringi & corroborari artus, & in infem superflui humores excicari a discuti. Ad arthritidem calidam balneum aque dulcis laudant Trallianus, & alii docti viri post universalis. Illo tamen articuli non videntur corroborari, cum potius laxentur, sed tantum intemperies jecoris corrigi, & sanguis in venis refrigerari. Idcirco Galenus lib. iij Meth. med. cap. x, balneum ejusmodi arthritici maxime adversum infert. Nam cum prius disisset in febribus, imbecilla existente parte principe, balneum aque dulcis esse majores detrimenti & periculi, subdit: Quod si, præterquam quod nulla pars princeps imbecilla sit, veluti inferioris notæ partium aliqua sit invalida, veluti podagrici pedes, & iis qui articulo viro laborant, universi corporis articuli, maxima saltem pars agro comparabitur ex balneo ipsiis infirmis partibus, quæ supervacua sunt excipientibus. Aflorent enim nonnunquam & citius balneum supervacanea in partes infirmas conflueret, a balneo vero magis, ut pote succis ipsis perit liquidatis, tum viis per quas meent patetificæ. Ambo enim hæc ex moderato calore proveniant necesse est. Hæc Galenus. Ego tamen existimo ex parte articulos balneo aque dulcis corroborari posse, quandoquidem ex calidis fluxionibus fludentibus contrahunt in se artus intemperiem calidam, ob quam sunt imbecilles, & facile non modo recipiunt, sed etiam attrahunt humores in corpore mobiles. Hæc intemperies corrigi aque dulcis balneo potest; præterea venarum laxitas eadem constringi, si eo modo administretur, quo nos in podagricis docuit Trallianus his verbis: Balnea dulcis aque his conducunt; atque æ aquæ vesperi adhibentur magis quam matutina. Nam post cibum maximam vim ad calidiorum intemperiem corrigendam obtinent, præsertim in gracilibus, fœcibusque & acrioribus corporibus. Nam in ejusmodi si quotidie balnea adhibeas non eis nocet, sed plurimum etiam adjuvant. Ad primum autem æget in calidum balneum ingressurus sit, contiet ei pedes aqua frigida prius irrigare. Vbi vero medium domum balnei ingressus fuerit,

deinde modico sudaverit, situla tepida ei superfunderit, atque ita totum corpus hydrore perungi oportet. Porro balnei ætrem temperaturæ esse convenit, similiter & lavacri solum. Post unctionem, ex transito statim in calide solum æger ingreditur. Quod si etiam frigidam aquam infuserit contingat, pedes scaturigini submittat, prorsusque in ipsum descendat. Egressus rursus æ thermis descendere omnino in frigide solum debet: & si facta fuerit & oblectetur, in ea natet, vestimentis autem indutus pedibus iterum aqua frigida iniciatur. Reversus a balneo in domum æger non statim bibat vinum, præsertim merum, sed pitans cremorem aut tepidam aquam prius assumat. In medio autem prandii si facta fuerit, aquam frigidam; sin aut hyems, temperatam bibat. At si hoc balneo non satis corroborati esse videantur articuli, validiora poterunt adstringentia & refrigerantia adhiberi, emplastrum diacalcitæ cum aceto rosaceo, succus acaciæ cum posca, lycium cum croco.

Quod si nodos & tophos materia podagra fecerit, ut solet contingere (si quando diu & frequenter fluxione tentati sint artus) vel per se sponte a victu nimio, crassos & crudos humores generant, vel a mala curatione, nempe adhibitis magis quam decet refrigerantibus & narcoticis, aut validis discutientibus tenui humore exhalante, crasso & terrelli relicto in articulis atque impa- & tibus, aut præfatis humoribus a validis excicantibus & acris, sine admittione eorum quæ emolliunt, his quoque tam internis quam externis remediis erit succurrendum. Ad rectam autem horum curationem, plurimum scire interest à quam materia oriatur. Nam si pituitosa sit, ut plenunque est, erit excalefciendum & attenuandum. Pro internis horum remediis proponuntur a Tralliano antidota, inter quæ duo hæc mihi maxime arident, quod consent ex iis medicamentis, quæ haberi possunt: primi descriptio talis est: Rec. centaury ana. v, chamædrys, hyperici, ana unc. x, aristolochia rotunda, gentiane, petroselin, agari, phy dulcis, mei ana unc. ij, spiritus cardui unc. j, excipito melle, datoque ex aqua tepida. Alterius antidoti descriptio, quod dat ad annum famileter, præterquam quod callos in articulis concretos summe discutit, medetur etiam articulo rum, capitis, stomachi, oculorum, jecoris & renum dolori, urinæque difficultati, eodem Tralliano teste, qui ipsam dat mense Ianuario diebus quinque alternatim, Februario, Martio, April diebus quinque alternatim, Iulio uno die, Augusto uno die, Septembri uno die, Octobri duobus diebus alternis, Novembri duobus diebus alternis, Decembri quatuor diebus alternis. Adhibendum est mero, carne frulla, bubula, leporena; Item braccia & siapi & crusili omnis generis oleis, hydrogato. Et bene concoquat æger, qui medicamentum assument, pedes aqua calida lavet & oleo iungat, lacticis porione absterneat. Rec. raphanotis, agari, ana unc. ij, phy unc. ij, petroselin macedonici, & mei ana unc. iij, gentiane, hyperici ana unc. v, aristolochia unc. v, centaury ana unc. viij, chamædrys unc. iij, daturur vis scrupuli duo; mulieribus, unc. Novit quendam Trallianum cum tophos habere incepisset, decocto

Tepi inde, ex quocumque caliditate.

Tralliani antidota.

Atque caliditate, hinc & lacticis, in antidoto.

decocto chamæpyteos & origani assumpto probi-
huile, ne alii nascerentur. Huc refer ea etiam
antidota podagrica quæ superius recensimus.
Porro externa remedia sunt, si nondum nodi articu-
lorum plane gypseam aut lapideam materiam
contineant, ammoniacum cum modico aceti dis-
solutum, vel hoc emplastrum, Rec. olei olivarum
vereris unc. ij, lythargyri aurei præparati in tenuis-
simum polinem (vel lapidis pyritis præparati
secundum Dioscoridem) gagatis (cui inest vis
emollientis & discutienti, unde & podagricis me-
dicamentis & acopis additur, teste Dioscoride)
& adipis decoctionis perne vetustæ, ana unc. ij,
additur unc. fs. aceti, ubi fluxiones calidæ nodos
molestare solent, coquitur in emplastrum: pro-
derit & oleum viperinum, & lacertæ viridis, &
adipes earundem præsertim vetustiores, vel, Rec.
diachyli simplicis unc. j, ammoniaci, galbani,
bdelli, sagapeni, ana drach. j, olei irini, liliorum
alborum, ana unc. fs. pulv. ieros unc. j, M. cogatur
denovo in ceratum. Validus, quod emollit &
discutit cataplasma pro duris thopis. Rec. rad.
bryoniæ, cucumeris agrestis, iridis, figuli Mariæ
crudæ, ana unc. ij, rad. althææ, & liliorum albo-
rum sub calidis cineribus coctarum, ana num. iij,
sem. utriusq. sinapios, nasturtii, ana unc. j, trita
cum adipe asinerio, & oleo amygdalarum dulci-
um q. s. fiat cataplasma, imponatur, factio prius
fomento cum decocto althææ, malvæ, borum Cha-
mæmeli & meliori. Ceratum excellentissimum
tophis articulo rum dissolvens adeo, ut neque an
oborti fuerint adhuc appareat. Rec. aphronitii
unc. viij, therebinthinae unc. xij, ceræ unc. xv,
olei vereris unc. xvj, lixivii, quo pilarii utuntur
pro laniis succidendis abluendis, quod etiam nonnulli
Græci protholacton vocant, unc. vj. Hoc jubet
uti Trallianus ut præstantissimum. At celeberrimum
est, & à multis hodie probatum quod ex cæso
vereri unc. iij, vel quantum libet, intingatur in juris
carnis suillæ salis sufficienti quantitate; mox in
mortarii sponte pistillo, thopis imponitur.
Nam cute sponte disrupta absque sectione articu-
los citra noxam quotidie lapidibus liberans reficit.
Alii postea ad Galeni imitationem pedes suum
salutis in aqua decoquunt in mucilaginem, cum
pistillis admodum calæi antiqui partes duas, nastur-
ti pulverati partem unam, & fs. emplastrum con-
ficiunt, quo innumeros à fe curatos esse testantur.
Podagricorum thopis ac nervorum seu tendinum
distortionibus hæc facile parabilia præscribit Dio-
scorides: ammoniacum cum arida pice imposi-
tum, bdellium jejuni saliva emollitum, cannabis
sylvestris imposita, tyrras saliva emollit, & se-
sulum in forma cataplasmati adhibuit. Æque
efficax est hoc ceratum, quod ex tabaco conficitur,
& citrinum appellatur: Rec. succi tabaci, fuscæ
herbæ reginæ unc. iij, ceræ citrinæ novissimæ
unc. ij, refinæ pini unc. xfs. refinæ therebinthina
unc. j, olei myrtini q. s. M. fiat ceratum molle.
D. Bartholomæi in agro Patavino, quibus nam
atque vesperei singulis vicibus per horam vel am-
plius calide foveatur articuli, mox aqua thermalis
abluuntur & imponuntur cerata & emplastra præ-

Cataplasma
pro duris tho-
pibus.

Cataplasma
Coloni.

Cerati citrini
descriptio.

scripta, magis & minus resolutiva & emollientia,
uti requirit indicatio. Nonnulli hic validius sta-
tuunt suffumigium ex lapide molari, quod scirrho-
sis nodis commode adhibetur. Prius pars nodola
fricatur donec sudor appareat, deinde inungitur
hoc unguento; Rec. olei amygdalarum dulcium
unc. ij, adipis gallinæ, anatis, olei chamæmelini,
ana unc. j, medullæ cruris bovis, refinæ pini, ana
unc. fs. ceræ flavæ drach. v, dissoluta ad ignem
fit unguentum. Bis hæc unctio quotidie repe-
tatur (uno intermedio ad unguentum & frican-
dum destinatum) donec durities adfuerit. In hoc ca-
su reperio etiam pretiosum hoc cataplasma, quod
præter nodos podagricos etiam his veneræ
duras & scirrhosas collectiones discutit. Rec. ster-
coris caprini pulverati, farinæ hordei, singulorum
partes æquales, aceti acerrimi & aquæ ana q. s.
ut possit fluere; deinde supra pannum lineum diffen-
datur, & aliquot parti nodosæ tam calidæ quam
potest sufferti uno die, altero vero quiescat ab
eius impositione; unguentum tantum aliquo emollien-
te, & nonnihil resolvente, ut adipe asinerio, vel
præscripto unguento: nec debet hoc cataplasma
renovari quo die imponitur, nisi nimium siccefact.
Quod si vero gypsea materia, aut instar lapidis
dura, vel terræ cimoliz similis (qualem in noso-
comio Delphensi notavit Forestus, & ego Olmu-
tii ex articulis digitorum manus cussidam paupers
effluxisse, qua pingebat & inscribebat parietibus)
ex nodis podagricorum exeat & ulcerati eva-
rescit; imponatur donec sponte claudatur ulcus
nec amplius talis materia emanet, diachylum sim-
plex cum adipe asinerio emollitum, deinde
sine adipe; tripharmacum, vel citrinum ex taba-
co. At si nodi & thopi à nimia exustione humoris
melancholici vel biliosi nati sint, vel vi acrium
medicamentorum plussquam decebat calefacien-
tium & siccantium: à cibo siccante & calefacien-
te, præscriptis antidotis, aliisque omnibus, quæ
corpus & humores siccant abstinentibus: fed
mediciter calefacientibus & humectantibus la-
descens materia diffundenda dissolvendaque. Igi-
tur foveatur locus decocto malvæ, althææ, borum
chamæmeli & meliori, capitis calstrati, postea
lana succida imponatur. Emollit plurimum & ca-
lefacit admodum convenienter quod in ventriculo
calstrati jamjam matcati reperitur, & præsertim
nutriti herbis appropriatis, si eo adhuc calen-
te per aliquot dies partes foveatur. Victus ratio
non modo ratione materia, sed etiam temporis re-
missionis dolorum pro præservatione, & tempore
paroxyfimi variat. Nam podagra à causa calida
litis & fames non admodum laudatur, dum ur-
gent dolores; quod hisce & parvis & sanguis in-
flammetur, evadatque acrior & biliosior, bilio-
susque fames non valde tolerat, ut in arthriticis à
pituita, vel mixtis humoribus biliosis cum multa
pituita. Tempore igitur dolorum à bilioso humo-
re natorum detur psilana hordeacea, vel farina aut
panis coctus in aqua cum modico butyri recentis
vel juris carnis non valde nutritivis, vel cum se-
mine melonum, vel lacte amygdalarum dulcium;
quali modo & oryza coqui potest in aqua pluvia
ut in pulmentum profusus abeat, & fs. condiri cum ali-
quo ex præscriptis, vel cum sacchari modico.
Carnes in prandio assumat, vel earum consuetum

imo

imo sæpe abstinere à carnibus multum conducit
arthriticis, præsertim sanguineis. Frequens enim
comestio carnum generat podagram dixit Rha-
sen. duodecimo Continentis: ratio est quod plus
alimenti accumulatur in corpore nostro quam
partes nutriendæ requirunt, & præcipue articuli,
qui in provectioni ætate, ut & juventute, non attri-
bunt tantum alimenti, quantum in adolefcentia
& pueritia; in quibus ætatibus articuli non solum
nutriebantur, sed & augebantur ac firmiores soli-
dioresque evadebant: quod cum non amplius
contingat in juvenibus ac viris & ætate provec-
tioribus, inde fit ut alimentum superabundet ex ni-
mis nutritivis cibis, & inde in excrementa pro-
volfque humores vel crudos commutetur. Non-
nulli tempore paroxyfimi concesserunt ciceres à
corrice liberatos & lentes. Dantur commodè car-
nes cum boragine, buglossa, beta, lactuca, vel
potius endivia, soncho, cicchora coctæ & om-
phacio; etiam spinachia, malva, portulaca cum
modicis visvis passis, & butyro recenter factis: hoc
enim minus calefacit. Potus fit aqua pluvia vel flu-
minis in qua panis calidus lotus est vel maceratus,
vel pars cruris bovis sine carne & medulla cocta,
vel hordei decoctum cum visvis passis & cinnamo-
mo, vel aqua saccharata: sitim enim sedat, & per
urinas in multis facile transit. Vnde præscribitur
& aqua coriandri. Hoc claretum etiam commen-
do: Rec. hordei mundi M. j. prunorum damascen-
orum num. xx. granorum berberis, si subacidum
potum velit, unc. iiij, aqua pluvia vel fluminis
lib. x. bul. ad consumptionem tertie partis & amos-
tis ab igne & adhuc calentibus adde cinnamomi
crassifculæ incisi unc. fs. sacchari albi lib. fs. co-
la per manicam Hippocratis. Atque hæc omnia
in declinatione nonnihil immutanda, ut paulo ple-
niori sit victus: sed vino omnino interdicitur.
Averroes dimittendum esse vinum monet quous-
que integre sanetur: quæ sententiam nonnulli
putant intelligendam esse quo tempore ur-
get dolor: alii vero non tantum quo urget, sed
quo debet præservari. Sane Ægineta scribit plu-
rimos sanitatem consecutos, qui prorsus à vino
abstinebant: horum alios per morbi initia libera-
tos; alios in potterum rariis, & minori cum dolore
accessiones percepisse. Quod si autem paroxyf-
mus abiit, victus ratio nihilominus proba est in-
stituenda, quæ generationi materiae calidæ, & par-
tium principum imbecillitati opponitur, qualis est
refrigerans atque humectans jam præscripta, sed
paulo plenior, præsertim si ager non cogatur de-
cumbere, sed propter viam institutum medicoriter
fe exercere queat vel debeat. Igitur in prandio
ex carnis comedat calstrati, vituli aut capri
lactantis, bovis, & maxime ejus ventrem. Novæ
quoddam, inquit Trallianus, qui cum fluxione co-
piosissima & valde acri laboraret, tunc maxime
carnibus bubulis adjutos fuisse. Dicebant enim
non amplius fe continue ut vehementer pedibus
doleret, quemadmodum cum victu tenui iterum
te: esse autem pedes bubulos aut ventres magis
cum decoctum. Porro erat hic ætate florida,
& calidior temperamento. Alibi tamen Hippocra-
tes jecur bubula carne calefcere scripsit. Ave-
cennæ laudantur phasianii, attagenes, perdices,
gallinæ cohortales non pingues admodum, meru-

læ, turdi: pisces saxatiles carnis albæ atque friabi-
lissimis in aqua cocti, cum pauco oleo, & paucis
acribus feminibus: item telluridinis, ranæ aut vipe-
ræ caro, quæ comesta novis quendam dolore co-
xendicis liberatum, qui extractum ejus per cir-
culum destillatum assumpserat. Nam per cir-
culum materiam ex alo pellit & discutit cum sudo-
ribus. Porro coquitur cum oleo, vino, salis exi-
guo & anetho; hique præparatam puto in omni
arthritide convenire. Cochleæ lata potat tollere
dicuntur articulo rum dolores, ut Plinius auctor
est. Oltracoderna, ut pecines, chamæ, dachyli, un-
gues, oltræ cœteri interdum poterunt: myaces
articuli utilissimi sunt, ut refert Plinius. Carnes
telluridinis coquuntur, eodem autore, in aqua
congio sale modice addito, ita decoctarum ad
tertiæ partes fuscus articulo rum morbos feni-
tibus bibitur: ejusdem decollatæ sanguine pedes
fricantur. Hordei farina in aqua cocta, vel tritici,
vel psilana, vel puls avenacæ cum modico buty-
ro recenti, vel jure carnis bubulæ; & aqua tremula
commoda sunt. Inter legumina concessit Trallia-
nus fabas virides & ficas leviter servelatæ: item
fiscosum Alexandrinum, quod puro nunc esse hæ-
reosum Caramanorum & dora didici, peregrinum
apud nos ferit, aliquando in Italia. Hoc enim
inter omnia legumina quæ novis, minus inflat,
& est melioris nutrimenti, à cæteris abstinen-
dum: fructum pomaceum bene maturum admo-
dum dulcem, inquit Trallianus, offerre consulo
circa horam sequendam vel tertiam; præsertim
perica aut rhodacina, aut uvam duram, & non ad-
fringentem damascena, mala dulcia, citria purga-
ta & exhorciata probe; quibus addo mala vinosi
saporis bul cineribus cocta, & cyronæ. Iyrum
vero, malum punicum aliaque omnia raro aut ne-
quaquam offerre jubet. Arthriticis naxia, nuces
juglandes, aut pineæ, aut amygdalæ, ut placen-
tæ. Ex bellariis castaneæ potissimum assumere
voluit Trallianus. Acetum quoque in omni cibo
pro condimento nocet, quod nervis, tendinibus,
& stomachi tunicæ sit maxime inimicum. uno aut
altero cibo in prandio & cœna æger sit contentus.
Varietas enim eduliorum repletionis omnique fe-
re fluxionis ratio est. Brasciam edentes, teste Pli-
nio, liberati à podagra inveniuntur. Si æger præ-
scriptis potu uti noluerit, nec vino abstinere,
bibat loram, aut vinum tenue oligophorum, facile
per urinas transiens, quale in plantis locis natum in
Italia, & arenosis colligitur mense Iulii & Augusti
ex visvis activis bene maturis; in frigidiore regione
ex visvis maturis montanis exprimitur multum, cui
tertia pars aquæ fluminis, à nonnullis chalybeata
permiscetur, imponitur in cadis donec bullierit
per mensem, deinde obturatur orificium, ne quid
exipiret, & fs. servatur ad annum. Alii vinum
graminis extollunt: potest graminis radices debi-
ta quantitas aquæ incoqui, quæ cum vino solet
ante ebullitionem permisceri. Cur Trallianus ab-
stinthes vinum his præscripsit equidem non as-
sequor, cum calfaciat magis, & caput gravet, &
inducere somnum videatur, si cum cibo sumatur.
Fortassis eo fluxiones sili autumat, quod biliosa
detrahatur, quæ stomacho & alo invehitur, uri-
nam cieat, crapulam in potu præsumptum ar-
ceat, de abstinio scripsit Dioscorides. Porro nil

Fructus ar-
thriticis con-
solendi.

Quæ arthriti-
di nocent.

pejus in hoc morbo quam bibere inter prandium, & cenam jejuno stomacho, & præcipue si vinum sit, quod aeger bibit. Hoc enim vehementer movet fluxiones & irritat nervos jecurque & sanguinem calefacit. Sic & statim bibere in prandio vel cena non confert valetudini, sed octo vel decem bolos præsumpsisse de cibo melius est. Post cenam etiam bibere vetitum volo, ac multum quoque bibere. Arthritici à sanguine hac eadem victus ratione sunt tractandi, sed paulo tenuiori & minus nutriente; dandaque omnia quæ minus sanguinis generant. At si pituita arthritidem causet, confert hic victus edulcis tenuior, & cibi ac potus interdum abstinentia. Corporibus enim carnes humidas habentibus famem adhibere convenit: Fames enim, inquit Hippocrates, corpora ficit. Quamobrem ubi doloribus vel fluxionibus torquentur, semel in die comedant, parum bibentes in prandio, vel si tantum abstinere à cibo nequeant, incidentia, attenuantia, calefacientia & ficientia offerantur, & quæ non multum alunt. Eadem etiam intermedii temporibus quando à doloribus vacat æger pro præsertione porrigenda paulo pleniori victu; quæ multum nutriunt bis in die offerantur neque multa. Convenit his imprimis oryza succus in aqua coctæ cum saccharo & cinnamomo asperso, vel ex jure carnis porrigatur cum petroselinio alterato. Carnes commemoratæ sunt potius assæ quam elixæ, pisces saxatiles similiter, sed elixari quandoque poterunt cum petroselinio, anetho, feniculo, hyssopo, satureja, majorana, serpillio, pulegio. Vvæ passæ & capparæ in aceto mullo conceduntur. A pomis, pyris, prunis, persicis, cæterisque ejusmodi fructus abstineat. Aëtius etiam juglandes & pistachia concessit. Vinum aliquando bibat tenue, fulvum, maturum atque vetus, sed parce attingat. De cætero potus sit aqua cocta cum aniso, feniculo, uvis passis, radice acori, cinnamomo, vel cerevisia tenuis, in qua bacca lauri vel juniperi, vel radix lappæ vel uvæ passæ, dum adhuc recens esset, una bullierint. Extollitur hic multum aqua mulla. Nam Mefues affectus frigidus cerebri, nervorum & articularum juvare ait, loco vini potum tussim humidam, puris & pituitæ crassæ expectorationem promovere, lavare, tergere, purgare viscera, atque intestina & meatus urinarios, colicis prodesse, ac calculum in viis urinæ prohibere ne hereat aut generetur. Quamobrem & Plinius, mullum dari solere veteribus articulari morbo laborantibus, memoria prodidit. Venere in omni arthritide abstinentium est, at in calida quam maxime & statim à cibo, hanc ante cibum moderata corporis exercitatio juvat, fatigatio summoere ladij, quod à lassitudinibus corpus & articuli imprimis incallescant. Vehementiora exercitia & corporis motus cum levi lassitudine iis, qui frigidis fluxionibus tentantur, jure concedantur. Caveat sibi etiam æger à forti frictione, caligis & calceis angustis, ligaturis fortibus, æquitatione forti & vigiliis su-

perfluis, somno denique post prandium. Roborant articulos, præsertim pedum, caligæ integræ strictæ ex panno infecto cocco baphica seu Kermes, cum quo etiam dormiat si velit.

*Pro pseudarthritide
curatio.*

Pro pseudarthritidis curatione duabus satisfaciendum est indicationibus, nempe humectandi artus exsiccatos, & regenerandi naturalem eorum humiditatem. Pro his consequendis conducet (omissis in totum purgationibus, & præsertim acris & vehementibus, ob nimiam eorum exsiccationem vini, quæ articulis nocere possunt) interius vicium medicamentosum, exterius balnea, fomenta, emplastra, unguenta adhibere. Victus præscribatur, qualem biliosæ arthritidis præscripsimus, plenior tamen & minus refrigerantem ficeantemque. Sint omnia, quæ mensis apponuntur boni succi, facili concoctionis, nec multas superfluitates in corpore gignentia, qualia sunt, carnes hœdi, vituli lactentis, cappones & pulli gallinæ pinguiusculi, eorumque pedes; carnes suillæ recentes stomachis robustis, elixæ potius omnes quam assæ; ova recentia forbilia tremula, pitæna ex hordeo, spelta seu zea, avena, farre, oryza cum jure carniarum prædictarum, caseus recens, lac recentior multum & potum. Potus sit vinum tenue, maturum, subdulce, & oligophorum. Balneum aquæ dulcis alteratum radicibus althææ, & malvæ, capite castrati, pedibusque ejus & vituli: ingredietur æger quotidie ad minus semel. Exeuntem, & si sit ambulandi impotens, ducere tamen oportet, ut exerceantur leniter articuli, & sic ad ipsos humiditas attrahatur; cavere tunc oportet, ne ætèr vel calidior sit, in quo æger versatur, vel frigidior, sed tepidus. Calor enim eisdem ex poros laxando, ipsamque illam qui affluit humorem attenuando discutit & absorbit. Frigus vero articulos constringendo in ipsos humorem, quem postulamus, illabi non sinit, & tendines musculorum rigidos facit, qui ad articulos confluunt: unde ad motum sit æger ineptior. Hæc etiam ut præcaveantur consuevit, ut æger à balneo oleis actû calidis circa articulos inungatur, quale est amygdalarum dulcium, chamæmelinum, mastichinum, narcissinum, olivarum dulce, & lumbricorum: à cæteris resolutentibus abstineatur. Adhiberi etiam articulis poterit emplastrum ex eisdem oleis confectum cum medulla cervina, vitulina, exungia suilla recenti & butyro quam recentissimo, additis mucilagibus lini, althææ & fenigraci & cera flava novissima: præsertim si convelli patientes se circa laborantes articulos perceperint. Tunc nullam præbere satis est, & vino interdicere. Viscumque à balneo abstineant (inquit Petrus Salus) fomenta ex eisdem rebus, nempe ex quibus fit balneum, parata in usum habeant; in quorum administratione hoc animadvertant adstantes, ut antequam caro denumescat, vel hominem à balneo educant, vel fomenta removeant, alias in his administrandis, succedente humoris attracti resolutione, restitutio deperditæ humiditatis non esset speranda.

F I N I S.

ADRIANI SPIGELII

BRUXELLENSIS

DE

LUMBRICOLATO,

LIBER.

INDEX CAPITVM

DE

LUMBRICO LATO.

CAP. I.	Quid Vermis,	87
II.	Quid Lumbricus, ἔλμυς, ὄφεις.	87
III.	Quid Lumbricus rotundus, latus seu planus, στρογγύλος, πλατύς,	88
IV.	Propria Lat Lumbrici nomina,	88
V.	Figura & Descriptio Lumbrici Latī,	89
VI.	Quid Vermis Cucurbitinus Arabum, Tania degener Auctoris,	92
VII.	An Lumbricus Latus sit Animal,	93
VIII.	De ejus generatione & materia,	94
IX.	Pituita quomodo transeat in lumbricum latum, & quanam hujus prima forma,	95
X.	Plures uno non nasci: nec bis in homine nasci notatum,	97
XI.	Locus generationis, utrum crassum sit, an tenue intestinum,	97
XII.	Qua etate generetur in humano ventre,	98
XIII.	An pariat,	99
XIV.	Quamdiu vivat,	99
XV.	Signa ejus Diagnostica,	100
XVI.	Prognostica ejus signa,	103
XVII.	Quenam sit ejus curandi ratio,	104

DE

LUMBRICO LATO,

LIBER.

CAP. I.

Quid Vermis.



Piena sit trahit.

infectum.

Vermis est infectum, & eructa.

Quid vermis.

Infecta & eructa vermes facit.

Eructa. Vermes.

Voniam ad hujus animalis plenior, quam hactenus a Medicis, atque Philosophis tradita est, notitiam & varia ejus synonyma intelligenda plurimum prodent, prius cognoscere, quid Vermis, Lumbricus, ἔλμυς, ὄφεις, antiquis significet, statui hujus libri initio, loco procemii, harum vocum significationes diversas tradendo, latius quam Medico fortassis convenire multis videbitur, expatiari. Parvorum igitur animalium sanguine carentium, quae ἔλμυς Græcis, Latinis infecta dicuntur, genera plures continent species quam enumerari possint propriis nominibus. Ideoque obscuro aut nullo nomine designantur aliqua, quae a Grammaticis non sine ratione στρογγύλος, & πλατύς, id est, Vermes, & Vermiculi vocantur. Etenim omnem vermem infectum esse, atque omnino fere infectum vermem, patet ex eo, quod vix ullum infectum est, quod non vermis aut sit, aut certe fuerit. Nam appello proprie vermem infectum oblongum, & pedibus carens, quod aut speciei est perfecti animalis ac destituti ut ex eo nil aliud generetur, ut lumbricus, hirus, aut principium est infecti pedati, sive sponte more plantarum provenientis, ut culicis, seu per sexum generati, ut apis, sive utroque modo, ut muscae. Aristoteles Hist. de animalib. lib. v. cap. xix, omnia infecta, aut ex animalibus, aut sponte provenire fertur. Quae ex animalibus procreantur, omnia a verme oriri manifestum est. Nam omnia infecta, ait Philosophus, quae pariant à gēni, vermem faciunt, excepto quodam genere papilionum, quod parit quiddam seminis cuius simile, intus humorem continens. Sed etiam ex hoc femine nasci videtur eruca, quae nil aliud est, quam vermis, eodem teste. Qui bombycum erucas filum sericum nentes aluerunt, experti sunt, ex femine, quod papilionem pepererunt, eas quoque prodire, deinde in chrysalida mutari, atque ex hac fieri papilionem. Iam & eorum, quae sponte proveniunt, ortus primordia, modo sint sensibus nostris manifesta (nam in minutissimis animalibus propter corporis exiguitatem interdum latent) si diligenter examinaverimus, rarissime sane, quae ex verme producta non fuerint, reperiemus. Recte igitur Veteres Græci obscura insectorum nomina, quibus proprias quasdam species significabant, vernem dixerunt, & exposuerunt, nomine scilicet omnia infecta comprehendente.

CAP. II.

Quid Lumbricus, ἔλμυς, ὄφεις.

Sequitur Lumbricus, cuius appellatio latius apud Latinos, quam apud Græcos patere videtur. Illi enim per lumbricos intelligunt non tantum vermes, qui in animalium ventre generantur, sed etiam qui ex terra ipsa oriuntur: nam terrenos vermes, quos Græci ἔλμυς τῆς γῆς, id est, inter finem terræ, lumbricos terrestres sive terrenos nominant: Hi vero per ἔλμυς (quod Latini veteres, proprio magis nomine carentes, passim lumbricum, paulo latius quam debent, interpretantur) vermes tantum in animalium intestinis, seu ventre nascentes designantur. Sic Aristoteles lib. v. Historiarum tria genera ἔλμυδων enumerans, loquitur de lumbricis in excrementis animalium, adhuc intra eorum corpus contentis, enatis. Et lib. viii. Histor. quando inquit, ἔλμυς sub cane ballore, atque illius innasit, locutus est de ventris lumbrico. Et lib. ix. Hist. Cane, ait, tritici herbam comederit, & ante ἔλμυδων, id est, cum lumbrici intestinum laborant. Sed & ante Aristotelem Hippocrates nunquam per ἔλμυς aliud intellexit. Recte igitur utroque secutus Galenus, lib. i de Locis male affecti, ubi recenset nonnullos morbos, ex quorum cognitione devenimus ad certam notitiam loci affecti, scripsit ἔλμυς in solis intestinis nasci. Ergo eorum, qui vim Græci hujus vocabuli non satis sunt affecti, vana mihi videtur disceptatio, qua contra hunc Galeni locum probare conantur, lumbricos in aliis corporis partibus, præterquam in intestinis nasci. Porro cum tria recensentur lumbricorum, seu ἔλμυδων genera, terrene, nempe, latum, & quod ascaris appellatur, notandum est strictim apud Latinos Lumbricum, & ἔλμυς simpliciter apud Græcos, capi quoque pro uno ex prædictis generibus, scilicet pro tereti, seu rotundo, quod huic, ut cæteris generibus, nullum nomen proprium donatum fuerit, frequentiusque cæteris in animalium, hominis præcipue, ventre conspiciatur. Nam latus lumbricus habet sua nomina, quae paulo infra recensentur, & tertium genus dicitur ascaris. Ita Hippocrates lib. i Epidem. non aliam lumbrici in ventre geniti speciem intellexit, quam teretem, sive rotundum, dum inquit, οὐδὲν δὲ καὶ τὸ ἐν τῷ σπλάχνῳ ἐν τῷ μεσεντερικῷ μὲν ἔλμυδον, id est, tritum ab eo, liquidum, turbidum cum lumbrici extiterit, sic & alibi: sed in libro de Crisibus recensens bonæ Criseos signa ait, καὶ μὲν ἐστὶν ἔλμυς seu lumbricus exire, morbo ad iudicationem tendente. Quod & lib. ii Prognost. & in Coacis prænotionibus de lumbricis rotundi scribit. Et clarus agricola Constantius aus Caesar, agens de nascituris

Lumbrici terrestres.


Explicatio Galeni.

Tria lumbricorum ἔλμυδων genera.

Lumbrici cuius cor pro tereti accipitur.

Hippocratis auctoritas.

Item Constantius aus Caesar, agens de nascituris

Anteriori
tenuis.Epilum
Ver-
mici
tenuis.Intestini
An-
teriori
vnde
mucositas.Cingulum
Tenuis
dilatatus.Anteriori
opinio
vnde
vermicis
fieri.Cucurbitum
Vermis
cum
fascia
non
dilatatus.Tenuis
depo-
nens
anteriori
Graci
non
mucositas.

depinxit, qui de oculis naturæ characteris
inferitur. Etenim similem Antonius Benivienus
in suis medicinalibus observationibus videtur an-
notasse, ubi ait, se vidisse aliquando seriem ver-
mium quatuor cubitorum longitudinem exceden-
tem, quæ unicuique corpus, & unum vermem refe-
rebat, ex multis sibi invicem mordicibus inhaeren-
tibus connexus. Et, quia equi fere omnes morbos
pati dicuntur, quos homo, prater eundem hic non
est, quod Musa Brasavolus in pullis equinis Her-
culis Ducis Ferrariæ mortuis ob ingentem ver-
mium copiam, quæ in singulorum ventriculis con-
tinebatur, observavit; nempe hos vermes fuisse
colore, partim rubicundos, partim subnigros, fi-
gura feminis cucurbitæ. Ego quoque pictorem
Germanum ante aliquot annos Patavii conveni, ut
hoc frustum veræ fasciæ, quod hic depingi cura-
vi, delinearet, is mihi retulit forem suam Au-
gustæ Vindellicorum similes figura, quales Gem-
ma depinxit, excrevisse, quorum iconem, quam
mihi erat pollicitus, derepente Patavio avocatus
ad Magnum Heriarie Ducem, relinquere non
potuit. Picturam igitur Gemmæ nostræ iconi ad-
junximus, propterea quod multis visa sit fasciæ, seu
tæniæ veterum; quamvis ex multis vermibus, se-
mini cucurbitæ similibus constare nonnulli sint
arbitrati, quidam etiam partem ejus esse. Si-
quidem Arnoldus Villanovanus cucurbitinos hu-
icque vermes appellans, opinari aliquos refert, in
ventre tæniæ, quam cingulum vocant, generari.
Quin proba & fide digna Matrona, inquit Monar-
des, nuper in magno quopiam verme, quem ejus
avia agrotâ dejecerat, se vidisse multos vermicu-
los cucurbitæ feminibus similes asseveravit. Ver-
rum mea fert opinio, tam longam seriem vermium
in ventre. Tæniæ consistere non posse, uti mox
probo à forma corporis: neque ex multis ver-
mibus, ut somniant autores, sibi invicem adha-
rentibus catenatim, conflata; sed ex multis no-
dis, veluti articulis, semen cucumeris referenti-
bus, unum vermem esse compositum, qui, quod
non habeat fasciæ aliquam similitudinem, non de-
bet pro veterum lato lumbrico sumi, etsi longitu-
dine par ei aliquando esse videatur, sed pro suæ
speciei lumbrico, quem Arabes fortassis cucurbi-
tinum vermem, à figura ejus articulorum, appel-
lare voluerunt: quamvis Franciscus Pedemontanus
latos & cucurbitinos, ex Rabbi Moyfis, &
aliis Arabum interpresibus, pro ejusdem generis
lumbricis nominat. Ego nihilominus fasciam po-
tius, seu tæniam degenerem nominabo. De hac
apud antiquos Græcos fateor ingenue me nullam
reperisse factam mentionem; ut propterea al-
quando fieri in ea opinione, fasciam nostram
quandoque in ventre se volvere posse in speciem
talis vermis, qualem ex Cornelio Gemma hic fo-
cundo loco depingi curavi.

CAP. VII.

An Lumbricus Latus sit Animal.

SED quia perobscura atque cognita perquam
difficilis est tam longi corporis generatio & vi-
ta, nonnulli dubitare ceperunt, an id esset anima-
tum, quod veteres latum lumbricum nominant.
Non defuerunt in arte medica nobiles Viri, qui id

animal esse negarunt; atque tantum substantiam
esse rudem, & membranaceam, quæ quandam ver-
mium delineationem, & quasi inchoatam, non
absolutam speciem præ se ferre videatur, esse vo-
luerunt. Idque etiam veterum testimonio puerant se
probare, quos ajunt dixisse, substantiam quandam
esse adnatam ipsis intestinis, quæ animalis formam
repræsentat quodammodo. Ego nil quidquam tale
ex veterum scriptis unquam elicere potui, ut pro-
pterea admiror, tam sapientes viros de his dubita-
se, de quibus neutiquam erat ambigendum, ac
veterum fere omnium testimonio, alicujus forte
obscurum locum anteposuisse. Peraque idem is
contigit, quod olim Sorano, qui tridracumli ge-
nus, quod lumbricis simile animalculum in regio-
nibus Indiarum supra Ægyptum in mulcosis homi-
num partibus, brachiis scilicet & femoribus tibif-
que, in pueris etiam in lateribus sub cute consistit,
manifesteque movetur, negavit animal esse, ve-
rum tantum nervi alicujus concretionem, qui opi-
nionem solum ducat, quod moveatur. Nam quem-
admodum hic Soranus nunquam mihi visus est vi-
disse dracunculum, quod in Græcia malum hoc
fit insolens; aut si forte Indi hoc affecti in Græ-
ciam transierint, non curiose inperfixisse, ut nos nu-
perime in carduele avicula; aut fide dignis rela-
toribus non credidisse, propter summam rei novi-
tatem; eodem plane modo existimandum est, ejus
novæ opinionis inventores de lato lumbrico, aut
nuncquam, aut sane negligenter lumbrici lati cor-
pus, & figuram intuitus; nec antiquorum testimo-
niis ullam fidem habuisse. Etenim si lumbricus la-
tus non est animal, cur Hippocrates, Aristoteles,
Galenus, & alii posteriores, lumbricum nomina-
runt? Respondebunt fortassis, quod tris & se-
ctionibus hæc membrana prædita sit instar ver-
mium, non quod animalis vitam habeat? At per-
vetus Auctor lib. 17 de Morbis Ægypti vocat, dum
dicit *ἡ ὄψα τὴν τὴν ὄψιν*, id est, ut communis inter-
pres vertit, *qui habet hoc animalculum*. Aristoteles
etiam pro animali agnovit, dum cum in lib. 5 Hist.
de Animal. cap. 119, inter insecta recensuit, quæ
sponte oriuntur & pariunt. Plinius, de insectis lo-
quens, quæ nascuntur in homine, tæniarum men-
tionem facit, quos alii posteriores Græci & Latini
scriptores secuti sunt. Hippocrates, seu libri
quarti de morbis auctor, sensum & motum ipsi po-
licularem assignavit; dum ait, totum animal in pila-
modum se componere à præassumptis medica-
mentis bene preparato homine. Et paulo ante,
quibusdam, inquit, iter facientibus, aut laborantibus, &
ventriculo calefacto, deorsum descendit, ipsique promi-
net ex pedice inflatus, hocque facit, & de pedice refec-
tur, aut retrocedit. Profecto non retrocederet, si sen-
su motuque careret. Certe primam partem hujus
vermis à me depictam, foror ægræ (ut multorum
omittam nomina, qui ipsum vivum excrementum fuisse
viderunt) cum ex ano extraheret, adhuc lum-
brico adhaerentem digitis avulsit à reliquo cor-
pore, & in aquam projecit, moventemque se in
gyrum ad modum coronæ aut cinguli se vidisse
mihi narravit, brevique temporis spacio examina-
tum, reliquam partem, quæ adhuc ex ano pro-
pendebat, denuo in ventre regressam. Atque ego
asseverare possum, me apud ægram hanc aliquo-
ties auribus percepisse, instar pilæ in aqua se volu-
tantis,

Non esse
autem
animal
autem
autem
autemDracunculus
animal.Carduelis
Dracunculus
latens.Ego animal
autem
autem
autemLumbricus
latens
autem
autemA sensu
autem
autem
autem

Lumbrici Vi-
tulerum.

sententia, eam fieri vel per materiam appositionem, vel propter materiam copiam. Nam Franciscus Valeriolus lib. 1. *Observ. ix.* ingeniosissime hac scribit: *Quomodo autem ad tantam longitudinem profectus fuerit & ut genita, haud difficile fuerit perquirere, si quis verminum generationem reliquorumque inspicere, aut etiam fetus in utero sibi proponat contemplandum. Nam quemadmodum ex calida genitura in loco calido constituta, ipsa quidem inflatur, atque inflata pelliculam sibi induit: (circumcenditur enim, quod serpens cum ipsum eff, contineturque evadit, ut patet visum existens) & quemadmodum in pane, dum torretur, tenuis quidam pellicula species in superficie abscedit ac extat: (calescens enim panis & inflatus attollitur: qua parte vero inflatur, illic pellicula species excitatur, & consistit) ad hunc sane modum existimandum est, pituitum in intestinis copiosum quidem existentem, & calorem & ipsam quoque concepisse, tum merito loci, tum etiam a calore viretinali excalescunt: (erat enim in homine) (Petro Rationo Vinitorio, in quo se latum verminem, quem solummodo membranam appellat, observasse scribit) calor febriilis multus ex humorum intus, putredine enatus, unde febri continens gignatur, calefactus vero is humor, & sequax existens, a calore agente, & partes continue, in membranam formam abiit: & qua parte humor in magis incaluit, ea parte pelliculam induit, ut in pane, qua crassa nominatur: ac prout effectum est, ut a calore humidum evaporante alius exsiccante, si peritidum quidem pellicula tenuis hinc humor fuerit, qua species membrana longe inflat carici praedicitur. Quod vero spiritus & laciniis membrana ea sicla foret, id inaequalitatem subiecta materia, & loci est merito adiudicandum: quod non est aquo complanatus esset humor, ex quo membrana a calore efformante effrigebatur, inde scilicet illi (ut arbitrandum quidem est) gignebatur: vel etiam, quod cum matrem hunc verminem propriam efficeretur, delineationem quandam, & rudem verminem quasi inchoatum, non absolutam speciem referre ea membrana videtur, striatam generi formam: striati namque vermes revera sunt. Hac illae. Quibus verbis etiam male eorum, qui ejus membranam vermiformem nequaquam animal esse putant, fundamento iniunxit est, videtur tamen tam ingeniose & recte generationem ejus membranae proposuisse, ut multi, qui eandem membranam animal, & lumbricum latum veterum esse arbitrantur, eodem plane modo lumbricum latum generari, possent credere; nempe primo mutata copia pituita in membranam vermiformem magnitudinis & formae talis, qualis ipse vermis jam perfectus cernitur, deinde animala. Verum equidem opinor longe aliter hanc res se habere. Etenim quemadmodum arbores magnae ex parvo semine initium habent: ita quoque magna animalia, ex parva mole ortus sui primordium lumere, demonstratur ex singulis, quae per se hunc generant. Et in iis, qui sponte nascuntur, idem est observandum: nempe ex perquam exiguo corpore formari animal, quod cum deforis alimentum capere incipit, quod hunc latum lumbricum producere. Etenim ad tam longi corporis conformationem, antequam vivat, non modo requiritur copia tenacis pituitae, quae aliquando in intestinis cumulari solet, sed etiam locus opportunus, in quo secundum longitudinem diffusa paulatim, quo pacto docet Va-*

Pans confusio.

Alia Anallura fententia.

leriola, tunica obducitur. At talem in intestinis nullum invenio. Nam excrementa acria, vel duriora, quae praelabuntur, partem jam composita ad animalis formationem materiam (cum adhuc tenet pellicula induta sit) abrupterent, cum idem faciunt in animali jam perfecto. Siquidem lumbrico lato per longitudinem intestinorum extenso, saepe videntur particulae ejus a corpore avellae, abscedere, interdum unius spithamae, vel pedis, interdum plurium cubitorum longitudine. Est praeterea lumbrici longitudinem interdum multo major ipsius intestinis. Et hac sola ratio sufficit ad probandum, vanum esse arbitrari, pituitam per longitudinem intestinorum dum ratione tenacitatis & lentoris, & propter inaequalitatem, tum loci, tum materiae, multis incisuris articulari, & magnitudinem, quo ipsum animal perfectum cernitur, antequam animeretur, jam habere. Hinc etiam potest intelligi, minus esse probabiliter Medicorum opinionem, qui haec tunc materiam pituitosam copiam requiri ad generationem vermis scripserunt, cum a parvo vermine jam perfecto, capiente deforis alimentum, proferatur corpus in tantam longitudinem supra ea assignatum. Atque hunc vermiculum per longitudinem intestinorum productum figurari, priusquam vitam nanciscatur, olim non credebam, sed in spiras vitae compositum, ac conglobatum, & quemadmodum in ovo factum, levi membrana obducta a calore innati, enim mihi tunc videbatur generatio, quod minus spatio corpus contineretur, imbecille adhuc & externis injuriis praelabentium excrementorum minus obnoxium. Ad hoc persuadere exemplum animalium longorum & pedibus carentium; quorum fetus in ovo, priusquam nascatur, circulatim & acuatim jacet, ut serpentem, & erucam. Dracunculus obscuri motus vermis, quem in carduelis aviculae coxa, sub cute natum semel conflexi ante paucos annos, pedalis longitudinis, mediocri chorde testudinis crassitie, forma prorsus nervuli, hac fere figura positus erat. Itaque quemadmodum hic non ante cutem perumpit, & foras prodit, quem veram perfectionem, quae in tardo motu existit, acquiritur: ita etiam latum lumbricum involutum, in spirae contractum, in membrana prius nasci, mox vitale factum, vinculis natalibus solvere, membranam perumpere, tum intestino secundum longitudinem se annexere, atque sic adhaerere, ad tutius capiendum alimentum, illudque quod scribit Arill. lib. v. Hist. de Animal. cap. xix, unde ad aliam verminum formam uti tunc scripsit, id est, *Aditum autem sili adhaeret intestino, hoc est, intestinum intestinum superficiei, vel tunicae foli ac si diceret, reliquas duas lumbricorum species, nempe terreum & ascarida, non adhaerere intestino, sed vagari in intestinum cavitate, ac permisceri cum excrementis & cibo. Sic igitur quondam sententiam verum, cum consideramus accuratius planam corporis figuram, ejus longam, non requirere tantum circumvolutionem, aut compositionem in spiras, ut quae teres est, atque longa, quod illa distentia per longitudinem intestinorum valde exiguum spaciū occupet: imo in mucro, quo interna intestinum superficies incurritur, tutissime fit sita vitae primordia capere posset, cepti dubitare*

Alia opinio regitur.

Prior Anallura fententia videtur.

Dracunculus in carduelis aviculano.

de hac

Observatio Luminaria.

de hac mea sententia. Tandem Lanius Germanos adii, quibus aliquando in intestinis boum solet lumbricus latum occurrere. Hi retulerunt, se circa initia aetatis, vel medio veris tempore, quod generationis primordia ducere ajunt, exiguum aliquando per longitudinem intestinorum distentum, & firmiter is annexum conspexisse. Patet igitur apud Aristotelem illud verbum *negotiosius* significantis accipi posse pro eo, quod dicimus, *adnatum est*.

C A P. X.

Plures uno non nasci: nec bis in homine nasci notatum.

Duplex Problema.

Refensio ad primum.

Itaque cum a parvo principio, & parva corporis mole hunc lumbricum originem capere asseruerimus, oritur duplex problema; primum non inelegans, nempe: cur non gignantur plures uno, cum lumbrici teretes & ascarides plurimi generentur in ventre animalium; & id docere etiam videtur Aëtiarius lib. 1. Meth. med. cap. xxi, qui Iulio Alexandrino interprete, inquit, *Porro lenia nasa lata in intestina gignitur*. Alterum deinde problema est, cur semel expulsi vix alius renascatur? neque enim ulli unquam visus est latum lumbricum ex ventre integru, & post hunc rursus alios in ventre ejus natos: alii vero lumbrici brevi diebus numero, nempe ad summum trium vel quatuor demum nasci in multis agris videntur. Respondeo ad primum: natura ea animalia, quae grandia procreant, pauca numero procreare voluisse, quae vero parva, plura. Quadrupedum enim maxima singulos paritur fetus, ut bos, elephas, felis, mus. Inter aquatilia cere uniparum est. Arbores, quae magnos, respectu suae magnitudinis, faciunt fructus, paucos producant, quod sit propter alimentum, quod multis magnis fructibus suppeditari commode non potest. Hac eadem ratione natura videtur tantum unicum vermem latum generasse in ventre. Neque enim ex parvo principio propter alimentum inopiam, loci angustias, & corporis humani imbecillitatem, ad tantam magnitudinem vermis, tanquam ad suam perfectionem ultimam, & veram unquam pervenire potuisset, si eodem tempore plures numero procreasset. Apud Forestum tamen, inquit, in medicis observationibus legi, quendam adolescentem, ultra duodecim vermes latos, admodum longos, rejecisse, qui non alios intelligit, quam eos, de quibus jam agis, cum eorum signa in excrementis comparuerint certissima. Sed ego, ut tibi respondeam, censio, omnes, quotquot sunt, qui scripserunt se latos vermes plures, quam unum, ab agro expulsi conspexisse cum visis signis lumbrici lati antiquorum, partes tantum unius lumbrici, pedem circiter longas, aut unum vel alterum cubitum, aut plures ab integro vermibus corpore abruptas vidisse, nequaquam tot integros lumbricos. Quod si, per communem aliorum observationem, quispian revera plures integros in nostro corpore genitos animadvertit, necesse est, eos de communi longitudine plurimum degenerasse, & propter alimentum indigentiam expulsi fuisse, antequam perfectam magnitudinem

C A P. XI.

Locus generationis utrum crassum sit, an tenue intestinum.

Quoniam igitur a parva mole initium generationis habet in intestinis, atque intestinorum duo sint genera, crassum & tenue, quaerit quispian ulterius, in utro horum generetur? Galenus nullis (quantum equidem memoria teneo) certum aliquem generationis locum in intestinis, vel crassis, vel tenuibus ausus est assignare, cum tamen alii lumbricis proprium indicant. Nam in comment. aphor. xxvi, lib. i, in parte inferiori crassi intestini, maxime ascarides provenire scribit, in superioribus intestinis, teretes. De lato autem tenet subdit tantum cum esse omnibus *longissimum, & saepe per omnia extendi intestina*: quasi vero dicat, se nescire, utrum in aliquo proprio intestino, ut caeteri, generentur, an vero omnia intestina, tam crassa, quam tenuia simul, sit proprius generationis lati lumbrici locus, cum saepe per omnia intestina extendi videatur. Alexander Trallianus in epistola de lumbricis hac eadem videtur opinatus, cum eadem, quae Galenus, repetat. At Aëtius audacter in tenuibus praefertim ortus sui initia trahere docuit lib. ix, cap. xi. Reliqui omnes postiores docti medici, quos nominatim recensere superfluum censio, unanimiter in crassis, praecipue vero in colso. Atque ita mihi sentire videntur, qui colon intestinum multis valvulis fere cellulis, copia pituita repletis, praeditum sit, quodque locus fit longe capax intestinis tenuibus, tam magno animali generandis. Sed quoniam jam satis videoor probase, non requiri magnam illam pituitae copiam ad plures animalis generationem, quam haec omnes putarunt; neque locum amplius, quod a parva corporis mole primordia ducta, etiam colon intestinum esse locum incommo- dum, tum quod humor aqueo & copioso careat (semper enim repletur excrementis ficioribus) tum quod procul absit à chylis, quo simul ac natus est nutritur, & in tam vastam longitudinem brevi tempore se extendit, coqui sequi opinionem perdocti Aëtii. Hippocrates, fectum adhuc in utero matris existentem latum lumbricum innasci, scripsit. At cum crassa fecera intestina crassius & duris excrementis distendantur, tenuia vero liquidissima abundant, non video ulum commo- dorem, quam in tenuibus generandi locum. Accidit autem tum temporis, ut tenni pituita à capite diffillat in ventriculum, & ad chylum quantam formam à ventriculi concoctice facultate redactam, nutriatur tandiu, donec ex utero egressus fectus lac sugere incipiat; tunc enim lacte gaudeat, si non una cum excrementis intestinorum, & corporis

Aëtii opinio de loco proprio generationis lumbrici lati.

Approbat docti Aëtii sententiam.

Sponte ali-
quando exi-
t. Lumbri-
cus la-
tus.

Vermis qui
diu regis-
tur.

Cervi-
gigis.

Bonatus qui
in cognos-
cit.

Martius.

& mortuos, sponte sua exire per alvum, usus quo-
dianus abunde docet: contra difficillime pelli
ex intestinis lumbrium latum, quod intestinorum
internæ tunica firmiter adhaereat, eorumque sua
longitudine infractuos ductibus implicetur, ita
ut non, nisi bene preparatus, cum fortibus medi-
camentis expelli queat. Porro an hic lumbrius,
si non curetur, haud unquam sponte sua exeat,
sed contineatur cum homine, ut scribit autor libri
quartum de morbis, dubitari potest. Nam quando-
que integrum evomisse exer vifus est, aliquando
eundem per alvum reddidisse, nullo adhibito me-
dicamento, quod hunc expelleret. Olfervantur
piscatores in piscibus latum lumbrium habentibus,
hunc ex ventre eorum sponte exire, fierique tunc
eos maxime pinguis. Imo idem Autor libri
quartum de morbis, frustulatum eum exire narrat, &
quibuldam iter facientibus, aut laborantibus, &
ventriculo (sp. 165) calefcente ad anum descendere
ipsumque promovere ex podice inflatum, & inde
resolari, aut retro cedere. Hæc, quandoque vera
sunt, non tamen huic antiquo autori adferantur.
Sponte enim sua non exire dicendus, qui ali-
unde per accidens cogitur exire, nempe vel à cau-
sa interna, humore intus generato, lumbrio maxi-
me infesto; vel externa, cibo, potu, exercitiis,
aëre, lumbrio contrariis. Quæ vel omnia, vel
singula tantum in nobis possunt, ut quædam
hæc malo careant, quædam ob ea frequenter
eodem molestantur. Etenim Theophrastus quo-
to historice plantarum, interprete Gaza, hæc in-
quit, lumbrium (latum) intelligo, cum de eo proxi-
me mentio facta fuerit) gentium nonnullis natura in-
se percipitur. Habent enim omni quasi ex parte Aegypti,
Arabæ, Armeni, Syri, Cilices, & diversæ Thraciæ, ad
Thyrgibus nullo pacto innasce narrat. Inter Græcos The-
banus, Cilicet versari in gymnasiis solitis, & ad summam
hæretis innasce lumbrium novimus; Atheniensibus nullo
pacto. * Atque idem in piscibus duobus leucisco
(quem in Moravia Germani appellant Weissfisch)
hoc est, piscem alvum, & altero, quem Plöken
appellant, Piscatores notantur. Quia in piscibus
aquam clarum habentibus, vel quibus recens aqua
continuo affluit, non admodum ali temiores pi-
scis affirmant: contra in stagnis, & lacu lumbio
crassa aqua, & turbida referto, ad quam haud fa-
cile recens aqua affluere, nec qua diu fletit, ef-
fluere potest, perpetuo his piscibus abundare, ma-
xime circa autumnum. Talis aqua apud Mora-
vos in lacu Cobliceni est. Sed ad institutum re-
deamus. Habere autem hunc lumbrium fusa æta-
tis jam diximus. Vltima ejus, quæ senectus est,
per sua signa à cæteris distinguenda, ne forte cu-
rationem aggrediamur non amplius necessariam.
Signa igitur hæc penduntur: si non multis tor-
mentibus, nec aliis gravius symptomatis ægra
afficiatur: si partes unius aut alterius pedis, nec

plurium longitudine à verme per longa intervalla
abruptantur. Sic in Helveti uxore vidimus, ven-
trem primo plurimum intumuisse, & tum secundo
quoque, ac tertio mense, aut paulo pluribus frusta
varie longitudinis per alvum reddidisse: ultimo
nunc, sub lato abdominis tumore, breve frustum,
quod vix pedem aut ulnam longitudine excede-
bat, excrevit.

C A P. XVII.

Quenam sit ejus Curandi ratio.

Diligenter mihi perpendenti curationum di-
versa genera, quæ à multis autoribus hinc in-
de sparsim decepti, duo nobiliora occurrunt, quo-
rum primum proponit tantum unicam indicatio-
nem, expellendi scilicet lumbrium, tanquam rem
toto genere præter naturam, & in eum finem præ-
ber valde purgantia, quorum vis eum expellere
conatur, five vivus sit, five mortuus, ut sunt, an-
timonium preparatum, pulvis ex argento vivo præ-
cipitatus, colocynthis, cammonium, helleborus,
grana ricini, præsertim quæ ex America defurunt,
radix eulæ, euphorbium, calcanthum, ejus-
que oleum in ea quantitate haustum, quæ vomitu
movere queat. Secundum vero duplicem
indicationem postulat, præparandi nempe & ex-
pellendi. Primum Empiricorum, secundum Do-
gmaticorum inventum est. Illud non sine pericu-
lo, hoc securus peragitur. Quia illius medica-
menta cum valida sint, ægotantem in vite discer-
ment adducunt, propter maleficam suam, quam
obtinent, facultatem, nimium vim purgandi, vires
agri debiles, feras motiones lumbri ac ejusmodi
de medicamentis productas. Hinc gravia & per-
timenda symptomata, syncope, epilepsia, ileo-
si, & colici dolores, aliaque ejus generis. Refer-
Schenchius in observationibus suis lib. 111, obs. 6.
CXXII, quandam suum Pharmacopœum acris
exhibitor vitrioli drachmam unam exhibuisse,
atque eo immensa longitudinis lumbrium latum
expulisse, non sine fastidiosis torminibus & sym-
ptomatibus, quæ eundem prope ad mortem ad-
egerunt. Idcirco sapientiores secundum curatio-
nis genus magis laudant. Sed & his hæc secta-
res in duplicem curandi viam vixisse mihi viden-
tur. Nam alii prius præparandum esse, ante-
quam expellatur, volunt; alii simul uno eodem-
que tempore, & præparandum, & expellen-
dum esse contendunt. Appellatur autem præpara-
tionem, eam dispositionem, quæ verni in-
ferat medicamentis ad faciliorem exclusionem
que fit, vel cum occiditur profusus, vel ita viru-
bus orbat, ut fiat tanquam semimortuus, & ita
in ventre se componat, ut totus in glomum cir-
cumvolatus, in intestinis positus, nulli eorum parti
aliqua vi corporis particula adhaereat. Nam qui
prius ipsum esse præparandum, antequam pellat-
ur, movent, veterum auctoritate, præsertim au-
toris libri quartum de morbis, Celsi, Galeni ma-
xime, se tuerunt. Nam autor libri quartum de mor-
bis ad perfectam curationem lumbri latum præ-
parationem proponit, ita scribens: Si quis curæ ho-
minem latum lumbrium habentem, & medicamentum
dederit ut potione, siquidem fuerit homo bene præpa-
ratus, totus rotundus fadus ad pile figuram exit, &
homo

homo
sanus evadit.

homo
sanus evadit.

homo
sanus evadit.

homo
sanus evadit.

homo
sanus evadit.

homo
sanus evadit.

Item vultu-
m.

Preparatio
quibus ratio-
nibus negle-
da.

Prima indi-
catione.

Secunda indi-
catione.

Valida medi-
camentis
fuerit.

Diversitas
tenuis, ter-
renæ, & latus
lumbrius.

Secundum
curatio-
nis generis
tenuis.

Preparatio
quid in cura-
tione lumbri-
cus.

Obliquitas
hinc.

Gravitas.

Gravitas.

Gravitas.

Gravitas.

Gravitas.

Gravitas.

Gravitas.

Gravitas.

homo sanus evadit. Adduntur etiam rationes. Lum-
bric enim vivi nequeunt expelli commodè ex in-
testinis, quod si obstruant: imo est medicamen-
ti impetu deorsum ferantur in alvum, redeant ta-
men in loca superiora, unde erant detrufi. Ipse
quoque testari possum vifam à me partem lumbri-
ci lati dimidi cubiti longitudine extra anum pro-
pendentem, cum nondum esset à verme separata,
iterum in ventrem irrepsisse. At vero qui præpa-
randum simul & expellendum esse dicunt, con-
tra affirmant, multorum usi comprobant, ma-
jorem noxam agris, tum pueris, tum adultis infer-
ri, cum lumbri prius occiduntur: deinde eam
curandi rationem brevior esse, quæ utrique
scopo uno tempore satisficit; secutos eam vete-
res & juniores. Siquidem apud hos extant plu-
rima medicamenta composita ad lumbrium latum,
in quorum descriptionibus tum ea, quæ ipsum oc-
cidunt, ut salia, acria, amara: tum quæ expurgant,
ut scammonium, colocynthis, aloë, helleborus,
reperitur. Verum enimvero, ut meam inter-
pationem in hac diffinitione opinionem; scire poste-
rioris sententia seclatotes debent, in lumbri-
citeribus & latis curandis, experientiam demon-
strasse, quo tempore eorum cades, inedia præci-
pue, præparatur aut expulsiorem, sava tor-
mina, gravissimos, ac maxime malignos morbos,
aliquando eos per se excitare; inprimis vero te-
retes monstrosos, aculeatice capitis intestina
perforare, & per cutem egressos fuisse, Trallia-
nus auctor est: at medicamentis, peculiariter ad
eos interficiendos destinatis, tutissime preparari,
antequam expurgent. Sed & illud latera nemi-
nem debet, teretes simul enecari, & expelli bre-
vissimo tempore posse; latera vero non ita. Lon-
giori enim mora ad eos enecandos opus est; nisi
quis velit minus tutam eorum aggredi curationem
validissimam edocuit. Etenim teretes facilius oc-
ciduntur & edocuitur levioribus remediis, quam
lati. Nam illi parvi sunt, & sub rotundo corpore,
minufque dearticulati, non ita adhaerent valide
intestinis, sique præterlabentium medicamentorum
injuriis in intestinis facile obnoxii funt, im-
becillioresque redditi non difficulter devolvun-
tur in alvum; at lati, quia longissimi sunt, & plano
corpore, plurimique incurvis præditi, interius in-
testinorum tunica validissime adherent, & sub
muccosa eorum interna superficie sese occultant;
levioris medicamenti transiensium vim facile
perferunt. Ita fit, ut difficilis interficiatur. Sed &
validioribus ob jam allatas causas interfici debent,
quæ si cum iis, quæ expurgant, medicamentis
permiscantur, imbecilliora solent evadere, quod
vis purgatrix unius medicamenti, alterius facultate
tatem occidendi lumbrium adepti, non finit diu
in ventre permanere. Sed dicet aliquis; nonne in
medicorum historis relatum est, sine ulia lumbri-
ci lati præparatione pilulis diuturnis cum rhabar-
baro appellatis, & aggregatis; ut ex hiera Rus-
ci, solis fenes in aceto maceratis, nonnullis ab hoc
verme liberatos fuisse? Nonne Huenius narrat,
potione ex graciola, quæ purgat, latum lumbri-
cum se expulisse una cum aquis? Nonne Manar-
des lib. 111 de Simplic. ex novo orbe dicit, cap. de
Verbera scribit, ex confilio nobilis cujusdam ma-
trone ex Peru redeuntis, cuidam singulis diebus

mane verberare, ignobilis adhuc herbæ ad occi-
dendos lumbrios, succum saccharo permixtum
præbuisse, ac præter multos vermes teretes, unum
longissimum instar cinguli rejecisse? Respondeo:
aliquando contingere, ut vel à victus ratione, vel
alia causa interna nobis adbita clangelescat lum-
bricus latus, ac sic præparetur, ut levioribus me-
dicamentis possit & occidi simul, & expelli: ni-
hilominus manet præparationem præcedere oportere,
antequam excludatur. Quod spectat ad
Verbera succum, cum ego nobilissimum esse du-
co ad occidendos vermes, tum teretes, tum latos,
& si veteres hanc eam nullam adscripserint,
propterea quod amarus sit, eumque malignitatem
humorum, & putredini, moribulose venenatorum
serpentum resistere, sciamus. Quapropter
quod Galenus de omni curatione dixit, in hujus
vermis curatione à me concluditur; præstare nempe
se, ut veris & tutius curetur, quam ut si citius cura-
tioni æger manifeste periculo exponatur. Sed præpa-
ratio duplex fit, una perfecta, altera imperfecta
(perfectam nomen, in qua vermis totus sponte sine
magnis torminibus, & cum levi medicamento
purgante exernitur: imperfectam vero, in qua
frustam expellitur, & per longa intervalla eo
frustam medicus collinare debet, ut perfectam
præparationem inficiatur. Sic enim quam citissime
fusa evadit, qui eo malo detinetur. Ex imperfec-
ta præparatione, longa, & fastidiosa metuenta
est curatio. Contingit hæc imperfecia præpara-
tio, cum non plane enecatus est medicamentis,
sed imbecillis redditus quiescit in ventre, nullis
motibus, aut aliis molestis vexans amplius ægros,
à propinato tamen medicamento purgante non
exit totus, sed tantum pars, à reliquo corpore
unio alterius, aut plurium cubitorum divisa.
* Et quanquam, ut in universum dixerim, omnem
lumbrium occidat acria, amara, acida, quorum
magnus est numerus; tamen nonnulla peculiari-
ter comperta sunt, ad latum lumbrium occiden-
dum, longe cæteris magis pollere. Ea nunc enu-
merabo, & ab iis, quæ omni ætati, sexuque, five
febre habeat, seu ea careat, toto adhiberi pos-
sunt primum exorsus, ad ea veniam, tum simplici-
tatem, tum composita, quæ non febricitantibus ma-
gis sunt idonea. In priori autem classe principum
locum mihi filix obtinere videtur, tum mas, tum
fœmina, quæ ἡλὸς ἡλικος dicitur Dioscoridi, &
Theophrasto, Tralliano vero ἡλὸς ἡλικος. Hujus
radix adhuc recensita aqua per balneum distilla-
pulveris ejus drachma dimidia semel, aut bis in
die, cum lacte nutris ipsi adhuc lactantibus: qui-
bus tamen in tali lumbrium latum, non memini
à quocumque observatum, præterquam ab Auto-
re libri quartum de morbis. Sed natu grandioribus
drachma una, vel paulo plus cum syrupo de flori-
bus persicorum, aut rosato solutivum, si alvum val-
de alitrdum habeant: aut, si lubrica fit, cum aqua
polygoni, graminis, aut plantaginis sufficit. Illud
perpetuo observandum, ut alvum exaltate lubrica-
viterent laxantia; ne nimium cito exeat medica-
mentum,

* De hac imperfecta præparatione curationem facit autor libri quartum
de morbis, ita scribens: Si vero (Lumbrius) latus, ad medicamentum horum
(Graciola dicitur habet, & si non quædamque legunt, id est, ut opi-
or, si ingreditur medicamentum purgantem, utique non mortuus, aut
totus comploratus) velle sua de lumbrio alterumque, longiusculum duc-
tum, aut trimum cultum, aut etiam longe amplius.

De hac imperfecta præparatione curationem facit autor libri quartum
de morbis, ita scribens: Si vero (Lumbrius) latus, ad medicamentum horum
(Graciola dicitur habet, & si non quædamque legunt, id est, ut opi-
or, si ingreditur medicamentum purgantem, utique non mortuus, aut
totus comploratus) velle sua de lumbrio alterumque, longiusculum duc-
tum, aut trimum cultum, aut etiam longe amplius.

De hac imperfecta præparatione curationem facit autor libri quartum
de morbis, ita scribens: Si vero (Lumbrius) latus, ad medicamentum horum
(Graciola dicitur habet, & si non quædamque legunt, id est, ut opi-
or, si ingreditur medicamentum purgantem, utique non mortuus, aut
totus comploratus) velle sua de lumbrio alterumque, longiusculum duc-
tum, aut trimum cultum, aut etiam longe amplius.

De hac imperfecta præparatione curationem facit autor libri quartum
de morbis, ita scribens: Si vero (Lumbrius) latus, ad medicamentum horum
(Graciola dicitur habet, & si non quædamque legunt, id est, ut opi-
or, si ingreditur medicamentum purgantem, utique non mortuus, aut
totus comploratus) velle sua de lumbrio alterumque, longiusculum duc-
tum, aut trimum cultum, aut etiam longe amplius.

De hac imperfecta præparatione curationem facit autor libri quartum
de morbis, ita scribens: Si vero (Lumbrius) latus, ad medicamentum horum
(Graciola dicitur habet, & si non quædamque legunt, id est, ut opi-
or, si ingreditur medicamentum purgantem, utique non mortuus, aut
totus comploratus) velle sua de lumbrio alterumque, longiusculum duc-
tum, aut trimum cultum, aut etiam longe amplius.

De hac imperfecta præparatione curationem facit autor libri quartum
de morbis, ita scribens: Si vero (Lumbrius) latus, ad medicamentum horum
(Graciola dicitur habet, & si non quædamque legunt, id est, ut opi-
or, si ingreditur medicamentum purgantem, utique non mortuus, aut
totus comploratus) velle sua de lumbrio alterumque, longiusculum duc-
tum, aut trimum cultum, aut etiam longe amplius.

Alimenta
medicamen-
tosa.

His enim comestis à jeuno, quatuor aut quinque diebus continuis, brevi feram, hoc est, lumbricum latum ejici. Atque hæc omnia non minus alimenta sunt, quam medicamenta; quod non modo corpus nostrum nutriat, sed etiam ipsum alterando lumbricum quoque interimant. Hoc præstant, quod vel amara sint, vel acria, vel falsa, vel acetosa manifestis qualitatibus. At occulta, cannabis semen, melimela, & melones; quæ alioquin cum potius dulcia sint, lumbrico lato nutriendo aptissima videntur. Nisi quis dicere voluerit, horum succo ulque adeo lumbricum latum delectari, ut præ alimenti copia debilis redditus, aut enecatus, excludatur. Itaque puerulis, quibus acria, amara, & falsa non placent, lac ex cannabis femine præbeatur jejunis. Adultis ejus oleo condiri possunt ciborum varia genera. Nam qui ex Illyrico tractu in Pannoniæ, Moraviæ, ac Poloniæ confinia sese transtulerunt, Turcarum tyrannidem fugientes, in penuria olei olivarum, hoc utuntur frequentissime, & præsertim jejuniis sacris diebus, nullo incommodo; pro eo nonnulli Galliæ incolæ ex nucibus juglandibus oleum expressum usurpant, quod etiam in hoc morbo commendatur. Porro ne quis itis, quæ jam de oleo cannabino dixi, fidem deroger, Nicolaus Myrepsus femine cannabis, tanquam experto & probato utitur ad lumbricos. Ipsum enim aridum, tufum & cribratum aquæ sufficienti immiscet, ut glutinis crassitudinem nanificatur, perque pannum purum expressum præbeat adultis cyathi mensura. * Dioscorides inquit, melimela saporis mellei *βυσιν ἐχιδνάσσει*, animalia expellere, quod Plinius in eorum viribus recensendis præterit. Sunt, qui hæc poma S. Iohannis esse putent, quæ æstatis initio, aut ante solstitium æstivum in Italia maturefcere consueverunt. Melopeponi quoque, quod dulcis sit fructus, nequam hanc vim ascripsissem; nisi ab eorum esu frustra hujus vermis dejecta fuisse non semel animadvertissem, & postea apud Avicennam Fen. xvi.

* Nonnullis aurigæ, cum per Pannoniam inferiorem iter facerem, activis temporibus, ut à muscarum, tabanorum, & asilorum injuriis, equos suos tuerentur, vidi, cannabis herba masculinam super, equos suos per dorsum, & alia partes externas fricasse, idque ipsi mirabiliter protulisse. Idem equites & viatores abstrusio lumbricis occidentis idoneo præstare conantur, sub cistellis etiam hæc herba posita, cum uno tamen fructu.

F I N I S.

Frigida ini-
mica Lumbrici.
co.Aer.
Suffraginosa.

ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS
ISAGOGES
IN REM HERBARIAM
LIBRI DVO.

cap. vi, legissem, melones inter remedia pro ascaridibus interficiendis, & edocendis propria. Debent autem hi fructus arte, nempe nive & glacie refrigerari, vel in profundo putei, ut mos est in Italia, detineri. Quæ enim maxime frigida sunt, ea lumbrico lato multum inimica existunt. Ceterum à frumentaceis pulvis ager abstinere, utatur pane autopyro, aut domestico cum multis tenuibus furfuribus subacto, & bene fermentato. Potus esse potest vinum ablynthites, aut hyssopites, aut aliud, quod sit oligophorum maturnum, nec dulce: quod si generosum id fuerit, decocto radicum graminis, diluatur. Magis autem hisce convenire potest, præsertim febricitantibus, oxymeli vel oxybaccharum dilutus, vel decoctum cortandri & cornu cervini; aut pomacium vinum factum ex melimelis, defecatum, quo plurimum hypochondriaci solent recreari, & commodius ab obstructionibus liberari. Aerem nonnulli alterari volunt allii fustimigio, alii vero sulfuris, quod agris nimium grave esse consuevit. Exercitia quoque moderata conducunt. Siquidem autor libri quarti de morbis tradit lumbricum quibusdam iter facientibus, & laborantibus, & ventriculo calscente, deorsum demigrare. Iam medicamentis, & alimentis occiso verme, aut plurimum sic infirmato, ut intestinis nequeat amplius adherere, & si plerumque sponte deturbetur, ac decidat, unaque exeat cum excrementis, præstat tamen dæ operam, ut quam citissime, dato aliquo leni, aut purgante medicamento, expellatur. Pueris & infantibus fatis est, mel, aut syrupus florum mali persicæ, vel rosarum solutivus, & manna; vel cassia cum rabarbaro, & infusione agarici: adultis electuarium Diasebesten cum Diagrydio, vel electuarium ex hiera, vel pilule Ruffi. Ad quid enim illa valida purgantia, quæ colocynthidem, euphorbium, elaterium, helleborum nigrum, & scammonium recipiunt, nisi quis forte parum adhuc spirantem lumbricum occidere velit, & simul ejicere. Celsus & Scribonius Largus post medicamenta aut potiones purgatorias, ubi de surgere cupit ager, ad exonerandum alvum, per se vim aqua calida plenam supponere jubent, ut in ea deficiat.

INDEX CAPITVM ISAGOGES

Quæ in duobus
Libris continentur.

LIBRI PRIMI.

- In quo agitur de forma Plantarum.
- CAP. I. *Quæ in Planta potissimum inquirenda, discenda- que.* Pag. 113
- II. *Unde forma cognoscatur,* ibid.
- III. *Partium diuisio, Similes que,* ibid.
- IV. *Dissimiles partes communes quot & que,* 114
- V. *Partes dissimiles communes non omnibus plantis inest,* ibid.
- VI. *Dissimiles partium communium in aliis partibus diffinitio,* 115
- VII. *De propria stirpium partibus,* 116
- VIII. *Partium differentie ex Theophrasto,* 117
- IX. *Radicum differentie,* ibid.
- X. *Cauleum differentie,* 118
- XI. *Differentie foliorum,* ibid.
- XII. *Florem differentie,* 119
- XIII. *Fructuum ac seminum differentie,* 120
- XIV. *De quatuor summis Plantarum generibus. Quid Arbor, Frutex, Scopulorum, Herba,* ibid.
- XV. *De aliis quibusdam generibus, que summis sub- sunt,* 121
- XVI. *De Orchide, Satyrio, Palma Christi,* ibid.
- XVII. *De Trifolio,* 122
- XVIII. *De Pentaphyllo seu quinque folio,* ibid.
- XIX. *De Herbu inuicibus, Coudrilla, Esteracio,* 123
- XX. *De Bruffica,* ibid.
- XXI. *De Inuo,* ibid.
- XXII. *De Equisetio,* ibid.
- XXIII. *De Lino & Linaria,* ibid.
- XXIV. *De Vetrica,* 124
- XXV. *De Verbafco,* ibid.
- XXVI. *De Gramine, Frumento, Milio, Panic,* ibid.
- XXVII. *De Tithymalo,* 125
- XXVIII. *De Fofio,* ibid.
- XXIX. *De Caryophyllis,* ibid.
- XXX. *De Lilio,* ibid.
- XXXI. *De Narciffo,* ibid.
- XXXII. *De Iride,* 126
- XXXIII. *De Ranunculo,* ibid.
- XXXIV. *De Alueme,* 127
- XXXV. *De Hyacinto,* ibid.
- XXXVI. *De Scabifsa,* ibid.
- XXXVII. *De Iacea,* 128
- XXXVIII. *De Hyperico,* ibid.
- XXXIX. *De Malua,* ibid.
- XL. *De Papauere,* ibid.
- XLI. *De Circeo,* 129
- XLII. *De Lithoftermo,* ibid.
- XLIII. *De Thafsa,* ibid.
- XLIV. *De Antherrino,* ibid.
- XLV. *De Cucumere,* ibid.

- XLVI. *De Legumine,* ibid.
- XLVII. *Arborum diuisio. De Quercu seu Glanofera. Quid Nuc, Malum, Actinu, Baccu,* ibid.
- XLVIII. *De Nucifera & Coniferis,* 130
- XLIX. *De Pomifera & Bacciferis,* ibid.
- L. *De Acanaceis & Carduiis,* 131
- LI. *De Semperviuo,* ibid.
- LII. *De Heliotropio,* ibid.
- LIII. *De Aloisio,* ibid.
- LIV. *De Ciffo,* 132
- LV. *Plantas imperfectas post perfectas esse diftendas; & perfectarum primum florescentes,* ibid.
- LVI. *Frequentem infestitatem ad formam specierum memoria tradendam esse neceffariam,* ibid.
- LVII. *Plantas depingendi, delinendique ratio,* 133
- LVIII. *Hortos hyemales conficiendi ratio,* ibid.

LIBRI SECVNDI.

In quo agitur de ufu & facultatibus Plantarum; de- que earum perfecta cognitione.

- I. *Ufu herbarum multiplex. Facultas in humano corpore duplex. Quid Alimentum. Quid Medicamentum,* Pag. 134
- II. *Prime plantarum facultates quot & que, ac de earum gradibus,* ibid.
- III. *De fecundi facultatibus,* 137
- IV. *De tertis facultatibus,* ibid.
- V. *De oculis plantarum qualitate seu proprietate,* 137
- VI. *De modo facultates Plantarum indagandi,* 138
- VII. *De faporum differentis,* ibid.
- VIII. *Odorum differentia,* ibid.
- IX. *Quomodo fapores manifestas qualitates indicent,* 139
- X. *Secundarum tertiarumque facultatum inuestigatio,* 140
- XI. *Ex odoribus facultates obfcuras cognofci,* ibid.
- XII. *Odorum virtutes,* 142
- XIII. *Oculorum facultatum diuifionem fieri per ex- perimentum, & quomodo hæc fiat,* ibid.
- XIV. *De Alimentis. Nullam plantam non esse medicamentum,* 143
- XV. *Alimentorum differentia,* ibid.
- XVI. *Alimentorum inuentrices, ratio & experientia,* 144
- XVII. *Exalta loquy Philofophia uariis qui acquiruntur. Auctores veteres & recentiores qui de ea scrip- fere,* 145
- XVIII. *Florilegium quid; qui conficiendi modus & ordo,* 147
- XIX. *Tituli quales; quod ordine in locis florilegii fer- bendis,* 148

ILLVSTRISSIMÆ NATIONI GERMANICÆ

Iuris Medicinæque studiofiffimæ
ADRIANVS SPIGELIVS .S.



ILLVSTRES, NOBILISSIMI, DOCTISSIMIQUE VIRI,

Sæpe multumque apud me cogitavi, quid esset, cur in tanta rei Herbarie operam tantum multitudinem, tam pauci, quantum proficere, aut deberent, aut vellent, tantum proficerent. Magno enim hujus scientiæ desiderio multos, non modo Sapientiæ, artisque Medicæ studiosos, quibus est ea perquam necessaria; sed etiam Iurisprudentiæ, & aliarum artium atque scientiarum cultores, quibus utilis & jucunda, teneri, & vos & ego per amplum testimonium præbere possimus. Nam vos quidem magnum numerum optimorum doctissimorumque juvenum publicos celeberrimæ hujus Academiæ hortos, cum Vere patent, quotannis frequentare vidistis: ego vero non minorem ad Pisanos ac Bononienses, in quibus Herbarum cognoscendarum gratia superioribus annis sum versatus, accedere animadverti. Tandem comperi non unam esse hujus rei causam. Sunt enim qui hortos ingressi studium discendi tantæ Stirpium varietatis, & tam multiplicis intuitu deponant, nescientes unde nam initium studii petere debeant. Reperiuntur qui Stirpem fortuito obviam eruant, ejusve ramum decerpant, conspectam mox abjiciant, tantum memoriæ fidentes suæ, ut unica inspectione in hæsuram firmiter animo Plantæ formam exilient; cum tamen nulla in re magis illa labatur, plusque iteratus aspectus valeat. Alios videmus, aut folia Plantarum tantum, aut apices ramorum ac furculos, aut flores, aut aliam denique partem decerpere, mox libris imponere renovandæ memoriæ causa, ignorantem cunctas cujusque speciei Plantarum partes considerandas, cognoscendasque. Quin etiam non desunt, qui Herbarum nomina & formas tantummodo discant, proflus vero negligant earum vires, quæ ad Stirpium cognitionem maxime spectant. His causis ut obviam irem, in gratiam eorum qui rem Plantariam facili via & modo, breviorique tempore, & minori quam hæctenus labore discere cupiunt, scripseram superioribus annis Institutionum duos libros, & veterum more amico legendos tradideram, ut majore fiducia in posteritatis commodum publicarentur. Cæterum cum hi una cum amico in alias migrassent terras, frequens me cum illis, qui Herbas discere studebant, consuetudo; frequens amicorum hortatus; frequens de modo, ac facili via eas cognoscendi interrogatio, disputatioque inter familiares meos, atque etiam vestros Medicinæ studiofissimos excitavit, ac impulit ad earum Institutionum compendium scribendum, quod summa & præcipua rerum in illis traditarum capita clare breviterque solummodo complecteretur. Nam in Institutionum libris multas quæstiones antiquas novalque solvabam, animadversiones notabam tum circa Plantarum formas, & vires, cæteraque accidentia, tum circa auctores qui de iis quippiam scripsere, quas consulo hic omitto. Onerat enim dicentes quæstionum, & multarum rerum discendarum turba, non instruit. Quo fit, ut admirari non satis possim doctissimos quosdam viros, & in re Herbaria exercitissimos, libros suos, quibus introducerent juvenes ad hanc scientiam, plenos controuersis, sæpe parum utilibus edidisse. Porro quidquid utilitatis ac fructus ex hoc libro studiosus lector percipiet, id vobis viri Illustres atque Doctissimi debet, in quorum gratiam hæc meas lucubrationes incepi, ad finem perduxi, atque in lucem edidi. Et enim hoc & amplius jamdiu debere me vobis exstimavi, cum pro vestra summa in me benevolentia, promptissimoque me promovendi, ac ceptis meis laboribus favendi studio, quod satis annis præteritis declarastis, cum me valedudinis vestræ curam gerere voluistis, vobis gratiam aliquam referrem; tum, ut non modo eos, qui inter vos Medi-

cinae

cinæ studiosissimi sunt, sed etiam cæteros, qui generis nobilitate, virtutum omnium splendore, linguarum, Iurisprudentiæ, artiumque omnium ac disciplinarum notitia, plusquam ulla alia Natio (absit invidia dicto) vere illustres sunt, ad hoc studium utilissimum iucundissimumque invitarem. Sed quid ego? an sponte currentibus addam calcaria quasi vero nesciam vos ad peregrinas hæc terras, & à patrio solo longe diffitas eo animo accessisse, ut aliquid dignum maioribus vestris faceretis, & Nobilissimorum parentum vestrorum veltigia sequeremini; quorum nullus non sapientissime prudentissimæque dominium suum aut reipub. cum summa rei militaris (ut fortissimos equites decet) & aliarum bonarum artium atque scientiarum peritia, ita regit, ita gubernat, ut cunctis aliis aliarum Nationum magnatibus exemplo in imperio suo pacis bellicique tempore esse possit. Hortatur veritas me plura de his dicere, dissuadent pudor & verecundia ulterius in vestras laudes prorumpere; ne ubi vestra celeberrima præconia, partem mihi eorum attribueret (qui & ipse Germanus sum) aut turpe adulantis studium confectari, aut invidiam multorum accendere videar. Illud tamen non prætereundum putavi, patres ac majores vestros, sive Principes fuerint, sive alterius cujlibet conditionis eminentioris, tam rei Plantariæ fuisse, atque etiamnum esse studiosos, quam olim veteres reges atque heroes, Gentius, Lyfimachus, Teucer, Attalus, Achilles, Salomon, Euax, Michridates, Cyrus, Diocletianus Imperator, & alii quos narrat imperiis dominis quæ se se abdicasse, ut majorem diligentiam hortis excolendis adhiberent propriis quæ manibus semina jacerent gauderetque terra vomere laureato, & triumphali aratore. Vixit paucis abhinc annis Fredericus invictissimus Romanorum Imperator, qui quo tempore Germanus præfuit, ita fæ rei Plantariæ tradidit, ut tam bene formas, quam quipsiam alius ex optimorum Medicorum numero, cum quibus sæpe de viribus disputare consueverat, cognosceret. Hunc Maximilianus secundus ejus abnepos hoc in studio superasset, nisi mors immatura prævenisset, non sine summo reipub. literariæ detrimento. Horum quoque exemplo patres vestri nobilissimi heroes, & variarum scientiarum cultores exiit, non modo in urbibus, sed etiam ruri amenissimos, & variis peregrinisque floribus, fructibus, coloribus, odoribusque perornatos colunt hortos, ut ad eos negotiis domini, reipub. studiorumque expeditis se conferant, animumque laboribus & curis fractum restituant, & si quando contigerit, mæstum consolentur. Nam in his verum solatium, præsentaneum doloris remedium, ut alias omittam utilitates omnibus notissimas. Quamobrem cum non minore esse in vobis animi propensionem, & amore in rei Herbariæ studium, quam in maioribus vestris, à quibus id dimanavit, certo mihi persuadere, non potui non grati mihi erga vos animi hoc symbolum vobis offerre, quamquam exiguum, cum majus hoc tempore per vires non liceret. Id vestra benevolentia & humanitate fretus, vos æqui bonique consultiros fat scio. Deus Opt. Max. cæpta studia & peregrinationes vestras bene fortunet, faxitque ut sani & incolumes in terram patriam redeatis. Valet.

P R Æ F A T I O.



Scientiarum omnium atque artium studia, nemo est qui nesciat, esse difficilissima. Præ enim prægrandes nitidissimeque artes non nisi in mari uno inveniuntur: sic latent præsertim in natura sua pulcherrime artes. & magno labore, contentioneque ingenii eruende sunt. Cæterum, qui in primo aliquis earum tradendæ vestibulo, multis rationibus illam imprimis arduam & difficilem persuadent, ut ipsi sapere plus ceteris videantur; tyrones profecto deterrent, & quasi aditu prohibent. In quo mihi imitari videntur inepti piscatores, qui ut artem, quam profectur labori periculique plenam esse inducant, ejus ejus discenda studio incensis vident, eos deducunt in altum cum maximis mare tempestatibus jactantur, atque ita imprudentes ardorem illum restringunt. Imitanda potius Phocææ solertia est, qui Jætus in sicco edens sensim deducunt ad mare, ut saltem degustent, mox eos reducunt, atque id Jæpius faciendo citæ in mari degende paulatim assuescunt. Ad eundem modum, qui artium studia quilibet difficilia sentiant, in primo tenentur, ut ita dicam, propendenda sunt elementa, quibus imbuti tantum roboris ac dardamenti acquirant, quantum ad omnes, que se illi obijciunt, difficultates superandas esse sat. Hæc mihi frequenter animo versanti, Jægozen hæc in rem Herbariam duobus libris comprehensam scribendis consilium incidit. Cum enim Philosophia partim nulla sit difficilior, quam ea que Plantarum naturam completitur, ob incredibilem formarum, virium & aliorum accidentium varietatem, operæpretium me salturum putavi, si coactis in novum facillioribus masque necessariis universilibus præceptis, ex quotidianis meis observationibus depromptis, compendiarium eorumlibus ad hæc scientiam viam præstarem. Quod quam recte præstiterim, alii judicabunt, & rei ipsa plantam faciet, quam statim aggredior.

A D R I A N I

A D R I A N I S P I G E L I I
B R V X E L L E N S I S
I S A G O G E S
I N R E M H E R B A R I A M
L I B E R P R I M V S.

De forma Plantarum.

C A P. I.

Que in Planta potissimum inquirenda discendaque.



SCIE inprimis convenit, duo in Plantis potissimum inquirenda discendaque; formam nimirum, & virtutem seu usum. Nam noscere, ubi, quando, quomodo nascantur; quantum vigeant, floreat, germinet, & cætera quæ ad generationem pertinent, ad exactam tantum hujus scientiæ cognitionem conferunt. Sed enim ad eos, qui prima fundamenta cupiunt, hic meus sermo est, quorum mentes confundit potius earum rerum tractatio. Adde quod multæ quotidie faciliæ adducuntur, ubi quis formam Plantarum usumque noverit; multæ quoque diligentissimæ naturæ indagatoribus relinquendæ, qui omnem ætatem in hæc scientia consumere cupiunt; idcirco qui forma atque usus cognosci possit, hic solummodo indagandum docendumque censui.

C A P. II.

Vnde forma cognoscatur.

Cum formam Plantæ dico, non eam intelligo, quæ omnibus Plantis inest mente contemplabilis, quam animam vegetativam appellant Philosophi, sed figuram seu faciem tam internam quam externam corporis, cui hæc anima vegetativa inhaeret. Eam esse cuiusque Plantarum speciem propriam, oculis cernimus. Ideo tot sunt earum differentie, quot formæ diversitates, quæ e partium varietatibus innumeris dimanant. Partes igitur Plantarum nobis primum enumeranda, earumque differentie consideranda sunt.

C A P. III.

Partium divisio. Similares quæ.

Partium aliæ similes sunt, aliæ dissimiles. Vtræque rursus tam communes, tum propriæ. Voco similes, quæ in alias partes simpliciores se dividi nequeunt: Dissimiles, quæ ex similibus constant. Partes similes communes sunt, quæ sere semper omnium Plantarum partibus dissimilibus insunt. Proprie vero quæ quarundam tantum. Inter communes censentur caro, nervus, vena, membrana five cutis, adde etiam his humorem. Nam sanguinem Aristoteles inter animalis

partes recensuit. Caro est solida pars, quæ in omnem dimensionem dividi potest, ut terra. Talis in pluribus fructibus sub regimine seu cute conficitur, ut Pyris, Pomis, Prunis. Nervus est protensum illud continuumque, ac cæteris partibus magis solidum, quod à carne & vena facile dissociatur, ac sinitur secundum longitudinem. Dicitur autem nervus, non quod ad movendum sit à natura datus, ut animalibus; sed potius ad quietem ac consistentiam, roboremque. Hic in quibusdam partibus intus conficitur, ut in caudice Ficus, atque Abietis; in nonnullis extat, ut in Plantaginis foliis, in quibus costa à nonnullis vocatur. Theophrastus nervum usque nuncupavit, id est, fibræ, in cuius definitione quid sibi velit hæc verba, ἀνεχώρητος ὁ ὅς ἀδραγὴν ἔχει φλέβας, me nec in ingenio fateor. Vena autem dicitur, quod oblongum est & cavum, humorem in se continens, qui Plantis alimento est. Ejus vero cave sit meatus, et si non facile conspici potest propter exiguitatem, tamen ratione comprehenditur certissima. Siquidem multæ Plantæ si inciduntur, humorem emittunt aut lactis similem, ut Tithymallorum genera; aut aquei coloris, ut Vitis; aut lutei, ut Chelidonium majus; aut alterius, ut multa alia. Fibris venas assimilavit Theophrastus, sed grandiores crassioresque ait esse, & in se ramos spargentes, quos in foliis plurium Stirpium apertissime videre est. Humor autem, qui in Venis atque tota Plantâ continetur, proprio nomine caret, quales in animalibus sanguineis sanguis existit. Menseior in cunctis Stirpibus simplicibus simpliciter imo appellatur, id est, succum; alii in quibusdam succum, in aliis vero, lachrymam: quæ tamen puto discreta esse extrahendi tantum modo, non materie differentia. Liqueor, qui ex contusa herba exprimitur aut elicitur, succus vocatur; qui vero incisione dimanat, lachryma. In quibusdam Plantis propria sunt his indita nomina. Nam in Papavere, qui & capitibus incisus emanat humor, opium nuncupatur: qui ex reliquis partibus, præcipue caule & foliis suis exprimitur, præcipue

Humor plantarum.

Succus & lachryma quid differant.

Partes similes res propriæ.

P

os vero

Oli. os vero durum illud ac solidum, in fructibus quibuldam carne tectum, & in se semen continens: tale in Cerasis, Amygdalis, Prunis (quo nomine Mala Persica, & Prascocia etiam comprehenduntur) cernitur. In Pomis, Pyris, Cucumeribus, ac ceteris ejusmodi cartilago est: tegumentum scilicet effusum molli, membrana & cute durius, sed atque pelliculam & tenue.

CAP. IV.

Diffimilares partes communes quot, & quæ.

Diffimilares partes communes sunt sex: radix, caulis, ramus, folia, flos, semen. Radix non à forma, sed ab usu describitur, definiturque: quod usus illi singularis sit, forma vero summo pere variet. Ideo Theophrastus lib. 1. Hist. cap. 1, radicem ait esse id, quo alimentum attrahitur; caulem vero, id quod supra terram simplex affurgens alimentum à radice attractum deserit; caudex hic in Arborum genere dici consuevit ramum, in quem caulis dividitur; qui ramus postea in furculos spargitur multiplices. Semen vero est fecus, & quasi totius Plantæ compendium. Sed quid Flos, atque Folium? Hoc diu multumque quaesivi, nec quiddam inveni, quo mihi vobisque satisficam. Nonnulli inter recentiores doctissimi Viri existimant frondes Arboribus à natura datas esse, ut calorem defendant ac fructum ne arefcat, ut folia vero ad decorem potius & ornamentum, quam ad tutelam spirituum, florum, fructuum, & ramentorum; nam & hi spiritum defendunt, qua de causa brachia à Columella in Arboribus appellantur. Addunt hujus opinionis causas, dum inquit. Stipitis tegumentum esse corticem: quasdam etiam Plantas neque florem, neque fructum edere, cum tamen habeant folia, nonnullas prius flores quam folia emittere, ut Amygdalos, qui frigidissima tempestate flores solent, qua tegumentis magis ad boream à fructibus, & ramis arcendum ipsi esse opus: denique in quam plurimis flores extra folia promittere, & aliqui ad tutelam externorum debent esse intra folia reconditi. Ceterum veteres illi sapientissimi Viri contra censuerunt, scilicet folia esse tegumenta spiritus, floris, fructus, atque ramentorum. Viri quatuor hanc opinionem defendam, meamque lubneam, novis hi rationibus prius respondendum duxi. Dico igitur, tametsi stipitis tegumentum cortex est; hic tamen cortex alio egebat tegumento. Sic cutis capitis & multarum aliarum partium pilis tegitur. Itaque ut quadrupedes animantes, pilos; aves, pennas; cervi, cornua amittunt; ita pleraque Plantarum genera foliis singulis annis spoliantur. Omnium enim que in Plantarum genere spectantur, dicebat Theophrastus Histor. lib. 1, similitudo petenda est ab eis, que animantibus insunt quoad fieri potest. Foliatis autem Stipitibus, quibus delegati sunt à natura flores fructusque, folia insunt ad ramentorum & spiritus tutelam. Quod si vero aliquæ sint, que prius florem, quam folia producant, earum flores foliati sunt ad fructus defensionem, atque etiam tam brevi pediculo, ut eo carere videantur; quo fit ut flores in hisce Stipitibus non sint externis injuriis multum obnoxii. nam qua parte è ramis emergunt, ramo

suo defenduntur: altera vero parte qua vento sunt patuli, fructus defendunt primordium quantum fieri potest. Illud autem perpetuo in memoria tenendum est, fructiferas Stipes cunctas partes communes producere fructus gratia. Idcirco flores in quamplurimis prominent extra folia. Quæ enim parte flos est, fructus adhuc tenellus confertur; qua autem pediculus emergit, folia & rami fructum defendunt ab externis injuriis. Hæc autem plus præbent tutelæ fructui, quam flores, quod hæc parte sit pediculus, qui & flos est & fructus principium. His credo abunde novis & latius rationibus ad veriorum falsitatem, quæ etiam latius alibi oppugnantur, explicabuntur: quod usus illi singularis sit, forma vero summo pere variet. Ideo Theophrastus lib. 1. Hist. cap. 1, radicem ait esse id, quo alimentum attrahitur; caulem vero, id quod supra terram simplex affurgens alimentum à radice attractum deserit; caudex hic in Arborum genere dici consuevit ramum, in quem caulis dividitur; qui ramus postea in furculos spargitur multiplices. Semen vero est fecus, & quasi totius Plantæ compendium. Sed quid Flos, atque Folium? Hoc diu multumque quaesivi, nec quiddam inveni, quo mihi vobisque satisficam. Nonnulli inter recentiores doctissimi Viri existimant frondes Arboribus à natura datas esse, ut calorem defendant ac fructum ne arefcat, ut folia vero ad decorem potius & ornamentum, quam ad tutelam spirituum, florum, fructuum, & ramentorum; nam & hi spiritum defendunt, qua de causa brachia à Columella in Arboribus appellantur. Addunt hujus opinionis causas, dum inquit. Stipitis tegumentum esse corticem: quasdam etiam Plantas neque florem, neque fructum edere, cum tamen habeant folia, nonnullas prius flores quam folia emittere, ut Amygdalos, qui frigidissima tempestate flores solent, qua tegumentis magis ad boream à fructibus, & ramis arcendum ipsi esse opus: denique in quam plurimis flores extra folia promittere, & aliqui ad tutelam externorum debent esse intra folia reconditi. Ceterum veteres illi sapientissimi Viri contra censuerunt, scilicet folia esse tegumenta spiritus, floris, fructus, atque ramentorum. Viri quatuor hanc opinionem defendam, meamque lubneam, novis hi rationibus prius respondendum duxi. Dico igitur, tametsi stipitis tegumentum cortex est; hic tamen cortex alio egebat tegumento. Sic cutis capitis & multarum aliarum partium pilis tegitur. Itaque ut quadrupedes animantes, pilos; aves, pennas; cervi, cornua amittunt; ita pleraque Plantarum genera foliis singulis annis spoliantur. Omnium enim que in Plantarum genere spectantur, dicebat Theophrastus Histor. lib. 1, similitudo petenda est ab eis, que animantibus insunt quoad fieri potest. Foliatis autem Stipitibus, quibus delegati sunt à natura flores fructusque, folia insunt ad ramentorum & spiritus tutelam. Quod si vero aliquæ sint, que prius florem, quam folia producant, earum flores foliati sunt ad fructus defensionem, atque etiam tam brevi pediculo, ut eo carere videantur; quo fit ut flores in hisce Stipitibus non sint externis injuriis multum obnoxii. nam qua parte è ramis emergunt, ramo

CAP. V.

Partes diffimilares communes non omnibus plantis inesse.

Hæc quas enumeravi partes, cunctis Stipitibus communes sunt: non tamen omnes omnibus. Sed quibus omnes insunt, ex perfectæ à nobis Plantæ appellantur, ut Pyrus, Prunus, Malus, Fœniculum, & alia his similia quamplurima, quæ ex primas atque præcipuas habent partes. Quibus vero desunt aliquæ, imperfectæ dicuntur: quæ quidem Plantarum perfectæ & imperfectæ, late admodum patet. Nam quanto quæpiam Plantæ pauciores partes habet, tanto imperfectior censeri debet: quantoque plures, eo perfectior. Etenim quibuldam unam tantum naturam ademit, ut Ficui florem, lesimino fructum, Scorpio & lunifero folium (nisi quis horum aculeos, pro foliis accipiat quam aculeatis) Trinito, Allio, Narcissis aliisque quamplurimis bulbosis ramum: alii, qui una cum ramis item ramos producant, caulem, qui una cum ramis quod inde acaulon nominatur. Quæ vero radice quod inde acaulon nominatur. Quæ vero radice destituantur, cæteræque partes aut omnes aut destituantur, ex cæpiis, quæ aliis Plantis incalescunt, ut Vico, Epithymo & Castilla & aliis id generis, quæ alterius radice fruantur, nullam novimus: nec reperiri posse opinamur propterea, quod nequeant hæc partes nutiri sine ea quæ de terra attrahat alimentum, atque id ipsum concoquat. Aristoteles lib. 11 de part. animal. accipere Plantas à tellure præparatum nutrimentum (καὶ ἐκ τῆς γῆς τὸν τροφὸν) scribit: in radice vero excoqui, ut in ventre animalium. Idcirco præceptorem fecutus Theophrastus lib. 1 de caus. Plant. cap. xviii, ventri

ventri radicem assimilavit; & supra in radicis definitione, oris ei officium videtur assignasse. Externe namque radicis partes attrahunt; internæ & cauli magis vicinæ, concoquunt. Ceterum cuncta animalia five sanguine prædita sunt, five eodem careant, os ventremque habere dictat par ratio. Confirmat maximus Philosophorum magister, Dioscoridi, qui lib. 1, cap. xi, tradit Lababathrum folium esse sui generis, quod Indice gignunt paludes, innatans aquis, sine radice, nullam adhibeo fidem. Plantæ enim omnes à terra prius, aut à paludibus nascuntur, originem capiat. Sic Lens palustris etiam ortus, in cujus averia parte, qua fundum spectat, dum aquis innatant, radices apertissime cernuntur. Eas mirum est hæc in nullis fuisse animalis veras. Porro quædam stirpes duabus aut pluribus partibus destituantur, ut Filix, quæ flore & semine caret. Phyllitis & Scolopendrium nil præter folia & radicem obtinent. Sunt & quæ unicam tantum partem habent, ut Tuberæ terræ, quæ nil aliud sunt quam radices. Quidquid enim sub terra latitat radix proculdubio est. Quare commodissime hæc scripsit Theophrastus lib. 1. Hist. plant. cap. 11, in totum, inquit, Plantas varia esse, atque multiplex, inque unumquemque de ea referre difficile. Indicium vero, quod nihil penitus est, quod commune accipi possit cunctis Plantis conveniens, ut animalibus os, venter, & alia proportionem eadem, alia quodam alio modo. Neque enim radicem, neque caulem, neque ramum, neque germen, neque folium, neque florem, neque fructum omnes Plantæ habere videntur. Quæ autem radice caret apud Theophrastum, præter eas quæ aliis Plantis innascuntur, nullæ sunt.

CAP. VI.

Diffimilium partium communium in aliis partes difficilio.

Communes hæc diffimilares voco partes, non quod omnibus communes omnibus; sed quod harum aliquam saltem, si non omnes, cunctis Plantis inesse oporteat. Hæc rursus aliis constant particulis similibus, aut diffimilibus, propriis aut magis communibus, externis aut internis. Radix externis corticem habet, qui etiam aliis partibus diffimilium, & communibus, nempe cauli, ramo, semini, aut fructui adhæret. Constat cortex ex carne & nervo; ut in Cichorio, Perosefino, & omnibus Plantis, quarum cortex à radicis interioribus parte separatur. Inter externas partes diffimilares etiam fibræ recensenda. Sic enim appellantur exigui ramuli & capillares, quibus tanquam manibus terram amplectitur radix, eique adhæret, & idoneum alimentum trahit. Hæc in Narcisso, capsa, cunctique quas novi bulbis subitus conspicuntur; in cæteris vero, à latere. Oblongæ vero radices & fasciculatæ paucioribus fibris, & interdu nullis præditæ sunt. Firmatur namque radix longitudine sua, terraque satis firmata adnectitur, nec opus est tot adiumentis, quot his quæ breviores aut rotundiores eundem existunt. Bulbi autem non facile telluri inhaerere poterant, nec aptum succum sugere, nisi tubus iis natura fibræ providisset, quibus terræ illos alligavit, ut recto caule Stips enascatur. Interna vero radices

pars communior, medulla est; quæ interdu sola est caro; interdu carne præditi nervi; ut in iis quibus durior cortice, lignosiorque medulla evadit. Vocantur nonnulli medullam, quod medium occuparet locum, cor; ἡ καρδιά, καὶ ἀδύσσοι, ἡ καρδιά, hoc est, cerebrum, vilcus (quo cor intelligere eos putandum est) animam; quasi vero animæ, hoc est, augendi, nutriendi, gignendique principium in hac parte crederetur consistere; quod in plerisque verum esse comprehendimus, non tamen in omnibus. Caulis autem & caudæ, cortice etiam & medulla constat. Hæc in radice matris & lignum nuncupatur. Folia ex tribus similibus constant partibus, vena, nervo, carne. His quemadmodum floribus quoque ac fructibus seu leminibus, pediculus adnascitur, qui etiam stylus dicitur, & à Columella petiolus, hoc flos, fructus, folium Plantis adnectuntur. Multis foliis petioli sunt quoque denegati, ut omnibus Graminibus, Orchidibus, Narcissis, atque iis, quibus folia sunt Gladioli, ut Camacoro, Iridi, multique aliis. Haud ita in floribus fructibusque contingit. His enim non desunt petioli, quamquam in multis deesse videantur eo brevitate, ubi aut fructus aut flos atque adnascuntur aliis partibus. In plurimis quoque Plantis longitudo tanta est pediculi, ut magno satis interstitio fructus & flos ramis distent pendenteque: quibus ideo aptius nomen pendiculi, quam pediculi. In eis vero quæ unicam tantum producant florem, pediculus incipit caulis desinit, cujus finis foliorum privatio cognoscitur, ut in Hemerocalide monarcho, Lilionarcisso, quem Tulipanum vocant. Sed quid de Colchico dicemus atque Narcissis, de Dentre leonis, alique id genus, quibus unicis flos, aut plures in summo statim à radice emergentis caulis nudi à foliis. Necesse est floribus pediculum in his esse, quem caulem nominant; aut naturam una uti caule pro pediculo. Magis fortassis in dubium vocari res potest de Chamæleone albo. Nam huius nullum caulem adscripsit Dioscorides lib. 1, 11, cap. x, ergo neque pediculus aderit, cum tamen sine florum altero nutriti flos ejus non possit. Sane conspiciat caulis modicum aut pediculi, ut horum quippiam ad hoc opus; utro enim modo appellare libeat non multum contendam. Idcirco mihi persuadere Dioscoridem non voluisse id caule appellare, quod non supra terram emineret, ut caulis consuevit. Sic Aristoteles aves quasdam apodas vocavit, non quod proflus pedibus careant, sed quod non tam longos non habeant, ut possint more cæterarum avium ingredi altioribus à terra crupibus, & (ut uno verbo dicam) καὶ ἡ ἀποδά, hoc est, male pedate. De floribus partibus, & primum de communibus nunc dicamus, quarum investigatio difficilis est. Etenim major in eis varietas, quam in ulla alia parte præcipua. Sine floribus tamen aliis non esse hinc dimittendū. Florum partes aliæ sunt externæ, aliæ internæ. Externæ duæ: pediculus, de quo jam egimus; & calix, & pediculus statim emergens, & utplurimum in foliola se dividens, florem aut folium, aut florum foliorum principia excipiens, ut in Rosa, in Tragopogo, in quo magnus est, confpicere potestis. Hic calix multis floribus contingit. Si fuerit cavus nec in tot foliola divisa, thesa appellari

A. p. s. i. m.

Centaurium minus: tenuem & gracilem, Alfarum, Gramen, Aristolochia clematidis. Positiones fortassis non omnibus radicibus eadem, si terram fecerim. Etenim quaedam tota terra occultantur, quaedam ex parte qua caulis emergit extra terram eminent, ut Raphani quoddam genus. Quae vero tota terra teguntur, aut alte se in terram defigunt, aut tantum terribi superficiem occupant. Omnibus tamen radicibus proprium est terrae inherere, aut alteri rei, quae proportionem telluri respondeat. Idcirco dicebat Theophrastus, positionis rationem in floribus, fructibus, germinibus, foliisque tantum accipi, non in radice, ut nec in caule ramisque, quod caulis semper radici inherere debeat, rami autem cauli.

C A P. X.

Caulium differentie.

A. p. s. i. m.

Caulium quoque a figura desumuntur differentie. Nam alii recti, obliqui, & per terram sparsi, aut ad coelum se attolentes, alii torti, & quodammodo in spiram convoluti: alii rotundi, quibus maxima pars Plantarum donata est, omnes Frutices, Arborumque, multaque Herbarum genera: alii plani, hoc est, angulosi, qui aut sunt duorum angulorum, ut Narcissi, aut trium, ut Cypripis, aut quatuor, ut Marrubii, cundumque Herbarum quae in caule non geniculato bina e regione prominent, folia sibi invicem opposita, mox post modicum intervallum alia duo paulo superius, aut inferius ex illis orientia lateribus, quae praedictis duobus nuda relinquuntur. Quo fit ut non fere elegantis spectaculo, si quis caulem ramumque foliorum decerpserit, & ab uno sine recta oculis collinantibus alium respiciat, in crucis modo divisa folia cernat, ut in Cruciatâ Dodonaei & aliorum. Sunt & alii caules pentagoni, alii hexagoni, ut Lyfimachiae purpureae trifoliae, quae in agro Patavino nascitur. A colore, alii unius, rubri, viridis, albi, nigri, aut alterius; quidam duobus tribusve coloribus maculati: nonnulli incani, & molli lanugine obditi, ut Lychnidis coronariae. Ceterum qui prorsus esset atro colore, nondum mihi in Herbarum genere conspexi est. Caudis autem color proprie cortici debetur, quoniam quocircum aut tegumentum exterius donatum colore videmus, eum toti cauli fallaci loquendi brevitate tribuimus. Alium pars caulis interna, alium externa colorem habet. Sub viridi cortice nigra aut alba saepe latet medulla. Sic asperos, laves, fristofque caules Herbarii dixere, quorum cortices & tegumenta viridi aut tactu talia apparent exterius. Dicuntur & alii nodosi, ut Arundinis; geniculati, ut Caryophylli, Saponariae quam Cruciatam vocant: molles, teneri, pingues, quorum substantia lenta est, facile frangitur, digitulque fitur: solidi, densi, rari, ut Arborum, cavi ut Sambuci, Arundinis, quorum internae caulis parti inest cavitas. Sapor autem & odor alius inest externae caulium parti, alius internae. Cinamomi cortex acri ac suavi gustu suavissimum odorem spirat; matrix vero odore saporeque prorsus carere videtur. Numerosos caules producit Solanum visiosum, quippe quod decem aut duodecim emitit teste Dioscoride: fenos, septenque ex una

T. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

radice, Secale, tres aut quatuor, Alica, singulariorem Arbore. Oreofelinum, & alia infinita. Sunt & caules alii grandes, aut parvi; alii crassi, aut teneres; alii longi aut breves. Quae omnes differentiae & ramis adscribuntur. Triangulos tamen ramos non memini me observasse. Illud hi addendum, unico que fit ramo nullam reperiri Stritem, quod ad minimum praedicta esse debet, in quos caulis se dividit. Quocirca miror nonnullos Graecos Artemisiam ramofam vocasse, quae appellata, atque recentiores quodam, hos fortassis imitatos, idem epitheton quibusdam Herbis apposuisse. Sed Graeci illi rami appellationem in caulem transulisse mihi videntur.

C A P. XI.

Foliorum differentie.

A. p. s. i. m.

Folia tertia sunt Semperivio vermiculari, alii plana: alii triangula, ut Scammonio teste Dioscoride; alii quadrangula: alii rotunda, ut Cappari, Cytho, Coryledoni, alii subrotunda, ut Anagallidi: in extremis oris angulosa, ut Hederae novellae antequam fructum ferat, item Tussilaginis, mucronata, Gramini, Iridi, Gladiolo: recta, incurva, gibbosa, ut Hyacintho, Auriculae murali alteri Dioscoridis, concava, Umbilico Veneris, Diaplace, qui sinu suo aquam imbreque suscipiunt, & etiam continent. Incisurum foliorum alia profundas incisuras habent, ut Papaver erraticum, Raphanus, Staphisagria, Verbenaca, Coronopus; alia tantum in superficie seu per ambitum; & horum alia ferrata sunt, ut Vrtice; alia crenata, quorum incisurae nequaquam ferarum modo denticulae sunt, sed obtusius mucrone praeditae. Inest etiam divisuris multitudo & paucitas, nonnullique certus earum numerus, ut Panaci Herculeae, cuius folia quinque divisiones habent. Color alius unius, ruber, albus, niger, luteus, viridis; aut duplex triplexque, ut generi Bliti, quod tricolor appellatur, a triplici colorum varietate, quae in foliis annotatur (nonnulli hoc Plinii Sophianum volunt) color item alius unus idemque est prona superiusque parte, alii diversus. Voco foliorum planorum partem eam partem, quae coelum spectant, supinam vero, quae terram aspiciunt. Rubi folia supra partem incana sunt, prona vero viridia. Lamium vero Plinii, quod rustici Bononenses Miltazetallum vocant, prona parte in medio foliorum maculam habet longam per longitudinem. Candida incanaeque folia plerumque hoc lanuginem densam, quam pubent, candida sunt, ut Marrubii, Lychnidis, & Verbaei: ceterae partes quae lausum habent, virides. Appellatur etiam folia rara, solida, densa, quae densam, raram, solidam aut spongiosam habent substantiam: subulosa, quibus inest cavitas, ut Cape. Cribri modo multis foraminibus perforata sunt Hyperici folia, item Othominei, ut auctor est Dioscorides. Nec desunt tenera, ut Chelidonio, pinguis, ut Acantho; dura, ut Oxypylae, sylvestri, Symphyto nonnulli: inferius tantum parte seu supina aspera, ut Asplenio; laxa & glabra, ut Acantho, Mandragora, crispa, ut Brassica nonnullis, atque Ocymis. His adde varios sapores odoreque, quorum nonnulli tantum in superficie habitant,

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

C A P. XII.

Florum differentie.

A. p. s. i. m.

Floris nomine supra, tam externas quam internas partes intelleximus, quemadmodum & alii Auctores. Quare hic in eodem significato accipimus. Quotiam autem interna pars floris praecipua, folia sunt, eorum differentie hic tradenda veniunt, omittis alii aliarum partium. Foliorum alia cava sunt, expansa, recta, alia repanda & inflexa, ut Iridis; quaedam fere rotunda, ut Perilymeni teste Dioscoride, in orbem circumdata, ut Smilacis laevis. Cavorum figura cum animatis & inanimatis comparatur. Campanas imitatur folium floris Smilacis laevis, & Convulvi coraelei, quem Nil Avicennae esse perhibent: unde ei & nomen Campanae ceruleae impositum. Digitalis inde appellationem habet, quod folis folium digitalis (hoc est munimentum digiti, quo mulieres quae acu videntur, digitum inter suendum unguere solent, ut sine laesione impellere acum queant) speciem exhibeat. Faciem mustelae & ridentem quadrantes expriment Galopidis floris folia, unde Herbe nomen. Antirrhini quoddam genus Os leonis nuncupatum fuit, quod oris leonis hianti simile esset. Leguminum & aliorum quorundam floris Papilionaceae nominantur, quod papilionem volatantem quodammodo aemulentur. Nam duplici horum floris folio consistit; quorum alterum inferiore floris tegit carinam, alterum superius ejus dorsum protenditur, ab utroque latere paululum se reflectens, alarum modo. Inciduntur pari modo & floris folia, ut ramorum & caulium in extremo; nonnunquam autem a latere. Colorum maxima in his differentia; nec tot speciei colorum, quot in his spectantur, pictioribus cognite. Cum enim omnes species colligere ex floribus vellem, pichoreseque optimos adirem, qui cunctas exprimerent, nullum unquam qui id praestaret, invenire potui. Ita natura in hisce superat humanum ingenium. Observantur & in foliis densitas, raras, asprities, mollicies, levitas, striae, saporis odoreque omnes, par & impar numerus, certusque & incertus. Vnum folium Smilacis datur est, duo, floris papilionaceis: tria, quatuor, quique, fex, septem, octo, & plura ceteris multis. Magna item alii floris folia, alia parva, angusta, lata, longa, brevia, tenuia, crassa. In flore autem animadvertenda praecipue numerus, & positio, atque ordo. Multis enim tantum unicus, alius duo; nonnullis tres, aut quatuor; aut quinque, aut sex foliolummodo; quae plures his edunt, nunquam certum tenent numerum. Nascuntur alii ex radice, alii e caulis, aut ramorum latere, aut e caumine; semperque fere ex alio foliorum si e latere (sic enim appello partem eam, quae folia cum caule & ramis articulat conjungunturque) nisi in caulis ramive fastigio, plures flumores congesti sint sine foliis. Prodeunt multi floris in caumine congesti, aut spicae in modum, ut Lavendulae, quae a spicati floris Spica dicitur; aut comini figura, aut thyrsi, aut verticilli, aut racemi, aut umbellae, unde Plantae umbelliferae appellantur, veluti Foeniculum, aut aliae in modum rotundi, unde Globulariae; aut alterius forma, quae etiam fructus

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

A. p. s. i. m.

membri forma, duas alias inferius ex eodem initio more testicularum dependentes. Cum his eadem esset Palma Christi, nisi radices latiores essent ac depressæ magis, & in tres, quatuor, aut quinque partes in exteomitibus divisæ instaret digitorum matris. Ideo Palmam Christi nominantur.

CAP. XVII.

De Trifolio.

N Villa vox pluribus Plantis communior quam Trifolio, quia non modo Herbarum varia genera, sed etiam Arborum ac Fructuum comprehenditur, quod cuncta ea Trifolia sunt, quæ semper terna folia tantum profertur in unitis pediculis exteomitibus, duo à latere sibi invicem opposita, atque tertium in extremo, quemadmodum in vulgari Herba, quæ Trifolium appellatur, conspicimus. Inter Arbores est Laburnum & Anagyris, quæ à Laburno fædo odore præcipue differt. Inter Frutices Cytisus, sub quo & Acaciam alteram Matthioli comprehendit, Genistæ quædam species flexibilibus ramis à Cytiso differt: hujus enim rami caulesque lignosi sunt. Adeo vero tria hæc folia Cytiso propria sunt, ut cunctos Frutices, etiam ad Arboris naturam quodammodo accedentes, tribus foliis uno pediculo inhaerentibus præditos, Cytisof appellent Herbarii, a quibus malte corum species describuntur. Inter Cremia & Herbas multo plura competitis genera, quæ sere cuncta hic recensito, non omittis cujusque magis propriis partibus. Trifolium vulgare, quod præterea vocant, floris edit aut albos, aut purpureos, aut luteos, aut alterius coloris, in summo caule in brevem veluti spicam coagmentatos: deinde semen rotundum in parvis siliculis. Quod autem in agro Salamantico Clusius observavit, petiolos ex alarum sinibus prodeuntes habebat, quibus flores coagmentati sustinebantur purpurei, & his succedebant membranae folliculi semen exiguum continentes. A dictis Trifoliis præcipue odore differt, quod Bituminosum vocant & Asphalites, quia bituminis odorem spirant, alii Menthanæ. Loti duo recensentur genera apud Dioscoridem, hortense & sylvestre. Hortense nullam nobis notam significavit, imo ne Trifolium quidem esse scribit: unde multi Lotos etiam plurimum foliorum quam trium nobis monstrant. Constat tamen Lotum hortense inter Trifolia poni debere ex eo, quod Loti sylvestris folia Trifoli præteritis appropinquat, sed femine Foenugræ, minore tantum, gustuque medicato. Melliloti, Serula Campana Latinis dicitur, quod antiquitus coronas & lerta ex hac facerent, optimaque in Campania nascebat. Dicitur autem Melliloti, quia folia sunt melliei coloris, qualia & in Trifolio quodam odore Foenugræ observavi. Folia autem Melliloti odorosi boni sunt, quod præcipue (quantum ex Veteribus colligere licet) à Loti sylvestris differt. Adhuc huic semina gustu medicati. Pro Lotis multa Trifoliorum species hodie circumferuntur, quæ cum aliis Trifoliis confunduntur adeo ut cuncta quæ præter tria illa folia vulgaris Trifolii folia similia ab extremo pediculi dependentia, alia bina cauli aut ramis sine petiolo annexa & sibi invicem opposita ac quasi alata habent, inter quæ pe-

tiolus trium foliorum enascitur, Loti censentur. Medica, ut auctor est Dioscorides, Trifolio præteritis omni in parte similis est, præterquam in fructu, quem lentis magnitudine promittit, sed contrarium, ut Siliqua (*vesicaria*). Ex qua descriptione nonnulli, qui *vesicaria* apud Dioscoridem corniculum interpretari cupiunt, nobis pro Medica proponunt varias Trifolii species, quarum fructus aut lunæ in modum incurvati sunt, aut instat testæ coactæ corniculorumve intortis. Foenugræcum siliquis suis oblongis se prodit, corniculis similibus, in extremitate acuminatis, sed maxime odore gravi, quæ tota Herba prædita est. Ononis quoque inter odorata Trifolia numeranda, similis Foenugræ, sed lignosior fruticiorque. Ejus enim folia odorata sunt, tum illius, cuius rami aculeos gerunt, tum alterius quæ proflus spinis caret. Flos utriusque papilionaceus, femineque in siliculis visis similibus. Reperitur & hujus generis in montibus Senenibus, quod capreolos, ut Vicia, gerit sine spinis, odore jucundissimo, qui duo in Planta exsiccata servatur. Lagopus Græcis atque Latinis aliquibus Trifolium humile appellatur. Spica caulis rectus, ac in cacumibus ramulorum huic lanuginosa hirsutave, pedem leporis imitans, unde Lagopi nomen: in ea semen continetur. Reliqua vero Trifoliorum genera ad alia quædam fructu potestate, quorum notitia aut à flore, aut à fructu pendente est, ut Anemonis species, Fragaria, Tribulus quidam, ac inter legumina Cicer quoddam sylvestre, tum Phaeolus, & si quæ sunt alia.

CAP. XVIII.

De Pentaphyllo, sive Quinq̃uefolio.

Inter Arbores Staphylo dendron, inter Frutices paucissima ab uno pediculo quinque folia semper dependentia habent. In Herbarum genere nonnulla quæ Pentaphylla & Quinq̃ue folia dicuntur. Horum flores quinque foliis diversi coloris, raro pluribus constituuntur. Tormentillum nonnulli cum Quinq̃uefoliis confundunt. Differt tamen numero foliorum florum, & foliorum Herbarum. Flos enim ex quatuor foliis constat luteis: folia in uno pediculo ut plurimum septem.

CAP. XIX.

De Herbis Intybacis, Chondrilla, Hieracii.

Intybaceæ Herbarum omnes inter Olera recenseri debent. *κινυβακία* appellat Theophrastus Hist. lib. vii, cap. vii, propter similitudinem foliorum quam habent cum Intybo. Eorum multa sunt genera: Seris quam nunc Cichorium dicunt, Chondrilla, Sonchus, Lactuca, Hieracium, & ad alia quædam nomine tantum cognita apud Theophrastum, & Plinium. Priora autem non satis exacte à veteribus descripta, quod antiquis illis temporibus pluraquam satis essent nota. In errore versantur recentiores Herbarii, qui nobis multas Chondrillas ob oculos proponunt flore luteo, cum tamen similem Chichorio, hoc est, coeruleum Chondrilla adscripserit Dioscorides, quemadmodum etiam & caulem & folia. Unde nonnulli Sylvestris Chichorii speciem arbitrabantur. Differt tamen ab Intybo, quod folia, flos & caulis, semen-

que graciliora tenuioraque sint, & in ramis gummi maticchi simillimum edat, cuius granum concretum *κινυβακία* Græci dicunt, hincque Chondrilla vox. Nec minor eorum est error, qui nobis multas Cichorii species luteis præditas floribus enumerant, si vulgare Cichorium verum sit veterum, ut hæcenus omnes arbitramur. Harum pleraque ad Hieracia & Lactucas referendas censeo, & ad alia quædam Intybacorum genera, quorum nomina extant apud Theophrastum & Plinium. Hieracia duo descripti Dioscorides lib. xiii, cap. lxx, magnum & parvum. Utrique folia Sonchii, flores lutei: magno, flores tales in oblongis capitulis; parvo, flores in orbem circinati. Constant Intybacorum flores ex multis foliis, sæpe in extremitatibus ferratis, luteis aut lacteis, raro rubris. Vnam enim Hieracii speciem purpureo flore novi.

CAP. XX.

De Brassica.

Brassica: multas species faciunt veteres atque recentiores. Omnes folio sunt carnoso, pingui, crispulo, aut lavi, aut laciniato & inciso, aut sine divisionibus, nigro aut albo, aut rubro, aut viridi, multum succi in se continente. Flos illius luteus aut albus, quatuor foliis constat: semen in siliculis. Brassicæ marinæ speciei Penæ Monospermos dicitur, quod singule silique unicum tantum semen continent, flos ex sex foliis constituitur. Quæ autem vulgo Soldanella dicitur, nequaquam ad Brassicas referenda. Flos & folio herbarum ad Brassicas referenda. Flos & folio herbarum quæ floris, Convolvulus; virtute vero, Scammonium est.

CAP. XXI.

De Iunco.

Notissima herba est Iuncus; prope paludes frequens, quamquam arenosa aridaque etiam loca non careant Iunco. Proprie Iuncos appellamus, quorum folia & caules scirpi nunc vocantur à multis, qui à radice oriuntur teretes, glabri & sine nodis; interdum etiam angulosis, intus cavi, medulla molli & alba pleni, aut spongiosi, denique flexiles. Cæsalpinus vocat Iuncos caules nodos flexileque, negatque folia à caulibus differre. Nos folia censemus, ubi fructum aut florem in caule nondum gerunt; ubi gerunt, caules. Cæterum angulosos interdum hos caules aut folia dixi.

Nam hujus generis triangularis in fossis Patavinis mihi comparuit. Sunt inter veteres, qui Cyperum etiam Iuncum appellaverunt, quod caulem edat Iunco vulgari similem, intus cavum, medullulosum, foris fine nodis ac foliis. Teres hic est in Cypero, quem Iuncum floridum appellat Matthioli; angulosus in Cyperis, quos Dioscorides & Plinius descripserunt. Reperitur enim frequenter triangulari caule, raro quadrangulo, qui Iuncus quadratus à Celso nominatur. Folia Cypero angusta, plana, glabra, & Porro similia, quibus maxime à vulgari Iunco distinguitur. Squinanthum autem officinarum, Græci quoque *κινυβακία* & *κινυβακία* nominant: Latini Iuncum odoratum, Celsus Iuncum rotundum, ut à Iunco vulgari & Cypero

qui triangularis ut plurimum est, distingueretur. Raro ad nos hæc Herba adfertur integra cum caule ex Arabia. Vidi caulem ejus rotundum, foliis alternatim oblitum, in quorum alii flores continebantur, folia Gramini humilia, cuius locum eff species. Est sane adhuc me latet, cur Iuncus peregrinam hanc Herbam dixerint, cum neque caulem, neque folia Iunci habeat. Parum à Cypero rotundumque Typha (folia enim similia, enodis caulis & in summo flos, aut fructus) ni durus caulis & lignosus effert instat Arundinis, & flos seu fructus tornatæ clavæ similis.

CAP. XXII.

De Equisetio.

Iunco subjungatur Equisetum forma parum dissimili: *ἵππος* Græci vocant, Latini Equisetum, & Caudam equinam, quam Herba hæc altius accrescens dependentibus comis refert. Caule & folio est luncæ, id est, rotundo, geniculato, & in se infarctis. Ut breviter dicam, ni folia aut ramos (utroque modo dici possunt partes in quas caulis Equiseti se dividit) proferret, Iuncus geniculatus merito appellari posset.

CAP. XXIII.

De Lino, & Linaria.

Lini & Linariæ genera folia & flores produnt, cunctis enim oblonga, angusta, acuminata in caule. Linaria à foliorum similitudine quam cum Lino habet, nomen accepit. Distinguntur flore & fructu. In Lino five sylvestre sit, five sativum, flos ex quinque foliis constat coerulei coloris aut albi, aut rubescentis, aut lutei: Linariæ vero flores figura varii. Vulgaris, quam Officinæ nuncupat Dioscorides, flores edit luteos à fronte latiusculos, clausulosque, os ranae imitantes: cauda angusta est, inflexa, ut Consolida regalis; foliis lini, qualia etiam in Esula minori conspiciuntur. Herbarii primæ nomenclaturæ Esulam à Linaria vulgari distinguunt, quod ex Esule caule aut foliis hæc emanet; & Linaria minime. Hoc ait tritus vericulus.

Esula testis, sine luteo Linaria crescit.
Cæterum quædam propulerunt nostri Neoterici Linarias, quarum folia non sunt Lino similia, sed flores vulgari Linariæ tantum, ut Linaria odorata, & Linaria Valentina Clusii.

CAP. XXIV.

De Vrtica.

Menthæ similia sunt Vrticæ folia, hoc est lata, in acutum desinentia, undique serrata. Natura urendi se prodit, distinguiturque à Mentha, mentha. Quod hæc non erat, & odorata fuit. Plinius à foliorum forma Vrticam Herculanam nominavit, quæ odorata est. Ego hanc inter Calamentha ponendam puto, si non tactu simul cum odore mordet. Vrticæ valde similes Herba est, quam mortuam Vrticam nominant, quia tactu innoxia est. Ejus duo genera, unum Lanium vocant; quod hujus flores cucullo larvatum faciem quantenus representant: alterum scitidum, quod Vrticam scitidam

pureum statuit; alterum flore candido, & calice purpureo. Virgilius Ecloga v purpureum Narcissum (ut putro) nominat, non quod undique sit purpureus: sed quia medium floribus (quod calicem videm Plinius appellasse) purpureum cernatur. Idem Plinius paulo post unum genus purpureo flore recenset, alterum herbario; quod tamen si de colore floribus intelligat, falsum est. Non enim floribus color herbarius, sed albus, in medio vero aut croceus, aut purpureus, aut albus totus. Herbarium caulem adscripsit Narcisso Theophrastus lib. Hist. vi, cap. vi, his verbis: *ἡ δὲ καὶ αὐτὴν ἀπὸ τοῦ μέσου διὰ τὴν ἀνὰ τὸν ἄκρον τὴν ἀνὰ τὸν ἄκρον* sine foliis habet, sed herbarium, florem in cacumine. Videtur autem Plinius herbarium retulisse. Narcissum autem Dioscorides folia Porro similia habere, sed tenuia, multoque minora & angustiora: caulem vacuum, sine foliis, palmo majorem, in quo folia albus, intus croceus, in quibusdam purpureus: radicem intus albam, rotundam, bulbosam: semen veluti in tunica nigra, oblongum. Recentiores multos nobis Narcissos depinxerunt, veros scilicet, & falsos. Vero voco, qui descriptionem Dioscoridis in flores admittunt: falsos vero, qui ab ea diffident. Verorum foliati sunt flores omnes sex foliis constantes, aut pluribus; albis omnibus, excepto quodam genere quod nuper ex Oriente ad nos delatum est; in medio autem floribus calix seu acetabulum, quod aut luteum aut croceum; aut luteum in fundo, croceum aut purpureum in oris; aut totum aureum, albumve. Id Ovidius eleganter, dum mutationem Narcissi adolefcentis in hunc florem describit, expressit his verbis:

*Nisquam corpus erat, croceum pro corpore florem
torcentur, foliis medium cingentibus albis.*

Quibusdam in medio protuberantia flava, que rotunda est, & vel integra (calicem plenum vocat Clusius lib. xi Hist. cap. xxi, in Narcisso pleno flore) vel in plures partes divisa foliis in medio habent, ut quibusdam, qui calicem in medio habent, flammula in medio calicis: quibusdam foliis, & alia quedam, que diligens communis Narcissi inspector observare poterit, & quantum aliis quoque in partibus differant, ut pseudonarcissum flammula in medio calicis sumunt. Ceterum falsorum Narcissorum plurime sunt species, que inter se variis partibus differunt. Dodonæus Narcissum montanum appellat, qui radix & folia, caulique Narcissi; atque etiam floribus folia vulgaris Narcissi que calicem ambiunt, ni flava essent; calix vero tam grandis, ut ex eo floribus dimidium constitutum esse videatur, atque in nonnullis ejus specibus floribus ex hoc calice cernatur.

Pseudonarcissus

Narcissus montanus
Theophr.

Campana peregrina.

appellaverunt, ad Narcissos quidam retulerunt, cum etiam & hanc nollent sui generis Plantam constituerunt. Narcissus certe non est; quoniam in medio floribus nullum acetabulum aut calicem, sed flammula seu ligule ut plurimum crocea, una cum stilo in medio, que sex alba folia ambiunt. Miror inter Narcissos relatum cum flore, quem vulgo peregrino vocabulo Tulipanum & Dulpanium vocat, cum prater bulbum nil cum Narcisso commune habeat. Inter Lili genera supra rectius videor collocasse.

Tulipanum
Lili genus.

CAP. XXXII.

De Iride.

Iridis flos sex folia habet: tria deorsum reflexa, & arcu modo, tria vero sursum contra se mutuo reflexa, que magnitudine, colore, odoreque variant. In vulgari ut plurimum color cereuleus aut arcus coelestis, unde Iridis nomen accepit. Ab hujus similitudine variae Plantae Iridis nomen mutuatæ sunt, quas in latissolis & angustifoliis divitæ Clusius lib. xi Hist. cap. xlv. Omnibus autem a radice sunt folia gladii similitudine. Iosephus Iridis Tripolitana folia magna versus caulem inflexa habet, & alia tria minora alata, ligulam flavam tenentia, bifida, ut novem folios consistere videatur. Chamaeiris flores odorati sunt, ex cereuleo albo, aliquando ex purpureo violaceo, ex nonnullis foliis confati. Lobelius Iridem raram nominat flore tribus tantum foliis repandis constante peregrina elegantia striatis, obscure violaceis. Xylus, quam Dioscorides Irin sylvestrem vocavit, vulgus spatulam foetidam, facile a reliquis Iridis speciebus dignoscitur ex flore & foliis, quæ a radice nascuntur. Floribus enim surrecta folia, atque in ejus umbilico puniceum quid: folia vero herbe recoctæ olent, unde & Recoctaria in quibusdam Italianis locis dicta est.

CAP. XXXIII.

De Ranunculo.

Cognoscuntur & ex flore Ranunculi genera. Hujus color aut niveus est, aut aureus testis Dioscoride, qui, uti neque ex aliis Plinius, quidquam de forma floribus præterea annotavit. Nostri Herbarii diligentiores in imponendis nominibus, omnes Herbas, quibus communium Ranunculorum floribus similes in caule micant flores, Ranunculos nominant. Consant quoque foliis aureis ut plurimum, interdum lacteis, expansis (que cultura & mangonio, tum etiam sponte multiplicari affirmant) in medio multis lacteis aut albis flammulis, brevibus, iisque sæpe cum apicibus. Reliqua vero genera, que proponunt alii, nequaquam Ranunculorum sunt, sed aut Anemones, aut alterius. Ranunculum Græci *βαρβαγγιον* appellant, quod vulgare illa species prope fossas, & in locis humidis nascuntur, ubi rana degere solent, ac se sub hac herba occultare. Plinius ait lib. xxv, cap. xxi, Strumeam a suis Herbariis vocari, quoniam strumis & panis molleatur; vel etiam, quod trumosa radice interdum conspiciatur. Ego in monte quodam Bononiensi Ranunculum

Ranunculus
radix Scrophularia.

culum passim nascentem vidiradice Scrophularia, & folio floreque communis Ranunculi.

CAP. XXXIV.

De Anemone.

Quoniam autem Ranunculo tam valde affinis est Anemone, ut multi hanc cum eo confundant, non erit inutile discrimina utriusque ostendere. Flos Anemones nisi radiis foliaribus illustretur, aut vento perfletur, non aperitur; unde ipsi nomen. Nam ventus Græcis *ἀνέμος*. Est præterea & in floribus differentia, & foliorum numero. Quoad colorem, Anemone color aut est puniceus, aut purpureus, raro albus aut lacteus: Ranunculo autem luteus fere semper, aliquando albus. Nam licet Ranunculus primum flore purpureo interdum esse scripserit Dioscorides: est tamen hæcenus a nullis rizotomis conspectus est. Plantam quidem Syriacam nobis depictam ostendit Leonardus Rauwolfius, quam ad Anemone retulit. Flos ei ex quinque foliis, modo luteis, modo purpureis, alias rubris. Sakaick appellant Arabes. Forte hoc primum Ranunculi genus Dioscoridis; quod foliis coriandri constat, sed latioribus, subalbidis, pinguibus, flore luteo, interdum purpureo. Verum quia non addit descriptionem hic Auctor, differtur quid certi conjectura assequi possim: icon satis descriptioni Dioscoridis respondet. Lacteo autem flore quartum genus Ranunculi donat Dioscorides. Quod ad foliorum numerum, ut dixi, Ranunculis omnibus in flore quinque folia, exceptis his qui multiplici foliorum serie constant: Anemones autem flos raro quinque habet folia, & si quinque, ea semper vel punicea, vel purpurea, nunquam alba: qui vero sex, septem, octo aut plura, omnibus coloribus etiam albo variat. Nam quem Ranunculum nemorenses appellant nonnulli flore albo, Anemones est species, cum ejus flos nunquam a me quinque; sed sæpius sex, interdum pluribus foliis conspectus sit. Sunt, inquit Dioscorides lib. xi, cap. cxcv, qui ab Anemone silvestri Argemone, & Papaver quod Rhodajum dicunt, propter eorum cognationem in floribus, distinguere non possunt. Verum Papaveris & Argemone color minus puniceus spectatur, & utrumque tardius flores. *Ῥοῖον* & Argemone croceum succum, gustu admodum acrum reddit: Rhodajum vero candidiorum, & acrum. Præterea Argemone & Rhodajum capitula silvestris Papaveris similia sunt: sed Argemone superius crassiusculum; Rhodajum angustius. Anemones genera vero que succum emittunt, neque capite donata sunt, sed veluti *ἀσπαράγγιον* cacumine. Hæc ille. Plinius lib. xxi, cap. xxvii, Anemone Phœnion dici tradit, forte a splendore. Sed apud eum potius legerem Phœnion: quoniam inter potha Dioscoridis legitur Anemone Phœniceum dici, scilicet a colore, *Qualem que lento celant sub cortice grana*
Punica fere solent.

Vt canit Ovidius lib. x Metamorphoseon.

CAP. XXXV.

De Hyacintho.

Dioscorides Hyacinthum suum sic describit. *Radix & folia habet bulbis, caulem dohrantem;*

lecom, minima digito tenuiorem, æquidem; etiam incombentem florum colore ad purpureum accedentem (sic *μεγανθυδης* interpretor) plantam, incurvantem. Quæ profecto descriptio non videtur convenire cum Hyacinthis, qui nobis ab Herbariis junioribus pro Hyacinthis Dioscoridis obtruduntur: liquidem color omnibus inest cereuleus: nisi forte idem sint *μεγανθυδης* & cereuleus, quemadmodum multis visum fuit, neutquam, ut credo, Dioscoridi. Hic enim in primo statim libro cap. i, de Iridis agens coloribus, purpureum a cereulo diffinit. Verum cum variare coloribus hosce juniorum Hyacinthos videamus, nonnullique tradant purpureos quoque reperiri; laudanda potius erit eorum sententia, qui nobis pro vero Dioscoridis monstrant eam Hyacinthis speciem, quæ purpurea cereuleis etiam flores habet præter cereuleos: oppugnanda vero eorum, qui qualvis Plantas quibus bulbosa radix est, folia oblonga, caulis nudus florum cereuleis plurimis onustus, figura comæ, pro Hyacinthis Dioscoridis communiterant. Cum autem bulbosus Plantis omnibus folia oblonga sint, & radice fatius producta, caulis ut plurimum nudus; sequitur Juniorum Hyacinthum flore tantum a cæteris bulbosis differre. Ideoque nobis Hyacinthis quidam etiam indidere peregrina plantæ, cui pro bulbo tuber & caulis foliatus, Hyacinthum Indicum appellant. In flores autem referunt multitudinem florum cauli supremo instar comæ adherentem, & colorem in eis cereuleum, etiam floribus forma variæ. Quibusdam enim unico folio constantes convolvocis adscribit, oblongos, rotundos, in latus se expandentes, per oras incisus in sex lacinas, que reflectuntur extrinsecis oris: quibusdam vero ex quinque aut sex foliis congestos, quos stellatos vocant ubi sese explicant. Omnes hi diversi partibus, figura, colore, Lobelius quandam speciem Hyacinthum comosum album vocavit, cum tamen ejus flos nunquam cereuleus aut purpureus visus sit. Nam quem comosum cereuleum ostendit, alia est Hyacinthis species, cujus flos in aliis multis, quam colore a prædicta variat. Sed illi forte id nominis dedit a florum in caule congerie, que comam Hyacinthis quodammodo imitari videtur. Quare cum recentiores tor nobis depinxerint Hyacinthos, Dioscorides tantum unum descripserit, Theophrastus nullam de eo mentionem fecerit, nisi quod inter veros flores connumerat, in Sattivamque & Sylvestrem distinxerit, opus fuit nostrum sententiam de Hyacintho haud vobis lupprimere.

CAP. XXXVI.

De Scabiosa.

Scabiosa proprium est in capitulo florem habere expansum, ex multis floribus parvis constantem, qui singuli caliculis membranceis continentur. Caliculi hi decidentibus floribus optime conspiciuntur, atque hæc fœmine sustinentur hirsuto; quod postquam aucti sunt una cum caliculis decidit. Capitulum in vulgari Scabiosa, nonnullique aliis, ex floribus quoque foliis confutis congestum est. Degenerat a Scabiosis paululum ea Planta quam Clusius Scabiosam Pannonicam majorem

Hyacinthus Indicus.

Hyacinthus Pannonicus
Clus.

Ranunculus primum genus
Diosc.

Iridis Tripolitana.

Chamaeiris.

Xylus.

Ranunculus nemorensis
albus.

Argemone.
Papaver Rhodajum.

Dioscorides
cereuleus.

Strumeam.

& nulla fit mentio trium generum Aconiti commemoratorum, sed Aconiti Lycoctono simpliciter ascribitur. Hæc causa cor recentiores Herbarii in vero invento Lycoctono negligentiores multas Herbas, quibus folia sunt Platani, sed altius incisa, aut rotundiuscula, plures divisa in partes, pro Aconitis Lycoctonis nobis obtrudant, quarum nulla radicem habet cammaro similem. Sic nomine interdum nos deterrent à multarum Herbarum salutaribus usus, imponuntque exitium, in quibus nulla noxa, imo magnum humano generi auxilium in adversa valetudine. Aconiti Lycoctoni speciem autumant Napellum, sic appellatum à Napi figura, quam radix ejus refert. Nam folia aliarum Lycoctoni specierum habet, quæ sane valde perniciosa sunt. A doctissimo Casare Scaligero in Commentariis librorum Aristotelis attributorum de Plantis, satis probatum est non esse Aconitum.

C A P. LIV.

De Cistho.

Cisthus Frutex est. Ejus duo sunt summa genera. Ladaniferum, & quod non fert ladanum. Illud Cisthus Ledum, hoc simpliciter Cisthus vocatur. Folia utrique oblonga, aut rotunda; flos Rose foliis vestris ex quinque foliolis constans, vari coloris, cum suis staminibus in medio; fructus vero trigonus aut pentagonus, in quo semen minutum paraverit aut Hylecyami. Sed de cæteris generibus quæ pluribus, quam una, aut altera nota cognoscuntur auctores consulendi, atque ii qui in hac scientia versati satis sunt. Nam omnia examinare atque describere hic non est animus, sed his tantum vobis aditum facere ad magnam Stirpium multitudinem brevi temporis spacio cognoscendam.

C A P. LV.

Plantas imperfectas post perfectas esse discendas; & perfectarum primum florescentes.

His prægnatis cum aliquo in re Herbaria meritorie versato, montes, valles, palcua, horti, aliaque loca, in quibus Plantarum varium copia suppetit, adveunda. Nec vero protinus Plantæ quæque obvia eruenta est aut decerpenda; sed ea quæ flores semenque fert, prius intenda, diligenterque ejus singulæ partium formæ contemplandæ quoad fieri potest. Perfectæ enim Plantæ prius quam imperfectæ, quarum minor multo est numerus, discendæ sunt. Dum autem florent Plantæ perfectæ, sunt pulcherrimæ, & in sua perfectione: ideoque tum innotescunt, magnificæ earum forma à cæteris distinguitur: tum sub quo genere quæque quam videris recensere possit perspicitur. Maxima enim (ut è supradictis colligere potestis) genera fructu, & flore nobis designantur. Præterea sæpe occurrit, ut quæpiam species peculiare quid in parte aliqua obtineat, quo vobis à plurimis distingat, quodque facile in memoria referatur. Omnium namque partium formas in memoria habere non possumus. Memoria nimis labili & inconstanti à natura donati fu-

mus. A comite & hujus rei perito præceptore duo posuimus, ut quantum fieri potest, median speciem lustrumorum quarundam generum vobis ostendat, doceatque maxime ex qua parte cognoscatur. Appello autem speciem median, & sub quibus similitudine genus quoddam constituitur, & sub quibus nomine multæ alie constituuntur similes. Verbi gratia: vulgare Gramen medium est inter cuncta Graminum genera, quæ à foliorum præcipue similitudine cum hoc Gramine, Graminis nomen adepta sunt. Hæc ratio est cur Graminis nomen partem, quæ una aut altera nota genus peculiare constituit, ea quæ licuit brevitate prolecuti sumus. Vbi autem Plantas inspexeritis, interrogandus præceptor de nomine, qui quod magis est in quotidiano sermone, aut generis ejus cum specifica differentia indicabit, tum quæ nota in eo genere sit præcipua. Haud etiam erubescas realias ejusdem generis species inquirere si ad manus sit, quemadmodum in publicis hortis esse solent. Sic generis idea firmius menti inhaerebit. Alterum etiam à præceptore præstandum est, ut eum quem non magno rem Herbariam addiscendi studio teneri videt, in iis cognoscendis tantum detineat, quarum communis est usus ad vitam conservandam morboque depellendos: ne quidquid ab eo suscipitum erat laboris, sine fructu sit: ei vero qui ardentius huic studio incumbere videtur, & has, & alias quarum nondum cognitum est usus, commoustrat. Quoniam autem omnibus Stirpibus sua sunt tempora, in quibus maxima earum pars formam mutare consueverunt; alique ipsi sit dum primum è terra erumpunt, alia dum augentur, alia dum vigent, danda est diligenter opera, ut quas florescentes vigentesque inspexistis, etiam cum augentur, primumque è terra erumpunt contemplantur. Cum his ubi perfectarum magnam partem noveritis per summa quædam genera, ad imperfectas, quarum pauca sunt genera, discendas vos accingite.

C A P. LVI.

Frequentem inspectionem ad formam specierum memoria tradendam esse necessariam.

Cæterum scire oportet tot specierum formas facilius sensibus externis percipi atque apprehendi, quam memoria conservari. Sedula igitur frequentique ad hoc (ut ad aliarum rerum sensibilibus cognitionem) opus est inspectione. Sæpe etiam contingit, ut in Plantis partium multiplicitatem omnes particule uno intuitu non possint à nobis observari ad totius speciei formam apprehendendam, nisi repetita inspectio eas nobis monstraverit, quæ aliarum, quæ priori intuitu percipiuntur, memoriam renovet, confirmetque. In hunc itaque finem invenda sæpius adveunda loca, in quibus nascuntur Plantæ, quæ semel aut bis vidistis. Quoniam autem contingit ut veris, æstatis, autumnique tempore propter multam commodam, hyemis vero, quia omnes Stirpes ferro periere, id præstare non possitis, ideo Hortos hyemales, (sic voco libros, in quibus Plantæ sicæ agglutinatæ chartis conservantur) inspicere debetis. Adeundi quin etiam eorum libri, qui nobis hæc Stirpes breviter, ac diligenter descriperunt, de-

pinxeruntque, quos postea recensere ubi de rei Herbariæ auctoribus egero.

C A P. LVII.

Plantas depingendi, delineandique ratio.

Quod si vero Auctores procul sint, modum quo Plantarum effigiem chartis imprimatis, aut in charta depingatis, etiam si artem pingendi non noveritis, vobis communicabo. Asserem populum, & glabrum lævemque atramento Typographorum leviter, & superficiei tenus illinitæ, pilulis manubriatis, quas mazas vocant Typographi. Afferi huic Plantam, aut viridem, aut ficcā, quam vultis integram, si parva sit; aut ramum ejusdem, si tota major sit quam charta cui imprimenda est capere possit, superferite: mox chartam superponite, ac desuper satis fortiter fricate, donec atramento Planta imbuta sit. Ablata ab assere, chartæ cui effigies imprimenda imponatur, alique superimposita manibus lintheis fricetur, donec videatur satis ad effigiem chartæ imprimendam.

C A P. LVIII.

Hortos Hyemales consiciendi ratio.

Verum laudandus magis est labor, qui ad Hortos Hyemales consiciendos suscipitur. Minor enim arque utilis. Quippe plura, quam in picturis monstrantur quæ ad formam spectant, nempe color, alique nonnulla, quæ tam exacte non possint priori modo depingi. Præterea prior labor in Plantis grandibus, alperis, & spinosis ac valde duris sæpe frustra fit. Modus autem chartis Stirpes agglutinandi talis esto. Planta quam vultis, aut ejus ramus viridis cum flore, foliis, atque semine, si haberi potest, perfectæque sit Planta, inter chartæ candidæ duo folia ponatur. Nam ignobilior charta, & quæ perliuit, quamquam ab omnibus hæcenus recipitur ad hunc usum, nequaquam apta censetur, quod experientia à me probatum est, inter hanc positas Stirpes difficultati ficari, sæpeque situ & squallore obitas marcescere. Ponenda autem ea quæ dixi folia in crasse & plurius paginarum libro, qui respondeat magnitudini foliorum imponendorum. Libro huic superponatur pondus, quo tanquam torculari paulatim Planta comprimatur. Cavendum autem

est ab ingenti pondere, prius quam Plantæ magna aquosioris humoris pars consumpta sit. Ideo paulatim aggravandum pondus, primumque levius sit, donec flaccescant Plantæ (quod æstatis tempore trium aut quatuor horarum spatio evenire solet) & postea gravior, tandem gravissimum ubi parum humoris adhuc in se habuerit, ac jam fere sicca fuerint. Illud etiam curæ esse debet, ut singulis diebus eas inspicatis ac revolvatis, & pilicæ, si quas videritis explicitis, floresque & folia ita accommodatis, ut ab utroque latere apici possint chartam, quæ mutetis donec prorsus sicca evafierit. Sicca erit loco sicco conservanda inter chartam, donec plurima sic exsiccata sint, operæque pretium fuerit agglutinandi laborem suscipere. Tum sic agitate. Penicilla variæ magnitudinis (Plantæ enim magnis foliis præditæ majora desiderant; parvis, minora) imbuere hoc glutine infra scripto, quo oblinetis eam Plantæ faciem quæ chartæ adhaerere debet. Componitur hoc gluten ex taurocollæ pellucida, quam collam Tedscham, hoc est gluten Germanicum vulgus Patavi vocat, uncia una quæ in aceti acerrimi uncis fere maceratur per noctem, deinde igitur apponitur lenito, ut liqueat. Amoto ab igne ubi paululum refriguit, adduntur adde hepaticæ drachma semis, pulveris caryophyllorum scrupulus unus, misceturque. Plantam igitur agglutinandam chartæ ignobiliori superferite, ac glutine oblinite, deinde auferre, chartæque candidæ imponite, & alio superposito folio, sudario aut linteo fortiter fricatis, & æqualiter, ut undique chartæ adhaerent: tum ipsam inter duo folia, alio libro concludit superincumbente bono pondere, donec ficeretur gluten (quod post unam aut alteram fit horam) mox auferre. Sciendum autem et illud hic est, non cum omnibus Stirpibus sic agendum esse. Nam quedam sunt, quæ facile ficari nequeunt, propter succi aquosi ubertatem, ut Semperivivi, Telespii, & aliorum quorundam genera. Etenim marcescunt, putrefiunt, perduntque folia, aut ea alterius coloris, quam naturalis erat, valdeque corrugata servant. Has igitur virides agglutinare satius est, prius tamen inter duo folia strata in librum ponere, comprimereque leviter levi pondere, donec flaccescant, pilicam, formamque sumperint, ut recte agglutinari possint. Hoc modo & alias quæque virides in montibus agglutinavi, folique, aut alio loco calido expositi, ut sic exsiccarentur, feliciterque successe hic labor.

FINIS PRIMI LIBRI

ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS
ISAGOGES
IN REM HERBARIAM
LIBER SECVNDVS.

De usu, & facultatibus Plantarum.

C A P. I.

Vnus Herbarum multiplex. Facultas in humano corpore duplex. Quid alimentum. Quid medicamentum.



Acultas Stirpium, cujus gratia earum forma prae-
cipue inquiritur, varia est at-
que multiplex, tum in ani-
matis, tum in anima caren-
tibus. Hinc event, quod
variae artes, imo fere om-
nes, earum vires ad suos
usos quotidie experiantur.

Præcipue tamen atque maxime in nostri gratiam à natura comparatæ videntur, ut cuncta alia, quæ sub-
lunari hoc globo comprehenduntur, helleque etiam ipse, quamquam à nobis sint remotissime. Ipse namque Philosophorum magister lib. 11 Physicæ hominem quodammodo omnium quæ existunt, finem statuit, atque omnia propter eum condita. Humanum autem corpus Plantæ nutrire debent, ut vitam sustineant, ut alterare, ut morbos depellant. Inde alimentum, hinc medicamentum. Alimentum enim dicere convenit, quod assimilatur & appositum nutrij substantiam auget & conservat: medicamentum vero, quicquid corpus nostrum sua qualitate alterat. Ex quibus patet duas facultates pro humano corpore in Stirpibus reperiri, scilicet nutriendi & alterandi. Eæ insunt toti Stirpi, vel parti ejus; aut simplices, aut mixtæ. Faciunt autem simplices ut Planta simpliciter alimentum dicatur, vel medicamentum. Mixtæ vero alimentum medicamentum constitunt; tale est Lactuca, Portulaca, quæ refrigerat & nutriunt; vinum, quod calefacit & nutrit. Vtraque sane multum excessu defectuque differunt. Quædam enim plus nutriunt, quam alterant, ut Triticum, quæ proprie alimenta medicamentosa appellantur; quædam vero plus alterant, quam nutriunt, & ideo medicamentosa alimentosa dici debent. Nullum autem alimentum novimus, quod non aliquam vim alterandi aut per se, aut per relationem obtineat. Quæcumque temperata sunt, in homine eucrato nihil alterant; sed in eo, qui intemperie aliqua affectus est in toto corpore, aut aliqua ejus parte. Per se autem cunctæ Plantæ alterare debent, ut nulla reperiatur, quæ omnibus elementorum qualitatibus æqualiter mixtis consistat. Medicamentum autem

omne non proflus alimento contrarium est: sed quoddam contrarium proflus, quod venenum est, omnibus qualitatibus totaque ut vocant, substantia, & occulta proprietate nobis inficit: aliq-
tantum diversum à medicamento, id scilicet, quod manifesta alterat qualitate.

C A P. II.

Prima Plantarum Facultates quæ & quæ, ac de earum gradibus.

Q Vippe medicamenta, vel manifesta alterant qualitate, vel occulta quam vocant totam substantiam. Qualitas manifesta triplex est, prima, secunda, & tertia. Prima rursus duplex, simplex una, altera vero composita. Unde duplex refusa prima facultas in medicamento, scilicet calefaciendi simpliciter (nulla alia comitante) aut refrigerandi, aut siccandi, aut humectandi: vel calefaciendi & siccandi, vel refrigerandi humectandi, vel calefaciendi & humectandi, vel refrigerandi & siccandi. Hæc facultas prima ut etiam secunda, de qua mox dicemus, intentione remissionis rursus differunt. Idcirco quatuor classes seu ordines finere præci, quibus exacte intentionem remissionis facultatum distinguere. Quod enim parum, hoc est non evidenter, fed aliqua demonstratione per rationem inventa calefacit, aut refrigerat, aut humectat, aut siccet, id primo gradu calidum, frigidum, humidum, siccumve dicitur: quod vero mediocriter id præstat, tale esse dicunt in secundo gradu: quod autem valenter his qualitatibus agit, id intemperatum censent tertio gradu: quod denique valentissime, id quartæ ordinis statuunt. Exempli gratia, calida in primo gradu sunt, Lini semen, Brassica, Amygdala dulcis, Althæa: in secundo, Arthemisia, Caparis. Chamæpitys, Crocus, Melissophyllum: in tertio, Abrotanum, Cinamomum, quod est Cassia lineæ electa, Dictamnus, Calamētha, Caryophyllum; in quarto, quæ tam insigni caliditate sunt ut crustam urendo partibus inducant, efcharotica vocantur; qualia sunt, Flammula, Euphorbium, Coloss, Cocca, Lepidium, quod Piperitum vocant. Refrigerant primo gradu Hordeum, Atriplex, Gramen, Rosa, Viola maritima. Secundo, Accacia, Cucumis, Lens palustris, Rhus obfcurior, Plantago: tertio Portulaca, Alter cum flore albo, Cicuta, & succus Citri Mali acidus: quarto quæ extringunt calorem nativum, quorum nulla exempla succurrunt. Cicuta enim, opium, Hyoscyamus,

mus, & si quæ sunt alia quæ stupefaciendi vi possunt, nequaquam manifesta qualitate stupefaciunt, fed occulta, uti alibi comprobabimus. Humectant in prima classe Buglossum, Glycyrrhiza, Malva, Saccharum, Helxine: in secunda Atriplex, Cucumis, Viola maritima: tertia Lactuca & Cucumerum succi. Humidum autem & siccum in quarto nullum censetur, quod sint passibiles qualitates, quæ summa vi operari nequeunt sine insigni calore aut frigore. Cæterum siccant primo ordine Brassica, Chamæmelum, Fœniculum: secundo Balanitium, Bursa pastoria, Plantago: Tertio Asarum, Abinthium, Calamētha, Ruta hortensis, Aloë. Singule autem hæc classes in principium, medium, finemque dividuntur: Exempli gratia, in principio primi gradus calidum dicitur, quod temperato est maxime vicinum in activis duabus qualitatibus, nempe calore & frigore, fed calore tamen paululum superante: quod vero in medio primi gradus calidum est, id simpliciter tale dicitur: In fine autem calidum, quod vicinius est principio secundi gradus.

C A P. III.

De secundis Facultatibus.

Secundæ autem facultates sunt quæ ex primis dimanant, unde secundæ nuncupantur. Nam prout varia est principium, hoc est principium qualitatum inter se mixto, pro eo & varie qualitates secundæ suboriuntur, quæ sunt mollicies, durities, raritas, densitas, asperitas, lavitas, crassities, tenuitas, tensio, laxitas. Ab his denominantur facultates secundæ, puta rarefaciendi, densandi, aperienti, attenuandi, attrahendi, discutiendi, repellendi, adurendi, extergendi, obfarcendi, & vis emplastica. A primis autem sic oriuntur. Nam moderatus calor in aërea seu mediocri materia cum humiditate & siccitate copulatus, si non excedat secundum ordinem, dura emollit, fundit, colligat, hoc est frigoris vi concreta. Caliditas autem vehemens cum siccitate insigni indurat molliam, tensasque ab humore & flatibus partes relaxat. Exhausti enim omnem humorem, relicta parte terrena, veluti sol, qui lutum indurat. Quod si vero siccitati calor modicus in tenui substantia conjungatur, crassam materiam attenuabit, incidet atque dissolvit, corporisque cutem rarefaciet, poroque aptiores reddit; ut per eos commodè diffari vapores possint: quemadmodum e contrario moderata frigiditas cum crassa terrenaque substantia, tenues humores in crassam, indurat ac densat eorum contiguitate poros, nihil evaporare sinit. Vbi vero frigidum quippiam est, quod pariter tenues habet essentiam; attenuabit quidem, sed minus valide quam calidum. Quodcumque autem inæquale partium superficiem & exasperatam, planam lavemque facit (ut Tragacanthæ gummi, Glycyrrhizæ radix, nuclei Pinei, semen Malvæ, & cætera quæ exasperatas fauces, tracheamque arteriam leniunt) humidum esse debet, ac in calido frigidoque moderatum cum mediocri materia coherere. Exasperant, hoc est partes summa facie inæquales reddunt, quæcumque insigni siccitate ac modico calore in materia mediocri, partium substantiam tergendum

nimum corradunt ac divellunt, ut Coleocyntidis, Centaurium minus, Aristolochia, & si quæ sunt alia valde amara falsaque. Siccitas insignis, licet eam cum frigore conjungatur, exasperat partem, non auferendo quippiam de substantia, sed contrahendo, ut in austeris, & acerbis, quæ fauces linguamque valde exasperant. Sic etiam levis, Adans Græci vocant, lavem reddit partium superficiem, tum quod corrasam substantiam aquabiliter restituit ac implet: tum etiam quod frigoris ac siccitatis vi contractam et exasperatam laxat, lubricat, & quasi distendit.

C A P. IV.

De Tertiis Facultatibus.

Tertie vero medicamentorum facultates oriuntur ex primis atque secundis vario modo junctis. Tales sunt pus movendi, urinae ciendi, menses provocandi; lac & semen generandi, vi minuendi, vel augendi, vel extinguendi; dolorem sedandi; carnem generandi; glutinandi; cicatricem inducendi, quibus adde quæ ad ornatum spectare videntur. Dicuntur autem tertie, quod non modo ex primis secundisque oriuntur, fed peculiares partes morboque respiciant. Quippe quæ pus movent, ad abscessus pertinent, aut ad sanguinem corruptum putridumque in aliquam partem decumbentem, qui in pus verti debet. Hanc facultatem Esculapio Græci dixerunt, ajuntque lac à moderato blandoque calore, & eigi nobis infusus est, simili oriri, qui hunc corruptum humorem, vel à vi emplastica, quæ humiditate moderatæ calore poros curis obfistipant, spiritum atque calorem parti insitum prohibet ne dissipetur diffusetur: unde calor magis acrius, hujusmodi humorem blandiorem reddit, atque concoquit, vel etiam à vi emollienti cum moderato calore, ut in Ladano, Bdello & similibus. Quæ urinae ciend, diuretica vocant, attenuando crassos humores atque incidendo, serofos ac tenniores separant & ad renes deducunt. Ea si una insigniter incidant, simulque abtergant, aereulas deturbant necumque ducent, calculosque dissolvunt, fin vero necesse calefaciant, siccant tamen valde, calculos in lapidis ac silicis duritiem concreta comminunt; ut Limonium succus acidus, radix Oxalidis, Bardane, Graminis. Non est hic inanis illa consideratio, utrum tam frigida diuretica, quam calida? Videntur non esse æque diuretica. Nam calor est fundere, liquare, partemque heterogeneas segregare, homogeneas congregare: unde Galenus negat sanguinem absque calido fundi & segregari. Nihil secus multa contra recentiorum urinae moventia frigida; ut quatuor femina frigida majora, fructus Halicacabi, & alia. Quare putò, ut responderi possit, vel recurrendum hic esse ad eas substantias diversas partes, quas sæpe inculcavit Galenus, plurimum medicamentorum exemplo declaravit: vel dicendum frigida non quidem fundere sanguinem & serofos humores separare à crassis, fed tantum attenuando præparare, ut facilius per venas ad renes deviant, qui postea sua proprietate tenues humores allicere solent. Menses autem movent cuncta, Menfes movendi.

Alimentum.

Medicamentum.

Facultates primarum & secundarum gradus.

Calida quæ.

Refrigerantia.

Frigida quæ.

Emollientia vis modo.

Indurantia modo.

Exasperantia modo.

Exasperantia modo.

Tertiae cur dicitur.

Pus movendi facies modo.

Primum ciendi modo.

Vtrum tam frigida diuretica quam calida.

Menfes movendi.

que in secundo ac tertio recessu calefaciunt, incaluerunt, attenuant. Ea nisi ora venarum aperient, atque parum ficerant, haud differentia diuretica. Magnam enim habent cum ipsis affinitatem, quæ calida sunt, & urinam cient. Horum valentiora conceptus secundaque pellunt atque evocant. Lac gignere ajunt quæ sanguinem procreant copiosum & probum, eumque moderata incalendi facultate ad mammas deducunt. Idcirco calida esse statuitur ac tenuium partium: differre tamen ab ipsis, quæ menstrua ducunt, ac urinam cient, quod hæc multum calefaciunt, illa vero moderata: utriusque multum ficerantia sunt adversa. Profecto si ex sanguine lac fiat, dubio procul sanguinem quæ producat lac generabunt, & quæ bonum sanguinem, bonum etiam lac, quæ vero pravius hoc est biliosum, pituitosum aut melancholicum sanguinem, tale quoque lac gignent, nisi tanta infirmitas (quæ multiplex esse potest) ut præcipiat lactis generationem. Ergo non est necesse, ut semper probum sanguinem producant, quæ lac generant, neque cuncta esse calida oportet, cum plurima sint frigida, quæ sanguinem faciunt. Sunt & nonnullæ Herbarum tam calide, tum frigide, quæ parum sanguinis ac nutrimenti suppediant, & tamen lactis copiam subministrant, ut Lactuca, Brasica, & Vincapervina, que in aqua aut jure carnis coda lac in mammis extrudunt revocant, existunt aut parum nutriat. Querimus ergo, quæ vi hæc medicamenta operentur? An partium tenuitate ac virtute incidenti? Nullo modo. Quæ enim incidenti vis Lactucæ & Brasicæ? Quare aliam invenimus viam, quæ nos in hanc ducat cognitionem, necesse est: nulla vero occurrit melior quam ea, per quam sanguis ad mammas pervadit. Quod duplici modo contingere potest: impulsu scilicet, & attractione. Impulsi, ut in mensibus suppressis contingit. Dicebat enim Hippocrates Sect. v, aph. xxxix, *Si mulier, quæ gravida non est, neque peperit, lac habet, hinc menstrua deferuntur*. Propellitur enim à natura sanguis, qui per loca uteri expurgari consueverat, ad mammas. Attractione, ut cum peculiari vi mammae attrahunt sanguinem. Hæc vero attractrix mammarum vis interdum sola operatur, ut quando in juvene muliere non admodum sanguine plena lac sit copiosum; interdum cum impulsu, vel validiore, vel debili; ut quando in muliere sanguine abundante, cui mensēs fluunt, aut non fluunt, lac tamen gignitur. Simili certe modo & Herbarum vis operatur. Quædam Menfes supprimunt, ac proinde aliorum protrudunt, ad mammas nempe si mulier peperit, & attractrix mammarum facultas non proflus languat: quædam vero excitant & augment attractricem atque concoctricem mammarum facultatem, quam ob causam copiosus sanguis ad mammas perferitur, & in lac convertitur; ut Lactuca, Brasica, & Vincapervina, quæ proprietate substantiæ hæc præstare potius dixerim, quam manifestæ qualitate. Neque enim omnes terree facultates, ut hæcenus multi opinati sunt, ducere possunt ad primas atque secundas, tanquam ad causas. Quædam enim Herbaræ attractricem renum testiumque facultatem augent, per quam urina copiosa profluit & venis, femineque copiosum generatur, quæ peculiari quadam, ut

sic dixerim id faciunt proprietate; unde eam ad quartas potius, quam ad tertias facultates reducere censet. Quare ut concludamus, quæ lac gignunt, alia suppediant materiam, hoc est, sanguinem; alia excitant attractricem concoctricemque facultatem mammarum, ut quæ recentissimum & hæc proprie lac gignentia dicuntur. Eadem laetis extendendi, aut imminuendi est ratio. Evenit enim ut lac extingatur (præter alias manifestas causas) etiam propter Plantarum virtutem aliamquam, quæ attractricem mammarum facultatem consopit. Imminuitur lac à paucis sanguine: huc facit, quæ valide ficerant, aut pauci feni nutrimenti, item quæ menses provocant largius quam debent. Nec alio etiam modo semen augetur, aut extinguitur. Copiosum enim semen ex copioso sanguine gignitur, adjuvante attractrice & concoctrice testium facultate. Semen enim augeat, tum quæ boni fucci fundi, multumque nutriunt (sive calida sint mediocriter, five parum frigida) & magis pingui substantia, quæ lac generant; tum quæ excitant aut augment testium facultates peculiari natura. Non est necesse, quod hæcenus magna pars Litterarum putarunt, fluctuata esse quæ semen augent, propterea quod feminis substantia sit spiritibus plena. Etenim gignuntur spiritus, qui insunt femini, non à flatibus, sed à sanguine repleto vitalibus naturalibusque spiritibus, qui per vasa, venas scilicet & arterias preparantes (mixtus spiritus) appellat Aristoteles, hoc est, *diffusio venales* ad testes deducitur, & a testium innato calore atque spiritu elaboratur. Prostat si calorem secum habeant insignem. Ex pultriciem testium & vasorum affluentium penitus quæ facultatem proritant acris & falsa, femineque reddunt fecundius, quod superfluis hujus humiditatis exsiccent. Ideo salem pecoribus obijciunt pastores. Ad coitum namque proniora & magis etiam fecunda redduntur teste Plutarcho Quæst. nat. iii, symp. iv, quæst. x, qui & canes lassitate celerius concipere ait: & naves, quibus sal vehitur, plures alere mures, quod frequenter coeant. Dolor cum variis de causis oriatur varia habet præfidia. Proprie tamen dolorem sedare dicuntur, quæ permanente causa dolorem levant, quæ idcirco paregorica & anodyna Græci dicuntur. Talia sunt quæ in tenui effentia consistente blando calore nostrum fovent, eique quadam familiaritate adblandiunt, causamque doloris mitigant vel molliendo, laxandoque ac digere-
do, ut Althæa, Malva, oleumque maturum: vel discutendo mediocri calore, ut Cæneugria.

Semen augentia
de ex-
tinguentia.

An quæ
semen augent,
habent ipsæ
substantia
gignit.

Atrolym.

Evacuantes
proprietate
copiosa.

Purgantia.

Narcotica.

Carnem gene-
rantia.

Glutinantia
vulnera.

quæ hæc virtute donantur. Multæ vero recentia vulnera glutinare possunt: imo ausim credere ex tribus plantis unam semper hæc vi polleere. Quippe cum montes Pisanos atque Bononienses peragrarem habitu rustico, ne agricola me cognoscere-
rent, ac latrones deprædarentur, multa de Plantarum viribus colonos sedulo percunctatus (quorum quæ nova erant incognita hæcenus Herbariis, & à pluribus confirmata, in librum observationum redegeram, quem in posteritatis commodum publicare decreveram, nisi quidam mihi eum nocte in itinere abstulisset) deprehendi tertiam & amplius Plantarum partem, quarum vires adhuc incognitas scripseram ex rusticorum relatu (erant autem plures quadringentis) ad recentia vulnera valere. Nec deest ratio: siquidem ex Plantæ, quæ in montibus nascuntur, magna ex parte ficerant & adstringunt. Ea autem quæ fluitant crassius partium esse debent simulque ficare, & adstringere in secundo gradu, five calida sint, five frigida. Glutinantia eadem essent cum cicatricem inducentibus, ni major in his ficeritas & adstrictio requireretur. Voco autem cicatricem inducentia, quæ carnis genitæ superficiem indurant, ac in callum vertunt, cutique quam simillimam reddunt. Hæc fere sunt terree facultates medicamentorum, inter quæ & alia recentiores possunt, quemadmodum quæ ad ornatum spectare videntur, quarum pleræque à secundis dependent, ut quæ detergendo, pilos, faciem, cicatricem, dentemque dealbant, & quæ erodendo pilos extripiunt. Alia vero quæ occulta proprietate operantur ad quartas reducenda sunt.

C A P. V.

De oculis Plantarum qualitate, seu proprietate.

DE oculis nunc dicamus qualitatibus, quæ à tota substantia dimanant. Oculatæ dicuntur, quod eam esse cunctum ratio à manifestis elementorum qualitatibus deduci non potest. Hæc admiramur, ac pro secretis occultisque proprietatibus habemus, cum nequitiam harum causarum nobis summo etiam studio & diligenter perquisitæ innotescant. Quæ per hæc agunt Plantæ, earum alia evacuant, alia alterant. Evacuant rursus alia per se, alia per accidens è toto corpore aut aliqua ejus parte peculiari quiddam, sive id humor fit biliosus, melancholicus, pituitosus, serosusve: five res quedam præter naturam, veluti spiculum, ut telum corpori infixum, ut radix Arundinis & Aristolochia rotunda. Quæ è toto fere corpore evacuant humores, purgare dicuntur. Purgant alia per vomitum, ut Helleborus albus & Afarum: alia per alvi dejectionem, ut Helleborus niger, Scammonium, Rhabarbarum. Evacuant per se ex peculiari aliqua parte, veluti ex cerebro, per os, ut quæ ad apoplethicos; aut per nares ut quæ ad errina medicamenta præscribuntur. Epithymum Atticum atrabilem humorem è ventriculo purgare Galenus lib. de Theriaca ad Pisonem tradidit. Aristolochia atque Cyclaminis radix ex utero per cervicem supravacuum humorem educit. Quæ vero per accidens evacuant, id præstant quia attractricem partium quarundam facultatem augent, ut nonnulla diuretica, renum;

& quædam quæ lac generant, mammarum; & semen augmentia, testium. Alterant oculatæ proprietate, quæ nos repente interimunt, aut parti alicui tota substantia noxam aliquam gravem cito adferunt: quia vi pollent venena cuncta propemodum quæ contrariantur alexipharmaca & antidota. Venenorum nullum toti nocet corpori, sed tantum partibus, aut uni, aut pluribus; quippe humanum corpus ex contrariis diversisque tum temperamento, tum tota substantia constitit partibus. Quod autem præsentaneam adfert mortem, principem aliquam partem illico invadit, ac opprimit, veluti ex lignis mox assumpto veneno apparentibus diligens observator animadvertet. Cerebrum & nervos petunt Opium, Mandragora, Stramonium, Solanum manicum, Papaver corniculatum, & pleræque alia, quæ convulsione flutillant. Thapsia partibus spiritibusque ac naturalibus, tam fixis applicitur, quam fixis sumatur vim inferit. Nam Thapsia si Plinio credimus fodiendibus nocet. Si minima aspirat aura, tumescunt corpora, faciemque invadunt igoes facies, ob id cerato prius illinunt. Fungorum genera stragulat interitum inducunt, quod spiritus vitales cordis opprimant. Argumento est cordis palpitatio, atque etiam animi deliquium quod sequitur, quando quis à putridis, & venenatis quosdam Fungos odoratus fuerit. Contraria venenis resistentia, quæ ob causam alexipharmaca dicuntur. Pharmacum namque nomen læpæ Latinis Græcique scriptoribus pro veneno accepit. Ex his quædam intus sumpta venena (quæ non modo Plantæ sed metalla, animaliaque esse possunt) totius substantiæ diffidio obtrudunt, & immutant; ut semen Citri mali, Melissa, Ruta capraria, quæ etiam pestilentes morbos depellunt, & alta quadam putredine oppressos spiritus vitales recreant, quædam vero exterius venenis resistent, ut gladio insilicis, aut à aliquo venenato animali illatis, ut Malva crabronum velparumque, nec non Phalangii ictus sanat; Alyssum & Pimpinella rabidi canis morsus. Inter Alexipharmaca & venena media quodammodo sunt, quæ eadem substantiæ proprietate, aut oculatæ virtute certis tantum partibus humani corporis, noxamentum aut dampnum afferant, aut commodum & utilitatem; verbi gratia, Salvia & Betonica cerebro sunt magis dicant, quam aliis partibus; Buglossum & Melissophyllum cordi; Agrimonia jecori; Asplenium lienii; Absinthium stomacho. Vnde & Plantæ, & scuti & alia quævis medicamenta, quæ aut ab animalibus, aut à fossilibus sumuntur, à jecore quod juvant hepaticæ dicuntur; à cerebro, aut capite, cephalicæ; à splene, splenicæ; à corde, cardiacæ; ab oculis, ophthalmicæ; à dentibus, odonticæ; ab articulis, arthriticæ; & sic deinceps à cæteris partibus. Cæterum de hac vi Plantarum certis membris diffinita, aliqua ratio à partium quas petit constitutionibus & temperamento dari potest: ideoque nonnulli ad tertias manifestas facultates hæc referre voluerunt. Verum obscura proflus & imbecilliss est hæc ratio, quæ non omnino potest curiosus animus quiescere.

Alterantia.

Venena.

Thapsia.

Fungi.

Alexipharmaca.

C A P. V I.

De modo facultates Plantarum indagandi.

Do sunt que nos in harum virtutum dignotionem deducunt; scilicet usus seu experientia, & ratio. Sed ratio difficilis est; experientia periculosa. Saepe multa perferat ratio, quæ uis redarguit; multaque uis aduenit, quæ neutrum ratio inuestigare potuit. Ad exactam tamen facultatem indagatorem utroque opus est. Occultarum autem facultatum, & quoque subtilitatis agere dicuntur, experientia inuentrix est ac iudicatrix: reliquarum autem, quæ a tribus manifestis qualitatibus dependunt, ratio ipsa, quæ defumitur a laboribus & odoribus, qui cuiusque Stripium infunt. His junioribus addere figuras, ex quibus cuiusque Plantæ facultatem, non modo manifestum, sed etiam occultam cognosci afferantur, quæ de causa libris Phytognomonicon scriptis insignes præ aliis lib. Bap. Pto. Neapolitanis, quibus docentur facultates Stripium, a forma externæ contemplatione; uerbi gratia, a Spherularum mederi Crophulis, quia radices profundæ quibus adherent radicales rotundæ: quasi pilulæ, quæ crophulus in collo navescentes imitari videntur; ac Heliotropium minus ad morfus scorpionis valere, quia in fummo Herbæ flos nascitur, in modum scorpionis fere incuruante. Verum quam frivola atque futilis fit horum doctrina, facile is patet, qui rationes considerare ac inuestigare cupiunt. Qualitatem autem manifestarum nullus certior index est, quamapor; quod per contactum lingue fiat. Tactu autem Galenus in li. de temperamentis certissime temperamenta indicari demonstravit.

C A P. VII.

De Saporum Differentiis.

Cum totum saporem differentie, quot electiorum mentiorum missiones, singulis Plantis proprios fuos ineffe fapores dicendum est. Hos propter infinitum Stirpium numerum recensere non possumus propriis nominibus, nec aliter explicare, quam si summam faporum differentias cunctis Plantis communes declaramus. Sapores aut simpliciter sunt, aut compositi fuo misti. Simpliciter septem; autem, qui adtingens ab effectu ducti, quemadmodum & acerbis, acidus, ascer, falsus, amarus, dulcis; qui quidem omnes intentione declarabitur. Est autem auterius fapor, qui linguam & os mediciorum confringit, inde vellem inducens asperitatem. Hic in immaturis fructibus facile percipitur, nempe Prunis, Melspis, & reliquis, que quo magis ad maturitatem vergunt, eo minus asperitatis obtinent, vellemque asperitatis. Huic affinis est ascer, qui in magis pruri linguam & palatum coarctat, atque exasperans. Talis est in Malicis, Sumacho, Galla & Cypressi nucibus, atque aliis, que magis minufce acerbam confectam. Acidus autem fapor gultum peracetum & sua tenuitate ferit fine caloris mali. Tali item Oxalidis & Oxyphatuli. Acris vero, qui Græcis *ῥομευ* dicitur, palatum & linguam acri-

C A P. IX.

Quomodo saporēs manifestas qualitates indicem

VT recte Plantarum vires cognoscitur ex fa-
poribus, non modo faporum qualitate, quae
gustui se offertur consideranda veniunt, sed
materie quibus inhaerent singula. Quia ut qui-
lites gustabiles, id est, fapores, qualitatium pri-
marum, materiae indices sunt secundarum. Sim-
plices fapores simplices etiam facultates prima-
ri manifestant: nam pascivus tam activas: quatuor
caliditatem, acris nimirum, amarus, falsus, dulcis
proprie dicitur, auctori frigiditatem, acidus, acer-
bus, auferens, infidus; pinguis temperiem tem-
peratam. At vero miltis, miltis etiam facultate
denotant, quae aut sunt contrariarum qualitatum
nancia, ut in Glycyrrhizae & Polydori radicibus
denotant caliditatem auctorem autem & quod
acer sit, frigiditatem (idem in aceto est quod
acer sit) frigiditatem, aut quod quidem fere natura
ut dulcis & amarus, vel ut amarus & calidus
ut aliquis praedictorum calidum, indicant ca-
liditatem: sic auferens cum acido aut acerbis
misceatur, frigiditatem. Gradus ex istissem fapo-
ribus cognoscitur, propterea intensiores his aut remissio-
res fuerint. Propterea enim quod intensius est, aut ama-

Grades tem-
peramento-
rum ut co-
noscantur.

in rem Herbariam, Lib. II.

rum, aut calidius, aut alterius faporis, pro eo etiam erit aut calidius, aut frigidius. Verum facile ad hoc imprimis confertur, quod non omnes fapores calidos eundem gradum denotent, sed quidam intensius aut remissius linguam ab eis afficiant, ut hic intensius aut remissius pecto. Nam fapor dulcis propter dictus nunquam indicat excessum caloris, primi gradus, licet circò nonnulli tãtòtunc hunc temperantur. Quicquid vero acre est si linguam vehementer mordet, ut etiam urit vesiculaque excitet, quantum caliditatis ordinem attingit, ut Piper, Euphorbium, Sinapi, Lepidium, item que colligant, et putrescant, ut Thapfia, Chamadrea, quas ne quævis quidem propter summam acrimoniam possumus. Quod autem linguam modico fervore imbut, id secundum gradum calidum esse dicimus, quod vero vehementius id præstat tertio; quem admodum etiam quod parum linguam urit, paucaque acrimonia stimulat, primo ordine calidum esse censendum est. Amaritudo autem atque falso secundum caliditatis gradum ad summum arguit, amaraque & falsa omnia que nulli alteri fapori conjunguntur, sine vehementi calore operantur. Nam talis que Chymici nostri ex quacunque re eliciunt, præterquam quod arte paratur etiam acrimoniae particeps est, ut cinis: unde fit, ut hic impense calefaciat, & pro cauteries usurpetur. Acida autem cuncta secundum frigiditatis gradum haud superant, quamquam sint mutante acida. Nam aciditas sine modico calore, aut fumante acido in frigidum, aut mutato eis frigido in calidum fieri non potest. Vinum enim hic calore suo depulso urit acetum fit, fructusque maturi pluri acetum accipiunt, mox à calore femicocci acidi redduntur, et dulces sunt ubi plus caloris acquirunt. Probatur etiam ex acidis rutiibus, qui non sunt à ventriculo bene cito consequente, aut nihil profuturò alterant, sed tantum ab imbecillius concipiuntur.

X. *Acidum non*
fit sine modi-
co calore.

Insipida pos-
sunt esse fri-
gida in tertio
gradu.

Narcotica frigida non sunt in quarto gradu.

Opus viii.

S 2

amarum grati odoris esse quodammodo primarium omniaque fere odorata amara esse: ita amarum calidum huiusmodi esse probatum est. Quam obrem cuncta odorata calida siccaque esse oportet. Sed quid de Rosis, violis ac ceteris dicemus, quorum flores suavem iucundumque cum exhalarent odorem nihilominus frigida censentur? Respondere partes esse in florum etiam foliis diversas, calidas scilicet ac frigidas; plures vero frigidas, atque hac ratione flores hos frigidos censeri: calidas vero partes exhalare propter earum tenuitatem, quae sunt in superficie foliorum, hoc est proxima acri. Huius rei argumentum est, quod isti flores triti nullum odorem spirant. Permiscetur enim plurimae partes crassae ac frigidae cum calidis ac tenuibus in contritione; et has partes calidas ac tenues paucas esse docet nos suavis atque exilis florum odor. Verum pleraque odorata in Stirpium genere partes calidas ac ficcas aut intus tantum obtinent, ut ea quae non nisi trita odoratum feriant: nam exterius terrena crassa ac frigida velintur efflentia, quae exhalationem odoris partium internarum prohibet. aut per totam Plantam, aut aliquam ejus partem, hoc est tam intus quam foris, ut omnia quae trita, & non trita odorem reddunt. Atque hac de odoratorum temperaments dicta sint. Quam autem qualitatem fecit: tunc monstrat stirpes, non satis ab antiquis ac recentioribus declaratum est. Videtur autem fector non a calore & siccitate generari, ut odor proprie dictus. Nam multa foetida frigida sunt, ut Cicuta, Hyoscyamus, quamquam plura calida: invenio praeterea apud Aniltolelem in problematicis Sect. XIII. multa odore malo praedita veluti excrementa animalium a cruditate provenire, quae fit a caloris naturalis inopia: existimo tamen fecorem cum fit odoris species, a calido similitur & sicco dependere. Foetida namque nobis sunt, quae ceteris animalibus multis odorata, & contra odorata quae multis foetida. Etenim Scarabaeos pilularios, quos Graeci *κατὰ φύσιν* vocant, odore Rosae exanimari apud veterum plurimos scriptores satis constat. Fector vero in Plantis frigidis, in alia parte praeterquam frigida consistit. Foetida autem intus concocta esse fallimur. Nam Spargula foetida, Cicuta, Hyoscyamus non minus cocta sunt a suo naturali calore, quam Cinnamonum & Nux myrica. Verum quia ex illis non spirat odor nostrae naturae familiaris & amica, ex his vero jucunda, idcirco illa nobis foetere, haec vero olere videntur. Sed cujusnam erunt temperamenti, quae putridum odorem edunt, qui species esse foetidi videtur? Hunc a nimio humore & caloris vi extinctionione generari, indicio sunt fructus & Herbae praefatae, quae motum humoris in se continent, quare frigida humidique putrida censeri debent. Respondere nos hic de naturali cujusque Plantae odore & temperamento agere, non de eo, qui est praeter naturam. Nunc ex odoribus vires proficquamur.

C A P. XII.

Odorum virtutes.

Alimenti ac sanitatis gratia nobis jucundus ac bonos odores natura suppeditavit. Quaecum-

que enim nobis bene olere videntur, ea aut cedunt in nutrimentum, aut medicamentum; male vero olentia tantum in medicamentum. nullum namque foetidum gustare audeamus. Conjunxit rerum opifex bonos sapores cum bonis odoribus in his Plantis, quae in cibum cedunt, quaeque aliquem odorem spirant, non tamen cum bonis odoribus bonos sapores. Multa enim odorata amara sunt. Quae in medicamentum cedunt, tantum spiritus cordis ac cerebri recreant atque reficiunt: quae vero in alimentum, & solidas partes & spiritus. Recte Sophocles in fabula Cretenses dicta, Venerem Deam, quia voluptas significatur, unguento perlesum fingit, & in speculo se aspicientem: Paladum vero, quae mens est, prudentia, virtutemque, oleo perungi & exerceri: inuens fens in capite positos odoribus demulceri. Quod etiam Alexius dixit apud Athenaeum lib. xv Deipnosoph. τῶν αἰσθητῶν μὲν οὐδὲν ἔστιν ὡς φάρμακον χρεώδης τῶν αἰσθητῶν, μάταια, inquit, sanitatis pars est, odores cerebri bonos facere. Apud veteres quoque in usum fuit pectus suavit olente unguento iungi, quod in pectore cor lateat, effectumque spiritus levitate odoris reficiscuntur. Sane in odore rei plane divina, si perficimus credamus ceremonias. Deos enim odoribus placare studebant, atque eosdem a calo evocare, & nostris temporibus prae ca consuetudine in sacris domibus fuisse sunt. Conspiciunt enim & languidam mentem excitant. Fector vero omnis ut cerebro non recte mentemque perturbat, ita cordis spiritus laedit, animumque prosternt. Peculiaris vis foetidis ad uteri suffocationes in naribus adhibeantur; odoratis, si infernis partibus applicentur.

C A P. XIII.

Occularum facultatum dignotionem fieri per experientiam, & quomodo hac fiat.

Nullus sapor aut odor nobis manifestat occultas proprietates, sed solus usus & experientia quae facta est in pluribus ob unum aut alterum effectum fortuito semel aut bis observatum. Nuper cum ruscus acetarium suae pararet familiae, flores Thlaspi umbelliferi, quod Creticum vocant, plures miscuit cum Lactuca et aliis Herbis ex quibus acetarium parabat. Nocturni omnes qui comederant, morfu circa ventriculi orificium correpti sunt, plures vomebant; omnes nonnulli infonnem traduxerunt, putabantque se venenum hausisse. Hinc suspicor, aut vomitum hoc Thlaspi genus excitare, aut deleteriam aliquam habere facultatem, quae facto semel atque iterum in aliis experimento innotescit. Multae enim ejusdem rei memoriae, unius experientiae vim efficiunt dicebat Aristoteles lib. i Metaph. Ita investigatur proprietates occultae: manifesta autem qualitas tum ratione, tum etiam experientia, quae tamen aliqua indiget methodo, ut recte fiat, aliqui maxime fallit rationem. Observandum morbus, causa morbi, & symptoma, tum aegri natura tam communis, quae temperamento refpicit, quam propria, quae idiopathia latentes. Etiam anni constitutio animadvertenda, regio, & aliae indicationes quae Galenus recensuit. Per morbum intellego non 246-tem seu essentiam, sed morbi tempora; hoc est principium, augmentum, statum, & declinationem.

Nuper

Nuper quidam quartanarius cum veris tempore, una aut altera hora antequam quartana corripi solitus erat, Lactucae comedit et Braccia, nec febris unquam postea rediret, putavit se a Lactucae & Braccia sanatum. Verum haec febris concocta paulatim materia veris tempore tanquam critico sponte solvit. Itaque imprudenter aliis duobus quartana laborantibus consulit, ut eandem coenam fumerent, quibus multo gravius ab hoc assumpto cibo facta est accessio, alterique duplex quartana supervenit. Sic alius inflammatione circa talum laborans, quae jam erat in declinatione, Sempervivum adhibuit, solvebatur morbus. Ideo quae putavit cunctis inflammationibus recte adhiberi posse. Quare cum alteri in brachio inflammatione laboranti cataplasma ex Sempervivo applicuisset, gangraenam induxit. Inest etiam singulis hominibus peculiaris natura, cujus manifestae causae latent, quae diligenter etiam venit observanda. Rosae odorem, quo plerique mortalium recreari solent, non potuit fuisse Oliverius Caraffa Cardinalis. Patri meo Fabis laxabatur alvus, quae tamen ceteris eam duram reddunt. Vidi quendam Alces magna frustra devorasse sine noxa, sine purgatione ulla, aut minima alvi lubricatione. Debet igitur unius ejusdemque rei observatio fieri in pluribus quae experta censetur. Haec non potest ab idiotis atque plebeis hominibus (qui multa se interdum expertes fuisse jactant) recte cognosci, utpote qui simile atque diversum sapere intuantur; sed tantum a Medicis artis peritissimis, qui haec quae propolui, cuncta animadvertunt acri quodam ac summa diligentia, ut idem a diverso distinguant.

C A P. XIV.

De alimentis. Nullam Plantam non esse medicamentum.

Transcamus ad alimentorum potentiam: de qua nobis primum dicendum fuisse, quod magis alimenta nobis, quam medicamenta sint necessaria (nam alimenta, neque in secunda, neque in adversa valetudine carere possumus, medicamentis vero multo valemus); nisi medicamentorum multa essent quae nil nutriunt, alimentorum vero nulla, quae non alterant. Quod multis rationibus monstrari potest, sed ea potissimum, quod nulla reperitur Planta, multique Plantae pars, quae ex omnibus qualitatibus elementorum aequaliter mistis constituitur. Nullum enim mistum in rerum natura tam exacte medio temperamento quod consenser reperiri ajunt Philosophi, sed id tantum esse mente contemplabile, quomadmmodum etiam quod proprie alimentum vocamus. Etenim quae mediis temperamenti, ut a Galeo lib. i de Alim. cap. i, docemur, nullaque vincuntur qualitate sunt praedita, ea solum sunt alimenta, non etiam medicamenta. Haec ratio est, quod qui bene valet, uno eodemque cibo fensuritur, tandem in morbos incidit, citius alii, alii tardius, prout minor aut major est cibi intemperies. Itaque inventi sunt vari, diversique cibos condiendi ac praeparandi modi, ut scilicet intemperies corrigi possit. Nec deest causa cur nullum alimentum sine aliqua exuperante elemen-

torum qualitate natura nobis comparaverit. Humanum enim corpus nullum est, quod plane modis fit temperamenti; sed semper aut calidius est, aut frigidius, aut humidius, aut siccus; idque vel ab ortu, vel ab etatum, locorum acrie commutatione. Quare necesse erat toti temperamento commutationibus obnoxium genus humanum, intertemperatis nutriti alimentis, si quom fieri potest diutissime permanere in hac vita deberet. Intemperata enim naturae modico contrariorum gaudent usu.

C A P. XV.

Alimentorum differentiae.

In sunt igitur duae Plantis non alentibus facultates, una nutritiis proprie & simpliciter dicta; alia alterans, de qua jam egimus satis copiose. Quibus inest facultas nutriens, alimenta appellantur, quorum differentiae facile patebunt, ubi prius quae ratione ac serie cuncta, quae a nobis assumuntur pro nutrimento, alterentur commutenturque, ut tandem assimilentur, breviter declaravero. Alimenta aut liquida sunt cum assumuntur per os, aut solida: illa leviter in ore egent preparatione aut nulla, ideoque statim nulla facta in ore mora per stomachum labuntur; haec vero praeparari mutatione debent. Ea fit praecipue pro proprium oris calorem & salivam quae ex stomacho, alique ori vicinis partibus suppediatur, seque cum cibo permiscit, ut liquidior evadat, facilius deglutatur, temperem quandam cum ventriculo ineat familiarem atque amicam, substantiamque chylo ventriculi similem fere efficit, quae a ventriculo facillime in chylum convertatur. Ventriculi liquidum officium est, cibum per os ingestum in chylum commutare. Hic postea chylus, hoc est tenuior alimentorum succus, cremori hordei similis factus, per venas melaericas, relictiis crassis excrementis in intestinis quae per alvum deturbantur, in jecur delatus, in sanguinem convertitur, deinde per venam cavam in universum corpus distribuitur, singulis particulis idoneum suppediatur alimentum proprie dictum, ubi ab his assimilatur atque agglutinatur. Ceterum qui de alimentorum scribere facultatibus, aliter fumentes nomen alimentum, non id tantum alimentum vocantur, quod jam nutrit; sed quod nutrire nos potest, hoc est quod cunctas quae diximus mutationes subire debet, antequam substantiam naturae nostrae familiarem, deperitaeque similem praebet. Haec ratio, & Planta aut tota, aut aliqua earum partes alimenta censentur. Horum multae sunt differentiae, sumptae partim a natura, partim ab ea, quae cum hac conjungitur, alterandi facultate. Nutriunt alia cito, alia tarde, alia multum, alia parum, alia bene, alia male. Sunt & quae medicioriter haec cuncta praestent, quorum natura ac vis media est inter haec duo extrema. Quae vero ori ingrata aut grata, facile aut difficulter corrumuntur, & excrementur, aut aliud quid simile praestant, propter alterantem & medicamentosam, quam continent facultatem, haec operantur: si quidem ori grata sunt propter saporem, quem nos suavem, Graeci *ἡδονή* nuncupare consueverunt, si est fit dulcis, ut in Amygdalis, five cum eo permixta aciditas,

Rosa cur trita nullum odorem spirant.

rem fiores.

Ferida quoque temperamento demota.

Substantia quae temperemque possident.

Odore in quoque cerebri.

Pectus in quoque cerebri.

Thlaspi creticum, quod flos quid dicitur.

Thlaspi creticum, quod flos quid dicitur.

Alimenta ac flos quomodo in corpore alterantur.

Alimenti namque quid dicitur.

Alimentorum differentiae.

aciditas, ut in malis quibusdam atque aliis fructibus. Similiter ori ingrata sunt, quæ hanc suavem habent saporem, sive fit salis, sive amaris, sive aulterus, qui prædominatur cæteris saporibus. Omnes autem alterare ex multis rationibus colligere quique potest, quas cum de medicamentorum per rationem investigandi facultate ageremus, sæpe recensimus. Ventriculo quæ jucunda sunt aut noxia, privato quoque id præstant temperamento, quod aut amicitiam conciliat, aut odium. Alimenta autem facile, aut difficilius in putredinem verti, ac per alvum externi, ab intemperie proveniunt. Quæ enim facile putrescunt ac corruptuntur, humida sunt cuncta, ut Cucurbitæ, Persicæ, & bona pars figurum fructuum, sicca vero difficilius. Sic quoque facile aut difficilius per alvum transiunt ob nimiam humiditatem, aut siccitatem. Quæ enim adstringunt, tarde: quæ laxant aut absurgunt, cito permeant, ut Ficus. Porro illud curiosius, non tamen sine fructu indagandum: an quæ male nos nutriunt, hoc est, primum suppediant succum, καὶ ὅτι Græci vocant: alimenta dici debeant? Si enim quod bonum est nobis, nostræque nature familiarem & gratum succum suppediat, alimentum appellandum est, ut videtur; erit quod primum & malum suggerit humorem, neutiquam appellandum alimentum, sed potius medicamentum, quod pravi tas hæc dependet ab intemperie. Respondeo alimentum dupliciter à scriptoribus accipi: simpliciter pro eo quod nobis bonum succum præbere potest: vel cum additione vocis primum, non pro eo quod nil nos nutrire potest, sed quod præter exiguum bonum succum multum pravi in se continet humoris, qui una cum bono per venas in universum corpus distribuitur; præsertim quando partem corporis ex aliqua inedia exinanite nutrimentum tam valida vi & tam celeriter attrahunt, ut nequeat natura partes nutrimenti noxias fecerere ab innoxias, ac per loca consuetæ à corpore deturbare. Pravi fucci appellari solent melancholici, biliosi, putridi: crudi vero & frigidi, pituitosi. Sequitur, ut qui prædicæ alimentorum differentia in Plantis atque aliis nec nutrimentis conjugantur commiscanturque, nunc indicemus. Quæ cito nutriunt, ea parum præbent alimenti: non tamen quæ tarde ea multum, sed quæ multum ea tarde. Haud enim verum est, cuncta ea quæ tarde nutriunt, multum nos nutrire; nec quæ parum, cito; sed quædam. Triticum multum nutrit, & tarde: nam tarde à ventriculo concoquitur. Quæ autem boni pravi sunt fucci, quædam cito, quædam tarde alunt. Sed boni fucci cuncta & multum & parum alere possunt; pravi vero neutiquam, sed parum tantum ea utile necesse est, atque aut cito, ut Persicæ, aut tarde, ut Lentæ. Eorum autem quæ mediocriter, hæc cuncta præstant, quædam mediocriter & nutriunt, & in corpore antequam nutriant, mediocri temporis spacio commorantur, five mediocriter pravi fucci sint participes, five profus eo careant. Sunt quæ mediocriter alunt, & aut tarde, aut cito: quæ vero mediocrem in corpore moram trahunt, antequam assumentur partibus, alia cito, alia tarde nutriunt, venasque corporis pervadunt. Vario etiam modo conjunguntur cum his facultates, quæ

dependent ab intemperie, & præsertim ex quarum mentionem fecimus, quæ cunctis alimentis inesse solent. Eorum quæ ori grata sunt, quædam facile, nonnulla difficilius concoquantur, aut corruptuntur aut descendunt, & cito aut tarde, parum aut multum alunt. Quæ cito & facile concoquantur, cito & facile etiam alunt, & contra quæ tarde ac difficilius. Sic & quæ cito in ventriculo concoquantur, cito etiam descendunt, & per intestina dilabuntur. Id quod etiam videtur affirmasse Hippocrates dum inquit lib. 11. Aph. xviii. Eorum quæ conspiciunt, & celeriter nutriunt celeres sunt excretiones. Nam loquitor non tantum de secunda & tertia concoctione, sed etiam de prima.

C A P. XVI.

Alimentorum inventrices, ratio & experientia.

Sunt sicuti medicamentorum, ita & alimentorum inventrices, ratio & experientia. Fallax tamen & multo minus certa in his est ratio, quæ à sapore, & odore desumitur, quam in medicamentis, si solam specietis nutrimentem facultatem. Exant apud Galenum lib. 1. de alim. Dioclis verba, sola experientia alimentorum facultates nobis cognitas esse arbitrantur, non ex indicationibus, quæ à temperamento & à saporibus sumuntur. Cæterum si Diocles nutrimentem potentiam in alimentis tantum considerasset, haud profus à veritate aberrasset. Nam à multis Sapiens probatum aberrasset. Prava & difficilis concoctio alimentum substantie præstante proprietate, quæ sola experientia indicatur. Ajunt tamen dulcia cuncta nos nutrire. Id si ita est, indicabit etiam sapor vim nutriendi, non tantum alterandi. Per dulcia autem nonnulli intelligunt cuncta, quæ gustui placent, indeque putant ductum proverbum, Quod bene sapit, bene nutrit: ergo præter illa etiam dulcia præparata dicta. Sine his enim nil palato aridet. Salia, acrida, amara, & si quæ sunt alio sapore prædita, qui alimentis inesse potest, si modum excedat, ori alimentis redduntur, & quod in ipsis dulce est, destrunt, aut præpediunt ne nutriat. Quare censendum est, non modo dulcia esse omnia, quæ nos nutriunt, sed & alimenta cuncta dulcia. Existimaverit autem aliquis falsam hanc esse universalem propositionem, propterea quod inter medicamenta nonnulla sunt, quæ nil nutriunt, dulcia. Hic facie condecernendum est, id non ob aliam causam contingere, quam ob partium diversitatem. Infunt enim, & illis partes, quæ nos nutriunt, & alia quæ medicamentorum continent potentiam; quæ quia in his insignis est, impedit in illis nutrimentem facultatem, ut nil operetur in nobis. Hujus rei manifesta sumatur demonstratio ab exemplis. Ari radix cruda, neque mandi potest, neque nutrire, propter ejus summam acrimoniam, cocta vero præbet alimentum. Huic necesse est adjungam memorabilem naturam ejus Plantæ, quam Huiccam vocant Indi occidentales, quamque fide digni ac multi scriptores, qui eas terras peragraverunt, & viderunt & scripserunt. Folium huic Herba Canabis, vel ut aliis placet Sambuci, radix humani femoris crassitudine. Hanc traudunt redigi in pulcem cotium attritu, deinde ex ea per calum

lum extrahi succum valde lethalem, nulloque invento ad hoc adhuc remedio: reliquum vero radicis exponi foli, ut exsicceat; mox siccatum in farinam molli, quæ aqua subacta in panes formetur, Caffavi ab ipsis appellatos: fervari hoser, duos annos ad usum familiarem sine noxa. Ex quibus patet non mirum esse quod refert Theophrastus, nonnullas radices dulces venenosas esse, tum etiam quod narrat alii scriptores, nonnullos venenosos educatos ac nutritos. Nutriebant enim non veneno, sed venenato, cujus partes nutritivæ alimentum corpori subministrant, ubi proprietate naturæ: venena nil operantur in quibusdam, aut ubi antequam assumantur ab omni venenosa qualitate purgantur. Nec defunt in rerum natura Herba, quibus totis innoxie vescimur, cum tamen earum succus cum vitæ periculo assumatur. Alii fucus potus hominem non modo turbat, sed etiam interficit, & Capæ si largius potetur, ob insignem caliditatem, & acrimoniam mentem turbat, & stomacho mirum in modum nocet. Igitur nutriendi vis in Stipribus innotescit ex sapore dulci, & quæ supra ponebamus modici caloris esse indicem. At quantum quodque alimentum nutriat, & an cunctum, aut velociter, ex substantiæ consistentia clarum evadit. Tenuis namque haud tam multum quam crassa & viscida nutrit, neque tam tarde, quoniam permeat facilius ac velociter per venas ad ultimas corporis partes. Quod vero pertinet ad alterandi facultatem, quæ alimentis inest, eam ex his indicibus explorabimus, quæ supra recensimus. Prava & difficilis concoctio alimentum ab effectu depræhenduntur. Qui enim prava capiunt alimenta, his nidolentius aut aliis gravis ructus accidit, aliis mordicatio: nonnulli utrumque: quibusdam flatibus distenditur venter, & flatus per os excluditur, aut instat plumbi aut lapidis, aut luti ipsorum ventri incumbere videtur, qui & durus etiam est, acensus, & quasi inflatus. Cæterum hi effectus multas ob causas accidere possunt: ob intemperiem alimenti, & partis in qua fit concoctio, nempe ventriculi: & ob lentorem atque crassitiam substantiæ, ob naturalem quandam proprietatem idiosyncrasiam Græcis appellatam. Quippe quæ valde frigida sunt, lenta & crassa, calorem stomachi imminuunt, extinguuntque; hinc agere descendunt, difficillimeque concoquantur. Nimis calida nimium etiam calorem augent, quod fit, ut prave concoquantur. Proprietates quibusque ventriculi spectanda: quin etiam, ac à communi deficiat. Inventi enim sunt, qui facilius ac celerius Faba Lentisque, quam ova concoquant. Quidam propter praves humores, quos in ventriculo coacerant, aut alium ob effectum præter naturam, quæ facili sunt coctis aut digestionis, prave & difficilius concoxerunt. Idcirco qui notitiam facultatum omnium, quæ alimentis inest appetit veli, cum diligenti experientia niti oportet in tali corpore dicta, quale est id quod maxime sanum existit, prænotis prius saporum odorumque naturis, qui Plantis maxime inveniunt, tum consistentia, quæ aut levis, aut friabilis, aut crassa, aut tenuis, laxa, aut lentia, gravitate efficitur. Hæc enim omnia, ut docet Galenus lib. 1. de alim. ad ipsarum inventionem adeo conferunt, ut cum in peregrinam re-

gionem perveneritis, si quid esculentum nunquam vobis conspecti occurrerit, permultas fritis occasionibus atque adjuncta ad ejus facultatem cognoscendam habuitur.

C A P. XVII.

Exacta hujus Philosophiæ notitia quæ acquirenda. Auctores veteres, & recentiores, qui de ea scripserunt.

His præcognitis, qui totum se huic Philosophiæ tradere cupit, & ad exactam ejus, quantum fieri potest, cognitionem devenire, cum veterum & recentiorum lectioni, qui ex professo quippiam ad rem Herbariam spectans edidit, aut ea de re obiter quippiam in suos commentarios retulere, diligenter incumbere oportet. Ad ea imprimis veteres Græcos atque Latinos, Theophrastum, Dioscoridem, Plinium, Galenum, Apuleium, Aeginetam, Oribasium, Emiliun Macrum, atque etiam Arabes, Avicennam, Serapionem, Mesuem, Rhafem. Libri Theophrasti (qui discipulus fuit Aristoteli) de Historia Plantarum novem, cum decimi principio; & sex alii de causis earundem, Græce admodum leguntur mutili ac depravati injuria temporum. Idcirco lectori indefesso indigent, & in Græca lingua non mediocriter exercitatio. Hæc Latio donavit Theodorus Gaza Theophrasti, eo tempore, quo jam Græci austeris negligebamus. Is homo multis præditi literis, reique Medicæ, atque utriusque linguæ peritissimus fuit. Quia autem in multa depravata incidit loca, dum hos verbos Latinos fecerat, quædam omittit in versione, nonnulla ea, quæ sibi videbantur optima, conjectura restituere coactus fuit. Et quoniam non de verbo ad verbum transverberare, sed mentem Philosophi exprimere summa eloquentia studuit, sæpe aliud quam autor, tradidit: aliquoties usque adeo Latine linguæ studiofus & amator fuit, ut matrem linguam ei postposuisset. Etenim Latinam novis vocibus, & plurimum non necessariis, ad Græcarum vocum imitationem augere semper studuit: veteri gratia, ἰατρικὸν Agitatorum veritatem cum Plinio & alii Græco utantur nomine. Interdum quoque variat in vocum versione: ἄσπερον Albuscum reddit atque etiam ἄσπερον, cum diversæ sint Herbae. Sic ἰατρικὸν plerumque Abietem, aliquando Pinum interpretatur: & πινος Abietem, Laricem, sive Picam. Solani quocunque fit genus appellat Vescicarias, cum maxime inter se differant. κίσπη perperam cum Plinio interpretatur Gladiolum. Et plura alia diligens lector notare poterit, qui propterea parum huic interpreti fidat sine Græco codice. Sensus ejus quoque interdum cum Theophrasto non convenit, quod hanc scientiam haud satis intelligeret, quæ ante cum per multa secula, ejusque tempore jacuit. In Historiam Theophrasti aliquid in posteritatis commoda molimur. In libros de causis Lulii Casar Scaliger inter doctissimos doctissimus nostro seculo commentatus est, qui Græce lingue atque Latine peritioris fuit. Mentem Theophrasti optime explanavit, loca pauciora multa feliciter restituit, & sæpe pauciora melius quam Gaza interpretatur, quæ fæpe at-

Alimenta nutritiva an nutritiva.

Alimenta dupliciter accipiuntur.

Pravi ac crudi fucci quæ.

Venena quæ modo aliqui nutriunt.

Prava & difficilis concoctio alimentum substantie præstante proprietate.

Dulcia non nutriunt.

Alimenta cuncta dulcia.

Ari radix non nutrit.

Huicca vocatur Indi alimentum.

Auctores veteres de re herbaria.

Theophrastus.

Theophrasti interpretes Thoma Gaza.

Lul. Cas. Scal. qui Græce lingue atque Latine peritioris fuit.

*Arst. lib. de
de Plantis.*

que optima ratione castigavit. Aristotelis adscripti libri duo de Plantis ab eodem Luc. Cesare Scallero explicati sunt. In his multa non contentenda quaedam quodque improbanda, quae ut diligenter studio semper, ita saepe nimis cuncto etque fabuliter a Scaligero animadvertuntur. Redacti Dioscoridis Anazarbei, qui miles atque Medicus sub Antonio & Cleopatra vixit, de Medica materia non vix extant libri, quorum quinque prioribus Striptium, quae suo tempore magis in usu erant, facultates praecipue absolvit brevier ac summo studio, non omnibus erant descriptionibus, quae non ita ubique occurrerant. Quae autem erant vulgariae notitiae non descriptit, unde factum est, ut eas quarum vires nobis monstravit, adhuc ignoremus. Dioscoridem primum Latine reddidit doctissimus Hermolaus Barbarus addito etiam corollario, quo autorem hunc multum illustravit. Post eum Marcellus Virgilius pra industria & eruditione, adiectis etiam commentariis elegantissimis: tandem Ioannes Ruellius, cujus verho nunc omnium fere manus tenitur. Scribere in eodem libros commentaria plures alii, fed copiosissimus Petrus Andreas Matthioli Senensis, apopositis quibus plurimum Striptium iconibus, tam veteribus descripturum, quam a recentioribus & seipso usurpaturum ad varios affectus humani corporis. Hic castigandis aliorum erroribus ita fere totum tradidit, ut proprios, quos plures commisit, quorum magna pars a Melchiore Guilandino viro eruditissimo, nec parum in hac Philologia versato, quantum epistolis in hac versatur, propemodum neglexit. Cuius Plinius secundus in Historia multo plerique, ad duodecimum scilicet usque ad vigesimum septimum, descriptiones, locos, usus, virtutes, & reliqua accidentia Plantarum, quarum apud autores, qui ante eum florere, ac fua quoque temperare extiter, facta est mentio, tam brevier perscrutavit, ut saepe propter sententiae ac phrasim brevitate non intelligeret, nisi autores praefertim Theophrastus & Dioscoridem, ex quibus plerique transcripsit, consuleretur. Correperunt hunc atque elucidarunt Hermolaus Barbarus in Castigationibus, Stephanus Aquinas in Commentariis, & alii celeberrimi viri: sed in primis nostro tempore Iacobus Dalechampius auxilio veterum codicum manuscriptorum, atque collatione autorum antiquorum, quibus Plinius usus est. Galenus undecim compulsi libros de simplicibus medicamentis, in quibus plerique de Striptium facultatibus primis, secundis, & tertiis generaliter agit, ex secundis primas investigando. In his nil fere quod non apud Dioscoridem inveniamus, imo quaedam omittuntur necessaria. Hos Galeni libros Paulus Aegineta in compendium rededit. Secundum ordinem Alphabeti Plantarum facultates atque descriptiones e Dioscoride in sua Collecta transtulit Orisbalus. Lucius Aplejus Madaurensis librum edidit de virtutibus Herbarum, item Aemilius Macer Veronensis verbis hexametris. Plurimum quoque Arabes hanc scientiam locupletarunt, Rhafes, Serapion, Mesius, Avicenna, & alii ignobiliores, qui praeterquam quod Graecis cognitas Herbas in suos libros renulere, novas etiam quam plurimas describere, ac earundem vires tradidere. Averroës in quinto colligit

infigniorum Striptium facultates secundum Galenum ordine Alphabetico prosequitur. Inter recentiores summo studio ac diligentia de natura Striptium tres libros amplissimos publicavit Ioannes Ruellius, in quibus accurate cuncta ex variis scriptoribus, Latinis praefertim ac Graecis, qui ante ipsum fuere, collegit. Nam praemis communibus quibusdam praecipis & animalium verisimilibus ad formam, vitam, generationem, cultum, & alia accidentia pertinentibus, mox ad particularem cujusque speciei tractationem devenit. Hac temperata etiam floruit Hieronymus Tragus, atque ejus avulus Leonardus Fuchsius, excellentes ambo viri, qui libros posteris de eadem materia reliquere adiectis iconibus. Sed Fuchsius magna ex parte descriptiones vireque suarum Striptium ex veteribus mutatas est in toto primo; nam alterum figuris depictis, ac nomenclaturis tantum illustrat: Tragus autem magnam Plantarum numerum in Germania fere nascentium paulo ante Fuchsiu edidit, quarum formam, tam generationem, vires cum veteribus cognitas, & vulgarum experientia inventas, examinavit atque indicavit. Hoc mortalibus satis laudare possum. Vtinam hoc omnes qui post & ante ipsum, amplexi fuissent. Etenim si nostro tempore tantum studi collocarent Herbari in examinatis Plantarum novarum, quarum picturas nobis offerunt, viribus in descibendis earum formis ac generationibus ponunt, profecto melius valeatundum humanae consuleretur. Ideo montes aliaque loca visenda sunt habiturilicet, quo facilius cum colonis inear gratia ac societas, obvi quique consilium, montium incolae adveniunt, ut usus & facultates aliquae earum Herbarum, quarum descriptiones nuper a doctis viris tradite sunt, cognoscantur, et si quae ab uno prius indicata sunt atque a pluribus postea confirmata, in observationum libro sunt annotanda. Sed ad rem redeamus. Fuchsiu atque Tragum secutus est Matthiolus, qui Dioscoridem commentariis illustravit; icones etiam non modo elegantiores, fed & plures, quam priores novarum Plantarum apposuit, quarum non praeterita ante incognitas qualdam vires. Scripsit Rembertus Dodonaeus post hunc Historiam Plantarum elegantissimam triginta libris conclusam cum iam imaginibus, in quibus novae nonnullas quoque videre licet. His alias adiecti Matthias Lobelius in suo Herbario, quod etiam cum Imaginibus edidit: item Petrus Pena, qui una cum Lobelio adversaria cum iconibus divulgavit. Carolus Clusius Atrabas hoc tempore plurimumque alius huic studio deditus novae Stripes plurimas, quas in Pannonia, Austria, Hispania summa diligenter & cura observavit, pictas aliquot libris divulgavit, quos annis ab hinc paucis in magna volumine congegit, quod pluribus novarum Plantarum descriptionibus & picturis locupletavit. In eodem volumine de Fungis cunctissimum tractatum videre licet: itemque Plantarum omnium in monte Veronensi celeberrimo, quem Baldum vocant, nascitum catalogum, quem Ioannes Pona Pharmacopaeus Veronensis in Striptium cognitione veratissimum composuit. Idem Clusius hoc anno

*Io. Ruellii de
natura Striptium libri.*

*Hieronymus
Tragus.*

*Christophorus
a Costa
Nicolaus Monardus.
Coronae ab
Horto.*

Petr. Relandus.

Andr. Caesalpinus.

*Dalechampius
historia Plantarum.*

Caspar. Bauhinus.

Iac. Tabernaemontanus.

Dodonaeus.

Leopoldus.

P. Pena.

Carolus Clusius.

*Ioannes Pona.
Aegyptiacae
Guilandinae.*

anno libros decem exoticorum in lucem protulit, in quibus de Plantis peregrinis, atque Indicis plurima. Hic etiam aliquot autores aliena lingua praeterquam Latina conscriptos ad hoc studium utilissimos in Latinam linguam vertit: Christophorus Acosta, Nicolaus Monardus, & Garcia ab Horto; qui Proregis Indiae Medicus fuit, duos libros de simplicibus apud Indos nascentibus, quos in Epitomen contraxit, ex Hispanico idiomate. Petri etiam Bellonii, qui de Arboribus Confisieris librum conscripsit, pulcherrimas observationes e Gallicis Latinas fecit. Libros sedecim de Plantis Andreas Caesalpinus Aretinus, Medicus & Philosophus in Italia suo tempore celeberrimus, nuper luci dedit. Nomina Plantarum, quas descripsit, ut plurimum indidit Hierusca, usque libenter pro Latinis usus est. Idcirco difficilis paululum est, qui Striptium vestigandum causa non videri Hieruscos agros, nec alios, qui Herbarios cum iconibus multo nomenclaturis ediderunt, prius insperarent. Descripsit hic propriis verbis singulas species diligentissime: mox an ea veteribus cognita sit ostendit: demum si quippiam is sit vitium, hanc ita prioribus scriptoribus cognovit, subnectit. Universalis Plantarum Historia, quam cetero Iacobus Dalechampius inchoavit, ac imperfectam nobis reliquit, ceteris, qui ante hanc editi sunt, Herbaris anteferae sane est, etiam si imperfecta sit. Nam duo magna ejus volumina, plurimis scaten erroribus, quos Typographi, atque ii, qui hanc transcriberant & imprimendam dederunt, commiserunt. Notantur hi singularem libello, quem de erroribus Historiam Plantarum generalis inscripsit Casparus Bauhinus. Imagines magna ex parte huic Historia inseruntur: item Striptium, quae describuntur, in quibus multae antea incognitae, tum nostrates, tum peregrinae ex India utraque delatae. Conferat hic doctissimus autor diligentissime antiquos scriptores inter se, ac multa eorum loca depravata majori quam alii judicio, ac multo felicius restituit. Tandem Iacobus Tabernaemontanus, qui Tragi discipulus fuit, in hac scientia prius qua priores industria consecutus. Ejus nuper liber est typis traditus, in quo praeter nomenclaturas Latinas ac Germanicas, & picturas, nil aliud continetur. Ostenduntur hoc libro plures Plantae depictae, quam in ullo alio praedictorum autorum: desiderantur descriptiones, & vires; quas audio eum lingua Germanica conscripsisse. Hi sunt praecipui scriptores tam veteres quam recentiores, qui de re Herbaria volumina reliquere, quos praeter legendos iudicavi. Tractavit de universalis Striptium natura Ioannes Costeus Laudensis. Aloyfius Anguillara, qui ante Guilandinum horti Patavini praefectus fuit, placita sua compendiose, & magno cum iudicio conscripta, in lucem protulit, sed Italiam tantum. Extant de hac Philologia aliorum quorundam eruditissimorum scripta, ut Ioannis Thalii, Ioachimi Camerarii, Fabii Columnae, Prosperi Alpini, qui de Aegyptiacis Plantis librum edidit, sed omnes nominare supervacaneum arbitror, cum qui omnes fere desiderant, Philosophos ac Medicos, qui Bibliothecam Medicam ac Philosophicam typis mandarunt, consulerent. His adjungantur scriptores varii, Poetae, Historici, Oratores,

tam veteres, quam juniores, qui obiter mentionem Plantarum saepe facientes, quippiam de vinibus aut natura earundem addere solent, sed maxime, qui de compositione medicamentorum scribere, insipienti iudicet, item qui curationes affectuum corporis humani, qui de re culinaria, & cibaria, inter quos Apicius & Athenaeus imprimis commode: item qui de Agricultura, quam tractarunt Varro, Cato, Lucius Moderatus, Columella, Palladius, & alii, qui de Hippia, & similibus; denique qui miscellanea, adveniunt. Quare si quis hos omnes autores diligenter attenteque legent, ac singula annotanda in suo Florilegio propriis locis se capitibus posuerit, quo facilius memoriae inhaerant, aut promptius, quando lubet, cunctae autorum sententiae reperiantur, is vere excellens in hoc studio evadet. Ad exquisitae perfectam Plantarum cognitionem nullum perveniet, quantumvis laboriosum, humanum ingenium. Infinita nimis earum varietas, in forma, ulso, & ceteris accidentibus: semper novi aliquid asserere videmus fluvios, paludes, mare, montes, campos, valles, arenam, parietes, faxa, prata, vineas, sylvas, incultae, & ut brevier, Europaeam, Asiam, Africanam, Indiam. Itaque si vi la medicinae in parte magis Hippocraticis sententiae veritas elucet, vita brevis, ars longa, sane in hac maxime, quae ad Medicum nam imprimis pertinet. Nolim tamen in Scientia Herbaria, quemquam deterreat rerum discendum multitudinem. Quisquis in ea tantum proficiat, quantum ad suam scientiam excolendam & exornandam necessarium est, nisi quis fere totum huic studio tradere velit. Medici haec Galenus: *Medicus ut omnium Striptium, si fieri potest, peritiam habeat: cosule, si minus, plurimum sciam, quibus frequenter utimur, sunt autem ipsarum genera, vel si sic ea nominare velis, differentia haec, Arbores, Frutices, Herbae, Spinae, &c.*

C A P. XVIII.

Florilegium quid; ejus consiciendi modus, & ordo.

Q Voni am autem Florilegii facta est mentio (sic enim soleo libros appellare, quos alii collectione, nonnulli locos communes, quibus inscribunt cuncta notata digna, quae ad rem hanc spectant, five ab autoribus, five ex aliorum observatione, ac didicis, ut facilius tantorum rerum multitudine & varietate observata in memoria habeantur, si quando de re quapiam disputandum est) operae precium existimavi modum atque ordinem locos communes componendi vobis praeficere, qui jam paululum hanc scientiam degustatis, atque eadem inestati estis. Nam proflus rudibus haec erunt inutilia, quae nunc dicam de Florilegio. Libros chartaceos fex, aut septem, aut octo pluresve capite (prout vultis istos extendere, ac diffusius observanda adiutare) ex viginti quibus folis constantes, & quatercenties vulgus chartariorum vocat. Ex his fiat volumen, cujus foliorum paginae facies, tam dextra, quam sinistra, doctus per longitudinem interfecerit lineis, quibus medium faciei intercludatur, & tria loca diversa ejusdem magnitudinis constituantur in utraque paginae facie. Inscribentur supra in fronte singularis locis sui tituli, qui tres erunt, relicto tergo paginae omnis inscriptionis vacuo, donec frontis

scriptis observationibus repleta sit. Tunc enim, & tergo eadem inscriptiones inscribenda suis locis, & nova charta, si opus, addenda. Volumen hoc in tres partes dividatur: prima contineat, quae de Plantis in genere dicuntur; altera singulas Plantarum species complectatur: tertia quaestiones, quas tamen etiam poterimus, si lubet, praedicaturum duarum partium locis inferre, ad quos pertinere magis videbuntur. In his tribus prius agendum historice, mox Philosophice, ut i cause omnium quae in historia enarrantur, doceantur: sic difficilissimum Theophrastus historiam à causis separavit. Hunc autem ordinem in primis laudare debeo, eo quod si aliquis Commentarios de hac materia exactissimos scribendi desiderio teneatur, statim paucis mutatis, eadem serie cuncta, quae annotavit, describere ac in libros congerere facile possit. Hinc quoque perdifficiles quaestiones, quae multorum autorum indigent testimoniis, quaque diligens examen requirunt, eodem ordine sunt tractandae: ne dicendorum serie in prioribus libris (in quibus breviter opinio de similibus controversis animadvertenda) interrupta, & lectio mentem à proposita re avertant, ac in morosissimam lectionem deducant. A forma Plantarum in tribus partibus semper incipiendum est; deinde ad accidentia deveniendum, quo nomine generationes, affectiones, loca, vitae, ususque comprehenduntur. Forma enim accidentis nobis notior, à notioribus nobis in hac Philosophia procedere oportet.

C A P. XIX.

Tituli quales; quo ordine in locis Florilegii scribendi.

Tituli vero primae partis Florilegii tales fere sunt, eoque, quo hic leguntur, ordine disponantur. Quid sit res, aut Philosophia Plantaria: ejus antiquitas, dignitas, praestantia, utilitas. Inventores, & in quot partes haec Philosophia dividatur. Scriptores rei Plantariae, Graeci, Latini, Arabes, & alterius idiomatis. Subiectum ejus, & quid sit Planta. Ejus differentiae ut sumatur: quantum ab animalis differat. De partibus Plantae propriis, communibus, earum definitione. Partium simularum differentiae formales, & accidentales. Partium dissimularum communium differentiae, & earum partes aliae. Partium propriarum communium dissimularum differentiae. Plantarum divisio in summa quaedam genera. Quid Arbos, Frutex, Herba, Oler, Frumentum, Legumen, & ejusmodi. De Plantae actione, & ejus facultatibus. Plantarum generatio quot fiat modis; quae sponte, quae è semine. Terra, locus, tempus anni, sidera quid conferant ad generationem. Terrarum locorumque differentiae. Semen quomodo terrae mandandum, & quando. Quamdiu semen duret ut terrae mandari possit. Quo die è semine quaeque Planta erumpat. Quae partes primum è semine prodeant, & quae serie omnes nascantur. De Plantarum augmento, & perfectione. De fructuum maturitate. De alimento, & excremento. De succo, lachryma, gummi, eorumque differentis. Plantae, quae aliis inascantur Plantis. De Vita, & quae longioris, ac brevioris. Terra, locus, tempus, anni sidera ad vitam quid conducant. De annuis Plan-

tis, & perpetuis. Partes quoque diutius in vita perdurent. De radice perpetuis. De caule, & ramis perpetuis. Quae nunquam perdunt folia, flores, fructus. Abortus; Monstra. Plantarum mutatio in alias species. Partium mutatio, foliorum, florum, & aliarum partium. Contractio, apertio & similia. Odores Plantarum quot: & quae odoratae, quae inodora. De saporibus, & eorum differentis. Quae saporem habeant, quae non; & qualem: Item paucis Plantis eundem saporem per omnes partes diffundi, ut & odorem. Sympathia, & antipathia. Morbi intrinseci, & extrinseci, communes, proprii. Animalia quae in Plantis generentur. Quae aliunde genita noxam Plantis afferant. De interitu totius Plantae, & partis alicujus. De cultura. Quae sine cultura vivere nequeant: Item quid sint agrestes, & mites Plantae. Arandi tempora. De fossione. De Rigatione. De Stercoratione. De Transplantatione, & reliquis similibus culturae operibus. Infitio, inoculatio. Infrumenta ad culturam. Remedia ad morbos. Usus Plantarum in homine, & primum de alimentis, de medicamentis. Facultates earumque digestio. Planta quae tota, quo tempore ad usum colligenda, & quomodo servanda: tempus, & modus colligendi ac servandi earum partes: ad quae, & alia pharmacopoeorum & unguentariorum opera pertinent, quae quique in plura capita dividere poterit, ut etiam usum in brutis, atque inanimatis. Materies quae fabris, quaeque igni conficienda idonea: ubi etiam de candelis materia. Tam enim varius est Stirpium usus, atque multiplex, tam varia usus consideratio, ut paucis verbis, ac summum percurrere nequeat. Quod si vero quippiam in reipub. literariae commodum libros de re Herbaria exactissime conscribere velit, atque ideo quoque de causis agere eorum, quae in historiis dicta sunt, eum oportet sub iisdem titulis causas annotare, easque postea eodem fere ordine singulari libro recensere, quod parvo cum labore facere poterit. Secunda autem pars particulares cujusque stirpis tractabit historias, ac causas: hoc est formam; tempus, quo seminetur, nascatur, augeatur, floreat; locum, quo gignatur; culturam, ulum, & si quae sunt alia, quae non cunctis Plantis communia sunt, ea animadvertet, & eorumdem rationes, si pervestigari possunt, subnectet. Ideo singuli locorum tituli singulas Plantarum species continent, quarum multa extat apud veteres & recentiores memoria. Tres, quatuor aut quinque species, quarum natura non admodum adhuc celebrata est, sub uno titulo comprehendat: aut uno generico nomine, omnes species quae sub eo continentur. Verbi gratia, non opus est singulares, ac proprios facere titulos de Fago, de Robore, de Subere, de Illice, sed uno nomine, nimirum Quercus, omnes intelligere, ac significare, alioqui cum sit immensa, & incredibilis stirpium multitudo, secunda haec pars Florilegii in magnam nimis molem excreceret. Paucae admodum sunt Plantae, quae non ad aliquod genus reducuntur, seu nomen habeant, five eodem careant. Ceterum cum credo, & ad doctrinam exactius tradendam, & ad memoriam plurimum conducatur; qualis ille in hac secunda parte, quae tam innumerabilem Stirpium copiam amplectitur constituendus sit, ut facile tituli

*Ordo librorum
scribendorum de re
herbaria.*

tituli reperiantur, docendum est. Video multos qui libros de Plantis particularibus in publicum protulere (talis namque tenendus est ordo, qualis in libris componendis observatur) elementorum, hoc est literarum ordinem, quem alphabetico appellant, dilexisse, Plantis, quarum nominum elementum primum A est; prius positis. Alii à totius stirpis formae differentis ordinem fumentes in quatuor summa genera eas dividunt, Arborem, Fruticem, Subfruticem, Herbam; progrediunturque à perfectioribus, & notioribus ad imperfecta, & minus nota. Sunt autem perfectiores, notiores nobiliorique Arbores Fruticibus, Frutices Creemiis, Creemia Herbis. Nam haec omnium imperfectissima, utpote, quarum magis pars, aut floribus, aut fructibus, aut foliis, aut caule destituatur. Verum quam fit confusus, qui à literarum serie sumitur ordo, norunt ii, qui multa saepe privati quibusdam speciebus indita nomina non ignorant: qui Plantas admodum naturae dissimiles conjungi hac ratione vident: qui nil fere penitus, praeter nominum communium elementa sic memoriae traditi non nesciunt: qui denique à Philosophiae praecipio abhorre hunc ordinem omnino conspiciunt. Laudandi sane sunt, qui à summis generibus ordinem sumunt; quod nullus ordo pulchrior, ac promemoria fructuosior sit, quam qui à forma deducitur. Summa haec genera in plures species communes diffinguntur, donec ad infinita, atque individua perveniant. Theophrastus quoque hunc ordinem servavit: si quidem prius de Arboribus, mox de Fruticibus, deinde de Creemiis, tandem de Herbis in Historia tractat: singulaque haec genera in *ήμισα*, i. mitia, & *άγρια*, i. agrestia partitus est: semperque de mitibus, vel si mavis, hortensibus primum veluti magis notis, mox de agrestibus, tanquam minus notis. Vocat mitia, quae à nobis coluntur, ac nostra opera mansuefunt ciculanturque: agrestia vero, quae sponte sine ulla cultura proveniunt, nec facile aut unquam cicurari possunt. Salsum enim est in aliquot Stirpibus, quod

putant Hippocrates & Plato, Plantas omnes naturae agrestes cultu *σπυρμα*, id est, mansuere, ut ex Pirralto, Olea sylvestris, & reliquis differe licet. In animalibus idem accidere autor est Aristoteles, qui in historia animalium, & libro Problematum scribit, esse nonnullas feras, quae nulla ratione mansueferi possint, ut leonem, pantheram. Porro cum Aristoteles divisionem animalium in mansuetas & fera improbat, quoniam *σπυρμα* formalem differentiam non designat, similibus Plantarum divisio haud multum laudanda. Magis autem perplaceat Andreae Casalpini partitio, qui à fructuum varietate horum generum divisionem secundam fuisse. Est enim fructus pars omnium reliquarum nobilissima, notissima, ipsa denique Plantae perfectio, & ob quam magna ex parte quasi à natura conditae Stirpes videntur. Pulcherrimus sane hic ordo, multumque cum Philosophiae legibus consentiens. Sed & à radicum differentis non minus utilis ordo colligi potest, quam à fructuum. Etenim docet Plantae partem, ejus contemplatio saepe ab hujus studii anatoribus praetermittitur, quam quia non ita ut reliquae partes sub conspectum cadat, sed terra occultetur, ac ratione fructu ignobiliora censent, minime notam nobis. Prius tamen nota nobis radix esse debet, quam ceterae partes, quod sit omnium Stirpium principium, nec ulla pars communior omnibus. Verum quia de fructuum & radicum differentis satis superque dictum est, non erit opus ea repetere, ut titulos hujus secundae partis Florilegii recensamus, cum ex iis quisvis in hoc studio paululum versatus, haec accipere poterit. Quid si vero cupiamus novos titulos condere, difficultatem pariat, is libros Casalpini, quorum nunc facili est occasio, perlegat, atque ex ejus ordine titulos tot quot velit deducat. Peregrina autem plantarum quarum pars aliqua, quae magis utimur, tantum cognita est, singulari sunt titulo complectenda, ne, qui praedictum ordinem rumpere nolit, has negligenter omittat.

FINIS SECVNDI LIBRI.



ADRIANI SPIGELII
BRUXELLENSIS
EPISTOLÆ
QVÆDAM.

EPISTOLA I,

An Animal sine corde vivere possit?

Ad Perillustrem Virum,
D. GVILELMVM SIOHERVM,
Amicum suum.



In cœna nudius quartus nobiscum ita locutus es mihi Sohère: Quæ ista est tam diligens eruditio virorum commemoratio? quæ digna vel Ciceronis commentariis historia, ut bovem sine corde vixisse narrent? Subiunxi ego quod inferre volebas, potestne bos excors vivere? Proh hominum fidem! Potestne, inquam, bos excors vivere? Adferat quisque quod velit, immolante Cajo Casare in tauri opimi exitis cor non fuisse; adijungat etiam in iis animalibus, quæ exanguia sunt, cor non inveniri: nunquam tamen mihi persuadebit cor ulli animalium quod sanguinem habet, unquam defuisse. Magna, inquit, Caji Caesaris auctoritas, magnumque testimonium. Dic igitur fodes, inquit, quo avolvit? quis id, dum bos mactaretur, abstulit? quis, dum immolaretur, eripuit aut arte furatus est? an larium aut decuram aliquis, quos ipse Imperator tunc temporis coluit, id ipsum eripuit? aut cor aliquo morbo consumptum ante mactationem opinari licebit? Nullo modo, inquam; sed copiosa pinguedine sua in tauri viscibus ita fuisse occultatum, ut omnino exta immolanti Casari, non autem diligenter velut Anatomico perscrutanti, non comparuerit: præsertim cum animalia sanguinea quo pinguiora sunt, eo quoque minus hoc viscus habeant. Neque id tibi mihi videri debet, cor in pinguibus animalibus latere posse: Annis enim superioribus, plurimis in Theatro Anatomico monstravi, cor thrustiohameli tanta pinguedine obsum, ut facile Anatomæ minus perito Imperatori fidem facere potuisset etiam huic avi cor defuisse. Tanta enim est ad vitam animalium sanguineorum necessitas, ut Peripateticorum Princes etiam iis quæ sanguine earent, cordi proportionem respondentem partem assignaret. Cor esse in omnibus, quæ id habent, quod ultimo mortium, experientia quotidiana monstrat, & in omni animali corde vulnerato profunde vel ablato mortem illico consequi. Quapropter ut mundum sine sole constituere naturæ non licet: sic animal, quod sanguineum est, sine corde formari non potest. Quod clarius cognoscas, si mecum actionem pro-

priam cordis, quam aliquando in publica anatome auditoribus proposui, tecum repetes. Vale, Patavii, XVII Junii MDCCCXXII.

EPISTOLA II,

An cor Germanici Cæsaris cremari non
potuerit, & cur Morbo cardiaco
& veneno interempti signa.

AD EVMDEM.



Quoties Vitas Cæsaris perlegis, quas Cajus Suetonius edidit, toties scribis te admirari ea, quæ scripsit de Cæsaris Germanici morte, scilicet ejus cor (cum corpus de more Veterum post obitum cremaretur) comburi non potuisse. Ego profecto, ut verum farcar, sapius de veritate hujus historici dubitavi, cum viderem cor non ex aliis constare partibus, quam iis, quæ cremari possunt; carnis nempe, venis, arteriis, membranis, & pinguedine. Sed cum ego quoque in alios gravissimos auctores incidissem, Cajum Plinium, qui lib. xi, cap. xxxvii Naturalis historię, cor Germanici Cæsaris cremari non potuisse testatus est: & in Tacitum Thuanum nostri temporis nobilium historicorum referentem in bello, quod Helvetii inter se gesserunt pro religionum mutatione, Tigurinis vix, Zuïnglium quandam fortiter pugnantem in primis ordinibus occubuisse: religioni, ut ipse ait, tributum à Tigurinis & qui cum illis stabat, quod cadavere flammis ab hostibus tradito cor exuri non potuerit: ad causam aliquam, quam petis, potius confluere: fuit coactus, præsertim cum veterum nonnulli & recentiorum expostulasse eam, & invenisse viderentur. Etenim Plinius ad duas causas videtur retulisse, quod cor Germanici Cæsaris cremari non potuerit. Nempe vel ad morbum, vel ad venenum. Negatur, inquit, cremari posse iis qui cardiaco morbo obierint. Nec contra genere morbi defensus est Piso. Recentiores nonnulli id cordium proprietati adscripserunt, cum constet, in quibusdam corporibus humanis partem esse quamdam, in quam nil ignis possit: sicut de majori dextri pedis articulo Pyrrhi Epirotarum regis memoriam aique frigidæ æstatis tempore ingreditur. Congelatur vero in vas, vel quia crassius est, vicidius, lentius,

Plinii

Plinii causis curiosius explicare, & indagare an morbus cardiaco aut venenum ignis vim in corde tollere possit, ut ejus substantiam mutare. Sane prius est explicanda oratio, ut ea debeat intelligi. Equidem exitimo temporis tractu horum virorum corda cremari potuisse, sed longe diutius quam alias solet igni resistisse, ac sic superstitiose id fuisse animalversum, aut hyperbolice à nostris majoribus enarratum. Ita quoque de Salamandra creditum fuit, canente Q. Sereno Sammonico.

Ser. Salamandra petens nullisque obnoxia flammis.

At Aristoteles Salamandram per ignem ingredi non ex viâ, sed ex auditu prodidit; ut & Dioscorides; proculdubio quod cæteris animalibus magis igni resisteret. Imo si tantum ignis apponas, aut carbonum accensorum, quantum satis est ad comburendum & encandam lacertam communem, vel grandiorum serpentem, videmus ei vix quicquam noxæ accidere, sed ignem potius extinguere: sed si plures carbones accendi addantur, istaque magna flamma, etiam Salamandram comburi. Hoc quotidie observare unicuique est commodum. Idcirco Galenus lib. xv de compos. medicam. secundum loca, cinerem Salamandrarum præscribit in medicamentis; & lib. de simp. medicam. facult. Salamandram combustam. Sunt itaque de corde incombustibiles, ut de Salamandra hyperbolice scripta. Quapropter inquirendum, quomodo cardiaco morbo & veneno potuerit cor Cæsaris Germanici diutius quam alia corda igni resistere. Ego existimo copiam sanguinis præcipue viscidæ, lentæ, mucosæ & crudi id posse efficere quotiescunque nimio opplentur sinus cordis tam dexter quam sinister. Nam si inspicias modum quo cadavera cremantur, id plane redderet probabilius. Etenim quando primum omnes partes uruntur, externæ prius cremantur, inde internæ. Itaque si plenum id sanguine fit præsertim viscido, mirum esse non debet quod diu igni resistat. Inde patet causa, cur à morbo cardiaco mortuorum cor non tam cito, quam aliorum comburatur; in eo enim morbo sanguis externas partes relinquens ad interiora rept, & maxime ad cor. Quod facile eo probatur, quia exteriores partes in eo frigeant, interiores caleant; pulsus quoque iis sine parvi & vermiculantes, & priusquam adveniat passio etiam intercepti. Præ copia enim sanguinis in sinibus cordis contenti mori citi, contingit suffocari ægros, & dialthes mori, nisi ipsi sanguinis missione succurrant. Notæ sunt historię ab hoc affectu mortuorum, quæ cardiacam fynopen nonnulli appellaverunt, in quibus venæ cavæ & arteriæ magnæ truncus sanguinis concreto plenus fuit, qui alias in mortuis concretere non solet. Exiis enim incisus oblonga sanguinis coagulati pars unita extrahatur. Porro fuit hic sanguis ad cor & cordi vicinas partes, vel quia impellitur aut à frigidis assumptis, aquæ videlicet frigide potu (a quo non pauci post valida exercitia vel aliunde calefacto corpore de repente sunt extincti) aut ab externis admotis, ut quando menstruata mulier balneum aquæ frigide æstatis tempore ingreditur. Congelatur vero in vas, vel quia crassius est, vicidius, lentius,

melancholicus; vel quia fit supra modum refrigeratus ab internis & externis. Venena quoque id faciunt; ut ob hanc causam non fuerit à ratione alienum, quod de Pifone suspicabantur, cum Cæsarem Germanicum veneno infusuisse, contingit enim id quoties spiritus & sanguis in arteriis & venis refrigerantur, & ingens ejus copia va utrunque implet. His igitur de causis fieri potuit, quod cor nonnullorum difficulter potuerit cremari. Iis etiam adjungam signa, per quæ medicus cognoscere poterit an qui mortuus est à sanguine concreto in venis, propter venenum fit mortuus, an propter morbum. Venenum quod cito hominem de medio rodit, profundum somnum inducit; hoc ingravescente excitatur quidem æger, non relevatur: sed tarde ad mortem properat. Quod si venenum ad tempus fuerit datum, paulatim conglobabitur & coalescet sanguis, & cum omnia vasa non obstruat, quædam propter acquirat acrimoniam aperiet; ut propterea concretus sanguis & narius prodeat, aliquando etiam ab eo extrahatur. Hi tamen, ut bene animadvertit Petr. Salus Diversus lib. de Affect. partic. cap. iv, liquato hoc sanguine & proprio calore resolutio moritur. At quæ à cardiaca fyncope communitur mors supervenit, longe alio modo accidit. Vale.

EPISTOLA III,

De

Incerto tempore Partus

Ad Incltyros Germanos in Gymnasio Patavino VALL. Studiofos.



Nec eos sermones, qui in convivii Nobilium, & Iuris Medicinæ peritorum hominum adferri solent, animadverti sapientius quæsum dubitatumque, an Mulier præter partumque, octavum, novum, ac decimum menses, alios habeat; quibus legitime factus humanus in lucem prodire possit? Vtilique omnibus, ac gravis, imo & perdidicissis visa hæc quotiescunque tempus. Nam si præter nominatos menses non sint alii, recte erit legibus imperatoris sancitum, septimo mense natos post patris obitum, vel octavo, nono, aut decimo, legitimis tantum censeri debere bonorum paternorum heredes; cæteros vero spurios & exheredes: sin etiam spatio duodecim, tredecim, quatuordecim, quindecim mensem uterum ferre mulierem posse dicamus, reprehendendus tum Vlpianus, qui post decimum mensem editum nullum ad hereditatem admittit; tum alii qui, si forte contingat à primo nuptiarum die, sexto mense nasci infantem, oppugnant pudicitiam honestarum virginum & viduarum; renunciant iis repudium, quas fœmister credunt ante primum mariti congressum ex alio concepit. Sed & perobscura cunctis apparet hæc questio, tum propter funum philosophorum & medicorum contradicendum sibi auctoritatem, tum propter mulierum & obstrictum Historias haud satis approbate fidei, causarumque

Quæstio iustæ.
151.

vari

varii temporis partus incomprehensibilem naturam. Ego autem cum longe aliter de pariendi tempore sentiam, atqui illi, qui hæcædem quæpiam de eo publicis scriptis sensisse videntur, statim, unica hac Epistola meam opinionem, vestrum quorundam iussu parens, perscribere.

Imprimis autem scire convenit partus tempus, aliud esse naturale, aliud præter naturam, antiquam utriusque temporis causam proponatur. Partus tempus naturale illud appello, quod folet à mulieribus ut plurimum observari, quale est, quod terminum habet à septimo mense usque ad decimum, forte etiam undecimum. Nam Arist. Hist. de animal. lib. vi. cap. xv. ait, nonnullas mulieres undecimum mensem attingere. Per menses intelligendi sunt illi, quibus lunæ cursus complectitur. Sed non est necesse, ut exacti hi omnes cursus compleantur, veluti Paulus vester lib. iv. sent. tit. ix. putabat, quando dicit *naturum septimo mense pleno ad xij. trism liberorum acquirendum prodesse matri*. Sufficit enim interdum, ut hocce mensem partus attingant, vel ingrediantur. Ita Hippocrates in lib. de septimestri partu inquit: *Septimestris autem nascuntur diebus centum, & octoginta duobus & dimidio & insuper accedente die partu. Si enim primi mensis dies quinquaginta superaverit, deinde quod mensem dies centum quingenta septem ac dimidium. Tu undecimæ enim diebus quam proximè duo menses perficiuntur. Ite igitur si habentibus ad septimum mensem fuerint dies plusquam viginti, & est ita iuncta dimidi anni una cum aliquantula die parte ad partum accedente. Neque computare oportet primum mensem conceptionis integram, sed mutilum, aut dimidium pro integro quousque. Statuatur enim mulier, quæ (exempli gratia) hujus quindécim, vel sexdecim dies mensis lunaris, qui sequuntur ulque ad novissimum, pro integro mense lunæ reputandis; ita ut primus mensis fit quindécim, vel sexdecim dierum, reliqui vero quinquæ, qui sequuntur in septimestri partu, pleni esse debent viginti novem dierum cum dimidio. Septimus rursus ut sit integer atque plenus non est necesse: dummodo excedat quindécim vel sexdecim dies; aut, ut loquar secundum Hippocratem, viginti dies habeat, qui computati cum diebus quindécim, vel sexdecim primi mensis, quo facta est conceptio, efficiunt integram mensem qui sextus est paucis diebus superabundantibus, septimi mensis initium constitutibus, quibus septimestris fit partus. Quod ær nobis clarius explicandum, ne incidemus in eorum opinionem, qui putabant plures pro septimestri partu, ut primus mensis conceptionis esset trium vel quatuor dierum, & septimus rursus unus, alterius aut plurium dierum, quibus fit partus. Exempli gratia: Conceptus fit aliquis penultimo Martii, qui in lucem ædri primis diebus Septembris, hunc illi septimo mense natum arbitrantur, & sic quinquemensem natum, prout loquuntur nostræ femine exactis quinquæ mensibus secundum usum nostri Calendarii cum pauculis diebus reliquis; vel, ut clarius adhuc loquar, c. l. x. die natum septimestrem esse concluderent, quoniam ab eo attinguntur primi mensis pauculis diebus ultimis, & postremus, qui ipsi appellatur septimus suo initio, quinquæ*

mensibus intermediis solaribus, aut lunaribus integris.

Tempus autem præter naturam illud statuo, quod ante septimum, vel post undecimum mensem solet nonnunquam, etiam raro, contingere. In hoc præcoces partus, qui ante septimum sunt, ab abortu distinguendi sunt; quoniam & hi iidem temporibus evenire putantur. Abortus est immaturus factus exclusio, partus vero maturi. Maturitatem factus non illam intelligo, quæ angulis circumscripta terminis, factus humani fummi in lucem perfectionem continet, quam in factu maxime sano, & naturali tempore excludo videmus; sed quæ latioribus terminis contenta id habet perfectionis, quod sufficit, ut factus in lucem editus pervivere per plures dies, vel menses, vel annos queat; etiam si prodierit in lucem non integre conformatus, siue unguibus, siue pilis, siue palpebris, aut labris, aut auribus nondum disjunctis, siue fistulatis, vel in quibusdam partibus vix inchoatis ossibus, quæ imperfecte nec solent laborare illi, qui ante septimum mensem, & in septimo pariuntur. Sic rursus abortus non modo secundo, tertio, quarto, quinto & sexto mensibus accidit; sed etiam septimo, octavo, nono, atque decimo contingere quoniam; ita tamen, ut illi abortus sit factus naturalis tempore, ita vero præter naturam. Nam qui factus naturali tempore erat excludendus, hic quoque naturali tempore poterat esse abortus ante septimum mensem; qui vero non naturali tempore partum excedebat ultra undecimum mensem, hunc etiam existimo abortum posse appellari in septimo, vel octavo, vel nono, vel decimo mense si excludatur. Porro quod quinto, vel sexto mense à conceptu partus evaniant vitales, docent historie non ignobiles clarorum virosum, quod paulo ante nostra tempora floruerunt. Hieronymus Montanus Henrici 111. Galliarum Regis Principem novit, qui cum quinto mense natus esset, nihilominus ad floridam ætatem pervenit. Cardanus uxorem Petri Sormani, ubi Mediolani vivit Creticum vendebat, offendisse sibi scribit filiam Claram nomine, quæ centum & sexaginta octo diebus post abortum masculi quadrimetri Venetiis prodierit in lucem. Ferdinandus Mena scribit haud absurdum videri debere, si quinquemestris partus vitalis editus fit apud Valentinos. Apud Madriti incolas nonnullos observatum fensit ex pudica matre, honestissimamque vivendi rationem observante natum esse quinquemestrem. Franciscus Vallesius quinquemestrem puellam refoit suo tempore duodecimum ætatis annum ingressam fuisse. Sed existimo hocce quinquemestres natos fuisse omnibus mensibus quinquemestris, ita ut in sextum mensem ex peracta non fuisset tempore duodecimum ætatis annum ingressam fuisse. Sed existimo hocce quinquemestres natos fuisse omnibus mensibus quinquemestris, ita ut in sextum mensem ex peracta non fuisset tempore duodecimum ætatis annum ingressam fuisse. Sed existimo hocce quinquemestres natos fuisse omnibus mensibus quinquemestris, ita ut in sextum mensem ex peracta non fuisset tempore duodecimum ætatis annum ingressam fuisse.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

Partem tempus dicitur Naturale: Eadem Hipp.

exiguum, & viribus ita debilem, atque offusissimum, ut mater coacta fuerit gossipio circumductum ad frigora fovere, donec robur acquisiverit, quo posset falsici circumligari. Neque hæc omnes historie contradicunt auctoritati Aristotelis, qui lib. vi. i. Histor. de Animal. cap. iv. scriptum reliquit, factum qui maturius quam septimo mense prodit, nullo pacto vitale esse. Cum enim id rarissime contingat in tanta hominum multitudine, nasci nempe hominem sexto mense, nunquam contingere Philosopho dixit, aut sane non naturaliter, sed ex accidenti. Similiter post undecimum mensem natos fuisse multorum quoque & veterum, & recentiorum narrationibus comprobatur. Autor ejus libri, qui Historia philosophica inscribitur, & inter Galeni libros spurios circumfertur: *Timæus*, inquit, *duodecim menses partum gestari credidit: novem tamen eos interdum existimari, interdum & septem, quia non semper statim à conceptione in se intra septimum. Nec videtur ab hac sententia Homerum abhorruisse in Odyssæe undecimi huius carminibus, quibus Neptunus Nympham alloquitur à se compressam.*

Χαίρει πάρα Φιδέη, μετὰ τοῦτος δ' ἐναυρὶ Τέκος ἔσθ' ἄρα τὰς, Λέγει μὲν γὰρ τοῦτον, ἐν ἑνὶ μὲν ἔτος πάλαι σίλοι.

Vbi Eustathius *μετὰ τοῦτος δ' ἐναυρὶ* interpretatur *supra septimum*, id est, anno exatō, aut completo. Sed Phavorinus Philosophus apud Agellium vult significari affecto anno, non concepto: vel annum Homeri temporibus non fuisse duodecim mensem, ut nunc, sed decem, ut olim apud Romanos Romuli tempore: & apud Æolus quoque constat præficus temporibus annum fuisse decem mensem, Homerumque Poëtam in Æolide natum. Verum duodecimo mense naturaliter hominem nasci, quemadmodum opinatur Timæus, id solus partus frequentissimus, qui observatur in multis regionibus à primis nuptiarum diebus, factis redarguit. Nam semper fere cadit in nonum ac decimum mensem, & præcipue in Belgio, ubi mulieres videntur multis aliis plurimarum regionum fecunditate antecellere. Sed quod præter naturam accidere quoque possit, ut factus prodcat maturus in lucem mense duodecimo, etiam nullum adhuc habeam exemplum, non negabo. Quia ultra duodecimum mensem decimotertio, decimoquarto, decimoquinto, prorogari aliquando partum, tum veteres, tum recentiores nobis narant. Lex apud Britannos adhuc viget (quæ eorum monstrat cautam bonitatem non incautam, veluti nuper quidam spectare eruditissimus existimavit) ut maritus jubetur prolem agnosceret hæredemque habere anno post aut amplius natam, quam ipse ultimo ab uxore discessit. Plinius lib. vii. cap. v. *Maffurium*, inquit, *auter est L. Papirium Prætorum secunda herede lege agentem bonorum possessionem contra cum dedisse, cum mater partum se xlii mensibus discrevississet, quoniam nullum certum tempus partendi statum videretur*. Cardanus narrat filia dignam mulierem decimoquarto mense natum quoque peperisse factum cum dentibus, & bene super-vixisse. Ego quoque in manuscripto codice, qui

apud me extat; legi Bellocatum hic Patavii excellentissimum medicum aliquoties in publicis lectionibus narrasse discipulis suis, forem eruditissimum Viri Buccella Patavini per sexdecim menses utrum vitale, & cum omnes eam molam concepisse existimarent, peperisse filium optime formatum. Omnino monitrores partus viginti trium mensem, & duorum, imo etiam quatuor annorum, quorum mentionem fecit Hieronymus Mercatorialis in consiliis. Neque etiam hæc reclamant Aristoteli, quando dicit, qui *disturnere tempore quam undecimo mense nasci videntur, latere putantur: later enim mulieres horum conceptus initium, si cum ante inflatus fuerit uterus, ut sepe accidit, post coierint, atque concepti. Ite enim principium esse sui conceptus existimant, quod simile indicium atulit. Quæ quidem Philosophum non ex sua sententia, sed ex aliorum potius experimentis dixisse in verbis citatis manifeste apparet. Desumptum enim est hic locus Arist. ex libro de septimestri partu, quem alii ad Hippocratem, alii ad Polybum autorem referunt. In eo enim hæc leguntur: *Ceterum quæ longius, quam decem mensium tempus uterum gestare sibi esse sentiant (nam hoc sepe jam audiri) ille ipse hoc modo, quem dictum sum, desepit sunt. Quam uteri partum acciperent in seipso, à ventre statim exhibente elevatur ac intumescit, contingit enim hoc, videntur sane mulieres tum conceptæ: præterea si menses non procedentes congregeti fuerint in utero, & diutius manserint, semper pressant in utero, aliquando una cum statu à ventre, aliquando etiam calentes, & sane tunc quoque in utero habere mulieres sibi videntur, nimirum mensibus non preducentibus, & uteri elevati. Deinde aliquando menses sua sponte erumpunt, aut alio supercipientibus à corpore ad uteros, & priores protrudentibus, & statim egrediuntur: & multis jam statim post mensium partum generationem uteri hiant, & ad pudendum revertuntur, & tunc viris permixta ad se genitum concipiunt eadem die, aut omnino in paucis. Existimant enim inexpecte horum rerum ac rationum etiam illo tempore se in utero elevatis, quando menses non preducent ipsi, & uteri erant elevati ac tumentes. Verum profecto decipere uteros inflatos potuit mulieres ignaras signorum vectorum conceptionis; aut quætas non facile. Nam præter mensium suppressionem & ventris tumorem, adiunt adhuc alia signa conceptionis in utero, rigor à coitu, pudendumque ficitas, & coarctatio, nausea, ciborumque fastidium. Quod si contingat, ut conceptionem aliquando præcedat tumor uteri à flatibus, & mensibus purgationibus suppressis, hic tamen tumor folet evanescere rursus, antequam concipiat mulier. Cautiores enim femines animadvertunt ventrem detumescere, & menses corruptos, qui in utero conclusi detinebantur, expurgant, & flatu prodire: Dein gestimo, vel ochagefimo, vel sexagefimo, vel septagesimo, vel ochagefimo die saltem fetus, qui primus est ejus motus, quando vitam accipit. Et differt hic motus à motu uteri statim adhuc humore corrupto difflenti, quod ille motus est infans cancri incipientis moveri, ut referunt sustinere filii pedibus veluti se defendentes, non tamen moventis de loco ad locum, at hic uteri motus est veluti sublatio atque depressio, si in loco permanset, vel de sinistro in dextrum, vel in contrarium transitus. Quomobrem prudenter Parisenses, ut restant**

Quamvis etiam hoc non restat.

Atque facta qui differre à motu statim.

I N D E X.

- Macies lumbrico lato laboranti u
de, IC
Malabathrum non est sine radice, I

- P.
Palladius,
Palma Christi ab orchide differt, 127
Palms caudex intus continet nervum,
Paneratii radix, 113
Panici femen, 138
Panicum, 124
Pans autopyros, ec6. confectio, 96
Panicis radice, 106
Papaverculum, 98
Papaver corniculatum, rheas, 127. spinosum, 127
Papaveris esu qui afficiuntur, 102
Papaverum genera, 121

I N D E X

- [illegible]

ridis, 140

INDEX.

S. Al Chymicorum, 139. omni insecto inimicum, 127
Salem cur pecoribus obijciat pastores, 141
Salsa inodora, 142
Sallia sapor, 142. caliditatem indicat, 140
Silla, quibus plantis inuit, 120. unde fiat, 140
ex sanguine & lacte quomodo fieri possit, 140
fit lumbricus latus, 94
Sanguis Aristoteli pars animalis, 113
in sauo corpore facienda experientia, 145
ex sapore & odore quae stirpium genera cognoscantur, 121
Sapores boni cum bonis odoribus, 142
calidi frigidi que, 139. mixti, 138. qualiditatem certissimi indices, 139. eadem passivarum, 140. suaves qui, 143
Saporum differentia, 140. materia, quibus singuli inhaerent, 140
Sarsae parillae decoctum in semitertiana, 42. 41
Saxifraga, 121
Saxifragia, 121
Scabiola montana Dalechampi jacea, 127
non est, 128. Pannonica Clusii, 127
Scaligeni opinio de Cremio, 120. de uli florum ac foliorum, 114
Scammoni vires, 38
Scammonium pellit lumbricum latum, 104
Scarabaei in intestinis geniti, 88. odore rosae moriuntur, 143
Serpentaria corallina est, 106
Scientia, & artes quomodo tironibus tradenda, 112
Scientia plantarum qui exacte cognoscenda, 113
Scientiarum omnium studia difficilia, 112
Scirpi junctorum, 123
Scolymus, 131
Scordium, 138. ex aceto, 126
Scorpionum oleum ex descriptione Matthioli, 107. Moribus quae conducant, 138
Scrophularia, 124
Secale, 124
Secundae facultates medicamentorum, & earum investigatio, 140
Sedes humoris in arthritide, 68
Semen augentia, & extinguentia, 136. augentia an flatulenta, 124. plantarum quid, 114
in Semine principium ex quo radix ubi, 116
Seminis generatio, 116
Seminum differentia, 120. umbilicus, 116
Semitertiana, vide, Febris semitertiana
Sempervivi genera, 131. majoris sapor, 139. usus ad inflammationes, 143
Senecionis facultas, 107
Senectus lumbrici lati, 100. quomodo ex cognoscatur, 104
Sene foliis in aceto maceratis expulsi lumbricus latus, 105
Serpentis fetus in ovo posicio, 96
Serrulata jacea est, 128
Sextimeltrium puerorum exempla, 152
Sexa non distinguat lumbricus latus, 99
Sicca plantae quae magis oleant viridibus, 141

INDEX.

Sicca in primo, secundo & tertio gradu, 135
Siccitas cum tenaci materia, 140
Siccitatem indicantes sapes, 127
Sicilianae, 128
Viderit tertia Dioscoridis, 138
Signa aceffionem in arthritide ventris indicantia, 72. arthritidis arabiam indicantia, 72. arthritidis sanguinem, 70. larii biliose, pituitose, sanguinem, 70. arthritidis quomodo tallant, 70. arthritidis Gallicae, 71. causa conjuncta arthritidis, 70. diagnostica arthritidis, 70. lumbrici lati communia, 106. prognostica arthritidis, 72. propter lumbrici lati, 100. recidiva in alium morbum, 129
Sivana, 129
Sivonitana, 129
Similares & dissimilares partes, 113
Sitis qualis in muliere habente lumbricum latum, 102
Smagdi vires contra febrem semitertianam, 41
Smyrni radix mollis, 117
Solonium manicum cerebrum peti, 123
Soldanella non est brassica, 118
Sophonia Plinii, 118
Sotanus dracunculorum animal esse negavit, 93
Spacula ferenda, 139
Spiz lumbrici lati, 90
Spool-worm Germanorum, 89
Spongia rosae sylvestris, 116
Sporonices lati lumbrici exitus a corpore, 104
Stamina floris, 116
Stephanus Aqueus, 146
Stoebe Salamanica Clusii non est jacea, 128
Stoechas citrina herbariorum, 106
Stramonium, 137
Strabellus quid, 88
Strume Plinii, 126
Stylus floris, 116. foliorum, 115
Suber quercus genus, 144
Succi pravi qui, 120
Suffrutex quid, 120
Suffragium contra tenesum, 50
Sulphuris suffragium aer alterandus pro lumbrico lato laborantibus, 108
Suppositoria ad educendum lumbricum latum, 107
Suralis ramorum, 114
Synopas facit lumbricus teres, 100
Syri habent lumbricum latum, 104
Syrupus de floribus persicorum, 108. rosarum laxatus purgat infantes, 124
T. ad Abanos equis infestis quae conducant, 108
Tanacetum Aphricanum auctoris, 125
Tacli. qualitate differentia radicum, 117. caulium, 118
Tactus temperamenti certissimus index, 138
Tania lumbrici lati nomen proprium, 88
degener auctoris, 91
Tania, 88
Tarma Italis veterinariis, 124
Temperamentorum gradus ut cognoscantur, 128
Tepidus Abfryti, 88
Terra intestina valent ad omne genus lumbricorum, 106
Terra Cimolia & Melitenfis, 124

Tertius plantarum facultates alterantes, 135
Tertiarum facultatum investigatio, 140
Tertiana in lumbrico lato laborante, 108
valde tuta, 103
Thapsia vis, 137
Thebanis non est lumbricus, 104
Theca floris, 115
Theophrasti historia plantarum, 145
Theophrasti historia plantarum, 145. de saporibus opinio, locus emendatus, 121, 128, 131. obfcurus animadvertus, 113. locus de populi lumbricum habentibus, 104
Theophrastus animadvertus, 106. cum Galileo conciliatur, 141. filicem gravida mulieri negavit, 106. quae differentias attribuit partibus plantarum, 117
Thesauri cur dicantur ventris lumbrici, 88
Thesauri, 114
Theriac laus ad occidendum lumbrico, 107
Thlaspi clypeatum, 129. Cretili folius quid efficit, 142. genera, 129
Thora non est Aconitum, 131
Thyraces caret lumbrico, 104
Thymica minimum semen ferre, 114
Thymica Heluticorum, 106
Tinearia Marcelli & Scribonii Largi, 114
Tineis similis Afcaris, 88
Tithymalorum genera, 113, 124
Topica quae in arthritide fit administranda, 96
Tormen in ventriculo lumbricum latum habentis, 101. quomodo huic providetur, 107
Tormentilla, 122
Tralliani antidota ad arthritidem, 81. cataplasma, 78. externa medicamenta, 81
Trifolii folia, 119. pratensis flores & fructus, 122
Trifoliorum genera, 124
Trifolium bituminosum, 124. Salamanicum Clusii, 124
Trifolii genera, 124. vulgaris semen quale, 124
Triticum multum nutrit, 144
Trochisci Chamamelini, 41. Plinii Valeriani, 47
Tubera terra nil aliud quam radices, 115
Tulipan lili genus, 125, 126
Typha, 123
V. Aleriole de generatione lati lumbrici sententia, 96
Varro, 147
Valorum differentia secundum magnitudinem, 7. secundum loca & connectionem, 8
Vena plantarum pars familiaris, 113. fibris affimilata, 113
Vena in arthritide secunda, 72
Venarum melariae varum orificia obstruit lumbricus latus, 102
Venenis aliquos educatos esse, 145
Venorum vis, 137. in alterandis cordibus, ut igni resistent, 151. nullum toti corpori, omnia partibus tantum, uni aut pluribus docent, 145
Venosula nonnulla dulcia, 145
Ventre quid perpeffa mulier a lumbrico lato, 101
Vetri

INDEX.

Vetri animalium suillis radix plantarum, 115
Ventriculi officium, 143
Ventriculi genera, 124
Verbenae vis, 105
Veris initio leuciscorum venter non tumet, 99
Vermes brevioris sunt vis, & ex 99. in animalium ventre nascentes lumbrici dicuntur, 87
Vermis lava Lucretii, 88
Vermisul grani tinctorii, 147
Vermisucurbitinus Arabum quid, 91
Vermis Auctori quid, 89. Grammatici quid, 124. omne insectum quodammodo completitur, 124
Vesicaria ad admittenda in arthritide, 73
Vicia legumen, 129
Vidus ratio extra aceffionem in arthritide servanda, 83. in arthritide biliosa, 76. in arthritide pituitosa, 84. in curatione lumbrici lati, 107
Vigiliae non valde accidunt agrotanti ex lumbrico lato, 100
Vincis pervincis vis, 136
Vinis falsidium in lumbrico lato, 101
Vinofus sapor, 138
Vinum quide praefibendum qui lumbrico lato laborant, 108
Viola aurumtalis Gallorum, 125. barbarae Dalechampi, 125. attolia, 124. lutea, 124. mariana, 124. mariae flores frigidi, matronalis, 124
Viola, 124
Vires an ad venae sectionem sufficientes sint quomodo cognoscendum, 33
Virgilius cur Narcissum perperum dixerit, 126
Viridia quaedam cur magis oleant quam ficata, 141
Vinariae vires in sedandis doloribus articulo, 77
Vires brevioris sunt animalia minus dearticulata, 100
Vitam longam habet lumbricus latus, 99. & euri, 100
Vitellus, 116
Vitis annuli, 116
Vmbilici regionis quae medicamenta imponenda contra lumbr. latum, 107
Vmbilici veneris folia concava, 118
Vmbilicus floris, 116. fructus, 124. seminis, 153
Vadecicestrum exempla, 153
Voguenta quae conveniant, in curatione

lumbrici lati, 107. ita argentum non admiscendum, 108
Voguento cur pedus perfunderent antequi, 143
Vnionibus similes scientiae, 112
Vocis intercepto a lumbrico lato, 101
Vomitoria in pituitosa arthritide, 75. quibus fumenda, 39. quibus vitanda, 124
Vomitum aliquando rejicitur lumbricus latus, 104
Vomitus in quibus febribus utiliter infuso, 39
Vrinae sciendi facultas unde, 135
Vitica mortua, 123
Vires brevioris sunt animalia minus dearticulata, 100
Vetus lumbrico lato deest, 99
Walskerb Germanis quid, 89
X.
Xyridis floris, 126
Xyridis floris, 126
Z.
Zinguli ejusdem cor cremari non potuit, 150

FINIS.

